

Glaser  
Botanisches  
Feldherbarbuch.

Preis 5 Mark.

Bot. Diet

HARVARD UNIVERSITY HERBARIUM.


G 46

*Bought*

LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM

HARVARD UNIVERSITY.

BOUGHT.




26 / 11 11

M. 5.

12/20/22

TASCHENWÖRTERBUCH  
FÜR  
BOTANIKER.





TASCHENWÖRTERBUCH  
FÜR  
**BOTANIKER**  
UND

ALLE FREUNDE DER BOTANIK

ENTHALTEND DIE

**BOTANISCHE NOMENKLATUR, TERMINOLOGIE UND LITTERATUR**

NEBST

EINEM ALPHABETISCHEN VERZEICHNISSE

ALLER WICHTIGEN ZIER-, TREIBHAUS- UND KULTURPFLANZEN,  
SOWIE DERJENIGEN DER HEIMISCHEN FLORA.

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. **L. GLASER.**



LEIPZIG  
T. O. WEIGEL.  
1885.





## Vorwort.

---

Das vorliegende Taschenwörterbuch sucht dem längstgefühlten Bedürfnis eines kurzen Ratgebers über die mancherlei, sich immer mehr steigernden Schwierigkeiten des botanischen Studiums entgegen zu kommen. — In dem ersten Teile will es das Verständnis lateinisch geschriebener Deskriptionstexte, lateinischer Büchertitel u. Druckorte und dasjenige der botanischen Terminologie vermitteln, indem es ein Wörterbuch der neulateinischen Kunstausdrücke vielfach griechischen Ursprungs und aller derjenigen wissenschaftlichen und geographischen Lateinworte giebt, welche gewöhnliche lateinische Wörterbücher für klassische Autoren nicht zu enthalten pflegen. — Im zweiten Teile wird die Nomenklatur der Pflanzengattungen nicht nur unserer einheimischen, sondern auch aller eingeführten Nutz- und Ziergewächse der Landwirtschaft und Gartenzucht, der Zimmer- und Gewächshausgärtnerei in möglichster Vollständigkeit etymologisch behandelt, um das Verständnis aller eingeführten Namen zu vermitteln und dadurch deren Behalten zu erleichtern, zugleich mit Andeutung richtig accentuierter Aussprache, in welcher Hinsicht in unzähligen Fällen so vielfach gefehlt wird. Von den Pflanzengattungen wird jedesmal ausser der Worterklärung auch die übliche deutsche, sowie meist auch französische und englische Benennung angeführt, die wissenschaftliche Stellung in dem natürlichen, wie Linné'schen System angedeutet, die Synonyme und betreffenden Autoren angegeben und die wichtigsten Arten der Gattung mit Bezeichnung des Vaterlandes beispielsweise beigelegt. — Die dritte Ab-

teilung giebt sodann die populären und trivialen Deutschnamen der wichtigsten einheimischen und die volkstümlichen Fremdnamen der exotischen merkantil- und technisch-wichtigen Pflanzen oder ihrer Produkte nach ihrer wissenschaftlichen Benennung an, um über dergleichen Namen, wie sie uns in der Litteratur, in Reisebeschreibungen und Zeitschriften oder der Tageslitteratur begegnen, rasche Auskunft zu erteilen. — In dem vierten oder letzten Abschnitt wird sodann die Gesamtlitteratur der Botanik in kurzen und bündigen Anmerkungen über die wichtigsten Autoren und deren Werke mitgeteilt, so dass insbesondere ein Verständnis der den Pflanzennamen gewöhnlich beigefügten Autorenabkürzungen vermittelt wird.

Wir glauben insbesondere Studierenden oder Anfängern, aber auch Lehrern der Botanik mit unserm kurzen Taschenbuche willkommen zu sein, sowie auch Freunden der Gewächse bei ihren Besuchen von Gärten, Gewächshäusern und Ausstellungen einen Dienst zu leisten, indem wir ihnen ein handliches, über alles Gewünschte schnell unterrichtendes Vademecum in die Hand geben, das denn auch namentlich praktischen Gärtnern zum Verstehen der Namen, wie zu richtiger Aussprache sowohl als Orthographie derselben verhelfen wird.

**Der Verfasser.**

# Inhaltsverzeichnis.

I. Terminologie und Pflanzenbeschreibung (Deskription) . . .	1
II. Etymologische Nomenklatur (Wörterklärung der Pflanzen- namen).	
A. Lateinnamen . . . . .	59
Übersicht der nicht näher ausgeführten Synonyme des Buches . . . . .	371
B. Deutsch-, Trivial- und Fremdnamen der technischen, merkantilen und besonders wichtigen sonstigen Pflan- zen und ihrer Produkte nach wissenschaftlicher Be- nennung . . . . .	389
III. Botanische Litteratur.	
a. Die Autoren nebst Personalien und wichtigsten Werken	407
b. Geographische Botanik oder die Autoren und botani- schen Werke nach den Ländern alphabetisch zu- sammengestellt . . . . .	455
c. Spezialbotanik oder botanische Monographien, Dissert- ationen und andere Spezialschriften nach dem In- halt alphabetisch geordnet . . . . .	458
d. Nomenklatur und Wörterbücher der Botanik . . . .	477
e. Botanische Litteratur und Geschichte . . . . .	478
IV. Die wichtigsten essbaren und giftigen Schwämme.	
a. Essbare . . . . .	479
b. Giftige . . . . .	480
V. Übersicht des von Bartling und Bischoff verbesserten de Can- dolle'schen Systems (nach Leunis-Frank's Synopsis des Pflanzenreichs).	
A. Plantae vasculares, Gefäßpflanzen . . . . .	481
A. Phanerogamae L., Phanerogamen oder Samen- pflanzen . . . . .	481
I. Kl. Dicotyledonöae Juss. . . . .	481
II. Kl. Monocotyledonöae Juss. . . . .	484
B. Cryptogamae L. (Acotyledonöae Juss.) Krypto- gamen oder Sporenpflanzen . . . . .	485
III. Kl. Cryptogamae vasculares, Gefäß- kryptogamen . . . . .	485
B. Plantae cellulares, Zellenpflanzen . . . . .	485
IV. Kl. Cryptogamae cellulares, Zellenkryp- togamen . . . . .	485

## Zeichen und Abkürzungen.

† giftig.  
 ‡ perennirend oder ausdauernd.  
 ☞ Bäume, ☞ Sträucher, ☞ Halbsträucher.  
 ⊙ zweijährig, ⊙ einjährig (annual).

3, 4, 5, 6 etc. März, April, Mai, Juni etc.  
 ♂ Zwitter (Hermaphrodit).  
 ♂ mas (männlich), ♀ femina (weiblich).

a int. = a intensivum, verstärkendes (nicht verneinendes) a.  
 a priv. = a privativum, verneinendes a.  
 adj. = Adjectivum, adv. = Adverbium.  
 a. e. = ad exemplum, zum Beispiel.  
 aut. = autoris, eines Autoren (Verfassers).  
 autt. = autorum, der Autoren (Verfasser).  
 B. = Baum.  
 ben. = benannt.  
 betr. = betreffend.  
 Bstr. = Baumstrauch.  
 coll. = Collectivum od. Sammelnamen (z. B. arborëtum).  
 comp. = Compositum od. zusammengesetztes Wort.  
 dem. od. dim. = Deminutivum (Dimin.-), Verkleinerungsform.  
 det. = Deteriorativum, Verschlechterungs- od. Verringerungsform (z. B. alsinastrum).  
 ds. = derselbe, dss. = dieselben.  
 e. g. = exempli gratia, zum Beispiel.  
 eig. = eigentlich.  
 etc. = etcetera, und so weiter.  
 f. = filius, Sohn (L. f. = Linné filius, Linné Sohn).  
 flor. = flores, Blüten (Thee).  
 fl. pl. = flore pleno, mit gefüllter Blume.  
 fol. = folia, Blätter od. Thee.  
 foss. = fossil, als Versteinerung (Petrefakt).  
 geb. = gebaut, d. i. angepflanzt, auch gebildet!  
 gem. = gemein.  
 gr. = griechisch.  
 g. n. = genus novum, neues od.

neugebildetes Geschlechts- oder Gattungswort.  
 herb. = herbarium, Pflanzen- od. Kräutersammlung.  
 Hort. = Hortorum, der Gärten.  
 Hortul. = Hortulanorum, der Gärtner.  
 Hstr. = Halbstrauch.  
 i. q. = id quod, dasselbe wie (od. was).  
 j. = jetzt.  
 lat. = lateinisch, latin. = latinisiert, d. i. in lateinische Form gebracht.  
 loc. = locativum, Behälternamen (z. B. pomarium).  
 m. = mit, m. v. v. = mit Varietäten.  
 n. = nach.  
 n. pr. = nomen proprium, Eigennamen.  
 obs. = obsoletus, obsolet, d. i. abgenutzt, nicht mehr gebräuchlich.  
 Off. = officinarum, der Offizinen oder Apotheken.  
 s. = siehe, s. = seit, s. g. = so genannt, s. eb. = siehe eben, s. v. = siehe vorher, s. d. = siehe diesen.  
 schr. = schrieb.  
 sc. = scilicet, nämlich.  
 st. = statt, anstatt.  
 Str. = Strauch.  
 syn. (od. nur s.) = synonym, d. i. mitnamig, gleichbedeutend.  
 u. a. m. = und andere mehr.  
 v. od. var. = Varietät (Spielart).  
 v. v. = Varietäten.  
 v. = vorher, und v. = von.  
 vgl. = vergleiche.  
 w. = weiss.  
 z. B. = zum Beispiel.

# I. Terminologie und Pflanzenbeschreibung (Deskription).

Der Bogen über den Vokalen kennzeichnet die Kürze, der Strich die Länge (Betönung) derselben.

**abbreviatus** abbreviert, abgekürzt.  
**abietinus** tannenartig (v. abies, -ëtis Tanne).  
**abortivus** fehlgeschlagen, zu früh geboren.  
**abortus** das Fehlschlagen, die Verkümmernung.  
**abrupte** adv., -tus abgebrochen, unterbrochen.  
**abschasicus** von Abschasien am Kaukasus.  
**absorptio** die Aufsaugung, das „Absorbieren“.  
**abstemius** enthaltsam, nüchtern.  
**acanthophyllus** stachelblättrig, akanthusblättrig.  
**acarifer**, -fëra etc. milbentragend (acärus M.).  
**acaulis** stiel- od. stengellos.  
**accessorius** hinzukommend (z. B. gemma Neben- od. Beiknospe).  
**accommodatio** Anpassung, das „Accommodieren“.  
**acephälus** kopflos (ἀ u. κεφαλή).  
**acerbus** herb, bitter.  
**acerosus** (a. e. folium) nadel- od. linienförmig, steif.  
**acervatus** gehäuft, **acervus** Haufen.  
**acetabulum** Bechergefäß.  
**Acetosa** u. **Acetosella** L. Sauerampfer (v. acëtum Essig).  
**achenium** Achene (Achäne), Schliessfrucht.  
**acicularis** nadelförmig (acus, dem. acicüla).  
**acidulus** säuerlich, **acidus** sauer, **acidum** Säure.  
**acidum hydrocyanicum** Blausäure.  
**acinaciformis** säbelförmig (acinäces, -is kurzer Säbel).  
**acinum** od. -us Beere (v. Trauben u. a.).

**acladödes** zweiglos (ἀ u. κλαδός) zweigig).  
**Acotyläe** (-ledones) Juss. Samensappenlose.  
**Acramphibryae** Endl. Endumspross.  
**Acrantheae** Endl. Spitzblüter. [ser.  
**Aeroblastae** Spitzkeimer (d. s. Monocotylen).  
**Aerobryae** Endl. Endsprosser.  
**acrocarpus** spitzfrüchtig.  
**acropetalus** (z. B. Blütenentw. Frank) an der Spitze kronblättrig.  
**actinomorphus** strahlig gebildet (ἀκτις, -iros; μορφή Gestalt).  
**aculeatus** stachelig, **aculéus** Stachel.  
**acumen**, -inis Spitze, **acuminatus** zugespitzt.  
**acutiusculus** etwas spitz, **acutus** scharf, spitz.  
**adauctus** vermehrt.  
**adhaerens** sich anhängend, anhängend.  
**adiposus** fettig, fettartig (adeps, -ipis).  
**adligans** anhaftend, -ntes (sc. radicëes) Klammerwurzeln.  
**adnascens** anwachsend (v. adnascor).  
**adnatus** angewachsen.  
**adossiert**, mit d. Rücken angelehnt (fr. dos Rücken), z. B. adoss. Vorblatt b. Monocotylen, Schwendener.  
**adpressus** angedrückt.  
**adscendens** aufsteigend.  
**adpersus** bestreut, bespritzt.  
**adstringens** zusammenziehend.  
**adulterinus** unächt, auch: ver schwägert.  
**adultus** herangewachsen.  
**adumbratio** Schattenriss, Skizze.  
**aduneus** hakenförmig gekrümmt.

- adustus** brandig, angebrannt.  
**adventitius** (a. e. gemma) hinzugekommen, unwesentlich (z. B. Adventivknospe).  
**Adventiv-** (in Zusammens.) s. eb., z. B. Spross, -Wurzel etc.  
**adversalis** gegenübergestellt, gegenständig.  
**adversaria**, -orum Conceptbuch, Kladder od. sog. Schmierbuch.  
**adversarius** Gegner.  
**aenëus** ebern, kupferbröncig (Kummer).  
**aequalis**, -ia gleichförmig, alle Blüten gleich (bei Compositen).  
**aequans** gleichkommend, gleichgross.  
**aequidistans** in gleichem Abstand.  
**aequivöcus** zweideutig, z. B. generatio aequivöca Urzeugung, Urbildung.  
**aequorëus** zum Meer gehörig.  
**Aërogämae** Jess. Luftblütler i. q. Phanerogämae L.  
**aeruginëus** (-nosus) spangrün (aerugo Grünspan).  
**aestivalis** sommerlich, im Sommer.  
**aestivatio** Knospenlage, i. q. praefloratio, Art der Blume vor d. Aufbrechen (z. B. imbricata gefaltet, valvata klappig etc.).  
**aestuans** lodernd, glühend, auch: schwankend.  
**affinis** verwandt, **affinitas** Verwandtschaft.  
**affixus** auf- od. angeheftet.  
**agämus** ehelos, ohne Blüten.  
**agathöcus** (-öicus) guthäusig, schön wohnend (*ἀγαθός* u. *οἶκος*).  
**Aggregation** = Anhäufung, Zusammengesellung.  
**aggregatus** gehäuft, zusammengestellt etc.  
**agrarius** u. **agrestis** auf Äckern.  
**agrostographia** Gräserkunde.  
**aizoides** dem ewiglebenden Aizöon ähnlich.  
**alabastrum** Blütenknospe.  
**alae** Flügel (an Papilionaceenblüten).  
**alatus** geflügelt (sc. caulis od. petiölus, mit Rand- od. Blatthäuten versehen).  
**albellus** weisslich (albus w.).  
**albensis** an der Elbe (Albis) zu Hause.  
**albidus** weisslich, weiss (i. q. albus).  
**albümen**, -inis Eiweiss, d: Innere von Samen etc.  
**albumum** Splint, Jung- od. Neuholz.  
**aleicornis** elennhörnic, wie ein Elenngeweih.  
**aleurites** mehllartig (*ἀλευρίτης* v. *ἀλευροσ* Mehl).  
**aleuron**, -rum Kleber im Samen (s. eb.).  
**alexeterius** (*ἀλεξήτιος*) zum Helfen od. Abwehren geschickt.  
**Algeria** Algier, **algeriensis** aus Algerien.  
**algidus** kalt.  
**alicastrum** (det. v. *alica*) Spelt- od. Kraftmehl.  
**alliaceus** lauchartig (v. *allium* Lauch).  
**alnicöla** Erlenwohner, an od. bei Erlen wachsend.  
**alpestris** u. **alpïnus** auf den Alpen wohnend.  
**alpigenus** auf d. Alpen erzeugt.  
**alsaticus** elsässer, im Elsass zu Hause.  
**altaicus** vom Gebirg Altaï (Innerasien).  
**alternus** abwechselnd, „alternierend“, *folia alterna* abwechselnd gestellte Blätter.  
**alternatum**, adv. abwechselnd bez. der Stellung.  
**alternatio** Abwechslung (s. eb.) z. B. im Stand der Blätter.  
**alternativa** (sc. *perforatio*) Halbedeckung der Schuppenlage (im Durchschnitt einer Knospe).  
**alterniflorus** wechselblütig, d. Blüt. in abwechselnder Stellung.  
**alternifolius** mit wechselständigen Blättern.  
**altilis** gemästet, mastig.  
**aluminosus** Alaun betreffend (alumen, -inis).  
**alutaceus** sammtledern, ledergelb (*alüta*).  
**alutipes** sammtlederfüssig, weichstielig.  
**alveolatus** grubig, **alveölus** Mulde, Trog etc.  
**amärus** bitter.  
**ambianensis** von Amiens (Ambianum).  
**ambigüus** zweideutig, unbeständig.  
**amblyonëmus** stumpffädig (*ἀμυβλόνος* stumpf, *νήμα* Faden, Staubfaden).  
**amblypterus** stumpfflügelig (s. eb., *πτέρον* Flügel).

- amboinensis** von Amboina (Molukken).
- amentacëus** kätzchentragend, kätzchenartig.
- amentum** (Bot.) Kätzchenblüte.
- amethystëus, -stëinus** amethystfarbig, veilchenblau.
- Anguno-Burejensis** am Amurfluss u. Burejagebirge zu Hause.
- amoeboides** amöboid i. q. amoebus.
- amoebus** gestaltwechselnd (z. B. Protoplasma).
- amoenitates** Annehmlichkeiten, Belustigungen.
- amoenus** lieblich, angenehm.
- amphozöa** Ohnformtiere (*ἀ. μορφῆς, ζῶον* Tier).
- Amphibrÿa** Endl. Umsprosser.
- Amphicarpanthëae** Rehb. Ringsfruchtblüter (Compositen).
- amphigastria** „umbauchige“ kleine Nebenblätter der Jungermännchen.
- amplexicaulis** stengelumfassend
- amplissimus** sehr beträchtlich, überaus gross etc.
- amplus** weitläufig, gross.
- ampulla** Flasche, Büchse, **-cëus** flaschenfrüchtig.
- Amstelodamum, -sterodama** Amsterdam.
- amygdalinus** mandelartig, wie d. Mandelbaum.
- amylum** Stärkemehl.
- anabioticus** (a. e. planta) wieder-auflebend (*ἀναβιώω*).
- anagramma** Anagramm d. i. Buchstabenversetzung eines Wortes.
- analecta, -orum** Auflese, Brosamen.
- analepticus** erfrischend (*ἀναληπιτικός*).
- analogia** Analogie, Ähnlichkeit, **-lögus** „analog“ d. i. übereinstimmend etc.
- anaphytosis** Pflanzen-Verjüngung.
- anastomosis** „Anastomose“, Zusammenmündung zweier Gefässe.
- anatomia** „Anatomie“, Zergliederung etc., **-miëus** „anatomisch“, Zergliederung betr.
- anätropus** gegenläufig, z. B. ovülum anätropum rückläufige Samenknospe, mit Abwärtsrichtung der Mikropyle od. des Keimmundes.
- anceps, -cipitis** (sc. caulis) zweischneidig.
- andicöla** die Anden bewohnend.
- androecium** Staubblatt - Inbegriff einer Blüte (*ἀνδρ. - γένος* Mann, d. i. Staubgefäss, und *οὐχίον* Häuschen).
- androgynus** mannweibig (männl. u. weibl. Organe d. Blüte verwachs., s. eb. u. *γυνή* Weib).
- anfractuösus** mit Krümmungen versehen.
- anfractus** krummer Weg, Biegung, Umgang.
- angiocarpus** hüllfrüchtig (*ἀγγειόν* Gefäss, u. *καρπός* Frucht).
- Angiospermae** L. Hüllfrüchtige, Decksamige.
- Anglia** England, **anglicus** englisch.
- angulatus** eckig, kantig, **angulus** Ecke, Winkel.
- anguliger** Ecken führend.
- angulisans** Ecken od. Kanten bildend.
- angustifolius** schmalblättrig, **angustus** eng, schmal.
- animadversio** Bemerkung.
- anisolöbus** ungleichlappig (*ἀ. ἰσός* u. *λοβός*).
- annosus** hochbejahrt.
- annuus** vorjährig, sprossend.
- annulus** Ringschicht (an Mooskapseln, um Farnsporangien etc.).
- annuus** einjährig, annuell.
- anomälus** (*ἀνώμαλος*) ungleich, unregelmässig, „anomal“.
- Anophÿta** Endl. Übererdigwachsende.
- antarecticus** südpolarisch, „antarktisch“.
- antecedens** vorhergehend.
- antennatus** fühlertförmig (antenna Fühlhorn d. Insekten).
- antennifer** Fühler führend.
- anthëla** (*ἀνθηλίη*) Spirre der Binsen.
- anthelminthëus** gegen Würmer gebraucht (*ἀντι* u. *ελμινθς, -ρθος* Wurm).
- anthëma** Blüte (*ἀνθημα* i. q. *ἀνθος*).
- anthëra** (*ἀνθηροία*) Staubbeutel, „Anthere“.
- antheridium** männl. Organ, ähnlich Antheren (bei Algen etc.).
- anthësis** Blütenbefruchtung.
- anthocyanum** Blattrot (*κυανός* eig. dunkelblau).
- anthodium** Blütenkorb, gemeins. Kelch der Compositen (v. *ἀνθώδης* blumengleich).

- anthologia** Blütensammlung, Blumenlese, „Anthologie“.
- antholysis** Blütenauflösung (Krankheit od. Ausartung).
- anthophyta** Blütenpflanzen, i. q. Phanerogamae.
- anthoplerosis** (ἀνθώσεσις) Blütenfüllung.
- anthoxanthinum** Blattgelb, i. q. xanthophyllum.
- anthracophilus** Kohlenliebhaber (ἀνθραξ, -ζος).
- antiades** drüsen- od. mandelartig (ἀντιὰς, -δος).
- anticus** vorderer.
- antiklin**, der Oberfläche entgegengesetzt od. rechtwinklig darauf (Sachs).
- antidysertericus** gegen die Ruhr od. Dysenterie.
- antipoda**, fem. Antipodin od. Gegenfüßlerin, **Antipodes** Antipoden (in der Südsee).
- antipyreticus** feuererstickend (ἀντι, πυρ).
- antiquior** älter, der Ältere.
- antiscorbuticus** gegen den Skorbut wirksam.
- antitropus** von einander gewendet, gegenüberläufig.
- apertura** Oeffnung, **apertus** offen.
- apetalus** kronblattlos, ohne Blumenblätter (petalum, πέταλον Kron- od. Blumenbl.).
- apex**, -icis Spitze, **apiculus** Spitzchen.
- aphaca** (ἀφάκη i. q. φακή) Vogelwicke, Linse.
- aphanes** (ἀφανής) unsichtbar, übersehen etc.
- aphrodisiacum** Geschlechtsreizmittel (Aphrodite = Venus).
- Aphyllae** DC. (Cryptogamae) Blattlose Kryptogamen.
- apicalis** spitzig, spitzmützig.
- apiculatus** mit Spitzchen versehen.
- apifer**, -era etc. bienentragend (apis u. fero).
- apifolius** sellerieblättrig (v. Apium).
- aponinus** müssig, unthätig (ἀπονοος).
- apophysis** Schwellung od. Ansatz unter dem Moosbüschchen.
- apothecia** Keimfrüchte der Flechten, „Apothecien“, d. s. kugl. od. schüsself. Erhebungen, Sporenlager.
- appendix** Anhang, Anhängsel.
- appplanatus** geebnet, verflacht.
- approximatus** genähert, nahe zusammen.
- apricus** sonnig, sonnig stehend.
- Apulus** (Appulus) apulisch, aus Apulien (in Unteritalien).
- Aquaticeae** Endl. Wasserkräuter (-quirle).
- aquaticeus**, -tilis in od. an Wasser wachsend.
- aquigenus** im Wasser erzeugt.
- aquilegifolius** ackeileblättrig (Aquila).
- aquilinus** adlerartig (aquila Adler).
- Aquisgranum** Aachen.
- arachnoideus** spinnenähnlich.
- aranifer**, -era etc. Spinnen tragend (arana).
- arborëtum** Baumpflanzung.
- arborëus** baumartig.
- arbusculus** kleines Bäumchen.
- arbustus** Baumgarten.
- arcænum** Geheimnis, Geheimmittel.
- archegonia** Fruchtansätze, weibl. Organe der Moose etc. mit Eizellen.
- archispermus** nackt- od. ursamig (v. ἀρχομαι fange an, daher Erz- oder Ur-).
- arete**, adv. eng, dicht beisammen, **aretius** enger etc.
- arcticus** Polar-, **antarcticus** Südpolar- (v. ἀρκτος Bären-Sternbild).
- aretous** i. q. arcticus, s. eb.
- arcuatus** gebogen, bogenförmig.
- arduennensis** in den Ardennen zu Hause.
- Arelatum** Arles, Arelat (Südfrankreich).
- arenarius**, -nosus im Sand wachsend.
- areolae** kleine Flächen zwischen den Rissen der Flechten etc. (dem. v. arca Fläche, das „Areal“).
- areolatus** gefäfelt, s. eb.
- Argentoratum** Strassburg.
- argillaceus** aus Thon od. Lehm, lehmig.
- argunensis** vom Fluss Argun (Nebenfluss d. Amur).
- argute**, adv. scharf, spitz, **-tus** spitzig, zierlich, listig u. dgl.
- argyraceus** silberweiss.
- argyrophyllum** silberblättrig.
- aridus** trocken, dürr.
- arietinus** widderartig (aries, -ëtis Widder).



**arillus** (oft fleischiger) Samenmantel.  
**Ariminum** Rimini (Italien).  
**arista** Granne, **-atus** gegrannt.  
**armeniæcus** aprikosenartig.  
**armillaris** armbandartig, **-atus** mit Armband geschmückt.  
**armoricus** aus Armorika (Bretagne).  
**Aronium** Aarau.  
**arcuatus**, s. *arcuatus*.  
**arrhizus** wurzellos (*ἄ* u. *ῥίζα*).  
**Artikularegimente** (Mikösch) = Knospenhüllen aus bleibenden Blattresten.  
**articulatus** gegliedert, **-culus** Glied.  
**arundinæcus** rohr- od. schilffartig.  
**arvensis** auf Ackerfeld (*arvum*).  
**arvernus** aus der Auvergne (Südfrankr.).  
**arvonicus** arvonisch (Arvonien das Land um Caernarvon im Fürstent. Wales).  
**ascalonicus** aus Askalon (Palästina).  
**ascidium** Blattschlauch, **ascus** Schlauch, **asci** Schläuche der Pilzsporen.  
**asëmus** zeichenlos (*ἄ* u. *σῆμα*), auch: ohne Fahne (Papilionaceen).  
**asper**, **-ëra** etc. rauh, scharf.  
**Asperifoliae** L. Rauhblättrige.  
**asprellus** rauhschuppig (Kummer).  
**assereulus** Pfählehen (dem. v. *asser* Pfahl, Balken etc.).  
**assimilatio** Verähnlichung, Aneignung.  
**assurgens** aufsteigend, sich aufrichtend.  
**asthmaticus** Asthma heilend, gegen Brustkrampf.  
**astragologia** Monographie der Traganthe.  
**Astylæ** Jess. (sc. *Apetalæ*) Griffellose.  
**atacta botanica** botanische Neuigkeiten, noch nicht Berührtes.  
**ater**, **-tra** etc. schwarz, **atro-** in compos.  
**Atlas**, **-ntis** Atlasgebirge (Nordafrika).  
**atomarius**, **-atus** mit Atomen bestreut.  
**atramentarius** Dinte betr. (*atramentum*).  
**atröpa** (sc. *ovula*) geradläufige Samenbläschen i. q. *orthotröpa*, vgl. *anatröpa*.  
**atrophia** Auszehrung aus Nahrungsmangel, „Atrophie“.

**atropurpureus** schwarz- od. dunkel-purpurrot.  
**atrovirens** schwarzgrün.  
**attenuatus** verdünnt, verschmälert.  
**aucuparius** zum Vogelfang dienend.  
**aurantiacus** orange- od. pomeranzengelb od. rot.  
**aurelianus** aus Orleans.  
**aureus** golden, goldgelb.  
**auricömus** goldhaarig.  
**auricula** Öhrchen (dem. v. *auris* Ohr).  
**auricularis**, **-atus** Öhrchen führend, gehört.  
**auriscalpium** Ohrlöffel.  
**austerus** herb, von scharfem Geschmack.  
**australasicus** südasiatisch.  
**australis** südlich.  
**austriacus** österreichisch, **Austria** Östreich.  
**austro-** in comp. süd-, z. B. *austro-occidentalis* südwestlich.  
**autumnalis** herbstlich, **autumnus** Herbst.  
**auxanometron** (-um) Wachstumsmesser (*αὐξάνουμα* u. *μετρον* Mass).  
**Auxosporen** (z. B. Diatomeen) Wachstumssporen od. = junge s. eb).  
**avenacëus** haferartig.  
**Avenio** Avignon.  
**avenius** aderlos (a u. *vena* Ader, „Vene“).  
**avernensis** aus der Auvergne (Frankreich).  
**aversus** abgewandt.  
**axilis** zur Achse gehörig.  
**axilla** Achsel, Blattachsel.  
**axillaris** achselständig, in d. Blattachsen stehend.  
**axiomatikus** abschätzend, z. B. Forstbeschreibung.  
**axis** Achse, Mittellinie.  
**azureus** himmelblau, **azur-** od. **lasurblau**.  
**bacca** Beere, **-atus** Beeren tragend, zu Beeren geformt.  
**baccifer**, **-ëra** etc. beerentragend.  
**baecilli** Fadenbakterien s. sogl.  
**bacteria** Bakterie, freilebende, elliptische, bewegliche Zelle (*Βακτηρία* Stab etc.).  
**bactrianus** aus Baktrien (Turkestan).  
**badius** kastanienbraun, schön braun.

- badipus** Braunfuss.  
**baeticus** bätisch, vom Fluss Baetis = Guadalquivir in Andalusien.  
**baldensis** von Baldo (in Südtirol).  
**Balsamiflūae** Juss. Balsamiflussbäume.  
**balticus** baltisch, vom baltischen Meer (Ostsee).  
**banaticus** aus dem Banat (Südungarn).  
**barbadensis** von Barbados (Antillen).  
**barbatus** gebartet, bärtig.  
**barbulatus** etwas bärtig, mit Bärtchen.  
**basidia** Sporenstützchen od. -Stielchen. Zellen, welche an der Spitze Sporen abströmen.  
**Basila** (-lea) Basel.  
**basipetal** (z. B. Blütenentw. Frank) an der Blumenbasis stehendes Kronblatt.  
**basis** (a. e. folii) Grund, Wurzel.  
**Batabis** = Patavia Passau.  
**batavus** holländisch, od. von Batavia auf der Insel Java.  
**bavaricus** bairisch (Bavaria Baiern).  
**bellidiflorus, -folius** masliebchenblütig, -blättrig (Bellis, -idis).  
**berolinensis** berliner, **Berolinum** Berlin.  
**betulifolius** birkenblättrig.  
**Betulin** = Birkenkorkzellenstoff (das Weisse etc.).  
**betulinus** an Birken wachsend.  
**bicolor, -oris** zweifarbig.  
**Bicornes** Endl. Zweihörnige (Antherenzweihörn.).  
**bicornis** zweihörnig.  
**bidens, -dentatus** zweizahnig.  
**biennis** zweijährig.  
**bifariam** adv., **bifarius** zweifach, doppelt.  
**bifidus** zweiteilig, -spaltig.  
**biflorus, -folius** zweiblütig, -blättrig.  
**biforatus** zweimal durchbohrt.  
**biformis** doppelt gestaltet.  
**bifrons** zweistirnig, Doppelgesicht.  
**bigeminus** zweimal doppelt.  
**bijugus** zweijochig, mit 2 Fiederpaaren.  
**bilabiatus** zweilippig.  
**bilobus** zweilappig.  
**bilocularis** zweifächerig.  
**bina, -ni** etc. zu zweien.  
**biovulatus** mit zwei Eichen oder Samenknospen.  
**bipartitus** in zwei Teile geteilt, zweiteilig.  
**bipinnatus** doppelt gefiedert.  
**biplicatus** doppelt gefaltet.  
**bipontinus** von Zweibrücken.  
**bipunctatus** doppeltpunktirt.  
**bisaceatus** mit zwei Säcken.  
**bisectatus** mit zwei Buckelschilden.  
**bisentellatus** mit zwei Buckelschildchen.  
**biserratus** doppeltesägt.  
**bistortus** zweimal gedreht.  
**bisulcatus** zweifurchig.  
**bituminosus** asphaltartig, „bituminös“.  
**bivalvis** zweiklappig.  
**bivulus** zweisegelig (velum), ringfransig (Kummer).  
**blandus** gewinnend, sich einschmeichelnd etc.  
**Blattspur-Stränge** = Gefäßbündel an der Basis der Blätter den Stamm hinab.  
**blesensis** von Blois (an d. Loire).  
**Blust** = Blütenstellung.  
**bogoriensis** von Buitenzorg (auf Java).  
**bogotensis** von Bogota (Südamerika).  
**boicus** bojisch, bairisch (Bojer = Baier, Bayer).  
**bolaris** bolusartig (Bolus od. Bol = Thonerde).  
**boloniensis** Boulogner.  
**bonariensis** von Buenos-Ayres (Südamerika).  
**Bononia** Bologna u. Boulogne.  
**bononiensis** von Bologna od. Boulogne.  
**boppardensis** von Boppard (am Rhein).  
**borbonicus** von der Insel Bourbon (j. Réunion).  
**boreali-orientalis** nordöstlich.  
**borealis** nördlich, nordisch (in comp. boreali- s. eb.).  
**Borstenkranz**, zu Pappus werden der Kelch der Einzelblüte bei Compositen.  
**borysthenicus** am Fluss Dnjepr (Borysthene).  
**bostryx** Schraubel, d. i. Trugdolde, deren Scheinachse immer auf derselben Seite ansetzt.  
**botanice**, Gen. -es Botanik (*βοτανική* sc. *τέχνη*).  
**botanicus** botanisch.  
**botanosophia** Pflanzenkunde.

**botryapius** traubenbirmartig ( $\beta\acute{o}\tau\alpha\pi\iota\upsilon\varsigma$  und  $\acute{\alpha}\tau\iota\omicron\nu$ ).

**botryoides** traubenähnlich.

**botrytis** (bess. -trytis) traubig.

**bottnicus** bottnisch, vom bottnischen Meerbusen.

**brachiatus** ästig, mit Ästen od. Armen.

**brachium** Ast, Arm (fr. branche).

**brachypetalus** mit kurzen Kronblättern.

**bractea** Bractee, d. i. Deck- od. Hochblatt um die Blumen herum.

**bracteatus** deckblättrig.

**bracteola** Deckblättchen.

**bractescens** Deckblätter treibend.

**brigantiacus** von Briançon od. auch von Bregenz am Bodensee (Brigantium).

**britannicus** britisch und Bretagner.

**brumalis** winterlich (v. bruma, contrahiert aus brevissima dies kürzester Tag).

**brunneus** braun, dunkelbraun.

**Brutknospen**, mehrzellige linsenförm. Organe der Fortpflanzung (z. B. bei Marchantia).

**Brutzellen** der Kryptogamen (vegetative Fortpfl.).

**Brutzwiebeln** (in den Blattachsen).

**bryoides** knotenmoosartig (Bryum, gr.  $\beta\rho\acute{\upsilon}\iota\omicron\nu$ ).

**bryologia** Mooskunde; -logicus „bryologisch“.

**bryophyta** Moosgewächse.

**bucca** der Backen, die Backe.

**bufonius** die Kröten betr.

**bulbifer**, -fera etc. zwiebeltragend.

**bulbiger** zwiebel- od. knollenführend.

**bulbillus** Knospenzwiebel (in den Achseln etc.).

**bulbosus** zwiebelig, knollig.

**bulbo-tuber** Knollenzwiebel.

**bulbus** Zwiebel, „Bölle“.

**bullä** Buckel, Blase, -acäus u. -atus blasenförmig.

**bumelia** ( $\beta\omicron\nu\mu\upsilon\eta\lambda\acute{\iota}\alpha$ ) eine Eschenart.

**Burdegala** (-digala) Bordeaux.

**bursa** Börse, Geldtasche.

**bursarius** börsen- od. taschenförmig.

**butibacensis** Butzbacher, v. Butzbach (Hess.-Darmst.).

**butteraceus** butterartig, **butyrus** Butter.

**butyrosus** butterig.

**byssacäus** flachs- od. seidenfaserig.

**byssus** ( $\beta\acute{\upsilon}\sigma\sigma\omicron\varsigma$ ) Flachs, Seide, Baumwolle etc.

**byssisäus** mit Byssus od. Fasern festsitzend.

**byzantinus** von Byzanz (Constantinopel).

**cabulicus** von Kabul in Afghanistan.

**cacumen**. -inis Gipfel, Spitze.

**cadäus** hinfällig, leicht abfallend.

**caelatus** getäfelt (v. caelo ciseliere, caelum Meissel etc.).

**caerulescens** bläulich.

**caeruläus** himmelblau, blau.

**caesius** blaugrün, blaugrau.

**caespes**. -itis Rasen (auch cespes).

**caespitosus** in oder wie Rasen wachsend.

**cajanensis** von Cayenne.

**Calamariae** Endl. Schaftfarne.

**calamarius** halmartig, Halm (calämus betr.).

**calaminaris** auf Galmeiboden wachsend.

**calamistra** Kräuseleisen (hohl wie ein Halm, calämus).

**calamitosus** unheilbringend.

**calämus** Halm, Rohr.

**calathidium** Blütenkörbchen, Korbblütchen.

**calathium** ( $\kappa\alpha\lambda\acute{\alpha}\theta\iota\omicron\nu$ ) Blütenkorb.

**caläthus** ( $\kappa\alpha\lambda\acute{\alpha}\theta\omicron\varsigma$ ) Korb.

**calcar** Sporn, -ratus gespornt,

-räus spornig.

**calceolus** kleiner Schuh, -latus schuhförmig.

**calceus** Schuh, Halbstiefel (v. calx, -cis Ferse).

**calcäus** kalkig, von Kalk (calx, -cis Kalkstein).

**caliculatus** kelchförmig, bekelcht (calix, -icis u. caliculus Kelch etc.).

**callochrous** schönhäutig, -farbig, aber auch schwienenhäutig (calium und  $\chi\omicron\upsilon\acute{\iota}\alpha$ ).

**callosus** schwielig.

**calophyllus** schönblättrig.

**calycanthema** in eine Krone verwandelter Kelch (z. B. Primel).

**Calycanthae** Rchb. Kelchblütige.

**Calyciflorae** Endl. Kelchblütler.

**calycinus** kelchartig, den Kelch betr. (calyx, -ycis Blumenkelch).

**calycularis** mit einem Hüllkelch versehen.

**calyculatus** mit Hüllkelch (kleinem Kelch) versehen.

**calycūlus** Aussen- od. Hüllkelch, kleiner Kelch.  
**calyptra** Haube od. Mütze der Moosblüten.  
**calyptrogēnum** „calyptrogene“ d. i. haubenbildende Wurzelschicht (Janczewski<sup>1)</sup>) (*καλύπτρα* und *γένω*).  
**calystachys** Hüllennähre (*καλύπτω*, *στάχυς*).  
**calyx**, -ycis Kelch, Blumenkelch.  
**Cambiform** = Cambiumbildungsgewebe.  
**cambium** Bildungssaft, Zellbildungsstoff unter der Rinde.  
**cambricus** „cambrisch“ (Cambria oder Cumbria, das Fürstentum Wales und Cumberland).  
**campylosperrnus** krummsamig, mit einwärts hohlem Endosperm (z. B. Doldenfrüchte).  
**campylotrōpum** (sc. ovulum) krummläufiges Sameneichen.  
**canaliculatus** mit Kanälchen versehen, gestreift.  
**canalicus** (sc. hortus) gräf. Canal'scher Garten in Prag.  
**cancellatus** gegittert, gitterartig.  
**canclianus** weisswerdend od. -aussehend.  
**candidus** blendendweiss.  
**canescens** ergrauend, grau aussehend.  
**caninus** den Hund betr., Hund's.  
**cannabīnus** hanfartig, -blättrig.  
**cannobrunneus** zimmtbraun.  
**cantrabrigiensis** von Cambridge (Cantabrigia).  
**Cantium** Kent (engl. Grafschaft).  
**canus** grau.  
**capensis** vom Cap (der guten Hoffnung).  
**caperatus** gekräuselt, gerunzelt (v. capero e. g. frontem).  
**capillaris** haarartig, **capillus** Kopfhhaar.  
**capillitium** Fadengewebe.  
**capitatus** kopfig, kopfförmig (caput, -itis).  
**capitulum** Köpfchen (dem. caput, -itis).  
**capreolatus** gestützt, rankend (s. sogl.).

1) Dessen Spitzenwachstum d. Phanerogamen (in Annales d. Sciences nat.).

**capreolus** Stiel- od. Astranke.  
**capronianus** (fr. capron) wie Ananaserdbeere schmeckend od. riechend.  
**capsella** Kapselchen (dem. capsula, Kapsel).  
**cardiophyllus** herzblättrig.  
**carentanus** kärnthisch, **Carentum** Kärnten.  
**caribaeus** caraïbisch (Caraïben od. Cariben, die Eingeborenen des nördl. Südamerika's).  
**caricinus** riet- od. seggenartig (von Carex, -ycis).  
**carina** Kiel, Schiffchen, **-atus** gekielt (bei Schmetterlingsblüten).  
**carinthiacus** kärnthisch, i. q. carentanus.  
**cariosus** morsch, faul, angefressen od. -gestossen.  
**caripensis** von Caripe, dem Land der Caripunas in Nordbrasilien.  
**carnicus** und **carniolicus** aus Krain (Carniöla).  
**carnosus** fleischig (von caro, -nis Fleisch).  
**carolinianus** von Carolina (Nordamerika).  
**carpellum** „Carpell“ od. Fruchtblatt.  
**Carpiden** (Schwendener) Fruchtteile (z. B. Stellung ders.).  
**Carpoböli** 'DC. Fruchtschneller (Pilze).  
**carpologia** Fruchtkunde.  
**carpophörum** Fruchtträger oder -halter (z. B. der Doldenfrüchte).  
**carptus** gerupft.  
**cartilaginēus** knorpelig.  
**carthusianus** Karthäuser.  
**caruncula** Keimwulstchen, **-atus** damit versehen.  
**carvifolius** kümmelblättrig.  
**caryophyllēus** (aceus) nelkenbraun od. -rot.  
**caryopsis** „Caryopse“, „Nussgleiche“, Schal-, Haut- od. Grasfrucht.  
**caseolaris** käschenfrüchtig.  
**cassine** zimmetartige (*καόσια* Zimmetrinde).  
**cassubicus** cassubisch, Cassuben, ein slavisches Volk in Pommern.  
**Catalauni** Chalons.  
**catalecta**, -orum Auswahl.  
**catalepticus** starrsüchtig.  
**catalōgus** Katalog, Verzeichnis.

**cataphractus** gepanzert.  
**catenulatus** in Kettchen geformt.  
**catharticus** reinigend, abführend (v. *καθαίρω*).  
**catinus** Napf, Schüssel etc.  
**caudatus** geschwänzt, schwanzartig (cauda).  
**caudex**, -icis Stock, Schaft, Stamm.  
**caulialatus** flügelstenglig, m. breit-häutigem Stengel.  
**cauliculus** Stengelchen der Keimlinge.  
**cauliflorus** am Stengel od. Stamm blühend.  
**caulinus** (v. *caulis*) am Stengel befindlich.  
**caulōma** Stengelgebilde (z. B. -Stacheln, Delbruck).  
**cavus** hohl.  
**cellula** Zelle, **cellularis** aus Zellen gebildet, z. B. cellulares Zellenkryptogamen.  
**cellulosus** „Cellulose“, d. i. Zellenfaserstoff.  
**cenisus** vom Mont Cenis.  
**Centifolia** Hundertblättrige Rose.  
**Centraleylinder**, z. B. der Wurzelgefäße.  
**centralis** „central“, den Mittelpunkt bildend.  
**Centrospermeae** Jess. (sc. Dianthiflorae) Spornsamige.  
**centuria** „Centurie“, das Hundert.  
**cepeaeifolius** (bess. *cepaeif.*) sedumblättrig (v. *κηπάια* Tripmadam).  
**ceraceus** wachsartig, -gelb.  
**cerasifer**, -era kirschentragend.  
**Cerealialia** „Cerealien“, Getreide (v. Ceres, der Ackerbau-Göttin).  
**cerens** wachsern (v. *cera* Wachs).  
**cerinus** wachsgelb (s. eb.).  
**cerodes** (*κηρώδης*) wachsartig, -gelb.  
**cernuus** nickend, geneigt.  
**cerussatus** bleiweiss.  
**cerussa** das Bleiweiss.  
**Cervicaria** Halskrautblume (*cervix*, -icis).  
**cespes**, -itis (*caespes*) Rasen.  
**cespitosus** (*caesp.*-) wie Rasen od. darin wachsend.  
**cestricus** von Chester (Pennsylvanien).  
**chalaza** Knospengrund, s. g. Hagelfleck (im ovulum).  
**chalconicus** aus Chalcedon (Kleinasien).

**chalepensis** von Haleb (Aleppo) in Syrien.  
**chalybeiformis** stahlhart (*χάλυψ*, -βος).  
**chalybeius** stählern (s. eb.).  
**chamae-** in compos. (*χαμῖ* adv.) Erd- (klein, niedrig).  
**chamaerēpes** (*χεῖτης*) auf der Erde kriechend.  
**charta** Papierblatt, Karte.  
**chiloensis** von der Insel Chiloë bei Chili.  
**chionaeus** (-nūs) schneeig, -weiss (*χιών* und *χιονέος*).  
**chius**, -ia „chiosisch“, von der Insel Chios.  
**chloraenus** grünspitzig (*χλωρόος* und *ἄκροός*).  
**chloranthia** Verlaubung einer Blüte (eine Ausartung).  
**chloranthus** grünblumig.  
**Chloris**, -idis **protogaea** vorweltliche Flora.  
**chlorophyllum** „Chlorophyll“, Blattgrün.  
**chlorosis** „Chlorose“, d. i. Bleichsucht der Blätter.  
**chloroticus** bleichsüchtig, kein Blattgrün ausbildend.  
**chordorrhizus** fadenwurzelig (chorda Saite etc.).  
**chrysanthus** goldgelbbütig.  
**chrysenterus** gelbfleischig (*χρυσέντερος* Eingeweide).  
**chryso-** in compos. Gold- (*χρυσός*).  
**chrysorrhoeus** goldflüssig, -fliessenlassend.  
**chrysoctictus** (-os, -on) goldpunktiert.  
**chthonoplastes** von Thon bildend (*χθών*, -όρος und *πλαστής*).  
**chymus** (*χυμός*) Speisebrei, Flüssigkeit, „Chymus“.  
**cibarius** als Speise dienend, **cibus** Speise.  
**cicatricula** Nárbechen, Keimmund des Sameneis.  
**cicatrix**, -icis Blattnarbe (nach dem Abfallen).  
**ciliaris** wimperig, -atus gewimpert.  
**Cilien** = Wimperchen der Schwärmsporen.  
**cimicinus** wanzenartig (v. *cimex*, -icis).  
**cincinnus** Wickel, d. i. Verzweigung, deren Scheinachse bald links, bald rechts ansetzt.

**cinctus** gegürtet, umzingelt.  
**cinerëus** aschgrau(cinis,-ërisAsche).  
**cingens** umgürtend, umzingelnd.  
**cinnabarinus** zinnoberrot.  
**cinnamomëus** zimmetfarbig.  
**circëllaris** gitter- od. rostförmig (fr. grillé).  
**circënalis,-atus** zirkelrund, schneckenförmig gerollt.  
**circëmans** in einen Zirkel sich rundend.  
**Circënantia** (sc. Chlorophÿta) i. q. Filices, s. eb.  
**circënus** Zirkel.  
**circumnatio** Umherbewegung der Vegetationsspitzen (Ch. Darwin).  
**circumscissus** ringschnittend.  
**cirrhatus** gerankt, **cirrhosus** rankig.  
**cirrhus** Ranke.  
**clandestinus** heimlich, versteckt.  
**clarus mons** Clermont (Frankreich).  
**clathratus** gegittert, gitterartig.  
**claudens** schliessend, zudrückend.  
**Clandiopölis** Klausenburg.  
**clava** Keule, **-atus** keulig, keulenförmig.  
**claviger,-ëra** keulenführend.  
**clavicula** Ranke, Wickelgabel, **-atus** mit solchen Wickelgabeln vers.  
**clavipes** nagelfüssig, keulenstielig (clava u. clavus u. pes Fuss, Stiel).  
**clavis** Schlüssel.  
**clavus** Nagel.  
**cleistogamus** verschlossenblütig<sup>1)</sup> (*κλειστός* u. *γάμος* Ehe etc.).  
**claudrum** Autherenschloss (z. B. b. Orchideen).  
**closterium** Gespinnst (*κλωστήριον,-ήριον* Spinner, Spindel).  
**clypeolus** kleiner Schild, **-atus** damit versehen.  
**clypeus** Schild, **-atus** schildförmig.  
**coadunatus** vereinigt (z. B. antherae).  
**coetaneus** gleichzeitig (nämlich Blätter u. Blüten).  
**coalitus** vereinigt.  
**coarctatus** zusammengeengt, -gepresst.  
**coccifer,-ëra** Scharlachbeeren od. Cochenillen tragend.  
**coccineus** scharlachrot.  
**cochleatus** muschelförmig gewunden.

**coelestinus** himmelblau.  
**coenanthium** Blütenkuchen (*κοινός* gemeinsam).  
**cognitus** bekannt.  
**cohaerens** zusammenhängend.  
**coliformis** kunkel- od. spinnrockenförmig (cölus).  
**collectio** „Collection“, Sammlung (ungleichartiger Pfl.).  
**collincola** Hügelbewohner.  
**collinitus** beschmiert.  
**collinus** auf Hügeln wachsend.  
**collum** Wurzelhals.  
**coloniensis** Kölner (Augusta Colonia Köln).  
**coloratus** „coloriert“, gefärbt.  
**columbarius,-ënis** Tauben betr.  
**columella** Mittelsäulchen (in Mooskapseln).  
**Columnelliferae** (sc. Dianthiflorae) Jess. Säulenträger (zu Gruinales).  
**columna** „Columnne“, d. i. Griffel- od. Befruchtungssäule, in einer Mittelsäule mit dem Griffel verwachsene Staubfäden.  
**Columniferae** Eudl. „Columnen“- od. Säulenträger.  
**coma** (gr. *κόμη*) Haarschopf.  
**comedens** aufzehrend (comedo verzehre).  
**comestible** fr. essbar.  
**comitialis** „Comitien“ od. Wahlversammlungen betr., Reigen (Kummer).  
**commentarium(-us)** „Commentar“, Tagebuch etc.  
**commentatio** Überlegung, Tagebuchsverzeichnis.  
**commissura** Naht, „Commissur“.  
**communis** gemein, „commun“, gemeinsam.  
**commutatus** vertauscht, verwechselt.  
**comosus** schopfzig, haarbuschartig.  
**compactus** zusammengedrängt, „kompakt“, derb (Kummer).  
**compilatio** Zusammenplünderung, „Compilation“.  
**complanatus** flach zusammengedrückt.  
**complectens** umfassend, in sich begreifend.  
**completus** vollständig, „complet“.  
**Compositae** Adans. Vereins- od. Korbbllütler.

1) Sich nicht öffnende Blüte!

- compressus** zusammengedrückt.  
**comptus** (comtus) geschmückt, schmuck anzusehen.  
**concauus** „concau“, hohl.  
**concentricus** „concentrisch“, um einen gemeinsamen Mittelpunkt herum.  
**conceptacula** Brutbecherchen (d. Lebermoose etc.).  
**conceptio** Empfängnis (bei Blütenbefruchtung).  
**concinuus** gehörig gefügt, abgemessen, zierlich etc.  
**concolor** gleichfarbig, einfarbig.  
**condensatus** „condensiert“, verdichtet.  
**conduplicatus** verdoppelt.  
**Conembrica** Coimbra (Portugal).  
**confertus** (e. g. flos) gefüllt (v. confertio).  
**confervoides** wasserfadenartig.  
**confinis** angrenzend, verwandt.  
**confluens** zusammenfließend.  
**Confluentes** Coblenz.  
**confocal** d. i. mit gleichem od. gemeins. Brennpunkt (z. B. Parabel, Sachs).  
**confragosus** holperig, uneben.  
**confusus** „confus“, verwirrt, wechselt etc.  
**congener**, -era verwandt.  
**congestus** zusammengestellt, gehäuft.  
**conglobatus** zusammengeballt, -geknäuel.  
**conglomeratus** zusammengehäuft, „Conglomerat“.  
**conglutinatus** zusammengeklebt (gluten, -inis).  
**congregatus** zusammengesellt, rasis (Kummer).  
**conicus** „conisch“, kegelförmig (conus).  
**conidiae** „Conidien“, d. s. sekundäre Sporen der Keimschläuche bei Kryptogamen.  
**conifer**, -era zapfentragend, „Conifera“.  
**Coniferae** DC., Coniferen od. Zapfenträger.  
**coni lupuli** Hopfenzapfen (conus Kegel, Zapfen).  
**conigenus** zapfenartig, einen Zapfen bildend.  
**Coniomycetes** Fr. Staupilze (κοίτιοι u. μυκησ, -μύκησ).  
**conjugatio** i. q. copulatio Vereinigung zweier Zellen od. Zweige zu einer od. einem.  
**conjugatus** zusammengejocht, veremigt.  
**connatus** zusammengewachsen, verbunden.  
**connectivum** „Connectiv“, d. i. Mittel- od. Zwischenband d. Antherenfächer, eine Fortsetzung d. Staubfadens.  
**connivens** zusammenneigend.  
**conocarpus** kegelfruchtig.  
**conopeus** (-opseus) fliegenartig (v. Conops Stechfliege).  
**conopilus** Kegelhut (conus, pilus).  
**consistens** sitzenbleibend.  
**consolidus** sehr fest, hart, innen erfüllt (nicht hohl).  
**conspectus** Überblick.  
**conspicuus** beträchtlich, ansehnlich.  
**constans** beständig.  
**Constante**, sich gleichbleibende Zahl, z. B. der Temperatur od. Wärmegrade.  
**constrictus** zusammengebunden, -gefesselt.  
**contiguus** anstossend, angedrückt (Kummer).  
**contortus** zusammengedreht, -gewunden.  
**contractus** zusammengezogen.  
**contrayerva** span. Gegengift.  
**controversus** bestritten, streitig.  
**conus** Kegel, Fruchtzapfen, Zapfenfrucht.  
**convallatus** umwallt, umgeben.  
**convexus** „convex“, erhaben, gewölbt.  
**convolutus** zusammengewunden.  
**convolvulus** sich zusammenwindend (Winde).  
**coprophilus** kothliebend (κόπρωσ).  
**copulatio** Vereinigung zweier Zellen, Zweige etc.  
**coracanus** Raben betr.? (corax), wahrsch. von Korakan (z. B. indisches Kammgas).  
**coracensis** aus Koräa (China).  
**coranicus** koranisch, den Koran d. Muhamedaner betr.  
**coreilum** Herzchen (dem. cor, -dis).  
**cordatus** herzförmig.  
**coriaceus** (-rius) lederartig (corium Leder).  
**coriifolius** lederblättrig.

- coriophorus** Wanzen tragend (v. *κόρις*, -ιος).
- Cornophytæ** Endl. Stock- oder Achsenpflanzen (*κόμος* u. *φυτόν*).
- cornus** hörnern, hörnartig.
- corniculatus** mit einem Hörnchen versehen.
- cornucopie** Füllhorn (cornu, copia Fülle).
- cornucopioides** füllhornähnlich.
- cornutus** gehörnt.
- cornuviensis** aus Cornwales.
- corolla** Blumenkrone.
- Corollifloræ** DC. Kron- od. Ganzblumige.
- corolliflorus** mit Krone blühend.
- corona** Kranz od. Nebenkrone innerhalb der Blumenkrone.
- corona staminea** die Staubgefäße tragende Nebenkrone (z. B. bei Apocynen, Asclepiadeen etc.).
- Coronariæ** Endl. Kronlilien.
- coronarius** eine Nebenkrone führend.
- coronula** i. q. paracorolla Nebenkrone.
- corpuseula** Embryosäckchen der Gymnospermen.
- corrugatus** voller Runzeln, **corrugis** dsgl.
- cortex**, -icis Rinde.
- corticalis** auf Rinden wachsend.
- corticæus** (-cosus) rinden- od. korkartig.
- cortina** Vorhang, Manchette am Strunk d. Pilze, auch Kessel.
- coruscus** schwankend, zitternd (-cans desgl.).
- corvinus** Raben betr. (corvus).
- Corymbifloræ** DC. Ebensträussler (Compositen).
- corymbosus** doldentraubig, ebensträussig.
- corymbus** Doldentraube, Ebenstrauß.
- coryphaeus** „Koryphæ“, Haupt (in Zusamm.).
- costa** Rippe, costa media Mittel- od. Hauptrippe.
- cotyledon** Samenlappen, **-dones** Keimblätter.
- cous** coisch, von der (griech.) Insel Kos (*Κῶς*).
- cracoviensis** Krakauer.
- crassinervius** dicknervig, -aderig.
- crassipes** Dickfuß, dickstielig.
- crateriformis** becherförmig.
- cremocarpium** Hängfrüchtchen (b. Dolden).
- crenatus** (-nulatus) gekerbt, fein gekerbt.
- crepidifolius** pippaublättrig (Crepis Pippau).
- crepitans** klappernd, rasselnd.
- crescientia** Wachstum, das Gewachsene, die „Crescenz“.
- crinitus** behaart, langhaarig (v. crinis Haupthaar).
- crispatio** Kräuselung, Kräuselkrankheit.
- crispus** kraus, **-pulus** kräuselig, etwas kraus.
- crista** Kamm, **-atus** gekämmt, kammartig.
- crithmifolius** bacillenblättrig (s. Crithmum).
- crocatas**, **-eüs** safrangelb (v. Crocus).
- cruciatus** gekreuzt, kreuzförmig.
- crucibulum** Tiegel (Kummer, Pilze).
- crucifer** u. **cruciger**, **-era** kreuztragend, -führend.
- Crucifloræ** DC. (-floræ Rehb.) Kreuzblütler.
- cruentus** blutig, blutrot.
- crura stigmatis** Narbenschkel.
- crypta** „Krypte“, Erdgruft (v. *κρυπτός* verborgen).
- cryptogamus** verborgenblühend, „Kryptogame“ (s. eb. u. *γάμος*; Ehe, d. h. Blüte).
- Crystalloidæ**, Krystallkörperchen aus Proteinstoff in Zellen.
- cubensis** von Cuba (Westindien).
- cuculi** des Kukuks (sc. flos).
- cucullatus** kappenförmig (cucullus Kappe, Kapuze).
- culmis** in compos. halmig (v. culmus Halm).
- cultratus** messerförmig (v. cultrum Messer).
- Cumbria** (Cambria) Cumberland, Fürst. Wales.
- cuneatus** keilförmig zugespitzt.
- cuneifolius** keilblättrig (cunæus Keil).
- cuneiformis** keilförmig.
- cuprarius** kupferig, **cupræus** kupferfarbig.
- cupula** Becherchen, Schüsselchen (z. B. der Eichel).
- Cupulifloræ** Rehb. Becherfrüchtler.
- curassavicus** aus Curaçao (holländ. Insel in Westindien).



**curavit** hat besorgt od. herausgegeben.

**Curia** Chur in Graubünden.

**curtipendulus** kurzherabhängend.

**curtus** kurz, gestutzt etc., **-tulus** etwas gestutzt.

**curvatus** gekrümmt, **curvus** krumm.

**cuspidatus** gespitzt, spitzig.

**cuticula** Oberhäutchen (dem. cutis Haut) z. B. Pollenhaut, oberste Epidermhaut.

**cuticularis** häutig, rindig (Kummer).

**-cyanus** in compos. von *κύανος*. Bohne.

**cyathiformis** becherförmig (*κύαθος*).

**Cybele** (Cybèle) Cybele od. Ceres, Naturgöttin.

**cyclisch** d. i. im Kreise geordnet (z. B. Blüten).

**cyclōsis** Kreisbewegung (des Milchsafts).

**cyclus** (*κύκλος*) Blattwirbel, spirali-ger Blattgang.

**cyma** Trugdölde, - globosa kugelige, - plana schirmartige, - unipara Wickel.

**cymiger** u. **cymosus** trugdoldig, m. seitensprossiger Verzweigung.

**Cynarocephalae** Juss. Distelköpfige.

**cyphelle** fr. Becherchen (- des lichens).

**cystocarpia** Blasenfruchtform (*κύστις* u. *καρπίς*).

**cytoblastus** „Cytoblast“ d. i. Zellkern (*κύτις*: Hülle, *βλαστός*: Keim).

**Daboecius** Daboek's (Namen eines irischen Heiligen).

**Dacia** Dacien (Rumänien, Wallachei u. Siebenbürgen).

**dactylifer** datteltragend, fingerführend.

**dactylus** Dattel, Finger.

**daedalus** künstlich, schön (*δαίδαλος*).

**dahuricus** daurisch, von d. daurischen Gebirge im östl. Nordasien.

**danicus** dänisch (Dania Dänemark).

**dasyarpus** rauhfrüchtig (*δασύς*: rauh, zottig).

**dasycladus** rauhästig, -zweigig (s. eb.).

**dasyphyllus** rauhlättrig (s. v.).

**davuricus** i. q. dahuricus.

**dealbatus** ausgeweist, überweist.

**debilis** schwächlich.

**decandrus** zehnmännig, m. 10 Staubgefässen (*δέκα* u. *ανήρ*, -*δωός*).

**decapetalus** m. zehn Kronblättern (*δέκα* u. *πέταλον*).

**decaus**, -*adis* Zahl Zehn, ein Zehend, eine „Dekade“.

**deciduus** abfällig, leicht abfallend.

**decipiens** täuschend, wie Rasen aussehend u. dgl.

**declinatus** gebeugt, geneigt.

**decolorans** abfärbend, abschliessend.

**decoloratus** entfärbt.

**decompositus** auseinandergestellt, getrennt.

**decorus** anständig, zierlich.

**decumanus** aus d. Zehntland, d. i. Südwestdeutschland, von d. Römern *agri Decumates* gen.

**decumbens** niederliegend.

**decurrens** hinablaufend (z. B. Blätter am Stengel d. Disteln etc.).

**decursivus** herablaufend.

**decussatus** ins Kreuz gestellt od. abgeteilt, „decussiert“ (z. B. Blattpaare).

**deflexus** herabgebogen.

**defloratus** verblüht, abgeblüht.

**deformatio** Entstellung, Missbildung.

**deformis** entstellt, hässlich.

**defossus** eingegraben, vergraben (v. *defodio*).

**degeneratio** „Degeneration“, Ausartung.

**deglyptus** abgeschält (v. *deglūbo*).

**deliscentia** das Aufspringen der Trockenfrüchte.

**delicatus** „delikat“, fein, köstlich, zärtlich.

**delicia**, -*orum* (*deliciae*, -*arum*) Ergötzen, Ergötzlichkeiten.

**deliciosus** köstlich, wohlschmeckend etc.

**deliquescent** zerfliesslich.

**deltoides** deltaförmig, dreieckig (*δέλτα* u. *εἰδομαί* gleiche).

**demersus** untergetaucht, unter Wasser wachsend.

**demissus** herabhängend, niedrig etc.

**demum** endlich, zuletzt, später.

**dendriticus** „dendritisch“, wie Dendriten d. i. Bäumchenzeichnung.

**dendrologia** „Dendrologie“ d. i. Baumkunde.

**dendrologicus** Baumkunde betr.

-dendron in compos. -Baum (*δέρυ-δουρ*).

**denigratus** geschwärzt.

**densiflorus** dicht od. gedrängt blühend.

**dentatus** gezähnt, gezähnel.

**denticulatus** mit Zähnchen, feingezähnel.

**denudatus** entblösst, bloss, kahl.

**depauperatus** beraubt, armgemacht, armbliätig.

**dependens** ab- od. herabhängend.

**depluens** abtröpfelnd.

**depressus** niedergedrückt, platt.

**dermatogēon** „Dermatogen“, d. i. Oberhautstoff, die Epidermis erzeugender.

**descendens** „Descendent“, Abkömmling.

**deserta**. -orum Wüste.

**destillatorius** Tropfen sammelnd.

**destitutus** beraubt, entbehrend.

**determinate** entschieden, bestimmt, durchaus.

**determinatio** das Bestimmen (z. B. der Pflanzen).

**detonsus** beschoren.

**deustus** angebrannt.

**devonicus** „devonisch“ (Gebirg in Cornwall u. Devonshire betr.).

**Dextrin** = Stärkekummi.

**dextrorsum** rechtsum, rechtsherum.

**diacanthus** zweistachelig, -dornig.

**diachenium** zweisamiges Schliessfrüchtchen (b. Dolden).

**diagramma** Zeichnung, Durchschnittsbild, Grundriss.

**Dialypetalae** DC. Getrenntkronblättrige.

**diamētrus** „Diameter“, Durchmesser.

**Diandria** L. Zweimännige.

**diaphānus** durchscheinend, durchsichtig.

**diaphoreticus** (*διαφορητικὸς*) verteilend, schweisstreibend.

**Diastase** = stickstoffhalt. Zellenkörper, der das Zerfallen der Stärke in Weingeist u. Kohlensäure bewirkt.

**diatrētus** gedrechselt? (Kummer), durchbohrt (*τορῆτος*).

**dichasialis** „dichasial“, Halbierungs- (Wylder, z. B. Verzweigung).

**dichasium** dopp. Seitensprossung, üb. d. Gipfelsprosse hinaus (*διζύω* zerteile etc.).

**dichogamae** m. Wechsel- od. gegen- seit. Zwitterbefruchtgt.

**Dichotomie** = Gabelung eines Triebes (*διχὸς* dopp., *τομὴ* Schnitt).

**dichotōmus** zweiteilig, gabelig.

**dichrōus** zweifarbig (*διχρόος*).

**dielinus** zweilagerig, getrennten Geschlechts (*ζλόρη* Bett), (die Blüten- geschlechter auf demselben Stock beisammen od. auf zweierlei auseinander, monöcisch od. diöcisch!).

**dicoccus** zweikörnig od. -kernig.

**dieranotrichus** doppelspitz- od. gabelzahnhaarig (*διζουανίς* zweiköpfig, *τοίξ, τοίχος* Haar).

**didymus** (*διδύμος*) doppelt, Zwilling.

**differenziert** = unterschieden, in verschiedene Teile auseinandergehend etc.

**diffusus** aufgeteilt, zerspaltet.

**diffusio** „Diffusion“ d. i. gleichmässige Verteilung von Flüssigkeiten in einander.

**diffusus** (e. g. *caulis*) ausgebreitet, auseinander-.

**digestus** verteilt, durcheinandergerührt, „digeriert“ (v. *digēro*).

**digitalis** Fingerhut.

**digitaliformis** fingerhutförmig.

**digitatus** gefingert, in Finger geteilt (*digitus*).

**digitellus** wie Fingerchen geformt (dem. *digitus*).

**Dignität** = mathematischer Wert.

**digynus** zweiförmig, m. zwei Griffeln od. Narben (*δι* u. *γυνή* Weib, Bot. Griffel etc.).

**dilatatus** erweitert, ausgedehnt, (in d. Zeit) verspätet.

**dilutus** verwaschen, verdünnt, verblasst.

**dinner** = zweigliedrig, -reihig (*μέρος* Stück).

**dimidiatus** in zwei Teile get., halbiert.

**dimorphismus** Zweiförmigkeit derselben Art; dimorphe Blüten d. s. mit grossen u. mit kleinen Griffeln.

**dioecus** (-oicus) (*διούκος*) zweihäusig = d. Blütengeschlechter auf zweierlei Stöcken auseinander.

**diosmōsis** „Diosmose“, d. i. Durchschwitzen von Flüssigkeit durch trennende Haut (*διωμὸς* v. *διώγω*).

- dipetalus** zweikronblättrig (*δίταλον* Kron- od. Blumenblatt).
- diphyllus** zweiblättrig, m. 2 Laubblättern (*δίφυλλον*).
- Diplecolobæe** DC. Zweikuchenlappige (Cruciferen).
- discoidens** scheibenförmig (discus, *δίσκος* u. *επίδομα* gleiche).
- Discanthæ** Endl. Scheibenblütler.
- discolor** verschiedenfarbig, bunt.
- Discomycetes** Fr. (-phori DC.) Scheibenpilze.
- discretus** (v. discerno) unterschieden.
- discus** (*δίσκος*) Scheibe, z. B. bei Radiaten, Rebenblütern od. Discanthæ = Scheibenblütern.
- disepalus** (sc. calyx) zweizipflig.
- dispar** ungleich, unähnlich, verschieden, ungleich gross.
- dispermus** zweisamig (*σπέρμα* Samen).
- dispersus** zerstreut, ausgebreitet (v. dispergo).
- dispositio** „Disposition“, Anordnung, Verteilung.
- dissectus** zerschnitten (v. dissecō).
- disseminatus** ausgesät, ausgestreut (semen, -inis Samen).
- dissepimentum** Scheidewand (z. B. im Fruchtknoten).
- dissertatio** „Dissertation“, Abhandlung.
- dissiliens** aufspringend.
- dissitiflorus** entferntblühend (dissitus abgelegene etc.).
- distachyos** zweijährig (*στάχυς*, -νος Ähre).
- distans** auseinanderstehend, entfernt.
- distentus** ausgedehnt, auseinandergezerrt etc.
- distichos** (-us) zweizeilig (*στάχος* Zeile, Reihe).
- distincte** (-us) deutlich getrennt, unterschieden.
- diurnus** über Tag blühend (dies).
- ditio**, -onis Botmässigkeit, Gebiet.
- divaricatus** ausgespreizt.
- divergentia** „Divergenz“, Abstand zweier aufeinanderfolgender Blätter etc.
- diversidens** ungleichzählig, verschieden-.
- Diviona** Dijon (in Burgund).
- divionensis** von Dijon.
- divulsus** auseinandergezerrt (divello).
- Dodecandria** L. Zwölfmännige.
- dodrantalis** zu Dreiviertel.
- dolabratus** axtförmig.
- dolabriformis** axtförmig, -petalus -kronblättrig.
- Donianus** Don's, des Botanikers, nicht d. Flusses Don.
- Doppelachäne** (z. B. bei Doldenfrüchten).
- dorsalis** (v. dorsum) auf d. Rücken befestigt, „dorsal“.
- drasticus** „drastisch“, wirksam, kräftig (*δραστικός* v. *δράω* handle etc.).
- drupa** Steinfrucht, -obst.
- Drupacæe** DC. Steinfrüchtige (-obst).
- drupacæus** steinfrüchtig, steinobstartig.
- drymeius** (v. *δρυμῶς*) in Gehölz wachsend.
- dryophilus** eichen- od. waldliebend (*δρυίς*, -ίος Eiche).
- Duacum** Douai (in Flandern).
- dubius** zweifelhaft, unbestimmt.
- duinensis** von Duino am Golf v. Triest.
- dulcamarus** süßbitterlich, bitter-süss.
- dumalis** in Gebüsch wachsend (v. dumus).
- dumetum** Dorngebüsch, -hecke.
- dumosus** voller Gestrüppe.
- duplex**, -icis doppelt, **duplicatus** verdoppelt.
- duramen** Kernholz.
- durius** hölzern (*δουροειός* od. -ορός).
- durisculus** etwas hart (dem. durus).
- dysentericus** die Ruhr od. „Dysenterie“ betr.
- Eblana** Dublin.
- ebracteatus** ohne Deckblatt.
- Ebrodunum** Yverdon (Schweiz).
- eburneus** von Elfenbein, elfenbeinweiss.
- echinatus** stachelig (*έχινος* Igel).
- echinosporus** stachelsporig, -samig.
- eclöge**, Plur. -gae Auswahl, Auslese.
- edentulus** zahnlos, ohne Zähnen.
- Edina** Edinburg, **edinensis** Edinburger.
- editio** Ausgabe, **editus** herausgeben.
- eductio** Auferziehung, Überführung.
- edulis** essbar.

- efflorescentia** das Aufblühen, die Blütezeit, Ausblühung od. „Efflorescenz“ (v. Salzen).
- effusus** ausgebreitet, locker, auseinander.
- egensis** von Ega (Stadt am Amazonenstrom).
- eläter** Schleuder, Spiralband (Schleuderzelle der Mooskapseln).
- elatiōr** (v. elatus) höher, etwas hoch.
- elegantior** (-ius) besonders elegant od. fein.
- elenchus** (ἐλέγχος) Beweisführung, Inhaltsverzeichnis.
- eleutherogynae** freiweibige, mit freiem Fruchtknoten.
- eleutheropetalae** mit freien (unverwachsenen) Kronblättern i. q. Dialypetalae DC.
- ellipticus** elliptisch, langrund.
- elōdes** (ἐλώδης von ἔλος) sumpfig, in Sumpf wachsend.
- elongatus** verlängert, langgestreckt.
- elytroides** flügeldeckähnlich (ἐλυτιοὺν Futteral, Flügeldecke d. Käfer etc.).
- emarcidus** welk, kraftlos.
- emarginatus** ausgerandet.
- embryōn** der „Embryo“ od. Keimling, der Keim im Innern eines Eis od. Samens.
- emendatus** verbessert, „emendiert“.
- emergentia** (sc. folia) Hervorragungen i. q. Tentakeln, „Emergenzen“.
- emērus** zahm, gebaut.
- emeticus** (ἐμετικὸς) brecheneneremēns hervorragend. [gend.]
- Emodus** (Imaus) **Mons Himalaya** Gebirge.
- emulsio** „Emulsion“, Auswaschung.
- enantioblastae** Endl. Gegensprosser (ἐναντίον gegenüber).
- encephalus** im Kopfe befindlich, hirntartig.
- enchiridion** Handbuch, Heft (ἐγχειρίδιον von ἐν in und χεῖρ Hand).
- encyclopaedia** „Encyklopädie“, Inbegriff der Wissenschaften.
- endemius** (gr. ἐνδημιός) „endemisch“, einheimisch, einem Lande eigen.
- endocarpium** Beerenhaut, (oft verholzte) Innenfruchthaut.
- endodermis** Korkinnenhaut.
- endogēnus** von innen wachsend, „Endogen“ DC.
- endophyta** Innenschmarotzer, -, gewächse“.
- endorrhizae** (sc. Monocotylae) scheidenwurzlige Monocotylen.
- endosmōsis** „Endosmose“, das Eindringen von Flüssigkeit durch trennende Haut.
- endospermum** „Endosperm“, Eiweiss od. innere Kernmasse.
- endosporium** Innenhaut der Mikrosporen (Rhizocarpeen).
- endostomium** Mund od. Öffnung der inneren Eihaut.
- endothecium** innere Schicht der Antherenhaut.
- Energie** = Kraftanstrengung, z. B. des Auswachsens (Vöchting).
- enervius** nervenlos, ohne Adern od. Äderchen.
- enneaphyllus** neunblättrig, m. 9 Laubblättern.
- enōdis** knotenlos, astlos, glatt.
- Ensatae** Endl. etc. Schwertelgewächse (ensis Schwert).
- ensiformis** schwertförmig.
- entomologia** „Entomologie“, d. i. Insektenkunde (ἐντομολογία Insekt).
- enumeratio** Aufzählung.
- ephemerus** „ephemer“, nur einen Tag dauernd (ἐπὶ auf, ἡμέρα Tag).
- epiblastēma** = terminale (an der Spitze befindliche) Antheridien u. Archegonien, Celakowski.
- epiblēma** Wurzeloberhaut (ἐπιβλήμα Decke).
- epicarpium** Fruchtoberhaut (bei Gräsern etc.), Fruchtaufsatz, öfter ablösbar.
- epichilum** Oberlippe (ἐπί u. χεῖλος Lippe, Lefze).
- epichnōus** oberflächlich mit Wolle bedeckt (ἐπιχνοός).
- epicrisis** Auswahl, Beurteilung, weitere Kritik.
- epidendron** (-um) auf Bäumen befindlich.
- epidermis** Oberhaut, oberste Hautschicht.
- epigaeus** (-eus) auf od. über d. Erde wachsend od. kriechend (z. B. Cottyledonen).
- epigyna** (sc. insertio) obenständige Einfügung od. Stellung d. Blüten-teile auf dem Stempel od. Fruchtknoten).
- Epilinum** auf Lein schmarotzend, s. g. Flachsseide.

**epimeliae** (ἐπιμέλεια) Studien.  
**epipetalus** „epipetal“, auf der Blumenkrone stehend (z. B. Staubgefässe, Celakowski).  
**epiphyllus** auf Laub wachsend (e. g. flos).  
**epiphytus** auf Pflanzen schmarotzend.  
**epipsilus** oben kahl od. nackt (ψιλός).  
**epiroticus** „epirotisch“, aus Epirus (Nordwestgriechenland).  
**epistaminia** Juss. mit oberständigen Staubfäden.  
**epithelium** zarte Oberhaut (ohne Spaltöffn.), „Epithel“.  
**Epithymum** auf Thymian schmarotzend.  
**epizoothia** auf Tieren wachsend. Pilze (ἐπιζώον Tier u. ὠφέλομαι dränge mich auf).  
**equitans** reitend, auf ein. Stengel gegenübergestellt (z. B. bractea).  
**erectusculus** ziemlich od. fast aufrecht. [recht. erectus aufrecht].  
**ergoté** fr. mit Sporen versehen (seigle = s. g. Mutterkorn).  
**ericaeus** auf Heiden vorkommend.  
**ericetum** Waldheideplatz.  
**erinaceus** (herinac.) Igel, igelartig, stachlig.  
**eriocarpus** wollfrüchtig (ἐριον).  
**eriphorus** Wolle tragend. [Wolle].  
**eriosthemon** saubfadewollig (στῆμων lat. stamen Staubfaden).  
**ermineus** hermelinartig (erminea Hermelin).  
**erosus** ausgenagt.  
**erraticus** umherirrend (z. B. erratischer Block in d. Geologie).  
**erucaefornis** (bess. erucif. -) rauken- od. raupenförmig.  
**erythraeus** am roten Meer wachsend (mare erythraeum, gr. ἔρυθραίων).  
**erythrocarpus** rotfrüchtig.  
**erythrophyllum** Blattrot i. q. anthocyänum.  
**erythrophyllus** rotblättrig.  
**erythropus** rotfüssig, -stielig.  
**escharoides** (ἐσχάρωδης) schorfartig, grindig.  
**esulentus** essbar.  
**eskius** (e. g. Festuca eskia) ausser Schatten wachsend (e od. ex, σκία Schatten).  
**esulus** (neulat. dem. esus gegessen) essbar.

**esuriendum** der Hungernden od. Hungrigen.  
**étiolées** (sc. feuilles) „etioliert“, bleichsüchtig.  
**Etiolin** i. q. xanthophyllum „Blattgelb“, beim s. g. Vergeilen der Bleichstoff.  
**etruscus** etruskisch, aus Etrurien (Toskana).  
**etymologia** „Etymologie“, d. i. Kunde von der Bedeutung der Wörter.  
**euganeus** euganeisch (Gegend v. Padua in Venetien).  
**eumorphus** wohlgestaltet, schöngebildet.  
**evernius** gutwachsend, wohlgewachsen (ἐδεονής von ἐδεονέω gedeihe etc.).  
**evolutio** „Evolution“, Aufwicklung.  
**evolutus** aufgewickelt, entwirrt.  
**evolvens** aufwickelnd, eine s. g. „Evolvente“ bildend.  
**exalbuminosus** ohne Eiweiss (Albumen).  
**exanthema** (ἐξάνθημα) „Exanthem“, d. i. Ausschlag, Aussatz.  
**exanthematicus** wie Aussatz aussehend.  
**excelsior, -sus** höher, hoch.  
**Excentrität** d. i. Abstand der Ellipsenbrennpunkte von der Mitte.  
**excipuliformis** trichterförmig.  
**excipulum** Hülle (der Pilze etc.), Auffanggefäss, Trichter.  
**excisus** ausgeschnitten.  
**excoriatus** enthäutet, geschunden (corium Haut, Leder).  
**excorticatus** entrindet (cortex, -icis).  
**excretio** Ausscheidung.  
**excursorius** zu Excursionen (Ausflügen) bestimmt.  
**exhibens** darstellend, von sich gebend.  
**exiguus** klein, winzig, gering.  
**exilis** dünn, mager, niedrig.  
**exine** = äussere Haut des Pollenkorns.  
**exogenus** aussen wachsend, „Exogen“ DC.  
**exoniensis** von Exonia, d. i. Exeter (engl. Südküste).  
**exorrhizae** (sc. Dicotyledones) nackt od. freiwurzlige D.

- exosmōsis** „Exosmose“, d. i. Herausdringen von Flüssigkeit durch trennende Haut.
- exostomium** Mund od. Öffnung d. äusseren Eihaut.
- exothecium** äussere Antheren-Hautschicht.
- exoticus** „exotisch“, d. i. aus fremden Ländern stammend.
- Expansionskraft**, Ausdehnungs- od. Spannkraft (Pfeffer, periodische Reizbewegung).
- expansus** ausgedehnt, ausgebreitet.
- explanatus** ausgebreitet, deutlich.
- expositio** Auseinandersetzung, -tus auseinandergesetzt.
- excāpus** schaft- od. stengellos.
- exsertus** herausgestreckt.
- exsiccat** ausgetrocknet.
- exstipulatus** ohne Nebenblatt, nacktachelig, -winklig.
- exsuccus** saftlos, ausgetrocknet.
- extensus** ausgedehnt, weitläufig.
- exterior** äusserer, **extimus** äusserster, ganz aussen.
- extinctorius** auslöschend, zerstörend.
- extra-axillaris** ausserblattwinklig (z. B. Ranke, Warming).
- exuviatus** abgehäutet, als Balg abgestreift.
- Eystettensis** von Eichstädt (Bayern).
- fabacēus**, -arius bohnenartig.
- faciōla** Buchenbewohner, an od. bei solchen wachsend.
- falcatus**, -arius sichelförmig (falx, -cis Sichel).
- falcifolius** sichelblättrig.
- fallax**, -acis trügerisch, täuschend.
- farcimentum** Füllsel, Wurst.
- fartus** (fartus) vollgestopft (v. farcio).
- farina** Mehl, -acēus, -osus mehlig.
- farnesianus** farnesisch, v. Palast der Farnese in Florenz.
- fasciatio** Verbänderung, d. i. Verbreiterung der Stammgebilde.
- fasciatus** gebändert (fascia Band, Binde).
- fascicularis**, -atus bündelförmig.
- fasciculus** Bündel, Büschel, „Fascikel“, i. q. glomerulus.
- fastibilis** widerlich.
- fastidiosus** ekelerregend, verdriesslich.
- fastigiatus** gegipfelt, flachgipfelig, ebenstrüssig.
- fastuosus** prächtig, prachtvoll, stolz etc.
- fatuus** weissagend, Wetter verkündigend, auch auffällig, albern (Kummer: fad).
- faux**, -cis Schlund.
- Faventia** Stadt Faenza (in der Romagna).
- febrilis** fieberartig, -heilend (febris Fieber).
- febrifugus** Fieber vertreibend.
- febrinus** reinigend.
- fecundus** (foec-) fruchtbar, ergiebig.
- Federgranne** = Schwanz auf Schliessfrüchten.
- Federkrone**, z. B. am Kelchrand der Baldrianfrüchte.
- femina** Weib, -nēus, -nīnus weiblich.
- fenestratus** gefenstert, durchbrochen.
- fennicus** finnisch, aus Finnland.
- fenum** (foenum) Heu.
- ferax**, -cis fruchttragend, Ertrag liefernd.
- ferinus** Wild betr. (ferina Wildpret).
- fermentum** „Ferment“, Gärungserreger, Hefe.
- ferox**, -ocis wild, kriegerisch abwehrt, stark bestachelt.
- ferruginēus** rostfarbig, -gelb.
- ferrugo**, -inis Eisenrost.
- fertilis** fruchtbar.
- fērus** wild.
- fibrillae** Wurzelfasern od. -zasern.
- fibrillosus** u. **fibrosus** faserig (fībra Faser).
- fibro-vasalis** Fasergefässe od. Gefässbündel betr.
- ficarius** feigenknollig (ficus Feige).
- ficifolius** feigenblättrig.
- ficoidēs** feigenartig.
- filamentum** Faden, Staubfaden.
- filicaulis** fadenstenglig (filum Faden).
- filiculosus** wie kleines Farnkraut (filiculus dem. v. filix, -cis Farn).
- filifolius** fadenblättrig.
- filiformis** fadenförmig.
- filipendulus** an Fäden hängend (z. B. Knollen an Wurzelfäden).
- filopes** (st. filipes) fadenfüssig, -stielig.
- Filtrationswiderstand** des Protoplasmas, wodurch der Wasser-

- druck oder Turgor der Zellen bewirkt wird.
- filtrum** „Filter“, fr. filtre Seihe, Durchschlag.
- fimbria** Franse, -atus gefranst.
- fimicöla** Dung- od. Mistbewohner (finum od. -us Mist).
- fimiputris** dungfaul.
- fissus** gespalten.
- fistula** „Fistel“, Röhre, -osus röhrenförmig.
- flabelliformis** fächer- od. fächerförmig.
- flabellum** Fächer, Wedel, **flabellus** fächerlig.
- flaccidus** od. **flaccus** welk, schlapp, flatternd.
- fladnizensis** von den Fladnitzer Alpen (in Kärnthen).
- flagelliformis** peitschenförmig.
- flagellum** Geißel, Peitsche, Schössling od. Ausläufer.
- flammula** (dem. flamma) Flämmchen.
- flexilis** biegsam, gebogen.
- flexipes** schlangenförmig (Kummer).
- flexuosus** hin- und hergebogen.
- floccidus**, -cosus flockig, flockenfaserig.
- floccus** Flocke, Wollenfaser, Wolle.
- Flöra** eig. Göttin der Blumen u. Blüten, in d. Botanik = Pflanzeninbegriff.
- florescentia** „Florescenz“, d. i. Blütenbildung, das Aufblühen.
- florëus** blumig, blumenreich.
- floribundus**, -ridus blumig, reichblühend etc.
- florifer**, -ger, -ëra blüentragend.
- florilegium** Blumenlese.
- Florula** (dem. Flora) kleine Flora.
- flos**, -öris Blume, Blüte, **flores** = Thee.
- flosculus** Blümchen, -losus m. kleinen Blütchen vers.
- flos compositus** zusammengesetzte Blume, Blütenkorb.
- Flughaare**, z. B. Pappel- u. Weidenwolle.
- fluitans** flutend, auf fließ. Wasser aufliegend od. darin vorwärtstrebend.
- Fluminensis** (sc. Flora, Fl. Flum.) von Rio-Janeiro.
- fluvialis**, -aticus im Fluss wachsend.
- focus** Brennpunkt, z. B. der Ellipsen, Parabeln etc.
- foecundatio** Befruchtung.
- foecundus** (fecundus) fruchtbar.
- foeminëus** (fem.-) weiblich.
- foeniculacëus** fenchelartig.
- foenum** Heu, foenum graecum, s. d. Nomenklatur.
- foetens**, -tidus übelriechend, stinkend.
- foliacëus** blatt- od. laubartig.
- foliatus** beblättert, blattführend.
- foliolum** Teilblättchen eines zusammengesetzten (gefiederten etc.) Blatts.
- foliosus** blattreich, blättrig, **folium** (*φύλλον*) Laubblatt.
- folliculus** Balgfrucht d. i. aus einem an d. Bauchnaht aufspringenden Fruchtblatt bestehend.
- follicularis** balgfrüchtig.
- fomentarius** Zunder liefernd.
- fongus** (fr.) lat. fungus Schwamm, Pilz.
- fontänus** in Quellen zu finden, aus solchen stammend (fons, -tis).
- fontigëus** in Quellen erzeugt.
- forcipatus** zangenförmig (forceps, -ipis).
- formatio** „Formation“, Bildung (Gesteinschicht etc.).
- formosianus** von d. Insel Formosa bei China).
- formosus** schöngeformt, stattlich etc., -issimus besonders stattlich.
- fornicatus** mit Bogenwölbungen od. Schüppchen.
- fornix**, -icis Bogen, Wölbung, -ices Schüppchen od. Klappen.
- fovëa** (dem. -veöla) Grube, Honigrube (Grübchen).
- foveolatus** mit Grübchen versehen.
- foveosus** grubig, mit Honigruben.
- fovilla** feuchter Polleninhalte, Befruchtungsstoff.
- fragifer**, -ëra Erdbeeren tragend (fragum).
- fragilis** zerbrechlich, gebrechlich.
- fragmentum** „Fragment“ d. i. Bruchstück.
- fragrans** (sc. odor) duftend, davon **Fragaria** Erdbeere.
- Francfurtum** Frankfurt.
- francoëicus** aus Franken.
- frangulus** zerbrechlich.
- fraternus** brüderlich, verwandt.
- fraxinëus** eschenartig, von Esche.
- fribergensis** von Freiberg (in Sachsen).

**friburgensis** von Freiburg.  
**frigidus** kalt, im Kalten wachsend.  
**fritillarius** brettspielartig.  
**fritillus** Würfelbecher und Brettspiel (-um Schachbrett).  
**frondescentia** Belaubung.  
**frondosus** laubblättrig (frons, -dis Laub).  
**frons**, -tis Stirne, „Fronte“.  
**frutescentia** Fruchtbildung.  
**fructigenus** auf Früchten sich erzeugend.  
**fructus** fr. fruit Frucht.  
**frugilegium** Fruchtlese, Fruchtsammlung.  
**frustraneus** vergeblich, umsonst (bei Compositen die unfrucht. Strahlenblüten).  
**frustulatus** zerstückelt (frustum Bissen, Bisschen).  
**frutescens** strauchartig, einen Strauch bildend.  
**frutex**, -icis Strauch.  
**fruticans** strauchartig wachsend, strauchbildend.  
**fruticetum** Gesträuch, Gebüsch.  
**fruticosus**, -ulosus strauch-, etwas strauchartig.  
**fuscophyllus** schminkblättrig.  
**fucatus** geschminkt, nnecht.  
**fuciflorus** hummelblütig, mit Blüten wie Hummeln.  
**fucoides** (-deus) tangartig, **fucus** (gr. *φύκος*) Meertang.  
**fulcrum** Stütze, Stützblatt.  
**fulgens**, -gidus glänzend, leuchtend, strahlend.  
**fuliginæus** russig, ruffarbig (fuligo, -inis Russ).  
**fuliginoides** russähnlich, -artig.  
**fuliginosus** russig, ruffarbig.  
**fullonum** (Gen. Pl. v. fullō) der Walker od. Tuchbereiter.  
**fulvus** rot- od. braungelb.  
**fumosus** rauchig, rauchgrau.  
**funalis** strickartig (funis Strick, Seil).  
**fundamentum** „Fundament“, Grundlage.  
**fungosus** schwammartig (fungus Schwamm, Pilz).  
**funiculus**(dem. funis)Strang, Nabelstrang, Träger des Samens.  
**funifer**, -era strickführend.  
**furax**, -cis diebisch, verstholen.  
**furea** Gabel, -catus gabelig.  
**furcellatus** in Gabelchen geteilt.

**furfura** Kleien, -acæus kleienartig.  
**furvus** finster, dunkel, schwarz.  
**fuscescens** braunwerdend.  
**fusco-ater** braunschwarz.  
**fuscus** dunkelbraun, braun.  
**fusiformis** spindelförmig (fusus).  
**fusipes** spindelfüssig, -stielig.  
**fusus**, -i Spindel, -fusus, -a (in compos.) fließend, fliegend oder wallend, lagernd od. hingestreckt.

**Gaada** Gouda (Holland).  
**galbanus** grüngelb, bräunlichgelb.  
**galbulus** Beerenzapfen (z. B. Wachholder-, Thuja- etc.).  
**galeatus** behelmt, mit Helm versehen.  
**galericulatus** mit e. Helmchen od. Häubchen versehen.  
**galërus** Mütze, Kappe, Haube etc.  
**galloides** labkrautähnlich (Galium).  
**galli** (Gen. v. gallus) des Hahnen.  
**gamalensis** von Gamala (am See Genezareth).  
**gambosus** hufförmig (ital. gamba, fr. jambe, gr. *καμπή*).  
**gamopetalus** ganzkronig, m. verwachs. Krone.  
**Gandavum** fr. Gand Gent, **gandavensis** Genter.  
**garganicus** vom Monte Gargano (Süditalien).  
**Gasteromycetes** Fr. Bauchpilze (*γαστήρ* u. *μύκης*, -ήτος).  
**gazophylacium** Schatzkammer (*γάζα* u. *φυλάκειον* od. -ίον Wacht).  
**Gebenna** Cevennengebirge (Südfrankr.).  
**Gedänum** Danzig.  
**Gegenfüßlerinnen** = Zellen b. d. Embryobildung, Gegensatz zu d. Synergiden (Strasburger).  
**Gelatin** = Gallert, fr. gelée.  
**gelatinosus** gallert- od. geléeartig.  
**gelidus** eiskalt.  
**gelinum** Tanggallert, Gelin (v. gelo erstarre).  
**geminus** doppelt, Zwilling.  
**gemma** Auge, Knospe, -atus damit versehen.  
**gemmifer** knospentragend, mit Augensprossen.  
**gemonensis** glemanisch, von Gleman od. Gemona in Friaul.



**Genabŭm** Orleans.

**Genēva** fr. Genève Genf, **-vensis** Genfer.

**generatio** „Generation“, Zeugung, Entstehung.

**Generationswechsel** (bei Pilzen z. B. Getreiderost, erst als Berberizenrost).

**genianthus** bartblütig (v. *γένειον* Kinnbart).

**geniculatus** gekniet, kniegelenkig.

**genitale** (Pl. -lia) Geschlechtsteil.

**gentilis** aus edlem Geschlecht, fein, verwandt (Kummer).

**gemŭnus** ein- od. angeboren, echt, natürlich.

**genus**, -eris Geschlecht, Gattung, Sippe.

**-gēnus**, -čna etc. adj. verb. in comp. erzeugt (v. *γένω*).

**Geotropismus** = Streben d. Pfl. nach d. Erdmittelpunkt (positiver der Wurzeln, negativer des Stengels.)

**germen**, -inis Fruchtknoten.

**germinans** keimend.

**germinatio** Keimung, das Keimen.

**gibbosus** bucklig, höckerig (gibbus Buckel).

**gigantēus** riesenhaft, „gigantisch“ (*γίγαντιος*).

**gigartinus** mit Weinbeerkernen (F. W. Riemer, Lexik.), m. Weinbeeren versehen (*γίγατον*).

**gigno** erzeuge, bringe hervor.

**gilvus** isabell- od. fahlgelb, hell-, erbsengelb.

**Gissa** Giessen (Univers.), **-ensis** Giessener.

**glaber**, -bra glatt, **-berrimus** sehr glatt.

**glabratus** geklätet, kahl.

**glacialis** eisig, um Eis od. Gletscher herum wachsend.

**glandŭlae** „Glandeln“, Drüsen.

**glandulosus** drüsig, drüsenführend.

**glans**, -ndis Eichel, Kernfrucht.

**glastifolius** glas- od. waidblättrig.

**glaucescens** blau- od. grau grünlich.

**glaucŭpus** blaugraufüssig, -gestielt.

**glaucus** (*γλαυκος*) blaugrün, grau-grün.

**Gliederhŭle** (-schote) lomentum, aus abgesetzten Gliedern gebildet.

**Globoŭd** = rundliches Körperchen in den Proteinkörnern des Klebermehls.

**globosus** kugelig (globus).

**globŭlus** Kügelchen.

**globulifer**, -era Kügelchen tragend.

**-glochis** od. **-chis** (Gen. -idis) Spitze (gr. *γλῶχιν* od. *-χίς*).

**glomeratus** knäuelig, geknäuel.

**glomerŭlus** kleiner Knäuel od. Büschel i. q. fascicŭlus.

**glossoides** (gr. *γλωσσειδής* od. *-ώδης*) zungenähnlich.

**Glottia** Glasgow, **-ttianus** von Glasgow.

**gluma** Spelze, Spreublatt, Kelchschuppe der Gräser.

**glumaceus** spreu- od. spelzartig, **-cēae** „Glumaceen“ d. s. Gräser u. Halbgräser.

**glumella**, Blütenspelzchen.

**gluten**, -inis Leim, Kleber.

**glutinosus** klebrig, schmierig (s. eb.).

**glycearŭs** süssnüssig (*γλυκύς* u. *ζάουον*).

**glyciŭsmus** süssduftend (*ὄσμη*) Duft.

**glyciphyllus** süssholzblättrig (abgk. v. *Glycirrhiza* u. *γύλλον*).

**Glykose** = Süss- od. Zuckerstoff.

**gongylodes** rübenrund, kohlrabenförmig (*γογγύλος* rund).

**gonidia** „Gonidien“, d. s. Grünzellen der Thallus-Mittelschicht b. Algen u. Flechten (v. *γονή* Samen, *εἶδομαι* gleiche).

**gracilentus** u. **gracilis** dünn, schlank, zierlich.

**gramen**, -inis Gras, **graminēus** grasartig.

**Graminēae** DC. Grasgewächse.

**graminifolius** grasblättrig.

**granatus** mit Kernen gefüllt (granum Korn etc.).

**grandiceps** grossköpfig.

**grandiflorus** grossblütig, **-folius** grossblättrig.

**granifer** korn- od. kerntragend.

**granulatus** gekörnelt, mit Körnchen versehen.

**granulŭs** Stärkemehl (i. q. fari-nosis).

**granŭlum** (dem. granum) Körnchen.

**gratissŭmus** (Superl. v. *gratus* angenehm) äusserst angenehm.

**graveolens** starkriechend.

**grosse**, -us grob, dick u. stark.

**grossificatio** Schwängerung, das Dickwerden.

**grossularius** einer kleinen, unreifen Feige gleich.

- Gruinales** Endl. Storchschnäbler (grus, -is Kranich etc.).  
**grumosus** hügelig, klumpig, voller Knollen.  
**grundständige Blüte**, z. B. Zeitlose.  
**Gryphia** (Gryphiswalda) Greifsguestphalicus westfälisch. [walde. gummifer, -era gummitragend. gummosus gummiartig. guttatus getropfelt, gedüpfelt. guttifer, -era harzsafthaltig. gymnoblastae (sc. Acotyledones) Nacktkeimer. gymnocarpus nacktfüchtig. Gymnomycetes Rehb. Nacktpilze (μύκης Pilz). gymnospermus nachtsamig. gymnostomus nachtmündig. gynaeceum Stempelgesamtheit (γυναικείον Weiberstube). gynandreae, -dria L. Weibermännige (γυνή, ἀνήρ, -ῥοος). gynostemium Befruchtungssäule gynandrischer Pflanzen. gyrans sich im Kreis herumdrehend. gyroflexus in einen Kreis herumgebogen.
- habēna** Riemen, Zügel.  
**habitus** Haltung, Aussehen, „Habitus“.  
**hadiensis** aus Hedschas (Hedjas) in Arabien.  
**Hafnia** (Haunia, Havnia) Kopenhagen.  
**hafniensis** Kopenhagener.  
**HagaComitum** Gravenhagen (Haag).  
**Hala** Halle, -ensis von Halle, Hallenser.  
**Halbfächer** (z. B. Mohnkapsel) mit Halbscheidewänden.  
**halepensis** von Halep (Aleppo) in Syrien.  
**halicacabus** judenkirschartig.  
**halicensis** galizisch, von Halicz (Galizien).  
**hamatus** hakig, hakenförmig.  
**Hammonia** Hamburg.  
**hamulatus** hakenförmig.  
**hamulus** (dem. hamus) Häkchen.  
**hereynianus** vom Harzgebirge.  
**Hassia** Hessen, — inferior Niederhassläcus hessisch. [hessen. **hastatus**, -ilis spießförmig, -blättrig od. -früchtig.  
**hastifolius** spießblättrig.
- Haube** (z. B. Wurzel-) = oberste Schicht etc.  
**Hauffrucht**, z. B. Anona u. Magnolia.  
**hauanensis** von Havannah.  
**Haunia** (Havnia) Kopenhagen s. Hafnia.  
**haustellaris** trinkgefäßartig.  
**haustoria** Saugwarzen<sup>1)</sup> (z. B. der hederacēus epheuartig. [Cuscuta].  
**heleonastes** Sumpfbewohner (ἔλος, -εος u. νείστυς).  
**helicoidēa** (sc. cyma unipāra) eine schneckenartig gekrümmte Schraubel.  
**helioscopius** sonnenwendig, nach d. Sonne sehend (ἥλιος u. σκοπεῖν).  
**heliotropismus** (H. Müller) das Wenden nach der Sonne (positiver) und von d. Sonne weg (negativer).  
**helleborine** die Niesswurzartige (ἑλλεβορινός, -ή).  
**helmstädiensis** von Helmstädt (Prov. Hannover).  
**helobiae** Endl. etc. Sumpfbewohner (ἔλος, -εος).  
**helveticus** aus Helvetien, Schweizer.  
**helvölus** (dem. helvus) bleichrot, rötlichschimmernd.  
**hemisphaericus** halbkuglig (ἡμι u. σφαίρα).  
**hemitrichus** zur Hälfte behaart.  
**hepaticologia** Lebermooskunde.  
**Hepaticae** Juss. (-ci Rehb.) Lebermoose.  
**hepaticus** Leber betr. (ἥπαρ, -ατος).  
**heptangulus** siebenneckig, -kantig.  
**Heptandria** L. Siebenmännige.  
**heptaphyllus** siebenblättrig.  
**herbacēus** krautartig (herba Kraut).  
**herbarium** Kräuter- od. Pflanzensammlung.  
**hercogamia** Hindernis- od. Zaun- ehe (ἔοχος Zaun) d. i. durch Stellung der Geschlechtsteile gehinderte Selbstbefruchtung einer Blüte.  
**hereynianus** vom hereynischen od. Harzwald.  
**hermaphroditus** Zwitter (näml. zugl. m. männlichen u. weibl. Geschlechtsteilen).  
 (Hermes = Mercur, Aphrodite = Venus.)

1) nicht Hausterien (z. B. Druckf. in Schillings Grundriss, 13. Ausg.).

- hermeticus** „hermetisch“ (n. Hermes Trismegistus) gänzlich abgeschlossen.
- herpeticus** (ἑρπητικὸς) kriechend, zum Kriechen geschaffen.
- herrenhusanus** von Herrenhausen b. Hannover.
- heterodromus** die Richtung od. Stellung wechselnd.
- heteromallus** auf einer Seite wollig (ἑτερομούλλος).
- heteromerici** (sc. Lichenes) Flechten mit mehrschichtigem Lager.
- heterophyllus** verschiedenblättrig, mehrerlei Blätter führend.
- heterospermus** verschiedensamig.
- heterospörae** verschieden- d. i. gross- u. kleinsporige (z. B. Bärlappe).
- heterostylia** verschiedengrosse Griffel u. Staubgefässe zur Verhütung der Selbstbestäubung.
- hetruscus** u. **Hetruria** s. etruscus u. Etruria (j. Toskana).
- hexagynus** sechsweibig, -griffelig, -narbig.
- Hexandria** L. Kl. d. „Sechsmännigen“.
- hexastichos** (-us), -on (-um) sechszeilig, -reihig.
- hians** klaffend, aufgesperrt (hio klaffe).
- hibernaculum** Winterquartier, Wintergestalt einjähriger Kräuter.
- Hibernia** Hibernien od. Irland, -nicus irischn.
- hibernus** winterlich.
- hiemalis** winterlich (v. hiems, -mis W.).
- hieracioides** habichtskrautähnlich (Hieracium).
- hierobotanicon** Buch der heiligen Kräuter (ἑροβοτανική d. heil. Kr.).
- hierochunticus** (-tinus) aus Jericho (Palästina).
- Hierosolyma** Jerusalem.
- hilum** Nabel.
- Hippocastanum** Rosskastanie (ἵππος, καστανόν).
- hircinus**, -eosus bocksartig.
- hirculus** (dem. hircus) Böckchen.
- hirsutus** rauhaarig, struppig.
- hirtaeformis** borstenförmig.
- hirtus** rauhaarig.
- hispanicus** (-anus) spanisch, **Hispania** Spanien.
- hispidus** rauhaarig.
- hissatus** aufgehisst (fr. hisser, ital. issare hissen, d. i. aufziehen, nämli. d. Flagge).
- Holeraceae** (Olerac.) L. Gemüsekräuter (olus, -ëris).
- Holmia** Stockholm.
- hololeucus** ganz weiss (ὀλόος, λευκός).
- holosericeus** ganz seiden, sammetartig (σφιγκός).
- holosteus** ganz knöchern, knochenhart (ὀστεός knöchern).
- Holsatia** Holstein, -saticus holsteinsch.
- homodromia** Gleichläufigkeit, die Richtung od. Seite beibehaltende Stellung (ὁμός u. ὁόμος Lauf).
- homoeomericus** (sc. Lichen) mit einschichtigem Lager.
- homonemus** im Wald zusammen wachsend, zusamm. weidend (νέμος, -εος Wald, Weide).
- hondensis** von d. Stadt Honda am Magdalenenfluss (Südamerika).
- hordeaceus** gerstenartig (Hordeum).
- hordeisticus** gerstenzeilig.
- hornus** heurig, diesjährig.
- horridus** zottig, struppig.
- hortensis** in Gärten wachsend.
- hortulanus** Gärtner.
- hospitor** (-ari) „hospitiere“, nehme als Gast teil.
- hospitus** fremd, Gast.
- humifusus** auf die Erde hingegossen,
- humilis** niedrig. [-gestreckt.
- humus** Damm- od. Gartenerde, Humusboden.
- Hungaria** Ungarn, -ricus ungarisch.
- hyalinus** gläsern, von Glas (ὕαλι).
- hibernaculum** s. hibern.
- hybridatio** Bastardbefruchtung.
- hybridus** unecht, Bastard.
- hydnoïdes** stachelpilzähnlich (Hydnum).
- Hydrogen** = Wasserstoff (v. γένω erzeuge).
- hydrogramma** Wellenstrich.
- Hydrocarpes** Lk. Wassernussgewächse.
- hydrophorus** wasserhaltig, wässrig.
- Hydrophyta** Endl. Wassergewächse (Algen).
- hydropiper** Wasserpfeffer.
- hydrotropismus** Pflanzenbewegung im Wasser.
- hygrometricus** (-metrus) Feuchtigk. anzeigend, wetterprophetisch (ὕγρος u. μετεωρέω messe).

- hygrophilus** Feuchtigkeit od. Nässe liebend.
- hymenium** Keimhaut der Pilze (*ὄμιον*, *-έρος*), näml. die Sporen tragende, von Basidien gebildete Fruchthaut.
- hymenodon** Hautzahn (*ὄμιον* u. *ὄδων*).
- Hymenomycetes** Fr. Hautpilze.
- Hyperbel** = Kegelschnittcurve parallel der Kegellachse.
- hyperboræus** nordisch, im Land d. Hyperboræer.
- hyphen** (v. *ἕψη* Gewebe) verzweigt. Fadengewebe od. fadenförm. aneinandergedrehte Zellen d. Pilze.
- Hyphomycetes** Fr. Fadenpilze.
- hypnoides** astmoosähnlich (Hypnum etc.).
- hypochilum** Unterlippe (*ὕπὸ* u. *χείλος*).
- hypocotylus** unter den Cotyledonen befindlich.
- hypocateriformis** teller- od. untertassenförmig.
- hypogæus** untererdig (*ὑπόγειος* v. *ὑπὸ* u. *γῆ* Erde).
- hypoglottis** (Geschwulst) unter d. Zunge (*γλωττίτις*).
- hypogynus** unterstemplig, mit unterständigem Stempel.
- hypoleucus** unten weiss.
- hypopetalus** unterkronblättrig, mit unterständigen Kronblättern.
- hypophegæus** unter Buchen wachsend (*φηγῶς* lat. *fagus*).
- hypophyllus** unter Laub befindlich.
- hypostaminea** Juss. mit unterständigen Staubfäden.
- hypothallus** verfilztes Sporenfadengewebe der Pilze etc., „Unterthallus“.
- hypothëus** unten schwefelgelb (*ὑπὸν* od. *ῥέιον* Schwefel).
- hypsipetes** hochfüssig, -stielig (*ὑψι* hoch u. *pes* Fuss).
- hyrcæus** aus Hyrkanien (am Kaspiischen Meer).
- hystrix** igelstachelig (*ὕστρις* Stachelborste).
- jaculiformis** spieß- od. pfeilförmig.
- Iberia** Iberien (s. sogl.) od. Armenien (südl. v. Kaukasus).
- ibericus** iberisch, **Iberus** Ebro in Spanien (Iberien).
- ichoratus** rötlichgelb (v. *ἰχὼρ* blutähnliche Flüssigkeit).
- icæones** (v. *εἰκῶν*, *-όνος*) Abbildungen.
- Icosandria** L. Kl. d. Zwanzigmännigen (XII. Kl.).
- ieterinus** gelbsüchtig (v. *ἰκτερός* Gelbsucht).
- idaeus** vom Berg Ida (auf Creta).
- jemenicus** von Jemen (Yemen) in Arabien.
- jenensis** von Jena.
- igniarius** zu Feuer dienend, Feuer betr.
- iguanæus** Iguane od. Leguane betr. (iguana Leguan, eine Baumeidechse).
- illegitimus** „illegitim“, ungesetzlich, z. B. Befruchtung durch d. Blütheile derselben dimorphen Blütenform (Darwin).
- illustratio** „Illustration“, Erklärung mit Abbildungen.
- ilvensis** von d. Insel Ilva (Elba).
- Imaus Mons** (Emodus) Himalaya, **Imaus Seythicus** Tschiansan od. Muztagh (Innerasien).
- imbecillis** u. **-us**, fr. imbecille schwach, kraftlos.
- imberbis** bartlos (in u. barba).
- imbibitio** „Imbibition“, Einsaugung (z. B. der Zellhaut).
- imbricatus** (v. *imbrex*, *-icis*) wie mit Ziegeln bedeckt, hohlziegelartig.
- immersus** eingetaucht.
- impensus** darauf verwendet, **-sa** Kosten, **-sis** auf Kosten.
- imperialis** kaiserlich.
- impressus** eingedrückt.
- impubes** nicht mannbar, unbehaart.
- imus** unterster.
- inaequalis** ungleich.
- incæus** ganz grau, altersgrau.
- incarnatus** fleischrot, schön rot, „incarnat“.
- inchoatus** angefangen, versucht.
- incisus** eingeschnitten.
- inclinatus** geneigt, gebückt.
- inclusus** eingeschlossen.
- incœla** Bewohner.
- incomparabilis** unvergleichlich.
- incomplētus** unvollständig.
- inconspicuus** unansehnlich.
- inconstans** unbeständig.
- incrustatus** „inkrustiert“, als Krustenüberzug.
- incubaeus** zum Brüten aufsitzend.

**incurvus** eingekrümmt, krumm.  
**index**, -icis Anzeiger, Inhaltsverzeichnis.  
**indigēna**, -nus Eingeborner, einheimisch.  
**indivīsus** ungeteilt.  
**indumentum** Überzug, Bekleidung.  
**indusium** Schleierchen der Sporangien (b. Farnen).  
**inebrians** berauschend.  
**iuermis** unbewaffnet, stachellos.  
**infectorius** färbend, zum Färben dienend.  
**inferior** unterer, niederer, auch geringer.  
**inferus** unten befindlich, unterer.  
**infestans** feindlich, bewaffnet.  
**infestus** feindlich, bewaffnet.  
**infimus** unterster.  
**inflātus** aufgeblasen.  
**inflexus** einwärtsgebogen.  
**inflorescentia** „Inflorescenz“, Blütenstand.  
**infractus** geknickt, ungebrochen.  
**infundibuliformis** trichterförmig.  
**infusum** Aufguss, **infusorium** Aufgusstierchen.  
**ingricus** ingrisc, aus Ingermannland (um St. Petersburg).  
**initiale** Anfangspunkt (z. B. d. Wurzelkörpers).  
**inodorus** geruchlos.  
**inornatus** ungeschmückt.  
**inquilinus** Einmieter, Insasse.  
**inquinans** schmutzend, **-natus** beschmutzt.  
**inseulptus** eingegraben, eingepreßt.  
**insertio** Einfügung, **insertus**, eingefügt, inseriert“.  
**insidens** aufsitzend.  
**insititius** zum Pfropfen gebraucht, **insitus** gepfropft.  
**instructus** versehen, eingerichtet, „instruiert“.  
**insubricus** insubrisch (Insübres, Volk der Umgegend v. Mailand).  
**insuētus** ungewohnt, ungewöhnlich.  
**insulsus** unschmackhaft, abgeschmackt, „ungesalzen“.  
**intēger**, -gra unverletzt, ganz.  
**integerrimus** ganz unverletzt, vollkommen ganz.  
**integrifolius** ganzblättrig.  
**integumentum** Ei- od. Samenhülle.  
**intercalaris** eingeschaltet, z. B. intercalares Wachstum des Blütenbodens (Schwendener).

**intercellulare** Zwischenzellenraum.  
**intermedius** mittlerer.  
**interne** (-nus) innerlich, innerer.  
**internodium** Stengelglied zwischen je zwei Knoten, Zwischenknoten-glied.  
**interponiert** (Schwendener) dazwischengestellt (z. B. Quirle).  
**interrupte** (-tus) unterbrochen.  
**intestinalis** eingeweid- od. darmartig.  
**intextus** ein- od. zwischengewoben.  
**intimus** innerster.  
**intina** „Intine“ d. i. Innenhaut des Pollenkorns.  
**intra** innerhalb.  
**intricatus** in einander gewirrt, verworren.  
**introrsum** einwärts.  
**intrusus** (v. intrudo) eingedrungen, hineingestossen.  
**intubus** Endivie (v. tubus Röhre, -röhriger Stengel!).  
**intus** inwendig, im Innern.  
**intussusceptio** Wachsen der Zellohaut einwärts, Zunahme nach innen etc.  
**Intybus** s. intybus.  
**inulēns** alantartig (v. Inula s. Nomenkl.).  
**Inulin** = Schleimmehl des Alants (s. eb.).  
**inuloides** alantähnlich.  
**inundatus** überschwemmt.  
**inversus** umgewandt, umgekehrt.  
**invocellum** Hüllchen, Hüllblättchen (b. Dolden etc.).  
**involveratus** mit Hüllblättern versehen.  
**invoceram** Hülle (b. Dolden u. a. m.).  
**irrigatus** gewässert, gewellt, m. Wellenzeichnung.  
**irriguus** bewässert.  
**isagoge** (ἰσαγωγή) Einleitung.  
**isatideus** waidähnlich, -artig (Isätis Waid).  
**Ischaemon** (-um) blutstillend (ἰσχω hemme, αἷμα Blut).  
**isenacensis** von Eisenach, Eisenacher.  
**isiacus** „isisch“, der Göttin Isis heilig.  
**isoliert** = abgetrennt, abgesondert.  
**isosporus** gleichsporig (z. B. Farne) (ἴσος u. σπορίαι).  
**isthmus** Schlund, Hals.  
**Iteoidæe** Bisch. Weidengehölze.

- iteoides** weidenähnlich (v. *ἰτέα* Weide, Wiete).
- jubatus** mähenartig (v. *jubae*, -arum Mähne).
- juga** Rippen, Riefen d. Doldenfrüchte, -*primaria* Haupt-, -*secundaria* Nebenrippen.
- juglandēus** wallnussartig (v. *Juglans*, -ndis).
- jugum** Joch, Blattpaar (bei Fiederblättern).
- julacēus** vielfuss-, kätzchenartig (v. *Julus* g. *ἰούλος*).
- julifer**, -*era* Kätzchen tragend.
- Julliflorae** Endl. Kätzchenblütige.
- juncacēus** binsenartig (v. *Juncus*).
- Juncaginēae** Juss. Binsengewächse.
- juncēus** aus od. voll Binsen, -*cinus* binsenartig.
- Juvavum** (Juvavia) Salzburg.
- juxta** nach, gemäss.
- Juxta**position (Schwendener) Darnbenstellung od. Anschluss (z. B. bei Sprossungen).
- Kali** „Kali“ od. Laugensalz (in d. Chemie die alkalische Hauptbase!).
- karstiensis** vom Karstgebirge in Krain od. Illyrien.
- kermesinus** karmoisinrot.
- kewensis** (sc. hortus) von Kew bei London.
- Kilia** Kiel, -*ensis* Kieler.
- Krönchen** auf den Sporenknöspchen der Chara (s. Nom.).
- labellum** (dem. v. *labrum*) „Labell“ d. i. Lippchen (Lippe), bei den Orchideen inneres, längeres Perigonblatt!
- labiatus** (v. *labium*) gelippt, mit Lippen versehen, z. B. bei d. „Labiaten“.
- Labiatiflorae** DC. Lippenblütler.
- labrum**, i. q. *labium* Lippe, Lefze.
- laca** Lack, Gummilack, Gummiharz.
- laccifer** Gummiharz tragend od. liefernd.
- lacer**, -*era* zerrissen, zerschlitzt, struppig (Kummer).
- lacinia** Zipfel, Fetzen, -*niatus* zipfelig, zerfetzt.
- lac**, -*ctis* Milch, Milchsaft.
- lacrymabundus** thränend (*lacryma* Thräne).
- lacrymans** thränend, weinend, Feucht. ausschwitzend.
- lactarius** Milchner, Milch ausgebend (näml. Pilz).
- lactēus** milchsaftig, milchweiss, wie Milch.
- lacūna** Lache, Grube etc.
- lacunae aëreae** Luftlücken des Zellgewebes.
- lacunosus** zellig, grubig, m. Grübchen versehen.
- lacustris** (v. *lacus*) an od. in Teichen od. Lachen wachsend.
- ladanifer**, -*era* myrrhentragend (s. sogl.).
- Ladānum** Gummi od. wohlriechendes Cistharz vom Strauch *λίθος* (bei Luther „Myrrhe“).
- laevigatus** geglättet.
- laevis** glatt.
- lagenarius** flaschenförmig (*lagēna*).
- lamellae** „Lamellen“, blattart. Platten od. Strahlen der Blätterpilze.
- lamīna** Blech, Blatt, Spreite des Blatts.
- lamīna petāli** Platte des Kronblatts.
- lamīna prolīgēra** Keimschicht der Pilze.
- Laminartegmente** (Mikosch) d. s. Blattspreitenhüllen.
- lamprophyllus** glanzblättrig (*λαμπρός, φύλλοι*).
- lamprosperrnus** glanzsamig (s. eb.).
- lanatus** mit Wolle bewachsen (*lana*).
- lanceolatus** lanzettförmig.
- lanceifolius** lanzenblättrig (*lancēa*).
- lanestris** wollig (*lana*).
- lanēus** wollen, von Wolle.
- lanosus** wollig, voller Wolle.
- lanuginēus** wollflaumig, -*nosus* desgl. (s. sogl.).
- lanūgo**, -*inis* Milchhaar, Wollenflaum, Wollbehaarung.
- lapathifolius** ampferblättrig (*Lapathum*).
- lappacēus** klettenartig (*Lappa*, s. Nom.).
- lasiocarpus** zottenfrüchtig, mit rauhaariger Fr.
- lasius** (*λασιός*) rauh, zottig.
- latēbra** Schlupfwinkel, Versteck.
- lateral** = seitlich (*latus*, -*eris* Seite).
- lateritius** ziegelrot (*later*, -*eris* Ziegel).
- latex**, -*icis* Narbenfeuchtigkeit.
- lathyroides** kicher- od. platterbsenähnlich (*Lathyrus* s. Nom.).

- laurinus** lorbeerartig (laurus).  
**laxiflorus** weit-, offen-, schlaff blütig.  
**laxus** „lax“, schlaff, weit, offen etc.  
**Lebenseinheit** (Vöchting) = jed. selbständ. Pflanzengebilde, d. h. das für sich zu leben vermag.  
**lecus** Zwiebelscheibe (*λεξος*; Napf etc.).  
**legitimus** gesetzlich, „legitim“, z. B. Befruchtung, nämll. durch dimorphe Blüten Teile (Darwin).  
**legumen** Hülse, Hülsenfrucht.  
**legumen biloculare** Doppelhülse.  
**leguminosus** hülsenartig, -früchtig, z. B. „Leguminosen“ d. s. Hülsenfrüchte.  
**leianthus** glattblumig (*λείος* glatt, schlicht, kahl etc.).  
**Leida** Leyden.  
**leiocarpus** glattfrüchtig.  
**leio-stachyos** (-us) glattährig.  
**Leitbündel** (Russow) d. i. zuerst aus d. Cambium sich bildendes.  
**lemnacëus** wasserlinsenartig (Lemna).  
**lendiger**, -ëra Nisse od. Gnitten (Läuseeier) führend.  
**lens**, -dis Nisse od. Gnitte der Laus, Läuseei.  
**lens**, -tis Linse.  
**lenticellae** Linsenhöckerchen od. Korkwarzen d. Rinde.  
**lenticularis** Linschen od. Linsen betr.  
**lentiginosus** sommerfleckig, -sprossig.  
**lentigo**, -inis Sommersprosse.  
**Lentiscus** Mastixbaum (v. *lentesco* bin klebrig).  
**lentus** langsam, zäh.  
**Leodium** Lüttich.  
**leontinus** aus dem Leontinischen (bei Isola in Tyrol).  
**lepetitii** Le Petit betr. (n. pr.).  
**lepides** (*λεπίς*, -ιδος) Schuppen.  
**lepidocarpus** schuppenfrüchtig.  
**lepidotus** schuppig, schülferig.  
**lepidus** niedlich, artig, hübsch etc.  
**lepodinus** rindenzerstörend (*λέτος*; u. *δειρος* schrecklich etc.).  
**leporinus** Hasen betr. (*lepus*, -öris).  
**leprosus** aussätzig (lepra Aussätz etc.).  
**leptocephalus** dünnköpfig (*λεφαλή*).  
**leptocladus** fein- od. dünnstengelig (*λεπτόδοξ* Trieb etc.).  
**leptophyllus** dünn- od. feinblättrig.  
**leucanthus** weissblütig, -blumig.  
**leucocarpus** weissfrüchtig.  
**leucoconius** weisstäubig (*λευκόν* Staub).  
**Leucoglochium** Weissspitze (*γλωχίν* od. -ίζ).  
**leucomelas** weiss und schwarz.  
**leucounerus** weissnervig.  
**leucosorius** weisskapselig, m. weissen Fruchthäufchen (*λευκός*; Haufe od. auch *σορός* Gefäss).  
**leucostachys** weissährig.  
**levulosus** „Levulose“ d. i. Schleimzucker.  
**libanensis** vom Libanon-Gebirge.  
**liber**, -bri Bast.  
**libriforum** „Libriforum“, Bastfaserstoff.  
**Liburua** Liburnien (Bosnien u. Norddalmatien).  
**Liburnum** Livorno u. Libourne bei Bordeaux.  
**liburnus**, -nicus liburnisch, aus Liburnien (s. v.).  
**lichen**, -ënis (*λεϊχήν*, -ήρος) Flechte.  
**lichenosus** flechtenartig.  
**Liesch** d. s. getrocknete Blätter zum Dichten der Fässer (z. B. von Sparganium, s. Nonn.).  
**ligericus** von der Loire (Ligëris).  
**Lignum** = Holzfaserstoff (v. *lignum*).  
**lignosus** holzig.  
**ligula** (dem. v. *lingua*) Blatthäutchen, häut. Ansatz der Grasblätter am Halm.  
**ligulatus** m. Blatthäutchen vers. od. auch wie ein Zünglein geformt (sc. *flos*) (s. sogl.).  
**liguliflorus** \* zungenblütig (z. B. Strahlblütchen d. Compositen).  
**ligusticus**, -gurinus ligurisch, aus Ligurien (d. Gebiet um Genua).  
**liliifolius** lilienblättrig.  
**limacinus** Wegschnecken betr. (*limax*, -acis).  
**limacis** Gen. v. *limax* (s. eb.) (gr. *λίμαξ*, -αξος).  
**limbatus** gerandet, gesäumt (*limbus*).  
**limnobius** im Sumpf od. Teiche lebend.  
**limonius** limoufarbig, orangegelb.  
**limosus** schlammig, **limus** Schlamm, Kot.  
**linacëus** leinartig, **linum** Lein.  
**linariifolius** leinkrautblättrig (Linaria).

- linearis** „lineal“ oder linienförmig (linēa).
- lineatifolius** linirtblättrig, m. durch Linien bezeichneten Blättern.
- linguiformis** zungenförmig.
- linicōla** (-us) Lein bewohnend, unter Lein wachsend.
- linifolius** leinblättrig, fachsblättrig.
- linoides** lein- od. fachsähnlich.
- linterarius** leinwandartig (linterium Leintuch).
- lippizensis** von Lippiza im österr. Littoral.
- lipsicus, -siensis** Leipziger (Lipsia Leipzig).
- liquaminosus** saftig (liquamen, -inis).
- Liquiritia** Lakritzensaft.
- lithanthrax** Steinkohle (λίθοξ u. ἄνθοξ).
- lithuanicus** aus Litthauen.
- litigiosus** streitig, voller Streit.
- littoralis** (litoralis) am Strand, an der Seeküste.
- littoreus** (litor.-) desgl. (v. littus od. litus, -oris).
- lividus** bleifarbig, bläulich, blass.
- livonicus** livländisch (Livonia Livland).
- lobus** (in compos.) -lappig (lobus gr. λοβός Hautlappen).
- loculamentum** Fach, Gefach.
- locularis** (in compos.) -fächerig.
- locūli** (dem. v. loci) Fächer, z. B. der Frucht, loculi antherae Antherenfächer.
- loculicida** (sc. dehiscentia) fachteiliges (Aufspringen d. Frucht).
- locupletissimus** am reichsten, reichlichsten.
- locusta** Heuschrecke, aber auch Ährchen der Gräser.
- lodiciulae** Unterschüppchen bei Graspelzen.
- loliacēus** lolchartig (Lolium, s. Nom.).
- Lomentacēae** DC. Gliederschotige Cruciferen.
- lomentum** Gliederhülse od. -Schote.
- Londinium** London, **Londinium Gothorum** Lund in Schweden (Gothland).
- longaevus** hochbetagt, altersgrau.
- longirostris** langschnäblig.
- longisiliquis** langschotig.
- longitudinalis** in die Länge gerechnet.
- lorēus** riemenförmig (lorum Riemen).
- lorica** Panzerchen (v. Diatomeen), -catus gepanzert.
- lubricus** schlüpfrig.
- lucens, -cidus** schimmernd, hellleuchtend (lux, -cis Licht).
- lucifugus** lichtscheu (s. eb. und fugio fliehe).
- lucus, -i** Hain.
- Lufthöhlen** innerh. d. Gewebes (z. B. bei Fluviales).
- Luftspalten** in Oberhautzellen.
- Luftwurzeln** (z. B. bei Pandanus, Philodendron etc.).
- Lugdunum** Lyon, **Lugd. Batavorum** (batavum) Leyden (Holland).
- lugens** trauernd.
- lumbricalis** regenwurmformig (lumbricus).
- lumen, -inis** Licht, Weite od. innerer Durchmesser z. B. innerer, freier Raum einer Zelle.
- lunaris, -rius** d. Mond betr., mondförmig.
- lundensis** von Lund in Schweden.
- lupuliformis** hopfenförmig.
- lupulinus** Hopfen betr., hopfenartig sich schlingend.
- Lupulus** (sc. Humulus) Hopfen (s. d. Nomenkl.).
- luridus** blass, fahl, leichenfarbig, schmutziggelb.
- lusaticus** Lausitzer (Lusatia Lausitz).
- luteolus** (dem. lutēus) lehmgelblich (v. lütum Lehm od. auch v. lütum Gilbkraut od. Wau), goldgelblich.
- lutescens** gelblich.
- lutetianus** Pariser (Lutetia Parisiorum Paris, eig. Schmutz- od. Lehnstadt der Pariser).
- lutēus** gelblich, lehmgelb (v. lütum Lehm), goldgelb (v. lütum Wau, Gilbkraut).
- luxurians** üppig, schwelgend, wuchernd, fruchtbar.
- lycensis** von Lyck in Ostpreussen.
- lycopifolius** wolfsfußblättrig (Lycopus).
- lyratifolius** leier- od. lyrablättrig, -ratus leierförmig.
- maceratio** Mürb- od. Weichmachung, „Maceration“ (v. macer mager etc.).
- macis** Muskatblüte, Samenmantel der Muskatnuss.



- macranthus** gross- od. langblütig (*μακρός* gross, lang).
- macrocarpus** gross- od. langfrüchtig.
- macrophyllus** grosslaubig.
- macropus** gross- od. langfüssig, -gestielt.
- macrorrhizus** (-os, -on) langwurzlig (*ῥίζα*).
- macrosiphon** langröhrig (*σίφων* Röhre).
- macrospora** Gross- od. Langsporen (der Wasserfarne, werden von d. Mikrosporen befruchtet).
- macrosporangia** Grosssporenbehälter (i. d. Sporocarpn der Rhizocarpen).
- macrostachyos** gross- od. langährig.
- macula** „Makel“, Flecken, -atus fleckig.
- madraspatanus** nicht etwa kahlhäutig oder Fell kühlend (v. *μαδαός* u. *σιάτος* Fell), sond. i. q. *madraspatensis* (s. sogl.).
- madraspatensis** von Madras (Ostindien).
- maesiacus** (moesiacus) aus Mösien (j. Bulgarien etc.).
- maglia** (Solanum m.) Masche od. Netzaug (ital.), fr. maille.
- majusculus** etwas gross, grösser (als die andern Buchstaben).
- malachius** malvenrötlich.
- malacophyllus** malvenblättrig, weichlaubig (*μαλακός* weich).
- mamilla** Kernwarze.
- mamma** Brust, -warze, -mosus voller Zitzen.
- Manchette** (Manschette) (bei Pilzen) = Kragenhaut unterh. d. Hutes um den Strunk.
- manticus** von Mantes (in Frankr., Depart. Seine u. Oise), „mantisch“ (Mössl.-Rhb.), nicht v. *mantica* Beutel.
- mantissa** Ergänzung, Nachtrag, „Mantisse“ (Mathem.).
- manuale** Handbuch.
- marantinus** marantartig (Maranta, s. Nom.).
- marasmus** das Verwelken, Schwinden (d. Altersschwäche etc.).
- marcescens** welkend, -cidus welk.
- margaritaceus** perlfarbig, perlmutterig (v. margarita Perle, Perlmuschel).
- marifolius** marumblättrig (Marum, s. Nom.).
- marinus** am od. vom Meer, an od. von der See.
- maritimus** am Meer wachsend.
- maritus** Ehemann, Mämchen.
- mas-**, -culus Mann, Männchen, -culinus männlich.
- massa pollinis** Pollenmasse.
- Massilia** Marseille, -liensis Marseiller.
- mastoides** brustartig, -warzig.
- matronalis** matronenhaft, Matronen betr.
- maturus** reif, zeitig, -ritas Reife.
- matutinus** morgendlich, früher-scheinend.
- meatus intercellulares** Zellenzwischengänge.
- median** = mittler, z. B. Mediane = senkr. Mittelebene.
- medicamen**, -inis Heilmittel i. q. **medicamentum** „Medikament“.
- medicus** ärztlich, „medizinisch“, aber auch medisch, aus Medien.
- mediocris** mittelmässig.
- Mediolanum** Mailand, ital. Milano.
- mediterraneus** mittelländisch, -meerisch.
- medulla** Mark.
- mega(lo)politanus** Mechel- od. Mecklenburger, von Megapolis, d. i. Mechilen- od. Mecklenburg.
- mega(lo)potamicus** von Rio Grande del Norte (dem grossen Fluss aus d. Norden) in Nordamerika.
- megastachyos** lang- od. grossährig.
- melaenus** schwarz (v. *μέλας*, -λαϊνα).
- melananthus** schwarzblühend.
- melanochaetus** (-os) schwarzborstig (*χαιτή*).
- melanolomus** schwarz gesäumt, -bärtig (*λίμα* Saum etc.).
- melanophloeus** schwarzsplintig (*γλοιός* Bast, Splint etc.).
- melanöpus** schwarzfüssig, -gestielt.
- Melanosinapis** Schwarzenf.
- melanospermus** schwarzsamig.
- meletemata** fleissige Arbeiten od. Studien (*μελέτημα*).
- melinoides** (bess. mellin-) honig-gelb (mel, -llis Honig).
- melitensis** von Melite od. Malta.
- mellëus** honigartig, -gelb.
- mellifer**, -ëra honigführend, -haltend.
- melocarpus** melonenfrüchtig.

- membrana** „Membrane“ d. i. Haut, -nacens häutig.
- memphticus** von Memphis (Ägypten).
- mephticus** „mephtisch“, mephtisch schädli. Ausdünstung.
- merenchyma** krummflächiges Parenchym od. Mark.
- mericarpium** Teilfrüchtchen (der Doldenpfl.) (*μέρως* Stück etc.).
- merismaticus** sich aufteilend (s. sogl.).
- meristēma** „Meristemschicht“ (bei Wurzelbildung, Janczewski) d. i. noch junges, bildungsfähiges Ur- od. Teilungsgewebe (v. *μεροῦ* ω teile).
- mesenteriformis** gekröseförmig (*μεσεντερίεορ*).
- mesenterium** Gekröse, Mitteldarm (*μέσος* u. *έντερορ*).
- mesocarpium** mittlere (fleischige) Fruchthaut, Fruchtmittelschicht.
- mesophyllum** Laubmittelschicht, Blattmark.
- metachrous** farbwechselnd (*χρῶα* Farbe etc.).
- Metamorphose** = Verwandlung (*μεταμορφῶσις*).
- metaspermus** nachsamig<sup>1)</sup> (Gegensatz zu archi- od. gymnospermus ur- od. nachsamig).
- Metis** Metz, -tensis Metz, von Metz.
- metropolitanus** von der Hauptstadt (metropölis).
- metulifer** (-urus, -era) zackenführend (metula dem. meta = Pyramide od. Spitzsäule).
- micacēus** glimmerartig (mica).
- micans** schimmernd, glänzend (mīco).
- micranthus** kleinblumig (*μικρῶς, άνθος*).
- microcarpus** kleinfrüchtig.
- Micromycētes** „Kleinpilze“, d. i. mikroskopische etc.
- micropetalus** klein Kronblättrig.
- microphyllus** kleinblättrig, -laubig.
- micropyle** „Mikropyle“, d. i. Knospenmund od. enger Eingang in d. Samenknoſpe für den Pollenschlauch.
- microrrhizus** kleinwurzellig.
- microsōma** „Kleinkörperchen“ od. Plasmakörnchen (Strasburger).
- microspermus** kleinsamig.
- microspōra** Kleinspore (z. B. Equisetaceen, — befruchten die Makrosporen, s. d.).
- microsporangia** Kleinsporenbahälter (*άγγείον*).
- microstachyos** (-us) kleinährig.
- Milano** ital. Mailand (s. Mediolanum).
- Milchzellen** (David, 1872).
- milaceus** hirsenartig (Miliun, s. Nom.).
- militaris** „militärisch“, soldatisch.
- millefolius** tausendblättrig.
- millegranus** tausendkörnig (grānum).
- miniatuſ** mennigrot (minium Mennig).
- minus** (Superl. v. minor Compar. kleiner) kleinst.
- mirabilis** wunderbar.
- Missula** (Misnia) Meissen, Helvetia Missniae sächsische Schweiz.
- mitis** sanft.
- mixtuſ** gemischt, **mixtura** „Mixtur“, Mischung.
- modicus** mässig.
- modificatio** Beschränkung, „Modifikation“.
- modioluſ** (dem. modiuſ Mass) Mässchen od. Mäschen.
- Moenus** Main.
- moesiacus** (maes.-) aus Möſien (Bulgarien etc.).
- Moguntia** Mainz.
- moldaviuſ** aus der Moldau (Rumänien).
- Moleküle** = kleinste Masseteilchen.
- Molekularstruktur** (Pfeffer) = Anordnung der Moleküle.
- mollis** weich, **mollissimūſ** sehr od. ganz weich.
- Mollugo** Weichkraut, -klette.
- molluſcuſ** weich.
- molybdiuſ** molybdän- od. bleiartig.
- monacensis** münchener, **Monacum** München.
- monanthoſ** einblütig, -blumig.
- Monadelphia** L. Einbrüderige (XVI. Kl.).
- Monandria** L. Einmännige (I. Kl.).
- monile** Halskette, Rosenkranz, -liformis rosenkranzförmig.

1) S. Engler, Antherenbild. d. Metaspermien in Pringsheim's Jahrb. 1875.

**monilifer** rosenkranztragend.  
**monocarpus** ein- od. einzelfrüchtig.  
**Monochlamydeae** DC. Einhüllige, Perigonblütige.  
**Monoclinia** L. Einlagerige, Zwitterblumen.  
**Monocotylaeae** Einsamenlappige.  
**Monocelia** L. Einhäusige (XXI. Kl.).  
**monoecus** einhäusig (*μονός. οἰζός*) d. i. mit getrennten Geschlechtern auf demselben Stock.  
**monographia** „Monographie“, Einzelbeschreibung.  
**Monogynia** L. Einweibige.  
**monomerus** aus einem Stück bestehend (z. B. Stempel etc.).  
**monophyllus** einblättrig, n. ein e m Laubblatt.  
**monopodium** Einzelfussstück, d. h. für alle Äste Fuss bleibender Haupttrieb.  
**monostachyos**, -on einährig (*στᾶζυς*; Ähre).  
**monspeliæus** st. monspeliensis, aber auch: am Berg Pelion (mons Pelius) zu Hause, *Dianthus monsp.* Rehb.: „Vorgebirgsnelke“ (mons bonae spei Cap der guten Hoffnung).  
**monspeliensis** von Montpellier (Mons Puellarum).  
**monspeulanus** desgl.  
**monstrositas** „Monstrosität“ (s. sogl.).  
**monstrosus** (-struosus) „monströs“, d. i. ungeheuerlich, missgebildet (monstrum).  
**montanus** „montan“, auf Bergen wachsend.  
**moravicus** mährisch, aus Mähren (Moravia).  
**morbillosus** kränkelnd (morbillus dem. morbus).  
**morio** schwarzbraun.  
**morphologia** Gestaltungslehre (*μορφή*).  
**morphologischer Ort** (Vöchting) d. i. Entfernung von dem entsprech. Ende der Lebensinheit (Organbildung).  
**morphonomia** Gestaltungsregel.  
**morsus** Biss.  
**Mosa** Maasfluss.  
**moschatellinus** etwas nach Moschus riechend.  
**moschatus** moschusartig, n. Moschus riechend.

**Mosella** Mosel.  
**mosquensis** Moskauer (Moschia od. Moscovia Moskau).  
**mucedo** (v. mucus) Rotz.  
**mucidus** schimmelig (v. mucor).  
**mucilagineus** schleimig (v. mucilago, -inis).  
**mucilago** Schleim, Rotz (i. q. mucus).  
**mucinum** „Mucin“, ausziehbarer Klebstoff.  
**mucor** Schimmel, Kalm.  
**mucosus** rotzig (v. mucus).  
**mucronatus** zugespitzt, spitzig (mucro Dolch etc.).  
**mucosus**, -i Rotz.  
**muldavius** an der Moldau (Muldavia), Fluss in Böhmen, zu Hause.  
**multicaulis** vielstengelig.  
**multifidus** vielspaltig.  
**multiflorus** vielblütig, -blumig.  
**multilocularis** vielfächerig.  
**multiramis** vielästig, -zweigig.  
**multoties** oft- od. vielfach.  
**muniens** befestigend, schützend.  
**muralis** auf od. an Mauern wachsend.  
**muricatus** (fr. muriqué) purpurfarbig, aber auch stachelschneckenartig, reichstachelig (Kummer) (v. murex, -icis Purpur od. Stachelschnecke).  
**murinacæus** mäusegrau.  
**murinus** Mäuse betr., mäusegrau (mus, -ris Maus).  
**murorum** der Mauern (murus).  
**Muscardinæ** = durch Schimmelpilze verurs. Krankh. d. Seidenraupen.  
**muscarius** auf Fliegen bez. (musca Fliege).  
**muscerda** Mäusedreck.  
**Musci** Juss. Moose.  
**musciola** Moosbewohner (muscus Moos).  
**muscifer**, -ëra Fliegen tragend (v. musca), aber auch moostragend (v. muscus).  
**muscigenus** im Moos erzeugt.  
**Muscinæe** Bisch. Moosartige.  
**muscipula** Fliegenfalle (musca u. capio).  
**muscoideus** moosartig (muscus u. *είδουα* gleiche).  
**muscologia** Mooskunde.  
**mucosus** moosig.  
**muscoviensis** (sc. hortus) des Fürsten Pückler-Muskau.  
**muscus** Moos.

- mutabilis** veränderlich.  
**muticus** unbewehrt, grannenlos.  
**mutilatus** (-tilus) verstümmelt.  
**Mutina** Modena, **-nensis** modenesisch.  
**mycelium** „Mycel“, d. i. Pilzfaser-  
gewebe, zur Ernährung dienender  
Pilzunterteil (v. *μύκης* u. *εἶλω*  
wickle etc.).  
**Mycetes** Spr. Pilze (*μύκης*, -*ητος*).  
**myioides** fliegenartig (*μυία* Fliege).  
**myodes** (*μυώδης* v. *μῦς*, -*όν*  
Maus) mausähnlich.  
**myrepsicus** zum Balsamkochen  
dienend (*μυρεψιζός*).  
**myrrha** „Myrrhe“, Balsamharz  
(*μύρρα*).  
**myrsinites** myrtenblättrig.  
**myrtilloides** heidelbeerartig (*Myr-*  
*tillus*).  
**mytilinus** muschelförmig (*Mytilus*  
Miesmuschel).  
**myurus** Mäuseschwanz (*μῦς*, -*ός*  
u. *οὐρά*).  
**Myxogasteres** Fr. Schleimbalgpilze.  
**Myxomycetes** Wallr. Schleimpilze.
- Nagel** d. i. der schmale, stielförm.  
Unterteil eines Kronblatts.  
**Nannetes** (Nannetes) Nantes an  
der Loire.  
**Nanna** Zwergin u. Mutterschwester  
(*νάνη*).  
**nanus** zwerghaft, ein Zwerg (*νάνος*  
od. *νάνος*).  
**napaeus** (*ναπαῖος*) in Waldschluch-  
ten wachsend.  
**napiformis** steck- od. kohlrüben-  
förmig (*Napus*, s. *Nom.*).  
**napo-brassica** Steckerübenkohl.  
**narbonensis** von Narbonne (Süd-  
frankreich).  
**narcoticus** narkotisch, betäubend  
giftig (v. *ναρξάω* lähme etc.).  
**nascens**, -ntis wachsend (v. *nascor*  
entstehe etc.).  
**Nassovia** Nassau.  
**natans** schwimmend.  
**naucinus** (*naucus*) gering, schlicht.  
**nauseosus** brechen- od. ekelerregend  
(*nausea* Übelkeit).  
**navicula** (dem. *navis*) Schiffchen.  
**nebrodensis** vom Nebrodigebirge  
(Sicilien).  
**nebularis**, -losus nebelig, nebelgrau,  
düster, auch duftig.
- Necessaria** L. (sc. *Polygamia* XIX,  
Kl. 3) „Notwendige“ (d. Rand-  
blütchen fruchtbar, daher not-  
wendig).  
**nectarium** Honiggefäß, -behälter.  
**neglectus** vernachlässigt, übersehen.  
**nematodes** (*νηματώδης*) faden-  
förmig.  
**Nematophycæe** Ag. Fadenalgen.  
**nemausensis** von Nimes (Nemausus)  
in Südfrankreich.  
**neomolapathum** Waldampfer (*νέμος*,  
-*εος* Waldweide).  
**nemophilus** Hain od. Wald liebend.  
**nemoralis**, -rensis, -rosus, -ræus im  
Hain od. Wald wachsend (*nemus*,  
-*ōris*).  
**nemus**, -ōris Hain, Wald.  
**Nenuphar** nicht essbar (Nuphar, s.  
*Nom.*)  
**neomarchicus** Neumärker, aus d.  
Neumark (*νέος* neu).  
**neomexicanus** von Neumexiko.  
**neomontanus** von Neuberg (Steier-  
mark).  
**nepalensis** von Nepal (Nepaul) am  
Himalaya.  
**Nereis** „Nereide“, Meernymphe,  
Meer- od. Seeblora.  
**nervatio** Geäder, Berippung.  
**nervus** „Nerv“, Ader, Rippe (eines  
Blatts).  
**neubergensis** i. q. *neomontanus*  
Neuberg.
- nicaeensis** von Nizza (franz. Ober-  
italien).  
**Nicer** (*Nicrus*), -*cri* Neckar.  
**nidorosus** qualmig.  
**Nidrosia** Drontheim (am Nidfluss  
in Norwegen).  
**nidulans** nistend, wie ein Nest  
aussehend.  
**nidulus** (dem. *nidus*) Nestchen.  
**nidus avis** Vogelnest.  
**nigrescens** schwarz werdend, ins  
Schwarze ziehend.  
**nigricans** schwärzlich.  
**niloticus** am Nil zu Hause.  
**niskiensi** (*nais*) Neisser, *Niskia* Fluss  
Neisse.  
**nisus** das Aufstreben, Empor-  
wachsen.  
**nitens** (v. *nitéo*) glänzend, -**tídus**  
desgl.  
**nitriensis** von Neutra (*Nitria*) in  
Ungarn.

**nivalis** in oder um Schnee wachsend (s. sogl.).  
**Niveau** = Wasserhöhe, z. B. Niveau-Differenz, d. i. Höhenunterschied.  
**nivēus** schneeweiss (nix, -ivis Schnee).  
**nixus** i. q. nisus das Emporklimmen etc.  
**nobilis** edel, vornehm etc.  
**noctiflorus** nachts blühend.  
**nocturnus** nächtlich.  
**nodiflorus** knotenblütig.  
**nodosus** knotig, **nodus** Knoten.  
**noli tangere** wolle nicht anrühren, „rühr' mich nicht an!“  
**nomenclatio** (-tura) Namengebung, „Nomenklatur“.  
**nonscriptus** unbeschrieben, unbezeichnet.  
**Noricum**, jetzt Salzburg, Steiermark und Östreich.  
**Norimbergia** Nürnberg.  
**normal**=regelrecht (v. norma Norm, Richtschnur etc.).  
**norvegicus** norwegisch.  
**nothus** (νοθός) unecht, Bastard.  
**Notorrhizæ** DC. Rückenwurzler (d. Samen beim Aufgehen).  
**Neoboracum** (Neoboracum) New-York, -boracensis New-Yorker.  
**Noviomagus** Nymwegen.  
**novitiæ**, -arum Neuigkeiten.  
**nubilus** neblig, wolkig, trüb, düster.  
**Nucamentacæe** DC. Nüsschencruciferen (s. sogl.).  
**nucamentacæus** nussartig (nucamentum Nusschötchen).  
**Nucellargewebeeines** Eichens (Strasburger).  
**Nucellarhöker** (Strasburger) einer Kernzelle.  
**nucistæ** (sc. olcumi) Muskatnussöl.  
**nucleolus** (dem. nucléus) Kernkörperchen in d. Zelle, „Nüsschen“ in dem Zellkern.  
**nucléus** Samenkern, Zellkern.  
**Nuculiferae** Endl. Nüsschenträger (Asperifolien).  
**nudicaulis** nacktstenglig (nudus blos, nackt).  
**nudiflorus** nachtblütig (ohne Laub am Stock).  
**numerous** zahlreich.  
**numidicus** numidisch (Numidien, j. Algerien).  
**nutans** nickend, gebeugt.

**nutatio** Neigungsbewegung<sup>1)</sup>, die beim Wachsen sich äussernde während eines Tags nach oben od. unten (nicht seitwärts).  
**nux**, -cis Nuss.  
**nyctitropismus** Schlafbewegung d. Pfl.  
**nympheoides** (-phoides) teich- od. seerosenähnlich.

**obcordatus** verkehrt herzförmig.  
**obdiplostemon** (Schwendener) „doppelfadig“ (ὀδιπλόστος u. στῆμων).  
**obesus** geschwollen, feist, dickgefressen.  
**oblique**, -quus schräg, schief, seitwärts.  
**oblongus** länglich, **oblongum** längl. Rechteck.  
**obolus** Münze, Pfennig, „Obol“.  
**obovatus** verkehrt eiförmig.  
**obscurus** dunkel.  
**obsoleto** (-tus) abgenutzt, gemein, veraltet, nicht mehr gebräuchlich.  
**obtusangulus** stumpfeckig, -kantig.  
**obtusifolius** stumpfblättrig.  
**obtusiusculus** etwas abgestumpft.  
**obtusus** abgestumpft.  
**occidentalis** abendländisch.  
**ocellatus** mit Auglein versehen.  
**ochotensis** von Ochotsk, am ochotischen Meerbusen zu Hause.  
**ochra** Ocher, Ocker, -racæus ocker-gelb.  
**ochrea** (ocræa) Tute, häut. Gelenkscheide (z. B. des Knöterichs).  
**ochroleucus** gelblichweiss, blass-gelb.  
**Octandria** L. Achtmännige (VIII. Kl.)  
**octoni**, -nae etc. zu acht, je acht.  
**octopetalus** achtkronblättrig.  
**odontalgicus** zahnschmerzstillend (ὀδοίσις, -όρτος u. ἄλγος Schmerz).  
**odoratus** wohlriechend, -ratissimus überaus w.  
**odorus** riechend, von Geruch (besond. in compor. z. B. citriodorus).  
**oelandicus** von d. Insel Oeland (Schweden).  
**Oelcanäle** der Doldenfrüchte.  
**Oenipontanus** Innsbrucker (Oenus Inn).

1) S. Pfeffer, d. period. Bewegung d. Blattorgane, Lpz. 1875.

- officialis** „offizinell“, in Apotheken gebräuchlich.
- oleifer**, -ëra etc. ölgebend, -tragend (olëum).
- oleifolius** olivenblättrig (Olea Ölbaum, Olive).
- Oleracëae** Endl. Gemüsegew. (s. sogl.).
- oleracëus** als Gemüse benutzt (olus, -ëris).
- olïdus** übelriechend.
- oligocarpus** wenigfrüchtig (ὀλίγος wenig etc.).
- olitorius** vom Küchengärtner (olïtor) benutzt.
- ollarius** topfartig, -förmig (olla Topf).
- onomatologïa** Namenkunde (ὄνομα, -ατος).
- onoïcius** mit Eselsohren (ὄνος u. οὐς, ὠτός).
- oocarpus** eifrüchtig (ὠόν Ei, καρπός).
- oogonium** „Eibildungszelle“, Zelle m. Protoplasmaballen.
- oospöra** Dauerspore, d. i. durch ein Spermatozöid befruchtetes Ei des Oogoniums (s. eb.).
- opacëus** dunkel, schattig, glanzlos, unscheinbar.
- operculum** Deckel (v. operio bedecke).
- opifer**, -ëra hülfreich, Hülfe bringend.
- opipärus** herrlich, prächtig (ops, opis Kraft etc., päro bereite).
- opponiert** = gegenüber (z. B. dem Vorblatt).
- oppositifolius** mit gegenständigen od. entgegengestellten Blättern (s. sogl.).
- oppositus** entgegengestellt, gegenüberstehend.
- Optimum** (der Temperatur) = bester, geeignetster Grad.
- opulifolius** schneeballblättrig (Opulus, s. Nom.).
- opuntius** opuntisch, von Opus, -untis, Stadt in Lokris.
- opuseulum** Werkchen (dem. opus).
- orbicularis**, -atus kreisrund.
- orbis** (sc. terrarum) Erdkreis, Erdenrund.
- orchidëus** orchisartig, wie Knabenkraut.
- oreädes** (z. B. Collybia or.) „Oreaden“, bergbewohnende Nymphen.
- orgyialis** eine Klafter messend (ὄργυιά).
- orientalis** morgenländisch.
- origanifolius** dosten- od. majoranblättrig (Origänum, s. Nom.).
- orthocëras** geradhörnig (ὄρθος, ζέρας).
- orthogonal** (z. B. Trajectionen, Sachs) rechtwinklige (Durchsetzungen).
- orthospermus** geradsamig (bei Dol-den).
- orthospörum** Geradsamen (σπορά od. σπόρος).
- osmotïcus** „osmotisch“, die Diösmose betr. (s. d.).
- ossëus** knöchern, beinern, knochenod. beinhart (os, -sis).
- ossificatus** verknöchert.
- ossifragus** knochenbrechend, aber auch: bei Knochenbruch angewendet.
- ostreatus** wie eine Auster (ostrëa) geformt, zweischalig, aber auch rauh, hart.
- otia botanïca** bot. Früchte der Musse (otium).
- ovalis**, -atus „oval“, eirund.
- ovarium** Eierstock.
- ovinus** das Schaf betr. (ovis).
- ovirensis** von den Ovîr- (Obîr-) Alpen in Kärnthen.
- ovulum** (dem. ovum) Eichen, Eilein, Samenei.
- owariensis** von Oware (Westafrika).
- Oxonïa** (-nium) Oxford.
- oxyacanthus** weissdornartig (Oxyacantha, s. Nom.).
- Oxygen** (fr. oxygène) Sauerstoff (ὄξυς u. γένω erzeuge).
- oxyglottis** spitzzungig (γλώττα i. q. γλώσσα).
- oxyptërus** spitzflügelig (πιερόν).
- pabulum** Futter, Nahrung.
- pacificus** friedlich, vom stillen Ozean.
- Padus** Fluss Po.
- pagänus** ländlich, bäurisch, auch heidnisch (pāgus Dorf).
- pagina** Seite im Buch.
- pagus** Dorf, Gau.
- palaeontologïa** Petrefaktenkunde (παλαιός alt, ὄν, ὄντος Wesen).
- palaria** (sc. radix) Pfahlwurzel (pālus, -i).
- Palatinatus** die Pfalz, **P. electoralis** d. Churpfalz.

- palatinus** Pfälzer, aus d. Rheinpfalz, palatinisch.
- palatum** Gaumen, den Mundeingang versperrender Wulst.
- paleaceus** spelz- od. spreuartig, (palea Spreublatt).
- paleae** Klappen der Grasblüten.
- pallens** bleich, **pallescens** bleichwerdend.
- pallidus** blass, bleich.
- palliolatus** m. Kopfhülle vers. (palliolum).
- Pallisadengewebe** (richt. Palissaden-) der Blätter (Godlewski) (v. fr. palissade, lat. palus, Pfahlwerk).
- Palmaeae** Bartl. Palmen.
- palmaris** handgross (v. palma flache Hand).
- palmatifidus** handspaltig, handfingerig.
- palmatus** handförmig, palmblättrig (s. v.).
- palmensis** von Palma (auf Majorka).
- paludosus, -lustris** sumpfig, in Sumpf wachsend.
- panacee** (fr.) = Universalmittel (παναχης Alles heilend).
- panaché** (fr.) „panachiert“ d. i. buntstreifig.
- panduriformis** mandolinenförmig (πανδοῦρα dreisaitiges Instrument).
- panica** Rispe, **panicus** rispig.
- panicula** (dem. panica) Risphen, Rispe, **-culatus** in Rispen blühend.
- Pannonia** „Pannonien“ od. Ungarn, **-nicus** ungarisch.
- pannosus** zerlumpt, lumpig (pannus Tuch etc.).
- panormitanus** von Palermo (Panormus).
- pantherinus** pantherfleckig.
- pantothrix** ganz haarspaltig — nämlich alle Blätter.
- Papia** Pavia.
- Papilionaceae** L. Schmetterlingsblütige.
- papilla** Brustwarze, **-atus, -osus** warzig.
- papposus** m. Haar- od. Federkrone (Pappus) versehen.
- pappus** Haar- od. Federkrone (z. B. auf d. Samen d. Compositen).
- papyraceus** papierartig.
- papyrifera** -era papiergebend.
- papyrinus** papierartig.
- par, -es, -ia** gleich u. ein Paar.
- Parabel** = Kegelschnitteurve parallel der Seitenhöhe.
- paracorolla** Nebenkrone (innerh. der Hauptkrone).
- paradisiacus** im Paradies wachsend.
- paradoxus** sonderbar, gegen die Regel.
- paragramma** ähnliche Wortbildung, auch Wortfälschung, Seitenstück zu einem Wort.
- Parameter** (Mathem.) = parallel der Directrix od. Richtlinie in d. Brennpunkt einer Parabel die Achse senkrecht schneidende Linie.
- paraphysis** Zell- od. Saftfaden zwischen den Sporenschläuchen der Pilze (v. φύσα Blase).
- parasiticus** „parasitisch“, schmartzend d. i. mitspeisend.
- parasitus** „Parasit“ d. i. Schmarotzer (παράσιτος; Mitesser).
- parastemon** Nebenfaden (στήμων lat. stamen, Staubfaden).
- parastichon** Schrägzeile (bei d. Blattstellung).
- parenchyma** „Parenchym“, Würfelzellgewebe (παρά, ἐν u. χυμός „Chymus“, s. d.).
- parenthesis** Einschaltung s. g. „Parenthese“ (ἔσεις d. Setzen etc.).
- parergon** (παράεργον) Nebenwerk, Anhang.
- parietalis, -itinus** an Wänden od. Mauern wachsend (paries, -itis).
- Parietales** Endl. Wandfrüchtige.
- parmularius** wie ein kleiner Schild (dem. parma).
- paronymus** nach einem andern Wort ähnlich gebildet (παρώνυμος).
- Parthenogenese** (parthenogenesis od. -gennesis) jungfräuliche Zeugung, d. i. ohne vorausg. Befruchtung (παρθένος Jungfr. u. γένεσις od. γέννησις Erzeugung).
- partialis** teilweise, zum Teil, „partial“.
- partitus** geteilt (v. partio teile).
- parviflorus** kleinblütig, **-folius** -blättrig.
- paschalis** zur Zeit des Paschafestes (Ostern).
- pascua, -orum** Weide, Weideplatz.
- pascuus** auf Weiden, zur Weide dienlich.
- Passavia** (i. q. Bojodurum) Passau.

- passim** zerstreut, überallhin verbreitet.
- Patavia** Padua u. Passau (Patavium).
- Patavina** (sc. Provincia) d. paduanische Gebiet.
- patens** offenstehend, ausgebreitet.
- pateraeformis** (bess. -riformis) schalen- od. schüsselförmig.
- pathologia** „Pathologie“ d. i. Krankheitslehre (πάθος Leiden etc.).
- Patientia** (sc. Rumex) „Geduldskraut“, s. g. englischer Spinat.
- patulus** offen, offenstehend, ausgebreitet.
- pauciflorus** wenigblumig, -blühend.
- paucistaminus** m. wenigen Staubgefässen.
- Pazowa** Passau (vgl. Passavia u. Patavia).
- pebrina** „Pebrine“ d. i. Bakterienkrankheit der Seidenraupe.
- pecten**, -inis Kamm, -tinatus kammförmig.
- pectosis** „Pectose“, Pflanzengallert, -gelée (πηκτός geronnen).
- pedalis** einen Fuss messend (pes, -ēdis).
- pedatus** mit Fuss versehen, gestielt.
- Pedemontium** Piemont, -montanus piemontesisch.
- pediades** flach, eben (πεδιάς, -άδος Fuss-, πεδίον Feld etc.).
- pedica** Schlinge.
- pedicellus** Stielchen, Blütenstiel, -latus mit Blütenstiel versehen.
- pediculus** Füßchen (dem. pes, -dis) auch: Laus — wegen d. Form!).
- pediformis** fussförmig.
- pedunculus** Blütenstiel, -laris, -latus mit solchem versehen.
- pelisserianus** pelisserianisch, von Pelisseri.
- pellicula** Häutchen, Fellchen (dem. pellis).
- pellitus** m. Pelz bekleidet (pellis Fell etc.).
- pellucidus** durchscheinend (per u. lucidus).
- peloria** das Regelmässigwerden sonst unregelm. Blumen (πέλωρ, -ος Ungeheuer etc.).
- peltatus** schildförmig (pelta, πέλιτη kleiner, leichter Schild).
- peltiger**, -era Schildträger, -führer.
- pelviformis** schüssel- od. beckenförmig (pelvis).
- pendens** (v. pendeo) hängend.
- pendulinus** pendelartig, -dulus herabhängend, Hänge- (z. B. Esche).
- penicillatus** (v. penicillum) pinsel-peninsula Halbinsel. [förmig.
- penitior** eingehender.
- pennatifidus** fiederspaltig (s. sogl.).
- pennatus** gefiedert (v. penna Feder).
- pennatulus** etwas od. nahezu gefiedert.
- pentacrinus** fünfblüthenartig (πέντα u. κρίνον, in der Zoologie Pentacrinus).
- pentactinus** fünfstrahlig (ἀκτιν Strahl).
- pentacyclius** in fünf Kreisen bestehend (κύκλος).
- pentalobus** fünfklappig (λοβός).
- pentamerus** fünfteilig (μέρος Stück etc.).
- Pentandria** L. Fünfmännige (V. Kl.).
- pentandrus** fünf männig (ἀνδρ, -ύδρος Mann, in d. Bot. Staubgefäss).
- pentapetalus** fünf kronblättrig (πέταλον lat. petalum).
- pentaphyllus** fünflaubblättrig (φύλλον Laubblatt).
- peperitis** od. -tus pfefferartig (s. piperitis).
- peploides** wolfsmilchähnlich (Pep-lus, s. Nom.).
- pepo**, -onis Pflume, Melone, Kürbis od. Gurke.
- Peponiferae** Endl. Kürbisfrüchtige, Pfebenträger.
- peponium** Kürbisfrucht (s. eb.).
- Pepsin** = Verdauungs- Erregstoff d. Magens (πέψις u. πέπτω koche etc.).
- peregrinus** fremd, ausländisch, eingewandert.
- perennis** „perennierend“, ausdauernd (per u. annus Jahr).
- perfoliatus** m. (vom Stiel) durchwachsenen Blättern.
- perforatio** Durchbohrung (z. B. der Holzgefässe).
- perforatus** durchbohrt, -stochen.
- pergamenus** „pergamenisch“, v. Pergamum in Kleinasien.
- perianthium** eig. „Blüthenhülle“ (περὶ herum, ἄνθος) Überbleibsel der v. Moossporen durchbrochenen Archegonien, ähnl. einem häutigen Kelch!



- periblēma** Aussenrinde, -hülle (d. Rinde) (*βλήμα* v. *βάλλω* werfe).
- pericarpium** „Perikarp“, Fruchthülle, -gehäuse (*καρπίος*).
- perichaetium** Haarhülle um die Archegonien der Moose (*χαίτη* langes Haar).
- perikline Wandrichtung** (Sachs) = in ähnl. Sinn, wie die Oberfläche, gekrümmt.
- periclinium** Hüllkelch der Compositen (*κλίση* Lager, Bett).
- periderma** äussere Hautschicht der Borke od. Rinde.
- peridiolum** umhätetetes Staubkügeln d. Pilze (s. sogl.).
- peridium** Sporenhülle der Flechten u. Pilze.
- perigonium** „Perigon“, Blütenhülle.
- Perigynia** Juss. Umweibige, d. Stempel umständig (nicht ober- od. unter-).
- perigynus** (sc. flos) m. um den Stempel herum gestellten Blüten teilen.
- periodicitas** „Periodizität“, d. Wiederkehren in Perioden.
- Peripetalia** Juss. Umkronblättrige.
- periphericus** „peripherisch“, am Umfang befindlich.
- perispermium** „das Perisperm“ od. Zellgewebe um den Eikern herum, äuss. Sameneiweiss.
- Peristaminia** Juss. m. umständig. Staubfäden.
- peristomium** „Peristom“, Mundbesatz d. Moosfrüchte (*στόμα* Mund).
- perithecium** flaschenförm. Fruchthälter d. Pilze (*περιθήκη* Mütze u. dgl.).
- perlatus** mit Perlen (perla) besetzt, **per-latus** sehr weit od. breit.
- permicus** „permisch“, v. d. Stadt Perm am Ural.
- permollis** sehr weich (per- in comp. sehr).
- peronatus** gestiefelt (pero, -ōnis Stiefel).
- perpensus** genau erwogen (v. *perpendo* betrachte), auch i. q. *suspensus* aufgehängt.
- perpetuus** immerwährend.
- perpusillus** sehr klein, winzig (s. vorh.).
- persicarius** pfirsichartig (*persica* Pfirsich).
- persicifolius** pfirsichblättrig.
- persistens** festsitzend, stehenbleibend.
- personatus** (sc. flos) maskenförmig, m. geschloss. Gaumen etc. (*persona* Maske).
- Personatae** Endl. Maskenblumige.
- pertūsus** durchstossen, -bohrt, -brochen.
- perilae** Knospenschuppen, eig. Säckchen (dem. *pēra* Sack).
- pervius** durchbohrt, offen, durchzupassieren.
- Petalanthae** Endl. Kronblütige, Primelblütige.
- petaloides** kronblattähnlich.
- petalum** (*πέταλον*) Kron- od. Blumenblatt.
- petiginōsus** rüdig, flechtig, **petigo**, -inis Räude.
- petiolatus** m. Blattstiel vers. (*petiōlus* Blattstiel. [tiōlus]).
- petraeus** auf Felsen wachsend (*πέτραϊος*).
- petrefactus** versteinert, in Stein verwandelt (*πέτρα* u. *facio*).
- Petropolis** St. Petersburg, **-politānus** Petersburger.
- petricosus** u. **petrosus** felsig, steinig.
- peucedanifolius** haarstrangblättrig.
- phaca** Linse, Linsenfrucht, -gericht.
- phacorrhizus** linsenwurzlig, m. Linsenknollen an d. Wurzeln.
- phaenogāmus** deutlich od. sichtbar blühend.
- phänologisch** = die Erscheinungs- od. Blütezeit betr. (v. *φαίνομαι* erscheine).
- Phänologie** = Blütenerscheinungskunde.
- phaeus** (gr. *φαῖος*) rot- od. schwarzbraun.
- phagedanicus** (*φαγεδανικός*) krebsartig um sich greifend.
- phalangifer** (v. *phalangium* Weberknecht) W. tragend.
- phalaroides** glanzgrasähnlich (*Phalaris* s. Nom.).
- phaleratus** m. Kopf- od. Brustschmuck geziert (*phalerae*, gr. *φάλαρα*).
- phaneranthērus** m. deutlichen Antheren (*φανερὸς* sichtbar etc.).
- Phanerogamae**, L., Phanerogamen“ d. i. deutlich blühende Pfl.

- pharmaceutes** (*φαρμακευτήης*) Arzneibereiter, „Pharmazeut“.
- pharmacognosia** Arzneiwaarenkunde (*φάρμακον* u. *γνώσις* Kenntnis etc.).
- Phasen** = Erscheinungsformen (z. B. Mondphasen) (*φάσις* v. *φαίνω* etc.).
- phellēma** „Phellem“ d. i. Korkschicht (*φελλός* Kork).
- phelloderma** (Sanio) Korkrindenschicht, „Korkhaut“.
- phellogenon** (-um) „Phellogen“, Korkstoff (*γένω* erzeuge).
- Phelloidschicht** = korkartige, nicht eig. Korkschiebt.
- Phellos** (*φελλός*) Korkeiche (s. Nom.).
- philaea** erdliebende (*φιλή* u. *αία* Erde).
- philonōtis** nassliebend, gern an feuchten Orten (*ροτις* d. Nass, die Nässe).
- phlebophorus** Adern tragend, aderrig (*φλέψ*, -*βος*, lat. *vena* u. *φορός*).
- phleoides** lieschgrasähnlich (Phlēm, s. Nom.).
- phloēma** „Phloēm“, Bast- od. Rindenstoff, Bastteil des Cambiums od. Gefäßbündels (v. *φλοιός* Borke, Rinde, Bast).
- phlomoīdes** dochtkraut-, wolkrautähnlich (*φλομίς* od. -*μος* Woll- od. Kerzenkraut).
- phoeniceus** purpurrot (gr. *φοινίζεος*).
- phoeniceus** (od. -*ius*) phoenizisch (*φοινικικός*).
- phrygius** phrygisch, aus Phrygien (in Kleinasien).
- Phycēa** Wallr. Algen od. Tange.
- phycochrōma** „Phycochrom“, d. i. Farbstoff der Algen od. Tange.
- phycologia** Tang- od. Algenkunde (*φύκος* lat. *fucus* Tang).
- Phycomycetes** de By Algenpilze (Pilzalgen).
- phyllicifolius** heidenmyrtenblättrig, immergrün-blättrig.
- phylloblastae** Rehb. Blattkeimer (= Dikotylen).
- phyllocladium** Blattzweig, blattgleicher Zweig (*κλαδός* Ast etc.).
- phylloodium** Blattstielblatt, d. i. ein blattartig erweiterter Blattstiel (*φυλλώδης*).
- phyllōma** Laubgewebe, Blattgebilde (z. B. Phyllomstacheln, Delbrouck, Blütenphyllome, Schwendener).
- phyllomania** Laubsucht (*μανία* „Manie“, Sucht).
- phyllophilus** Laubfreund.
- phyllotaxis** Blattstellung,-ordnung.
- phyllum** (in compos.) Laubblatt (*φύλλον*).
- phylogenetis** Gattungs- od. Zunftbildung betr. (*φυλή* od. *φύλον* Stamm etc.).
- physiologia** „Physiologie“, Naturlehre (v. *φύσις*, -*ιος* Natur, *λόγος* kundig).
- physiotypia** Gestaltungslehre der Natur (*τυπή* „Type“, Schlag etc.).
- phytanthozōa** Blumentiere (*φυτόν*, Pflanze, *άνθωζ*, *ζώον*).
- phytobasanos** Pflanzenuntersuchung (*βασάνωζ* Probe).
- phytologia** Pflanzenkunde (*φυτόν*, *λόγος* kundig od. *λόγος* Kunde).
- phytozōa** Pflanzentiere (*ζώον* Tier).
- picaceus** Elster od. auch Specht betr. (*pica* Elster, *picus* Specht).
- picēus** Pech od. Teer liefernd (*pix*, -*icis* Pech, Teer), pechschwarz.
- piciferus** pechtragend.
- picreus** bitter (v. *πικρός*).
- picridis** des Bitterkrauts (Gen. v. *Picris*, s. Nom.).
- Pictavis** Poitiers.
- pictus** bemalt, farbenstreifig od. -fleckig.
- pileatus** (v. *pilēus*) mit Hut versehen.
- pilifer** (v. *pilus*) Haare tragend.
- pili stigmatis** Narbenhaare.
- piloselloides** mäuseohrähnlich (*Pilosella*, s. Nom.).
- pilosiusculus** etwas behaart (s. sogl.).
- pilosus** behaart, haarig (v. *pilus*).
- pilula** (dem. *pila* Ball) Pille.
- pilularis** Pillen betr. (s. eb.).
- pilulifer** Pillen tragend (s. v.).
- pilus** Haar (gr. *πίλος*).
- pimpinellifolius** pimpinellblättrig.
- pinastrum** (deter. v. *pinus*) Tanne, Fichte.
- pinetum** (collect. v. *pinus*) Tannenschlag, -wald.
- pinēus** tannen, an od. auf Tannen wachsend.
- pinicōla** Tannen od. Fichten bewohnend, an od. unter Tannen.
- pinna** Feder, -*natus* gefiedert.

- pinnatifidus** fiederspaltig.
- piperatus** gepfeffert, nach Pfeffer schmeckend.
- piperitis** (-itus) pfefferartig (περιπέριτης).
- pisiferus** erbsentragend.
- pisiformis** erbsenförmig (pisum).
- pisocarpus** erbsenfrüchtig (πίσος u. καρπός).
- pistillaris** pistill- od. keulenförmig.
- pistillum** „Pistill“, Stempel, Mörserkeule.
- pityreus** kleienartig, schorfig (πίτυρος).
- placenta** Samenleiste (i. q. spermophorum).
- Placencia** Piacenza (am Po).
- placide** (-dus) sanft, gefällig, allmählich, nach u. nach.
- plaga** Gegend, Distrikt.
- planus** breitfüßig.
- planiculmis** plattalmig, flach- od. plattstenglig.
- planiglumis** flachspelzig.
- planisiliquis** flach- od. plattschotig.
- planiscelus** ziemlich platt od. flach.
- planta** Pflanze, Fusssohle.
- plantaginæus** wegerichartig (Plantago, s. Nom.).
- plantatio** Pflanzung, „Plantage“.
- planus** platt, flach, eben.
- plasma** Bildungs- od. Zellenurstoff (πλάσμα, -τος).
- Plasmamembran** od. -Haut, Abgrenzung gegen den Zellstoff (Pfeffer).
- plasmodium** = bewegl. Plasmamasse (b. Schleimpilzen, z. B. Lohblüte).
- plasmolytischer Zustand**, d. i. wenn sich das Plasma von der Zellwand zurückgezogen.
- platanifolius** platanenblättrig.
- platanoides** platanenähnlich.
- platantherus** m. breiten Staubbeuteln vers.
- platanensis** vom La Plata-Strom.
- Platte** = d. breite Teil eines Cruciferen-Kronblatts.
- platyacanthus** breिटdornig (πλατύς breit, άκανθα Dorn).
- platycaarpus** breitfrüchtig, **-phyllus** breitblättr., **-spermus** breitsamig.
- platystigma** Breitnarbe.
- plenus** (sc. flos) voll, gefüllt.
- pleroma** „Plerom“, d. i. Centralcylinder d. Wurzel.
- pleuranthæ** Seitenblütige (Gräser) (πλευρά Seite).
- pleurocarpi** (sc. musci) Seitenfrüchtige (Moose).
- Pleurorrhizæe** (sc. Cruciferae) DC. seitenwurzelnende (d. Samen beim Aufgehen).
- plexipes** flechtfüßig, -stielig (v. plecto, -xus).
- plica** Falte, **-catus** gefaltet.
- plicatilis** faltig. [artig.
- plumarius, -mosus** federig, federplumbæus bleiern, bleifarbig.
- plumula** Flaum- od. Blattfederchen d. Samenkeims.
- pluvialis** Regen betr., **pluvius** desgl.
- podagrarius** Podagra od. Fussgicht heilend.
- podetium** Fussgestell, Stiel d. Pilzapotheccien.
- podium** das die Gabeläste tragende Stengelstück.
- podium** (in compos.) Fuss, Stiel (πόδιον).
- podolicus** podolisch, aus Podolien (Südrussland).
- polifolius** poleiblättrig.
- poliotrichus** grauhaarig (πολιός u. ποίξ, τρίχος).
- politus** „poliert“, verfeinert, fein.
- polius** (πολιός) grau.
- pollen**, -inis Samen- od. Blütenstaub, „Pollen“.
- pollicaris** daumendick (v. pollex, -icis).
- pollinarium** Pollenmasse, **-inium** desgl. bei Orchideen.
- Pollveria** (sc. Pirus) Bollweiler (Kreis Gebweiler in Ober-Elsass).
- polonicus** polnisch, aus Polen.
- Polyadelphia** L. Vielbrüderige (XVIII. Kl.).
- polyanthemos** (-us) vielblütig, -blumig (πολλή u. άνθεμος).
- Polycarpicæe** Endl. Vielfrüchtler.
- polycarpus** viel- od. mehrfrüchtig (z. B. gynæceum).
- polycladia** Vielverästelung, Astwucherung (πλατός Ast, Zweig).
- polycelonus** vielzweigig (ζλωρ, -ωρός Trieb etc.).
- polydactylos**, -on (-us, -um) vielfingerig.
- polyedrisches Parenchym** = aus vielfäch. Zellen bestehendes, polyedrische Areolen (Sachs) = Polyederfächlein; Polyeder (Mathem.)

= Vielfächer, d. i. Körper mit vielen Flächen (*ἔδρα* Sitz etc.).  
**Polygamia** L. Vielehige (XXIII. Kl.) u. Syngenes. „Vielblütblumige“.  
**polygonalis** „polygonal“ d. i. vieleckig, -kantig.  
**polygrammus** vielstreifig, vielmals gestrichelt (*γράμμα* Strich etc.).  
**polygynus** vielweibig, -griffelig etc. (*γυνή* Weib, Bot. Stempel).  
**polymērus** aus mehreren Stücken bestehend (*μέρος* Stück, Teil etc.).  
**polymorphus** vielgestaltig (*μορφή* Gestalt etc.).  
**Polypetala** Juss. Vielkronblättrige (*πέταλον*).  
**polyphyllus** vielblättrig, dicht beblättert (*φύλλον* Laubblatt).  
**polyrrhizus** vielwurzellig (*ρίζα* Wurzel).  
**polyspermus** vielsamig (*σπέρμα*).  
**polystachyos** (-us) vielährig (*στάχυς*, -ος Ähre).  
**Pomaceae** Rehb. Apfelfrüchtler.  
**Pomariae** Lindl. ebenso.  
**pomarium** Obstgarten.  
**Pomerauo-Rugius** pommerisch-rügenger (Rugia Insel Rügen).  
**pomeridianus** (st. postmer.-) nachmittäglich.  
**pomifer**, -era apfelobsttragend (pompum).  
**Pomōna** Göttin des Obstes.  
**Pomponius** (-ianus) pomponisch (röm. Familie), aber auch prunkend (fr. pompon Zierrat).  
**pomum** (fr. pomme) Apfel, **poma aurantiorum** Pomeranzen.  
**ponticus** pontisch, von Pontus am schwarzen Meer.  
**popinalis** in Küchen gebraucht (popina).  
**populinus** an Pappeln wachsend (Populus, s. Nom.).  
**populneus** die Pappel betr.  
**porcinus** Schweine betr. (porcus, -i).  
**porosus** „porös“, voller Poren od. Löcher.  
**porphyrius** porphyr- od. purpurfarbig.  
**porrectus** ausgestreckt (v. porrigo strecke aus etc.).  
**porreus** lauchartig (Porrum, s. Nom.).  
**porrifolius** lauchblättrig (s. eb.).  
**portatilis** tragbar, leicht mitzunehmen.

**portentosus** abenteuerlich (portentum Wunder etc.).  
**portulacoides** portulakähnlich (Portulaca, s. Nom.).  
**porus** (πόρος) Durchgang, „Pore“.  
**posoniensis** Posener, aus Posen (Posonia).  
**posthūmus** nach dem Tod herausgegeben od. zur Welt gekommen.  
**postice** (-us) hinten, hinterer.  
**Potamicae** Juss. Fluss- od. Laichkräuter.  
**praealtus** sehr hoch.  
**praecipue** besonders, vornehmlich.  
**praecox** frühzeitig, vor der Zeit.  
**praefloratio** Blütenknospen-Anlage.  
**praefoliatio** Blattknospen-Anlage, Knospenblatt-Deckung.  
**praelongus** langgestreckt.  
**praemorsus** vorn abgebissen (v. mordeo beisse).  
**praesertim** zumal, besonders.  
**praestans**, -tissimus vorzüglich, vorzüglichster.  
**prasinus** (πράσινος) lauchgrün (Prasum in comp. Lauch).  
**-prasum** in compos. Lauch (πράσον).  
**pratensis**, -torum auf Wiesen wachsend (pratium).  
**precatorius** zum Beten dienend (zu Rosenkranzperlen gebr.).  
**prehensilis** anfassend, sich windend.  
**preanthoides** hasenkohlähnlich (Prenanthes, s. Nom.).  
**Primanblüten** (z. B. Amaryllideen) hintenumlaufige Erstlingsblüten (Schwendener).  
**primarius** „primär“, Erstling, auch vornehm.  
**primitiae**, -arum Erstlingsarbeiten, Anfänge.  
**primordialis** (sc. utriculus) Primordialschlauch, erste innere Zellschicht, erstanfänglicher.  
**Principes** Endl. Edelbäume (Palmen).  
**prismaticus** „prismatisch“, säulen-, ecksäulenförmig (z. B. Gefäße od. Zellen).  
**proboscideus** rüsselartig (πρόβος-σις, -ίδος Rüssel).  
**procambium** Zellschicht, aus der d. Gefäßbündel hervorgehen.  
**procernus** von hohem Wuchs, vornehm.  
**procumbens** niederliegend.

- procurrens** hinlaufend, sich erstreckend.
- prodigiosus** wunderbar, **prodigium** Wunder.
- prodrōmus** Vorläufer, Vorrede, Einleitung.
- productus** vor- od. in die Länge gezogen, auch „produziert“ od. hervorgebracht, z. B. „Produkt“.
- proles**, -is Brut, Nachkommenschaft, Sprössling.
- prolifer**, -ēra sprösslingtragend (s. eb.).
- prolificatio** Sprossung, d. Hervorbringen v. Sprösslingen.
- prolusio** Vorspiel, Einleitung.
- prominens** vorragend, hervorstehend.
- promptuarium** Speisekammer (v. promo hole herbei).
- promulgatus** „promulgiert“, bekannt gemacht etc.
- promycelium** Keimschlauch, Sporidie, aus welcher das eig. Mycel des Ahrenbrands hervorgeht.
- propago**, -inis Ableger, Spross.
- propagulum** kleiner Ableger od. Spross (s. eb.).
- prope** nahe bei.
- propinquus** nahe, verwandt.
- proponticus** vom Marmarameer (Propontis).
- prosenchyma**, „Proenchym“, Faser- od. Streckzellen Gewebe.
- prosenthesis** Zusatz bei wiederholter Blattstellung.
- prostratus** niedergestreckt, dahinkriechend.
- Proteinkörner** od. Klebermehl (v. dem formwechselnden Gott Proteus abgeleitet).
- protandrae** Pfl. m. vorherreifenden Staubbeuteln (zur Verhütung der Selbstbestäubung, z. B. bei Campanula Medium).
- prothallium**, -allus Vorkeim (i. q. pro-embryo) aus den Farnsporen.
- protogaeus** vorweltlich (πρωτοῦ; erster, γαίῃ Erde).
- protogenitus** zuerst erzeugt, Urerzeugter (s. eb. u. genitus v. gigno).
- protogynae** (sc. plantae) m. vorherreifenden Stempeln zur Verhütung d. Selbstbefrucht. (z. B. bei Magnolien u. Aristolochia).
- protonēma** Vorkeim beim Generationswechsel d. Moose (νῆμα Faden).
- Protophyta** Endl. Urpflanzen (πρωῦτοῦ; γυτὸν).
- protoplasma** Zellengrund- od. Ursprungsstoff (s. plasma).
- prototypus** von erster od. ursprüngl. Bildung (πρωτότυπος).
- proventitius** vorhergehend, **-titiae gemmae** Proventivknospen (d. i. nicht entwick. Anfangs-).
- provincialis** „provencer“, aus der Provence.
- pruina** Reif, Duft, **-nosus** bereift, duftig.
- prunulum** (dem. prunum) Pfläumchen.
- pruriens** juckend, Jucken erregend.
- pruthenicus** (-tenicus) preussisch.
- psamma** (ψάμμα) Sand, Muhm.
- Pseudo-** od. Pseud- in compos. falsch, trügerisch (ψεύδος; Lug, Trug).
- psilocarpus** nackt- od. kahlfrüchtig (ohne Pappus) (ψιλό; kahl etc.).
- psilophyllus** kahl- od. nacktblättrig.
- psittacinus** papageigrün, -farbig (Psittacus).
- psoraleus** krätzig, schäbig (ψωραλέος).
- psyllophorus** flohtragend (ψύλλα od. -λλος; Floh).
- ptarmicus** Niesen (πταρμιός) erregend.
- pteridographia** Farnkunde, **-iens** dazu gehörig (πτεροί; -ίδος u. γράφω beschreibe).
- pteris** in compos. Farn, eig. Flügel od. Wedel (πτερόν).
- pterocarpus** flügelfrüchtig, Flügel Frucht.
- puber** (od. -es), -ēris mannbar, erwachsen.
- pubes**, -is Flaum, Behaarung, eig. Mannbarkeit.
- pubescens** weich- od. flaumhaarig.
- pubescentia** „Pubescenz“, weiche Behaarung.
- pudicus** verschämt.
- pudorinus** verschämt, schamröthlich.
- pugillaris**, -ium Schreibtäfelchen.
- pugillus** Heft.
- pulehellus** (-cellus) schön (dem. pulcher).
- pulicaris**, -rius Flöhe betr. (pulex, -icis).

**pullus** dunkel- od. schwarzbraun.  
**pulpa** Fruchtbrei.  
**pulveraceus** staubig, pulverig.  
**pulvinatus** polster- od. kissenartig (v. *pulvinus*).  
**pumilus** niedrig, niedlich, klein.  
**punctatus** punktiert, gedüpfelt.  
**pungens** stechend (*pungo*, *püpügi*, *punctum*, 3.).  
**punicæus** granatrot (v. *Punica* Granatbaum).  
**punicus** punisch, phönizisch, carthagisch.  
**pustula** „Pustel“, Bläschen, -atus m. Pusteln, pockig.  
**putāmen** Stein d. Steinfrucht, Kernstein od. -Schale.  
**puteanus** (-tanæus Kummer?) in Gruben od. Brunnen vorkommend (*putæus*).  
**putridus** angefault, morsch.  
**Pycnidæe** Tul. „Pykniden“, Fruchtformen mancher Pilze (v. *πυκνός* dick, dicht).  
**pycnocephalus** dick- od. dichtköpfig (s. eb. *κεφαλή*).  
**pygmaeus** (*πυγμαίος*) zwerg- od. „pygmäenhaft“.  
**pyramidalis** pyramidenförmig.  
**pyræna** „Pyrene“, Steinfruchtkern, z. B. bei Rubiaceen (*πυροήν*, -ήνος).  
**pyrenaicus**, -aicus pyrenäisch, von den Pyrenäen.  
**Pyrenomycetes** Fr. Kernpilze (s. v.).  
**pyriodorus** von Birngeruch (*pyrus* u. *odorus*).  
**pyrogalus** feuermilchig, m. feuergelber Milch (*πῦρ*, -ος u. *γάλα*).  
**pyrotechnicus** „pyrotechnisch“, z. Feuerwerk gehörig.  
**pyxidaris**, -arius büchsenartig (*πυξίς*, -ιδος).  
**pyxidatus** mit Büchsen besetzt.

**quadratus** „quadratisch“, viereckig.  
**quadrialatus** vierflügelig (*quadri-* in comp. u. *alatus* geflügelt).  
**quadriangularis**, -atus viereckig, -kantig (*angulus* Eck, Winkel).  
**quadrifariam**, -ius vierfach (adv. u. adj.).  
**quadrifidus** vierspaltig.  
**quadrifolius** vierblättrig.  
**quadrijugis** (-us) vierjochig, -paarig.  
**quadriocularis** vierfächerig (*loculus* dem. *locus*).

**quadriquetter**, -tra vierschneidig.  
**quadrus** viereckig, Viereck.  
**quatenus** wie weit, inwiefern, in Betracht dass.  
**quater** viermal.  
**quaternellus**, -ternus vierfältig.  
**quercetum** (collect. v. *quercus*) Eichenwald, -schlag.  
**quercæus** eichen, von Eichenholz.  
**quercifolius** eichenblättrig.  
**quercinus** die Eiche betr., zur Eiche gehörig.  
**quernus**, -næus wie eben.  
**quinatus** zu fünf gestellt, fünf-fach.  
**quinduesis** vom Berg Quindu (Neugranada).  
**quini**, -ae zu fünf, je fünf.  
**quinologia** Quinoakunde (*Quinoa*, s. Nom.).  
**quinquecornis** fünfhörning.  
**quinquedentatus** fünfzähmig.  
**quinquefidus** fünfspaltig, -teilig.  
**quinquefolius** fünfblättrig.  
**quinquepartitus** fünfteilig, in fünf Teile geteilt.  
**quinquevulnerus** fünfmarbig (*vulnus*, -eris Wunde).  
**Quirl** (*Wirtel verticillus*) Astkreis um einen Stamm herum (z. B. Fichte).  
**quisqualis** ungewiss was für (quis? qualis? wer? was für einer?).  
**quisquillæ** Schmutz, Unrat, Auswurf.  
**quisquiliaris** in od. auf Schmutz etc. wachsend.  
**quot** wie viele.  
**quotannis** jährlich, alljährlich.  
**quoties** wie oft, wie viermal.

**rablensis** aus dem Raiblthal in Kärnten.  
**racemosus** traubig, traubenartig (*racemus* Tr.), gipfelsprossig mit innerem Hauptstamm.  
**racemus** Traube u. Traubenkamm.  
**radialis** in Radien od. Strahlen gestellt, z. B. radiale Wände (Sachs) d. s. aus der Wachstumsachse rechtwinklig auf d. Oberfläche gestellte.  
**radians** strahlend.  
**Radiatae** Juss. Strahlcompositen.  
**radiatus** gestrahlt, strahlblütig („Radiaten“ bei d. Compositen).

- radicalis** aus der Wurzel, die W. betr.  
**radicans** wurzelnd, wurzelschlagend.  
**radicellae** Nebenwurzeln (dem. radix, -icis).  
**radicosus** wurzelartig, wurzelreich.  
**radicula** Würzelchen od. Schnäbelchen des Samenkeimes (aus dem sich d. Wurzel bildet).  
**radius** Strahl, z. B. Blütchen im Umkreis der Compositen.  
**radix**, -icis Wurzel.  
**radula** Raspel.  
**raehorrhizus** schweifwurzlig (*ῥαεβὸς* geschweift).  
**Rajolen** (Rijolen) = Bodenarbeit des Schichtwechslens.  
**ramalis** ästig, -**mealis** auf Ästen wachsend.  
**ramentaceus** schabselig, spänig (ramentum).  
**ramentum** Ausschlagschuppe, Schabsel, Späne.  
**ramens** an Ästen befindlich.  
**ramiger**, -**ura** Äste führend, geweihästig.  
**ramosus**, -**sissimus** ästig, sehr verästelt.  
**ramuli** Ästchen, Zweige (dem. ramus Ast).  
**ranae** des Frosches, **ranarius** unter Fröschen vorhanden.  
**rangiferinus** (st. ramiger ferinus) Wild-Astmoos betr.  
**rapa** Rübe, -**ceus** rübenförmig, -artig.  
**raphe** (*ῥαφή*) Naht, mit dem Samenstiel langwegs verwachsene Samenhaut.  
**raphida** (sc. crystalli) Nadelkristalle, Nadeln (*ῥαφίς*, -ίδος).  
**rapum** (i. q. rapa) Rübe.  
**rapunculoides** rapunzelartig.  
**rarior**, -**issimus** seltner, seltenster, **rarus** „rar“ etc.  
**ratisbonensis** Regensburger (Ratisbōna R.).  
**ratumagensis** von Rouen (Ratumä-gus od. Rotom.).  
**ravidus** u. **ravus** graugelb.  
**receptacularis** fruchtbodenständig.  
**receptaculum** Fruchtboden.  
**receptio** von aussen aufgenommene od. „Receptions“ - Bewegung d. Blätter (Pfeffer).  
**reciprocus** wiederkehrend, (Grammatik) rückbezüglich.  
**reccisus** zurückgeschnitten (v. rescindo).  
**reclinatus** zurückgeneigt, niederbeugt.  
**recte** richtig, **rectius** richtiger, -**tus** gerade, aufrecht.  
**recurvatus** (-vus) zurückgekrümmt, krumm.  
**recutitus** beschnitten (v. cutis Haut).  
**redivivus** wiederauflebend, -aufgelebt.  
**redolens** Geruch verbreitend.  
**reflexus** zurückgebogen.  
**refulgens** zurückstrahlend, widerscheinend.  
**regalis** u. **regillus** königlich, prächtig.  
**Regina** Regensburg.  
**Regiomontium** Königsberg.  
**regius** königlich.  
**regularis** „regulär“, regelmässig.  
**relativ** = im Verhältnis, verhältnismässig.  
**reliquiae** Überbleibsel, Nachlass.  
**religiosus** „religiös“, heilig.  
**Remi**, -**menses** Rheims, Rheinmer.  
**remotus** entfernt, auseinander.  
**remontante** fr. (z. B. Rose) wiederholt blühende.  
**renifolius** nierenblättrig (rēn, -nis Niere).  
**repandus** geschweift, ausgeschweift.  
**repens** u. **reptans** kriechend.  
**repertorium** (fr. répertoire) Register, Liste, „Repertoire“.  
**Reservestoff**, -**nahrung** = zur Ernährung in der Pfl. abgelagerter.  
**resinosus** harzsafführend (v. resina Harz).  
**resorbieren** = aufsaugen.  
**resortio** „Resorption“, Aufsaugung v. Flüss.  
**resupinatum** (sc. folium) unterst zu oberst gekehrt.  
**resupinus** zurückliegend, -geneigt, verkehrt.  
**reticulatus** netzförmig, -**culum** Fischnetz (v. rēte, retis Netz).  
**retinaculum** Halter (v. retineo).  
**retroflexus** zurückgebogen.  
**retrorsum** rückwärts.  
**retusus** stumpf, abgestumpft.  
**revisio** „Revision“, Durchsicht.  
**rhachis** (*ῥάχις*, -εως Rückgrat etc.) Blatthauptrippe, Spindel eines Fiederblatts.

**Raethia** „Rhätien“ (j. Tirol u. Graubünden).  
**rhamnoides** kreuzdornähnlich (Rhamnus, s. Nom.).  
**rhenanus** rheinisch, **Rhenus** Rhein.  
**rhipaeus** (ῥιπαῖος) od. **rhiphaeus** rhipäisch od. uralisch, von d. rhipäischen Gebirge (Ural).  
**Rhizanthëae** Endl. Wurzelblütler.  
**rhizinae** Hautfasern der Flechten.  
**Rhizocarpëae** Batsch Wurzel-früchtler.  
**rhizoides** wurzelähnlich, -artig, z. B. Rhizoïden = am Vorkeim der Chara sich bildende Wurzelbärtchen.  
**rhizōma** (ῥιζώμα) „Rhizom“, Wurzelstock.  
**rhizomorphus** wurzelartig gebildet.  
**rhizophōrus** wurzeltragend.  
**rhizotomīcum** (ῥιζοτομικόν) Buch üb. Wurzelgräberei od. -Schneiderei.  
**rhodo-** in comp. Rosen- (ῥόδον).  
**rhodopolium** (Gen. Pl.) der Rosenverkäufer (v. ῥοδοπωλῆς).  
**rhoeadifolius** möhnblättrig (Rhoëas, -ädis, s. Nom.).  
**rhoifolius** sumachblättrig (v. Rhus, -ois, s. Nom.).  
**rhombëus** rhombisch, rautenförmig.  
**rhomboidalis** rhomboidisch, lang-rautenförmig.  
**rhytidospermus** runzelsamig (ῥυτίδος, -ιδος).  
**rictus** Rachen, aufgesperrter Mund.  
**Riefen** = Rippchen der Doldenfrüchte (juga).  
**rigens** starr, steif (rigeo, -ere starren, steifsein).  
**rigidulus** etwas starr od. steif (s. eb.).  
**rigidus** starr, steif (s. v.).  
**riguus** bewässert.  
**Rillen** (vallecūlae) zwischen d. Riefen d. Doldenfrüchte.  
**rīma** Ritze, Riss, **-mosus** rissig, voller Ritzen.  
**rimosipes** rissfüßig, -stielig (s. eb.).  
**ringens** mundaufsperrend, rachenförmig (v. ringor, 3.).  
**ripaei montes** s. rhipaeus.  
**riparius** am Ufer wachsend (ripa).  
**rivalis** an Bächen wachsend (rivus).  
**riviniānus** Rivini's (n. pr.).  
**rivularis** an kleinen Bächen wachsend.

**rivulosus** rinnig, rissig, rinnselig (s. sogl.).  
**rivulus** (dem. rivus) Bächlein, kleiner Bach.  
**robertianus** Roberts od. Rupprechts.  
**robiginosus** rostig, rostfarbig (robigo, -inis).  
**robur**, -oris Kraft, Steineiche.  
**robustus** „robust“, stark, kräftig gebaut (s. eb.).  
**Röhrenblüten** (flores tubulosi) bei Compositen (Disteln etc.).  
**ros**, -ris Tau, Reif, Duft.  
**rosaceus**, -seus rosenartig.  
**rosëidus** betaut, bereift, beduftet.  
**roseola** (dem. rosa) Röschen.  
**Rosette** = Röschen, rosenförm. Rundverzierung.  
**Rosiflorae** Endl. Rosenblütige.  
**Rossia** Russland, — **meridionalis** Südrussland.  
**rossicus** russisch.  
**rosmarinifolius** rosmarinblättrig.  
**rostellatus** m. einem Schnäbelchen versehen (s. sogl.).  
**rostellum** (dem. v. rostrum) Schnäbelchen, Pollinientäschchen der Orchideen.  
**rostratus** (v. rostrum) geschnäbelt.  
**rosula** (dem. rosa) kleine Rosette, Blätterrosette etc.  
**Rotation** = Drehung, Radbewegung.  
**rotatus** radförmig (v. roto drehe um, rota Rad).  
**rothianus** (rothigūus s. Rothii) nach Roth benannt.  
**rothomagensis** (roto- u. rodomensis) von Rouen, vgl. ratumagensis.  
**rotundatus** gerundet.  
**rotundifolius** rundblättrig (rotundus rund).  
**rubellus** (dem. ruber) rötlich.  
**rubens** erötend, gerötet, rötlich, rot (v. rubëo).  
**ruber**, -bra etc. rot, **-berrimus** grell rot.  
**rubescens** errötend, gerötet (rubescere werde rot).  
**rubicundus** rötlichgelb, hochgelb.  
**rubifolius** brombeerblättrig (v. Rubus, s. Nom.).  
**rubiformis** brombeerförmig, -warzig (Kummer).  
**rubiginosus** i. q. robiginosus rostfarbig (rubigo, -inis).  
**rubigo**, -inis Rost, Rostfarbe.



**rubioides** brombeerähnlich (Rubus, s. Nom.).

**rubrica** Rötel, **-eatus** mit Rötel bezeichnet, „rubriziert“.

**rubrifolius** rotblättrig (ruber, -bri).

**ruderalis** auf Schutt wachsend (rudus, -ëris).

**rudimentär** = nur erste, rohe Anfänge zeigend.

**rudimentum** „Rudiment“, erster (roher) Anfang (s. sogl.).

**rudis**, -e roh.

**rufescens** rötlich werdend, ins Rote spielend.

**rufidulus** lichtrot, hell- od. hochrot.

**rufinervis** rotnervig, -aderig.

**rufulus** (dem. rufus) fuchs- od. hellrot.

**rugula** Runzel, **-gatus**, **-gosus** gerunzelt, runzelig.

**Rugia** Insel Rügen.

**rugula** Runzelchen, **-gulosus** etwas runzelig.

**rumelicus** rumelisch, aus Rumelien (Türkei).

**runcina** Hobel, Schrotsäge, **-natus** schrotsägenförmig.

**rupes** auf Felsen wachsend.

**rupicolus**, -a auf Felsen wohnend (rupes, -is).

**ruralis** ländlich, bäuerisch, im Feld wachsend (rus, -ris).

**rusticanus**, -icus ländlich, bäuerisch.

**rutaceus** rautenartig, -blättrig (Ruta, s. Nom.).

**rutaefolius** (bess. -tifolius) rautenblättrig.

**ruthenicus** ruthenisch, aus Rotrussland.

**rutillus** rötlich, rotgelb.

**sabandus** savoyer, aus Savoyen.

**sabulosus** sandig, **sabulum** Sand.

**saccatus** (v. saccus) sackförmig.

**saccharinus** Zucker betr., **saccharum** Zucker.

**saccharosis** „Saccharose“, Rohrzucker.

**saccifer**, -ëra sacktragend (nicht etwa zuckertragend, was saccharifer!)<sup>1)</sup>

**saepiarius** an Zäunen wachsend (saepes, -is Zaun).

**sagittalis**, **-arius**, **-atus** pfeilartig, -förmig.

**sagittifolius** pfeilblättrig (sagitta).

**salicetum** (collect. v. salix, -icis) Weidengehölze.

**salicifolius** weidenblättrig (s. eb.).

**salicinus** Weiden betr., unter solchen wachsend (s. v.).

**salignus** wie Weiden aussehend, auch von Weidenholz.

**salinus** salzig, an od. bei Salinen wachsend.

**salisburgensis** Salzburger.

**salsus** salzig, scharf, beissend.

**salutaris** heilkräftig (salus, -ütis Heil etc.).

**samara** Flügelfrucht.

**sambucinus** hollunderartig riechend, -ähnlich (Sambucus, s. Nom.).

**sanguinalis**, **-nëus** blutrot (sanguis, -inis).

**sanies**, -ei Jauche, **-niosus** jauchig, fließend.

**sapidus** schmackhaft.

**sapinëus** tannenartig (z. B. so riechend).

**saponaceus** seifig, seifenartig (sapo, -önis).

**saracenicus** aus d. Lande der Saracenen (Morgenland).

**sarcocarpium** Fruchtfleisch, -hülle (σάρξ, -κος Fleisch, σαρκός Frucht).

**sarcoïdes** fleischähnlich, -rot (s. eb., εἶδομαι gleiche).

**sardëus** (σάρδωος) sardinisch, von d. Insel Sardinien.

**Sarmatia** Land der Sarmaten (j. Polen u. Russland).

**Sarmentaceae** Rchb. Zaukenlilien (sogl.).

**sarmentosus** rankentreibend, **sarmentum** Schössling, Ranke.

**sarnicus**, **-niensis** von Guernsey (e. normännische Insel).

**sativus** gesät, gebaut, als Saat wachsend.

**saturate** (-us) gesättigt (von Farben).

**saxatilis** auf Felsen wachsend (saxus, -i).

**saxifragus** Felsen brechend od. zerbröckelnd (frango zerbreche).

**saxosus** felsig, steinig, voller Steine od. Felsen.

**scabellus** (dem. scaber) rüdig, schäbig.

1) S. z. B. Jürgens, etymol. Fremdwörterbuch, 1878.

**scaber**, -bra etc. rauh, **-berrimus** sehr rauh anzufühlen.

**scabiosus** schäbig, grindig (scabies, -ei Schorf etc.).

**scabriscūlus** etwas rauh (anzufühlen).

**scalariformis** leiterförmig (scalae, -arum Leiter).

**scandens** kletternd, klimmend (scando steige).

**scandicus** skandinavisch, schwedisch.

**Scania** Schonen (Südschweden).

**scapifer** schaft-, stiel- od. stengeltragend (scapus).

**scapiflorus** schaftblütig, -blumig.

**scapiformis** schaftförmig.

**scapus** Schaft, Stiel, Stengel.

**scariosus** rasseldürr (fr. scarieux).

**scaturiginus** Felsquell bewohnend (scaturigo, -inis).

**scaurus** klumpfüssig.

**sceleratus** verbrecherisch, giftig (scelero v. scelus, -eris).

**schedula** Zettel, Blatt.

**Scheibe** (discus) = bei Radiaten die innere Partie der Blütenchen.

**Scheinfrucht** (z. B. Maulbeere) = d. Samen einschliessende Fleischmasse als Fruchtstand (Perigonblätter etc.).

**Schistocarpi** spaltfrüchtige Laubmoose.

**schizocarpium** Spaltfrucht ( $\sigma\chi\iota\zeta\omega$  spalte etc.).

**Schlauchgefässe** (z. B. in den Blättern u. Stengeln der Monocotylen).

**Schlenderzellen** (elatères), z. B. der Mooskapseln.

**scholium** ( $\sigma\chi\omicron\lambda\iota\omicron\nu$ ) Erläuterung etc.

**sciagraphia** Schattenriss ( $\sigma\chi\alpha\gamma\rho\alpha$ ), Umriss.

**scissus** geschlitzt, spaltig, faserig (v. scindo, 3.).

**scitāmen**, -inis Geissel, Peitsche, -minosus peitschentreibend.

**Scitamineae** DC. Bananengewächse.

**Schwärmsporen** = freiumher-schwimmende (z. B. d. Algen).

**sciuroides** eichhornähnlich, -schwänzig (sciurus).

**sclerenchyma** hartes Parenchym ( $\sigma\chi\lambda\eta\rho\omicron\varsigma$  hart), z. B. Sclerenchymascheiden bei Carex-Rhizomen.

**sclerophyllus** hartblättrig.

**sclerotium** hartfleischige Missbildung (z. B. beim Mutterkorn), Dauermycel des Sclerotium Clavus (Claviceps).

**scobiformis** sägmehlförmig (scobs, -bis).

**scopulus** Felsklippe, Bergkuppe.

**scorodoniis** knoblauchartig ( $\sigma\chi\omicron\delta\omicron\delta\omicron\nu$ ).

**scorpioides** skorpionähnlich, -schwänzig.

**Scorpionschwanz** (cinnus) gekrümmte Wickel.

**scoticus** schottisch.

**scrobiculatus** mit Grübchen vers. (dem. scrobs, -bis Grube).

**scrophularius** skrofelig, Skrofeln heilend, eig. schweinsartig (scrofa od. -pha, dem. -phula Schwein).

**scruposus** voll spitzer Steinchen od. Hindernisse, ebenso **-pulosus** skrupulös.

**scutatus** (v. scutum) schildförmig, wie ein Langschild.

**scutellatus** (v. scutellum dem. scutum) schildförmig, wie ein Schildchen.

**sebacēus** talgig, talgartig (sebum Talg, Unschlitt).

**sebifer**, -era Talg führend (s. eb.).

**secalinus** korn- od. roggensartig (Secale, s. Nom.).

**secernierendes Organ** (Reinke) = absonderndes (s. sogl.).

**secretio** Ausscheidung, Absonderung (v. secerno, 3.).

**secretum** Absonderungsprodukt, z. B. Milch etc.

**secundiflorus** einseitig blühend (secundus v. sequor folge, nämli. dem Wind, mit dems. mich abwendend<sup>1)</sup>).

**secundus** folgender, zweiter, aber auch: einseitwendig, mit dem Wind weggewandt.

**securiger**, -era beilführend (secūris Beil).

**Sedinum** Stettin, **-uensis** Stettiner.

**seges**, -ētis Saat, Saatfeld, -tum der Saaten.

**segetalis** unter Saaten wachsend.

1) Nicht (n. Jürgens) zweitblütig (v. secundus zweiter, eig. folgender)! — vielmehr nach einer Seite gewendet.

**segmentum** „Segment“, Abschnitt, Teil, Glied.  
**Segregatae** L. Sonderblüt. Compositen (Bl. m. besond. Kelchen).  
**seguinus** schierlingsartig (fr. cigue, lat. cicuta).  
**Sesusio** Susa (Oberital.), -**siensis** von Susa.  
**Selbstbestäubung** u. Fremdbestäub. (durch andre Individuen).  
**selectus** auserlesen, auserwählt.  
**semecarpicus** fahnenfrüchtig ( $\sigma\eta\mu\alpha$  Zeichen, Fahne,  $\alpha\alpha\pi\lambda\omicron\varsigma$ ).  
**semen**, -inis Samen.  
**semestris** sechsmonatlich, ein „Semester“ od. Halbjahr dauernd (v. sex u. mensis Monat).  
**semiapertus** halboffen (semi-, in comp. halb).  
**semidecandrus** halbzehn- d. i. fünf-männig, st. zehn nur fünf Staubgefäße zählend.  
**semidecurrrens** halberablaufend.  
**semiliber**, -bēra halbfrei.  
**semiovatus** halbfeirund.  
**semipectinatus** halbgekämmt od. -kammförmig.  
**semipedalis** einen halben Schuh messend.  
**semperflorens** immerblühend, -**vi-reus** -grünend.  
**sempervivus** immerlebend.  
**senescens** alternd, greisenhaft.  
**seni**, -nae zu sechs, je sechs.  
**senilis** greisenhaft, den Greis betr. (senex, -nis).  
**senticosus** dornbuschig (v. sentis).  
**sepalum** Kelchblatt, -zipfel.  
**separatus** „separat“, abgesondert, getrennt.  
**sepiarius** (i. q. saepiarius) an Zäunen wachsend (sepes, -is, Pl. -ium).  
**sepium** Umzäunung.  
**sepium** Gen. Pl. v. sēpes Zaun.  
**septentrionalis** nordisch (Septentrio Norden od. Nordwind).  
**septidius** (sc. dehiscencia) wandteilendes Aufspringen (septum Wand u. caedo zerschneide).  
**septicus** ( $\sigma\eta\pi\tau\iota\omicron\varsigma$ ) fäulnisregerend.  
**septius** auf faulen Stoffen wachsend ( $\sigma\eta\pi\tau\iota\omicron\varsigma$  verfault).  
**sericanus** serisch, aus d. Lande d. Serer (Ostasien).  
**serialis** in Reihen stehend (series).

**sericeus** seidenartig.  
**series**, -ēi „Serie“, Reihe, Kette.  
**serifluus** blut- od. molkenflüssig (serum Blutwasser etc.).  
**-seris** in compos. -Salat ( $\sigma\acute{\epsilon}\rho\iota\varsigma$ , -ιδος).  
**serotinus** spät im Jahr, spätzeitig, -reif.  
**serpyllaceus** quendelartig (Serpylum, s. Nom.).  
**serraturae** Sägezähne, **serratus** gesägt (serra Säge).  
**serre** fr. Gewächshaus.  
**sertum** od. Pl. -**ta** Blumengewinde, (Guirlande).  
**sesquipedalis** anderthalb Schuh lang.  
**sesquiertius** dritthalb =  $2\frac{1}{2}$ .  
**sessiliflorus** sitzblütig, mit sitzenden Blüten.  
**sessilifolius** sitzblättrig, m. sitz. Laubblättern.  
**sessilis** sitzend, d. i. ungestielt.  
**seta** Borste, -**acēus** borstenförmig, -**arius** Borsten enthaltend.  
**setiger**, -**era** borstenführend (s. eb.).  
**setosus** borstig, m. Borsten besetzt.  
**seusanus** von der Save (Sau) in Ungarn.  
**sexangularis** sechseckig, -kantig.  
**sexuelle Fortpflanzung** = geschlechtliche, d. i. durch Sporen oder Samenverschmelzung der Pollen- u. Eizellen.  
**sexus** Geschlecht.  
**siccus** trocken, dürr.  
**siculus** sicilianisch.  
**Siebröhren** = Gefäße mit siebförmig durchbrochenen Zwischenwänden.  
**silifolius** merkblättrig (Sium, s. Nom.).  
**Silesia** Schlesien, -**siacus** schlesisch.  
**silex**, -icis Kiesel, -**catus** verkieselt, -**catum** „Silikat“, verkieselter Körper.  
**siliceus** kieselartig, -hart.  
**silicula** Schötchen, -**losus** Schötchen tragend.  
**Siliculosae** L. Schötchen-Cruciferen.  
**siliqua** Schote, -**quosus** Schoten tragend.  
**Siliquosae** L. Schoten-Cruciferen.  
**siluricus** silurisch (v. Silures, brit. Volk im Fürstentum Wales, Grossbritannien).

- silvaticus, -vestris** im Wald wachsend.
- simplex, -icis** einfach.
- simplicifolius** m. einfachen (ungeheilten) Blättern.
- simplicissimus** äusserst od. ganz einfach.
- simultan** = plötzlich, zusammen, auf einmal, z. B. simultane Zellscheidung, Simultankirche etc. (simultaneus von simul adv. zugleich).
- sinensis** i. q. chinensis sinesisch (chinesisch).
- sinicus** i. q. sinensis (s. eb.).
- sinister, -stra** linker, linksge wandter.
- sinistrorsum** linksherum.
- sinuatus** buchtig, ausgebuchtet, buchtblättrig (sinus).
- siphonanthus** Röhren- od. Pfeifenblume (*σίφων* etc.).
- Siphonocaulae** Bisch. Röhrenstenglige (Armleuchter).
- Sirmium** Stadt in Slavonien.
- sitophilus** weizenliebend (*σίτος*).
- situla** Eimer, -larius eimerförmig.
- situs, -us** Lage, Zustand.
- smegmadermus** schmier- od. seifenschalig (*σμήγμα* d. Schmierer, *δέσμα* Haut etc.).
- soboles** Stocksprossen.
- sobolifer** (-erus, -era) sprossentreibend, sprossend.
- sobrius** mässig, trocken (Kummer).
- sociatus** zusammengesellt, gesellig.
- solidus** dicht, „solid“, nicht hohl.
- solisaequus** der Sonne folgend.
- solitarius** einsam, einzelstehend.
- soloniensis, -onius** (sc. ager) Gebiet von Solona in Kärnten od. d. Solonische Geb. in Latium.
- solstitialis** sommerlich, zur Zeit der Sommerwende od. sommerl. Sonnenwende, eig. des Sonnenstillstands (sol u. sisto, -stiti, 3.).
- somnifer, -era** schlafbringend, -erregend (somnus).
- sonorus** tönend, schallend, rasselnd (von sonus Ton).
- Soredien** = zu ein. Gruppe verein. sich lostrennende Gonidien d. Flechten.
- sorius** sorisch, aus Soria, e. Provinz v. Altcastilien.
- sororius** schwesterlich, geschwisterlich.
- sorösis** Scheinbeere, z. B. Ananas, Maulbeere, Anhäufung (v. *σορός* Haufen).
- Sortiment** = Sammlung gleichartiger Pflanzen.
- sörus, -ri** Sporen- od. Fruchthäufchen d. Farne (s. eb.).
- spadicëus** kolbig (v. *spadix, -icis*), aber auch braunrot, dattelfarbig.
- spadiceo-grisëus** braungrau (Kummer).
- spadix, -icis** (*σπάδιξ, -κος*) Palmfruchtweig, Blütenkolben, aber auch dattelfarbig (s. v.).
- sparsiflorus** locker-, zerstreutblühend.
- sparsus** zerstreut (v. *spargo, -rsi* 3.).
- spartëus** pfriemengrasartig (spartum, *σπάριον*).
- spätha** Blütenscheide (*σπάθη* Spaten, Spatel).
- spathacëus** scheidenförmig.
- spathulatus** spatel- od. spatelförmig.
- spathulifolius** spatelblättrig.
- species** Spezies, Art, -cialis artlich, besonderer, „spezieller“.
- specificus** artlich eigen, eigentümlich, „spezifisch“.
- specimen, -inis** Muster, Artbeispiel, Probe.
- speciosus** wohlgestaltet, sehr schön etc.
- spectabilis** beträchtlich, ansehnlich, prächtig.
- spectans** dahin zielend, betreffend.
- speculum** Spiegel.
- spelta** Spelt, Spelz.
- spermatium, Pl. -tia** Sporen d. Pilze in s. g. Spermogonien (s. hern.).
- spermatophyta** Samenpflanzen i. q. Phanerogämae (*σπέρμα, -ατος* S. u. *φυτόν*).
- spermatozöida** = bewegl. Körperchen aus d. Antheridien, welche die Eizellen der Oogonien befruchten u. die Oosporen hervorbringen (z. B. Chara etc.).
- spermogonium** „Spermogon“, Fruchtform mancher Pilze (*σπέρμα* u. *γόνος* Zeugungsorgan).
- spermophorum** (*σπερμόφορον*) Samenträger, -leiste.
- sphaclatus** bündel- od. fackelartig (*σφάκελος*).
- sphaericus** kugelförmig, „sphärisch“ (v. *σφαίρα* K.).

**sphaeroidĕus** ein „Sphäroid“ bildend, kugelähnlich.  
**sphaerocarpus** kugelfruchtig.  
**sphaerocephalus** kugelköpfig.  
**spĕca** Ähre, -**catus** ährig, ährenförmig.  
**spĕcilegium** Ährenlese (spica u. lĕgo).  
**spĕcula** (dem. spica) Ährchen, -**eulosus** mit Ährchen.  
**spĕculum** Spiesschen, Pfeilchen.  
**spina** Dorn, -**nosus** dornig, -**nosissimus** äusserst dornig.  
**spinescens** etwas dornig.  
**spinulosus** m. Dörnchen besetzt (spinula dem. v. spina).  
**Spira** Speyer (Rheinpfalz).  
**spiralia** (sc. vasa) Spiralfässer.  
**spiralis** schraubenförmig (spira, gr. *σπείρα* Windung, „Spirale“).  
**spiranthes** schraubenblütig.  
**spissus** dicht gedrängt, langsam, -weilig, zäh (Kummer).  
**splendens**, -**didus** glänzend, ins Auge fallend.  
**spontanĕus** freiwillig, von selbst.  
**sponte nascens** frei od. wild wachsend.  
**spōrae** Sporen, Keimkörnchen (*σπόρος* Saat v. *σπείρω* säe).  
**sporangium** „Sporangie“, d. i. Sporenbehälter (v. *ἀγγείον*), Keimfrucht d. Kryptogamen.  
**Sporenknōsphen** der Armlauchter (Chara, s. Nom.).  
**sporidium** eine Art Spore, sekundäre Spore b. Kryptogamen.  
**sporocarpium** (i. q. sporangium) Keimfrucht.  
**sporogonium**, durch Befrucht. gebild. Embryo in Moosarchegonien (Mooskapseln).  
**Sporophŷta** Sporenpflanzen, i. q. Cryptogamae L.  
**Spreite** = breite Blattfläche (lamina).  
**spretus** verachtet, verworfen (v. sperno, sprevi, 3.).  
**spumarius** (v. spuma) schaumartig, wie Schaum aussehend.  
**spumosos** schäumend, schwammig (Kummer).  
**spurius** unecht, unehelich, Bastard etc.  
**squalens**, -**lidus** schmutzig, besond. schmutziggelb.  
**squama** Schuppe, Deckblatt d. Cyperaceenblüten.

**squamae** Niederblätter.  
**squamarius**, -**atus**, -**osus** schuppig (s. eb.).  
**squamulae hypogynae** Schüppchen unter d. Stempel.  
**squamulosus** mit Schüppchen besetzt, schuppig.  
**squarrosus** sparrig, steifästig, -**ruulosus** etwas sparrig.  
**stabularis** in Ställen vorkommend (stabulum).  
**stagnalis**, -**minus** im Sumpf wachsend (stagnum).  
**stamen**, -**inis** Staubgefäss, -blatt, -faden.  
**staminĕus** staubfadenartig, an Stelle d. Staubf. z. B. corona staminĕa d. Staubf. tragende Krone.  
**staminodium** in ein Blatt verwand. Staubgefäss.  
**stegocarpus** Dach- od. Deckfrucht, Hagebutte (*στέγη* Decke, *καρπός*).  
**stellaris**, -**atus** sternförmig (stella Stern).  
**Stempelpolster** der Doldenblüten.  
**stenantherus** eng- od. schmalbeutlig, mit engen Antheren (*στενός* eng etc.).  
**stenolobus** schmal- od. dünnschotig (*λοβός* Hülse etc.).  
**stenopetalus** dünnkronblättrig.  
**stenophyllus** dünnblättrig, -laubig.  
**stereoides** (-ōdes) (*στερεώδης*) fest, dicht.  
**sterilis** „steril“, unfruchtbar.  
**stictus** (*σικτιός* v. *στίζω*) gestichelt, punktiert.  
**stigma**, -**ātis** (*στίγμα* v. *στίζω*) Narbe, Stich etc.  
**stigmatōdes** (*στιγματώδης*) narbenartig, -ähnlich.  
**stilus** (styŷlus) (*στίλος*) Griffel, Pistill, Säule etc.  
**stimuli** Brennhaare, -borsten.  
**stipes**, -**itis** Stengel, Stamm, Stock, Strunk, Stiel, Stange etc.  
**stipitarius** auf Stengeln stehend od. wohnend.  
**stipitatus** gestielt, gestengelt (s. v.).  
**stipticus** (v. *στιπτός* zusammengedrückt etc.) herb, zusammenziehend.  
**stipulae** eig. Stützchen, Bot. Nebenblätter, Knospenschuppen.  
**stipularis**, -**atus** achsel- od. nebenblättrig (s. eb.).

- Stipulartergamente** (Mikosch) Achselblatthüllen der Knospen.
- stirps**, -pis Stamm, Baum, Pflanze, Staude etc.
- stolo**-, -ōnis Ausläufer, Wurzelschössling etc.
- stolonifer**-, -era Ausläufer treibend.
- stoloniflorus** mit blütentragenden Schösslingen.
- stomata** Spaltöffnungen (στόμα, -ατος Mund).
- Strahl** (radius) bei d. Compositen = äusserer Kreis d. Blütenchen.
- straminēus** strohartig, von Stroh, strohgelb.
- strata** Schichten, - annua Jahresringe (d. Stämme).
- strēpens** rauschend (strēpo).
- stria** Streif, Strieme, -atus gestreift, riefig.
- strietus** straff, steif, aufrecht etc. (v. stringo ziehe an).
- stridulus** knarrend, klappernd (v. stridēo).
- strigiceps** striegelköpfig, -haarig (striga Strich, Streif etc.).
- strigilis** Striegel, Rosskamm, Schabeisen (s. eb.).
- strigillarius**-, -losus gestrichelt, mit Stricheln (v. strigilla dem. striga, s. v.).
- strigosus** mager, dürr.
- Strobilacēae** Rchb. Zapfen-Coniferen.
- strobilacēus** (v. strobilus) zapfenartig.
- strobilus** Fruchtzapfen, Tannenzapfen (στροβίλος Kreisel etc.).
- stroma** (στρομα Lager) fleischiges Frucht-Lager der Pilze.
- strophila** Anhang des Nabelstrangs.
- structura** „Struktur“, Gefüge, Bau (v. struo, 3.).
- struma** Drüse, Kropf, -arius dageg. angewandt.
- strumosus** drüsig angeschwollen.
- Stützblatt**, oft ungewandelt in ein Dorn.
- stupa** (stuppa, gr. στυπή od. στυπήνη) Werg.
- stylopodium** Griffelfuss, -polster, -postament (s. sogl.).
- stylus** (στυλος) od. **stilus** Griffel, Pistill od. Stempelsäule od. -faden.
- styraciflūus** storaxausschwitzend, Storax fließenlassend.
- suaveolens** wohlriechend.
- suavis**-, -iter, adv. angenehm, lieblich etc.
- sub**- in compos. etwas-, fast- (s. sogl.).
- subacaulis** fast stengellos.
- subaequalis** fast od. ziemlich gleich.
- subalatus** etwas geflügelt.
- subalpinus** subalpinisch, an den Voralpen, um d. Alpen herum.
- subdecandrus** fast oder gewöhnlich zehnmännig.
- subdölus** heimlich, trügerisch (i. q. ambigius).
- suberectus** fast aufrecht.
- Suberin** = Korkstoff (s. sogl.).
- suberosus** (v. suber, -ēris Kork) korkig, K. hervorbringend.
- subinde** unmittelbar darauf, auch wiederholentlich.
- subintēger**-, -ēgra fast od. ziemlich vollständig, - ganz.
- Sublabiēae** krummlippige Labiaten.
- subliquescens** beinahe zerfliessend.
- submaeulatus** etwas fleckig, etwas bunt.
- submarinus** unterseeisch, -meerisch.
- submersus** untergetaucht.
- subnullus** so gut wie keiner.
- subpilosus** etwas behaart.
- subregularis** ziemlich od. fast regelmässig.
- subrotundus** rundlich, fast rund.
- subsessilis** fast sitzend.
- subsoltarius** fast einzeln.
- subsquamosus** vorübergehend schuppig.
- substantivum** „Substantiv“, Ding- od. Hauptwort.
- Substrat** = Unterlage, Boden od. Grund.
- subterraneum** unterirdische Höhle, fr. souterrain.
- subterraneus** unterirdisch, unter d. Erde befindlich.
- subtilis** eig. feingewebt (v. tela), fein, dünn, zart etc.
- subtortus** etwas gewunden.
- subtus** unten, unterseits.
- subula** Pfrieme, -atus pfriemenförmig.
- suburbanus** nahe bei der Stadt wachsend.
- succedanēus** Wachssaft hervorbringend (succus u. edo gebe aus).
- succedanus** (v. succēdo folge nach) allmählich, z. B. succedane Zellen-scheide.

**succinctus** umgürtet, gerüstet, auch abgekürzt.

**succinifer**, -era bernsteintragend, -gebend (s. sogl.).

**succinum** Bernstein, Harz (v. succus Saft).

**succisus** unten abgeschnitten (v. succido, 3.).

**Succidentae** Bartl. Saft- od. Fettpfl. **succulentus** saftig, saftreich, succus Saft.

**sudeticus** auf den Sudeten zu Hause. **suecicus** schwedisch, in Schweden (Suecia) zu Hause.

**Suessonia** Soissons (Frankr.).

**suffocatus** erstickt.

**suffrutices** Halbsträucher (v. frutex, -icis Strauch).

**suffruticosus** fast oder halb strauchartig.

**sulcatus** gefurcht, **suleus** Furche.

**-sulcus** in comp. -furchig, -zackig.

**sulfureus** (-phureus) schwefelgelb.

**summus** oberster, höchster.

**superbus** stolz, prächtig.

**Superflua** L. Überflüssige (XIX, 2.)

(Rand-u. Scheibenblüth.fruchtb.).

**superne** oberher, oberhalb, -seits.

**superponiert** (Schwendener) übereinander gestellt (z. B. Quirl).

**superus** oberer.

**supinus** niederliegend, flach ausgebreitet, rückwärts gebogen.

**supradecompositus** vielfach zusammengesetzt, vielfach auseinandergestellt.

**surcatus** gesprosst, sprossig od. zweigig (surcus).

**surculus** (dem. surcus) Zweiglein, Moosstengel.

**sursum** aufwärts, in d. Höhe.

**susceptus** unternommen.

**susianus** susanisch, von Susa (in Piemont od. in Persien).

**suspectus** verdächtig, beargwohnt, für giftig gehalten.

**suspensus** hängend, aufgehängt.

**sutura** „Sutur“, Verbindungsnaht (z. B. d. Hülsen).

**syconium** Feigenfrucht (v. *σῦζον* Feige).

**syllabus** Zusammenfassung (v. *σὺλ-λάβω*).

**sylloge** Sammlung (gr. *σὺλλογή*).

**sylvanus**, -vaticus, -vestris (silv.-) im Wald zu Hause.

**syböläe**, -arum Beiträge (*συμβολή* v. *συμβάλλω*).

**symmetricus** „symmetrisch“, gleichmässig, z. B. corolla, zwar unregelm., aber linke u. rechte Hälfte gleich!

**sympagentera** (sc. Pourretia) m. zusammengefügte Beuteln (v. *συμπήγνυμι* u. *ἐντέρον* Blase etc.).

**Symphysogynae** A. Rich. verwachsenweibige (v. *συμφύω*).

**sympodium** wiederholender Spross, d. i. jeder Gabel-Ast wieder Fussstück einer neuen Gabel.

**Synandrea** (A. Braun) m. verwachs. Staubbeutel, i. q. Synanthërae.

**Synanthërae** Rich., s. eb. (*ἄνθηρά* Staubbeutel).

**synanthia** Blütenverwachsung (*σύν* u. *ἄνθη*) bei zusammengewachs. Blumen.

**syncarpia** (-ium) Früchteverwachsung, z. B. Brombeere (*σύν* u. *καρπός*).

**synergidae** „Synergiden“ (Strasburger) d. s. Ei-Gehülfinnen bei Embryozellenbildung.

**Syngenesia** L. (XIX. Kl.) Verwachsbeutlige, Kl. d. „Syngenesisten“.

**synonymus** (*συνώνυμος*) „synonym“, d. i. mitnamig, gleichbedeutend.

**synophthia** Knospenverwachsung (*σφθαλιμός* Auge etc.).

**synopicus** dabei erblickt (*σύνοπός* Begleiter).

**synopsis** „Synopsis“, d. i. Überblick (*σύνοψις*).

**synopticus** „synoptisch“, übersichtlich.

**Synpetalae** Rehb. Ganzblumige, m. verwachs. Blumenblättern od. gauzer (verwachs.) Blumenkrone.

**syntagma** (Pfeffer) Zusammenhäufung, s. tagma.

**syphiliticus** „syphilitisch“, gegen d. venerische Krankh. od. Lustseuche angeht.

**syriacus** (-ricus) syrisch, aus Syrien.

**System** (systema, -ätis, gr. *σύστημα*, -ατος) wissenschaftl. Zusammenstellung.

**tabernaemontanus** von Bergzabern (Rheinpfalz).

**tabulae** Tafeln, Figurentafeln.

- taediger**, -ëra fackeltragend (taeda Kienholz etc.).
- tagma** (Pfeffer) (gr. *τάγμα* v. *τάσσω*) geordneter Haufen etc.
- tangential**, als Kreis berührende Gerade.
- tanguticus** tungusisch (nördl. Innerasien).
- Tannin** = Gerbstoff, -säure.
- tardiflorus** spätblühend (tarde langsam, spät).
- tartareus** den Tartarus (die Unterwelt) betr., auch Weinstein betr. (cremor tartari).
- tartaricus** (tataricus) tartarisch, aus der Tartarei.
- Tasmania** „Tasmanien“, Van-Diemensland.
- tauricus** taurisch, vom Gebirg Taurus in Kleinasien od. aus Taurien (Tauris, Halbinsel Krim).
- tectorum** der Dächer (tectum Dach).
- tegens**, -ntis deckend, schützend (v. *tēgo*, 3.).
- tegmen**, -inis Samenhaut (s. eb.).
- tegumentum** Knospendecke (s. v.).
- tegumen**, -inis Decke, Hülle (s. v.).
- tēla** (e. g. cellulosa) Gewebe, z. B. Zellgewebe.
- temulentus**, -mulus betäubend.
- tenacissimus** überaus zäh od. hartnäckig (s. sogl.).
- tenax**, -ācis zäh, hartnäckig.
- tenellus** (dem. tener, -ëra etc.) äusserst zart.
- tentaculum** „Tentakel“, Tastorgan, Fangarm.
- tentaculatus** mit Tentakeln versehen (s. eb.).
- tentāmen**, -inis Versuch (v. *tento*).
- tenuiflorus**, -folius dünnblütig, -blättrig.
- tenuis**, -issimus dünn, äusserst dünn od. schmal.
- tephroleucus** grauweiss (*τεφρός* aschgrau, *λευκός* weiss).
- teratologia** Wunder- od. Erscheinungslehre, Missbildungslehre (*τέρας*, -ατος Zeichen etc.).
- tēres**, -ētis gedreht, stielrund.
- teretifolius** stielblättrig, drehrund- od. walzenblättrig.
- teretiusculus** fast stielrund, etwas walzenförmig (s. v.).
- Tergeste** Triest.
- terglouensis** vom Terglou (in den julischen Alpen).
- terminalis** gipfelständig, endbildend (terminus Ende, Ziel).
- Terminologie** = Kunstsprache (terminus Ausdruck, eig. Begriffsbegrenzung).
- ternatus** gedreit, zu drei beisammen, dreizählig.
- terni**, -nae zu dreien, je drei.
- terrestris** (v. terra) auf der Erde
- terrëus** ebenso (terra). [wachsend]
- tersus** geglättet, glatt (v. *tëro* reibe).
- testa** Schale, äussere Samenhaut.
- testiculatus** mit Testikeln od. Hoden versehen.
- tetanicus** an Halsstarre (*τέτανος* Spannung etc.) leidend, gegen solche angewandt.
- tëter**, -tra hässlich, -**terrëmus** äusserst hässlich.
- tetrachocarpia** Vierlingsfrüchte (*τέτραχα* in vier Teile geteilt).
- tetrades** (i. q. basidia) Sporenstützen (*τετραδες*, -άδος d. Zahl 4).
- Tetradynamia** L. XV. Kl. „Viermächtige (unter 6 Staubfäden 4 grössere).
- tetragonus** viereckig, -kantig (*γῶνος* Eck etc.).
- tetralix** (te trahit dich täuscht?) vierblättrig in die Runde (*τέτρα* vier u. *λίτις* Umgang etc.).
- tetralix** (*τετραλίξ*) vierdrätzig, viermal gewunden (*λίξ*, -κος v. *έλίσσω* wickle etc.).
- Tetrandria** L. von **tetrandrus** viermännig, mit 4 Staubgefässen (*ἀνήρ*, -ῖδος Mann, Staubgefäss).
- tetragynus** vierweibig, m. 4 Stempeln (*γυνή* Weib etc.).
- tetrapetalus** vierkronblättrig.
- tetraphyllus** vierblättrig, m. 4 Laubblättern.
- tetrapterus** vierflüglig, -federig (*τετραπτερόν*).
- tetraquëter** (-trus), -tra vierkantig.
- tetraspermus** vierksamig.
- tetrasporae** Teilungs-, Vierteilungssporen (bei Florideen).
- texānus** texanisch, aus Texas (Nordamerika).
- textilis** gewebt, -le Textil, Zeug, Tuch etc.
- textura** „Textur“, Gewebe, Gefüge.
- Thalamiflorae** DC. Bodenblütige.
- thalämus** (*θάλαμος*) Blumen- od. Fruchtboden, eig. Gemach.



- thalassicus** meerisch, am Meer wach. (*θάλασσα*).
- thaliäus** nach dem Botaniker Thal benannt.
- thallöma** (Schwendener) Lager- od. Thallusgewebe (s. sogl.).
- Thallophyta** Endl. Lagerpflanzen.
- thallus** (*θάλλος*) Lager (besond. Flechten-), Spross etc.
- thapsiformis** kerzenförmig, wie Wollkraut (Thapsus, s. Nom.).
- thēca** (*θήκη*) Behälter, Büchse, Sporenkapsel etc.
- thegöälus** schwefelmilchig (*θήγιον* od. *θειον* Schwefel, *γάλα* Milch).
- Thelypteris** weiblicher Farn (*θήλυς* weibl., *πτερίς*).
- thermalis** in Thermen (d. s. Warmquellen) wachsend.
- thermicus** „thermisch“, Wärme betr. (*θερμός*; heiss).
- thesaurus** (*θησαυρός*) Schatz, Magazin.
- thesis** „These“, Satz, Behauptung.
- thurifer**, -era weihrauchtragend (thus, -ris).
- thuringiacus** Thüringer.
- thus**, -ris Weihrauch (der Bursera- ceen).
- Thyllen-Bildung** (Horvath) = Sack- od. Beutelstoff-Bildg. (*θύλλις* od. *θύλαξ*).
- thymiflorus** thymianblütig.
- thyrsiflorus** strausblütig (*θύσσος* „Thyrus“ etc.).
- thyroides** straussähnlich, -artig.
- thyrsus**, -i Strauss, umwickelter Stab, „Thyrus“ (*θύσσος*).
- thibetäus** (tib.-) aus Thibet (Tibet) (Hochasien).
- tigillaris** latten- od. balkenförmig (tigillum).
- tigilium** (sc. Croton) tigilisch (n. einer molukkischen Insel benannt).
- Tigürum** Zürich.
- tinctorius**, -torum zum Färben dienend, der Färber.
- tingens** (v. tingo) färbend, benetzend.
- tingitanus** von Tanger (Tingis) in Marokko (Tingitania), nicht tunesisch (Mössl. u. Rchb.)<sup>1)</sup>, was tune- tanus!
- titübans** taumelnd, schwankend (Kummer).
- togularis** bekleidet (Kummer) (dem. tago).
- tomentosus** filzig, **tomentum** Filz.
- tonicus** „tonisch“, d. i. anspannend, stärkend (*τόνος*; Sehne, Kraft).
- tousurans** „Tonsur“ hervorbrin- gend, schädelkühlend.
- topiarius** zur Kunstgärtnerei ge- hörend (*τοπιεῖον* od. *τοπιήϊον* Tau); opus topiarium Plin. be- schnittenes Heckenwerk.
- torminalis** Kolik od. Bauchgrimmen betr. (tormina, -um Schneiden im Leib).
- Tornäcus** (-cum) Tournay in Bel- gien.
- tornatus** gedrechselt (v. torno).
- torpens** träg, matt, starr (v. tor- peo, 2.).
- tortilis** gedreht, gewunden (s. sogl.).
- tortuosus** voller Windungen, **tortus** gedreht, gewunden (v. torqueo, 2.).
- torulosus** wulstig (torulus dem. to- rus Polster etc.).
- törus**, -i Polster, Bett, Blüten- polster, Fruchtboden.
- torvus** finster, dunkelbraun.
- toxicarius** giftig (v. *τοξικόν* eig. Pfeilgift).
- trabēus** an Balken vorkommend (trabes, -is).
- trachēae** „Tracheen“, geschloss. od. Luftfasern, -röhren.
- tracheidae** (Möller) tracheenähnl. Holzgefäße.
- trachyodon** Rauh Zahn (*τραχύς*, *ὄδων*).
- trachyphyllus** rauhblättrig.
- tractatus** „Traktat“ (fr. traité), Abhandlung.
- tragäus** bocksartig, von Bocks- geruch (gr. *τράγος* Bock).
- tragödes** (gr. *τραγοειδής*) bocks- artig.
- Trajectum** Utrecht (Holland).
- Transsylvania** Siebenbürgen.
- transversalis**, -sus quer, z. B. trans- versale Wände cylindrischer Ge- fäße (Sachs).
- transpiratio** „Transspiration“, Aus- dünstung (v. fr. transpirer).
- tremulus** zitternd (v. tremo zittere).
- trevericus** Trierer.
- Trevirorum** (sc. Augusta) Trier.
- triacanthus** dreidornig (*ἀκανθα* Dorn).

1) bei Scorzonera tingitāna!

**triangularis**, -gulus dreieckig, -kantig (v. tres, comp. tri-).  
**tribus** Zumft, Unterfamilie.  
**trichodes** (-choides) haarig, -artig, -ähnlich (τριχιδής).  
**trichophyllus** haarblättrig (τριφύλλος) Haar, φύλλον Laub).  
**trichospermus** haarsamig, -früchtig.  
**trichotomus** mit gestutzten Haaren (τριμέω).  
**trichromus** dreifarbig.  
**Tricoccae** Endl. (s. sogl.).  
**triccocus** dreikörnig (κόκκος Korn, Kern).  
**tricolor** dreifarbig.  
**tricornis** dreihörnig (cornu Horn).  
**tricosus** streitsüchtig, hadernnd (v. tricos hadere).  
**tricuspidatus** (-pis) dreispitzig.  
**tridactylites** dreifingerig (δάκτυλος Finger).  
**tridens**, -ntis Dreizehn, -zack.  
**tridentatus** dreizähmig.  
**trifidus** dreiteilig, -spaltig.  
**triflorus** dreiblütig, -foliatus, -folius dreiblättrig.  
**trigulmis** dreispelzig.  
**trigonus** dreieckig, -kantig (γωνία Eck etc.).  
**trilinguis** dreisprachig, in 3 Sprachen ausgedr. [-hülsig].  
**trilobus** (τριλόβος) dreilappig,  
**trimerus** (τριμερής) dreigliedrig, -teilig.  
**trimestris** dreimonatlich.  
**trimorphismus** Dreierbildung (m. läng., mittl. u. kürz. Griffeln).  
**trinervius** dreinervig, -aderig.  
**tripartitus** in drei Teile geteilt.  
**triphyllus** dreiblättrig, mit dreifachen Laubblättern.  
**triplex**, -icis dreifach, -fältig.  
**tripteris** dreiflügelig, -wedelig.  
**triqueter** (-trus), -tra dreieckig, -kantig, -schneidig.  
**Trisepalae** Bartl. Dreikelchblättrige.  
**tristis** „trist“, traurig.  
**trisulcus** dreifurchig, -zackig, -spitzig (sulcus eig. Furche).  
**trivalvis** dreilappig (valvae Thürflügel).  
**trivialis** „trivial“, gemein (v. trivium Scheideweg).  
**tropicus** „tropisch“, zwischen den Wendekreisen (Tropen) zu Hause.  
**truncatus** verstümmelt, gestutzt (v. truncus Stumpf etc.).

**tuber**, -ëris Knolle, -berosus knollig. **tuberculosus** voller „Tuberkeln“ (tuberulus dem. v. tuber).  
**tuberculus** „Tuberkel“, Knoten, Höker, Warze (s. eb.).  
**Tubiflorae** Bartl. Röhrenblumige.  
**tubi pollinis** Pollenschläuche.  
**tubulosus** voller Röhrechen, **tubulus** dem. tubus Röhre.  
**Tulipifera** L. Tulpenträgerin (-baum).  
**Tüpfel** = feine, schiefe Spalten der Holzgefäße.  
**tunetanus** tunesisch, von Tunis (Tunes, -ëtis).  
**tunica** Hemd, Hautschale (bei Zwiebeln).  
**tunicatus** hautschalig, überkleidet (Kummer).  
**turbinatus** gewirbelt, kreiselförmig (v. turbo, -inis).  
**turfosus** turfig, auf Torf wachsend.  
**turgescer** Zustand (de Vries) s. turgor (v. turgesco schwelle an).  
**Turgescenz** = Zellenspannung, Anschwellung.  
**turgidus** angeschwollen, gedunsen, strotzend.  
**turgor** der strotzende Inhalt.  
**Turicum** Zürich.  
**turio**, -onis Stockknospe, -sprosse, z. B. turiones asparagi Spargelsprossen.  
**Turones** Tours (an der Loire).  
**turritus** getürmt, turmförmig.  
**Tute** (ochrea) = häut. Scheide üb. den Knöterichgelenken.  
**typhinus** rohrrkolbenartig, -ähnlich (Typha, s. Nom.).  
**typicus** „typisch“, n. einem Bild gemacht, von bestimmt. Schlag (v. τύπος „Typus“, Figur, Bild, Schlag).  
**uberior**, -berrimus reichlicher, sehr reichlich.  
**ucranicus** ukrainisch, aus der Ukraine (Südrussl.).  
**udus** feucht, nass.  
**uliginosus** im Nassen wachsend.  
**ulmarius** ulmenartig, -blättrig.  
**ulmifolius** ulmenblättrig.  
**umbella** Schirm, Dolde, -aris, -atus doldenartig, schirmförmig.  
**Umbellatae** u. **Umbelliferae** Doldenblütige.  
**Umbelliflorae** DC. Schirmblütler.

- umbellula** Döldchen, Teil einer zusammenges. Dolde.
- umbilicalis** nabelförmig, umbilicus Nabel.
- umbraculifer**, -*era* sonnenschirmtragend (s. sogl.).
- umbraculum** Sonnenschirm (v. umbra Schatten).
- umbraticus** schattig, schattenliebend.
- umbrinus** umbrafarbig, -braun (umbra brauner Farbstoff).
- umbrosus** schattig.
- uncinalis**, -*atus* hakenförmig gekrümmt.
- uncus**, -*i* Haken, **uncus**, -*a* hakig.
- undulatus** wellenförmig, auf- u. abgebogen.
- undulosus** wellig (v. undula dem. unda Welle).
- unguicularis** fingernagelartig (unguiculus).
- unguis** Nagel, Klaue.
- unicus** einzig, **unicum** d. Einzige seiner Art.
- uniflorus**, -*folius* einblütig, -blättrig.
- uniformis** einförmig (forma).
- uniglumis** einspelzig (gluma).
- unijugum** (sc. folium) einjochig, -paarig (b. Fiederblättern).
- unilabiæ** (sc. Labiatae) Einlipper (labium).
- unilocularis** einfächerig (loculus).
- unipara** (sc. cyma) einseitig gekrümmte Trugdolde, s. g. Wickel.
- uniserialis** einreihig (series, -*ei*).
- universalis** gänzlich, allgemein.
- upsaliensis** von Upsala in Schweden.
- uragogus** urintreibend (*ουραγός*; Urinleiter).
- urbanus** städtisch, um Städte herum wachsend.
- urbicarius**, -*bicus* desgl. (urbs, -*bis*).
- urceolaris**, -*atus* krug- od. schlauchförmig, mit Schläuchen vers. (urceolus).
- urens** brennend (v. uro, 3.).
- Urmeristem** (Sachs) s. Meristem.
- ursi**, -*sinus* Bären- (ursus).
- usitatissimus** überall gebräuchlich.
- usneoides** bartflechtenähnlich (Usnea, s. Nom.).
- ussuriensis** am Ussuri (Nebenfluss des Amur) zu Hause.
- ustulatus** angebrannt (näml. so aussehend).
- utilis** nützlich, gebräuchlich (utor, -*ti*, 3.).
- utriculatus**, -*losus* schlauchartig, bauchig.
- utriculus** Schlauch, Schlauch- od. Hautfrucht, -*primordialis* „Primordialschlauch, d. i. im Anfang sich bildender.“
- utriformis** schlauch- od. sackförmig (uter, -*tris*).
- utrinque** v. beiden Seiten, an beiden Enden.
- uva crispa** Stachel- od. Rauhbeere, eig. krause Weinbeere.
- uvarius** traubenartig, weintrauben-
- uvidus** feucht, nass. [(uva).
- vaccinus** die Kuh betr., kuhfarbig (vacca).
- vademecum** „Geh' mit mir“, Taschenbuch.
- vagina** Scheide, -*atus* mit Scheide versehen.
- Vaginaltegumente** (Mikosch) = Scheidenhüllen.
- vaginula** (dem. vagīna) Scheidchen am Grund der zerrissenen Moos-Archegonien.
- valentinus** von Valencia (Spanien) od. v. Valence (Frankr.) (Valentia), auch Valentin's.
- valesiacus** Walliser, im Canton Wallis z. Hause.
- valleculæ** (dem. valles od. -*lis*) Thälchen od. Rillen zwischen d. Rippen der Doldenfrüchte.
- vallicula** Thälchen (dem. vallis, s. eb.).
- vallis** (od. -*es*) Thal, **vallum** Wall, Damm.
- valvae** Thürflügel, Klappen, -*atus* klappig.
- valvativa** (sc. vernatio) klappenart. Knospenblattlage.
- valvula** (dem. valva) Kläppchen,
- valvulus** i. q. vallicula, s. d.
- vaporarius** Dampf, Dunst, Wärme betr. (Kummer: Loh-).
- variabilis** veränderlich.
- Variable** = wechselnde Wertzahl.
- variatio** „Variation“, Abänderung, Schwankung od. Variationsbewegung d. Blätter (Pfeffer 1).

1) Dessen „period. Bewegungen d. Blattorgane“, Leipzig 1875.

**variecolor** buntfarbig.  
**variegatus** buntscheckig, -streifig.  
**variētas** „Varietät“, Spielart, Abart, Veränderung.  
**variōla** Pocke, Blatter, -laris blatterartig.  
**varius** mannigfaltig, bunt, verschieden.  
**varsoviensis** Warschauer, v. W. (Varsovia).  
**vas**, -āsis, Pl. -sa Gefäss.  
**Vasculares** DC. Gefäss - Kryptogamen.  
**vascularis** (s. sogl.) mit Gefässen versehen, **planta v.** Gefässpflanze.  
**vasculum** (dem. vas) Gefässchen.  
**Vegetationsconstante** (H. Hoffmann) = Wärmemengenzahl für d. Vegetation.  
**Vegetationscurve** (Askenasy) = d. i. der Beobachtungen üb. die Vegetationspunkte.  
**Vegetationskegel** (-punkte) = Enden od. jüngste Spitzen, von wo weiteres Wachstum ausgeht.  
**Vegetationsphasen** (Askenasy) s. Phasen.  
**vegetative Fortpflanzung** = ungeschlechtliche durch Sprosssteile.  
**vegētus** gesund, munter.  
**vegliensis** von Veglia (e. Insel d. ungar. Litorals).  
**vehēmens**, -menter adv. heftig, stürmisch etc.  
**velatus** verhüllt, bedeckt (vēlum Segel, Vorhang od. vēlo verhülle).  
**vellēus** fehlerh. st. **vellerēus** wollen, wie ein Vliess (vellus, -ēris).  
**vēlum** (fr. voile) Segel, Vorhang, Hautring am Strunk der Pilze.  
**velutinus** sammetartig (fr. velouté v. velours Sammet).  
**velutipes** Sammetfuß, -stiel (s. eb.).  
**vēna** „Vene“, Blutader, Ader.  
**Venēris** (Gen. v. Venus) Göttin der Schönheit etc.  
**veneticus** venetianisch, v. Venedig (Venetia).  
**venētus** venetisch, Veneter (Volk der Venēti), aber auch: seefarbig, bläulich.  
**venosus** aderig, nervig (v. vena).  
**ventosus** windig, auch veränderlich (ventus Wind).  
**ventricosus** bauchig (v. venter, -tris Bauch).  
**verecundus** sittsam, schamhaft.

**vēris** (Gen. v. vēr) des Frühlings.  
**vermicularis** wurmförmig, wie Würmchen (vermis dem. vermīculus).  
**vernaculus** vaterländisch, inländisch, einheimisch (v. verna Inländer etc.).  
**vernalis** im Frühling blühend (vēr, -ris).  
**vernatio** Knospenlage eines (noch nicht entwickelten) Blatts (v. verno mache Frühling).  
**verniciflūus** Firniß träufelnd (vernix, -icis).  
**vernix**, -icis Firniß.  
**vernus** frühlingszeitig etc. (v. vēr, -ris).  
**Verodünun** (Verdun Frankr.).  
**verruca** Warze, -cosus warzig.  
**versicolor**, -ōris schillernd, bunt, verschied. gefärbt.  
**versiflorus** bunt- od. wechselblütig (m. wechslend. Farben blühend).  
**versus** (Praep.) gegen, (Part.) gewendet, umgekehrt.  
**verticalis** scheidel- od. senkrecht, z. B. Vertikalebene, -zeile etc.  
**verticillaris**, -atus quirl- od. wirtelförmig.  
**verticillum** (-us) Quirl, Wirtel.  
**vērus** wahr, echt.  
**vesculus** (dem. vescus) niedlich, zart.  
**vescus** essbar (v. vescor, -ci sich nähren).  
**vesica** Blase, -carius blasenartig, blasig.  
**vesiculosus** blasig (s. eb.).  
**vesiculosus** voller Bläschen.  
**vespertinus** abendlich (vespera „Vesper“, Abend).  
**vestitus** bekleidet (vestio, 4.).  
**Viadrus** (Viadūa) Oderfluss (auch Odēra).  
**vialis** an od. auf Wegen wachsend.  
**viarius** desgl. (via Weg).  
**vibratilis** zitterig (v. vībro „vibriere“, zittere).  
**viciaefolius** wickenblättrig (Vicia, s. Nom.).  
**victorialis** zum Sieg verhelfend.  
**Vienna** Wien u. Vienne (Südfrankr.), -nensis Wiener u. Vienner.  
**viētus** welk.  
**villicaulis** m. zottigem Stengel (villus zottiges Haar).  
**villosus** zottig, haarig (s. eb.).  
**Vimära** Weimar.

- viminalis**, -nēus zum Flechten dienend (vimen, -inis).
- Vindelicia** das heutige Schwaben.
- Vindelicorum** (sc. Augusta) Augsburg.
- Vindobona** Wien, -nensis Wiener.
- vinealis** in Wingerten wachsend (vinea Weinberg etc.).
- vinifer**, -era weintragend, -gebend (vīnum W.).
- Viniferae** Juss. Weinträgerinnen (-palmen).
- violacēus** veilchenblau, violett.
- violascens** veilchenbläulich, violett werdend.
- virens**, -rescens grünend, grün werdend (virēo 2.).
- virescentia** Vergrünung von Blüten.
- virga** Rute, Streif, -atus rutenförmig, gestreift.
- virginianus**, -iēus virginisch, aus Virginien (Nordamer.).
- viridarium** Lustgarten (s. sogl.).
- viridis** grün, **viridiflorus** grünblütig.
- viriosus** giftig (v. virus indecl. Geifer, Giftschleim).
- virusanus** giftig (s. eb.).
- viscarius** klebrig, leimartig (viscum Leim).
- viscidulus** etwas klebrig.
- viscosus** voller Leim, kiebrig (s. v.).
- Vistula** (Wisla) Weichsel.
- Visurgis** Weser.
- Viteberga** Wittenberg.
- vitellarius**, -inns ei- od. dottergelb (vitellus Eigelb od. -dotter).
- viticūla** (dem. v. vitis) Weinstöcklein; viticūlae vitis Geringel der Weinstockranken.
- Vitiensis** (sc. Flora) von den Fidchinseln (Australocean).
- vitifolius** wein- od. rebenblättrig (Vitis, s. Nom.).
- visigēnus** (-ginēus) weinstock- od. rebenartig (γενός adj. verb. v. γένω erzeuge).
- vitilis** zäh, zum Binden geeignet (v. vīō binde).
- vitis** Rebe, Weinstock.
- vitreus** glasartig.
- vitta** Strieme, Streif, -atus striemig, gestreift.
- vittae** Striemen (der Doldenfrüchte).
- viviparus** lebendig gebärend, spross-treibend (vīvus u. pārio, 3. gebäre etc.).
- Vochinensis** von den Vocheiner Alpen (Oberkärnthen).
- vogesiācus** von den Vogesen, aus dem Wasgau.
- volēnus** die hohle Hand ausfüllend.
- volgo-uralensis** von den Wolga-Uralländern.
- volubilis** windend (v. volvo, 3. winde etc.).
- volūeris** Fem. v. volūer geflügelt.
- volūmen**, -inis „Volumen“, Umfang, Band.
- volva** Tasche, Hülle, -acēus hüllen- od. scheidartig.
- vomicus** brechenerregend (v. vomo, 3.).
- vomitōrius** zum Erbrechen dienend (s. eb.).
- Vorblatt** z. B. achselständiger Blüten (A. Braun).
- Vorkeim** (protonēma) = bei Generationswechsel sich bildender (z. B. bei Chara).
- Wratislava** (Wratislava) Breslau.
- vulgaris**, -atus „vulgär“, gemein, gewöhnlich (v. vulgo mache gemein od. vulgus Volk).
- vulnerans** verwundend (vulnēro, 1.).
- vulnerarius** bei Wunden gebr. (vulnus, -ēris).
- vulpinus** den Fuchs betr. (vulpes, -is).
- Winterknospe** = üb. Winter auf d. Wassergrund liegende Samenknospe der Hydrocharideen etc.
- Wirtel** (Quirl, verticillus), wirtelige Stellung = rings um einen Stamm im Kreise herum.
- Wurzelspitze** mit Wurzelhaube bei Wasserlinsen.
- xanthophyllum** Blattgelb, auch Anthoxanthin genannt = im Herbst zersetztes Chlorophyll.
- xenia** „Xenien“, Fremdgaben, Gastgeschenke (gr. ξένιον v. ξένος fremd).
- xerampelinus** (ξηροαμπέλινος) trockenweinlaubfarbig, hochrotgefärbt (ξηρός trocken).
- xerophilus** das Trockne liebend (s. eb.).
- xestripetalus** axt- od. beilblättrig, m. axt- od. beilförm. Kronblättern (ξέστορον od. ξύστορον) i. q. dolabripetalus (dolābra).

- xylēma** „Xylem“ = Holz- od. Splintstoff, Holzteil des Cambiums od. Gefässbündels.
- xylīnus** von Holz od. Baumwolle (ξύλιον).
- xylogēnum** „Xylogen“ = Verholzungsstoff der Zellen.
- xylophyllus** holzblättrig.
- yuceoides** yukka- od. palmilienähnlich (Yucca, s. Nom.).
- zeylanicus** von d. Insel Ceylon.
- ziziānus** nach dem Botaniker Ziz benannt.
- zonalis** gürtelig, d. Zone betr. (ζώνη Gürtel, „Zone“).
- zonatus** gegürtelt, mit Kreisbogen gezeichnet.
- zoospōrae** „Zoosporen“ = bewegliche od. Schwärmsporen.
- zosteraefolius** seegrasblättrig.
- Zungenblüten** bei Compositen (flores ligulati).
- zygomorphia** (Schwendener) = „Jochbildung“, d. i. links u. rechts in gleichgeneigten Reihen, in übereinstimmendem Anschluss an d. vorhergehenden (s. hern.).
- Zygomorphe** Blüten (Schwendener) = d. Netzwerk der sich kreuzenden Parastichen ist symmetrisch, wie die beiderseit. Fischschuppenreihen (z. B. das Androecium der Ranunculaceen u. Lecythideen) (ζυγός Joch u. μορφή Bildung, Gestalt).
- zygospōrae** zwei durch Conjugation vereinte Sporen (ζυγός Joch, σπορά).
- zymoticus** „zymotisch“, gärungserregend (ζύμη Sauerteig).

## II. Etymologische Nomenklatur (Wortklärung der Pflanzennamen).

### A. Lateinnamen.

- Abacosa** Alfid. (Leguminosen, XVII. 4) Heckenwicke, fr. vesce de haie, e. hedge-vetch (v. abäcus Säulendeckplatte — wegen d. Samenform!), z. B. *A. dumetorum* Alfid. (*Vicia* d. L.).
- Abasicarpon** Andr. (zu Arabis) Rchb. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Stielschotige“ Gänsekresse (*ā* priv., *βάσις* u. *καρπός* — nicht unmittelbar aufsitz. Schote, diese besond. gestielt!), z. B. *A. verna* R. Br., *arenosa* Scop.
- 1) **Abela** Salisb. (Coniferen, XXI. 9) Abel's Zapfenbaum. 2) **Abelia** R. Br. (Caprifoliaceen, V. 1) „Abelie“, z. B. *floribunda* Deesn., *chinensis* R. Br. (u. Clarke Abel, 1816 Reise in China mit Lord Amherst, † 1826).
- Abelmoschus** Grah. (sc. *Hibiscus*) L. (Malvaceen, XVI. 8) Bisam-Eibisch od. -Malve, fr. mauve-musquée od. abelmose, e. abelmusk, musk-seed (-rose) (v. abélir verschönern, altfr. schmücken, u. moschus Bisam, Wtst.: arab. habbl Samen u. el-mosk Bisam), z. B. *A. tetraphyllos* Grah. (Indien) s. g. „Jute“, Bastfaser-Eibisch.
- Abies** (-ētis) Tourn. (sc. *Pinus*) L. (Coniferen, XXI. 9) Fichte od. Tanne, fr. pin, sapin, sapinette, e. pine-tree od. fir (Föhre) (altröm. Name derselben abies), z. B. *Pinus Abies* L. = *Abies excelsa* DC. Rich. s. Picëa Mill. Rottanne od. gem. Fichte, fr. sapin-rouge (- de Norvège), e. common spruce m. v. v.; *A. pectinata* DC. Lam. (*Pin. Picëa* L.) Edel- od. Weissanne (Ab. alba Mill.), fr. sapin blanc od. épicea, e. combe-like-leaved Silver-Fir; *A. alba* Mchx. (*Picea alba* Lk., *A. canadensis* Mill.) Weissfichte Vilm., amerik. Schimmelfichte, fr. sapinette od. pesse blanche, e. white sprucefir; *A. nigra* Desf. Schwarzf. (*A. Mariana* Wagh., *denticulata* Poir. etc.); *A. rubra* Poir. (*Pinus r. Lamb.*, *Picëa r. Lk.*) Rotfichte, fr. sapinette rouge, e. redsprucefir (rote Sprossen-F.) m. v. *coerulea* Hort., u. a.
- Abietinae** Carr. (-tinæe Rich. DC.): *Tsuga*, *Pseudo-Tsuga*, *Keteleeria*, *Abies*, *Picëa*, *Larix*, *Pseudo-Larix*, *Cedrus*, *Pinus* = echte Tannen.
- Abröma** L., W. (Büttneriaceen R. Br. V. 1) Cacao-Malve, fr. abrome (*ā* ohne, *βρώμα* Speise — Gegensatz zu Theobröma Chokolade!), z. B. *A. fastuosum* Jacq. (*Theobroma augusta* L. s. *fastuosa* Jacq.) (Philippinen).
- Abrotia** Juss., Lam. (Nyctagineen, V. 1) „Zarthülle“, californ. Primel Dietr. (v. *ἀβρόος* zart, elegant etc.), z. B. *A. fragrans* Nutt., *umbellata* Lam. (*Tricrätus admirabilis* P'Hér.).
- Abrotänum** (sc. *Artemisia*) L. (Compositen Anthemideen, XIX. 2) Eberreis, Stabwurz, Gartheil O. W., fr. aurone od. abrotone, citronade

(-nelle) „Citronenkraut“, e. southern-wood (gr. ἄβροόταρον „Eber-  
raute“, v. ἄβροός zart, niedrig — bez. d. Blätt., Wtst.).

**Abrus L.** (Leguminos. od. Papilionaceen, XVII. 4) Kranzerbse, Pater-  
nosterstrauch, fr. conduri, liane bon Dieu, pois-de-badeau, pois  
rouges d'Amérique, e. bead's-tree (v. ἄβροός zart etc.), z. B. A. pre-  
catorius L. (Glycine Abrus autt.).

**Absinthium** (sc. Artemisia) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Wermut,  
fr. absinthe, e. worm-wood (gr. ἀψίνθιον v. ἀ priv. u. ψίνθος  
Vergnügen — bitter Geschmack, Wtst., nach d. Fluss Absus in Palä-  
stina, Plin.), syn. Absinthium vulgare Fl. Wett.

**Abutilon** Adans. (sc. Sida) L. (Malvaceen, XVI. 8) Schmuck- od. Schön-  
malve Rmpl., Sammetpappel, (-malve), fr. abutilon alt. Name für  
Malve, v. ἄ nicht, βροός Rind u. τίλος Durchfall-?), z. B. Zier. A.  
megapotamicum A. St. Hil., A. hybridum Lemoini (Winterzier.), viti-  
folium Presl. (Chili), vexillarium E. Morr. m. v. marmoratum; insigne  
Planch. u. a.

1) **Acacia** Neck. (zu Mimosa) Rehb. (Mimoseen, XXIII. 1) Akazie (wahre),  
fr. cassie, acacia des Jardiniers (gr. ἀκακία v. ἀκη Dorn, i. q. ἀκαρθα  
Dornbaum), z. B. (Stuben) A. grandis, Farnesiana, lophantha, m.  
Blattphyllodien: armata R. Br., cordifolia Sw., etc. 2) **Acacia** germa-  
nica G. Fr. (Amygdalaceen, XII. 1) Schlehdorn = Prunus spinosa L.

1) **Acalypha** L. (Euphorbiaceen, XXI. 4) Brennkraut (ἄ pr., καλός schön,  
ἀφή Berührung), z. B. A. indica L. (Mercurialis zeylanica Herm.),  
(Gärten) A. Wilkesiana Seem. (tricolor Hort.). 2) **Acalypha** Mappa  
W. (Ricinus M.-L., Folium Mappae Rumph.) Tischuch-Ricinus, fr.  
ricinelle (Molukken). — Acalyphaceae Kltz. Grck. (-phéae zu Ruta-  
ceae Rehb.).

**Acantholimon** Boiss. (Plumbagineen, V. 6) Dornnelkengras (ἀκαρθα u.  
λειμών Wiese), z. B. Zier. A. venustum Boiss. (Statice v. Fenzl),  
glumacéum s. Armeriopsis u. Staticopsis.

**Acanthus** T. (Acanthaceen od. Rhinanthac. XIV. 2) Stachel-Bärenklau,  
Bartsch, wälsche Bärenklau, G. Fr., fr. acanthe, branche, branc-ur-  
sine, pied-d'ours, e. brook-ursine (gr. ἀκαρθος Dorn), z. B. Zier.  
A. mollis L., e. soft bear's-breech, grandifolius Hort., fr. grande  
berce, etc. — Acanthaceae R. Br.

**Acer** (-cris) L. (Aceraceen od. Sapindaceen, XXIII. 1) Ahorn, fr. érable,  
e. maple-tree (v. d. celt. ac Spitze? od. lat. acer, -cris stark? od. ἄ int.  
u. ζέρας Horn, wesh. Neutrum! — ungewiss), z. B. A. campestre L.  
Masholder, fr. érable, e. water-elder, whitten-tree, Zier. A. poly-  
morphum Zucc., e. japanese Maple, m. v. dissectum, v. roseo-mar-  
ginatum Hort.; A. platanoides L. Spitzahorn, s. g. Lönne (Lenne),  
fr. main découpée, m. v. v. dissectum, laciniatum s. crispum; A.  
monspessulanum L. Ahorn v. Montpellier, etc. — Acēra Juss. Endl.,  
-raceae Grck., -rinēae DC. Ahornbäume (Ord. Malpighinae Bartl.).

**Acēras** R. Br. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) „Ohnhorn“, Ohnsporn-  
Orche (ἄ pr. u. ζέρας Horn), z. B. A. anthropophōra R. Br.

1) **Acetosa** u. **Acetosella** (sc. Rumex) L. (Polygonaceen, VI. 3) Sauer- u.  
Spitzampfer, fr. oseille des jardins (ordinaire), e. sorrel, und fr. réne-  
bré, e. spear-sorrel (v. acētum Essig). 2) **Acetosella** (sc. Oxālis) L.  
(Oxalideen, X. 4) Sauerklee, fr. pain-du-coucou, alléluia, e. wood-  
sorrel. 3) **Acetosa** (sect. Rumex) Rehb. zweihäus. Ampfer XXI. 6),  
z. B. R. Acetosella L., scutosa L. (Schildampfer) etc.

**Achania** Sw. (Malvaceen, XVI. 8) Tuten- od. Dütenmalve (v. ἀχάνεια  
weite Oeffnung, Wtst. v. ἀχανής nicht gähnend — Blüten zusamen-  
gedreht!), z. B. A. mollis Ait. (Malvaviscus m. autt.), A. Malvaviscus  
Ait. Sw. (Malvaviscus arborēus Cav.).



- Achillēa** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Schafgarbe, fr. achillé, herbe à la coupure, e. nose-bleed (Plin.: Achilles heilte damit den von ihm verwundeten Telephus; Andere n. Chirons Sohn Achilles, Myth.), z. B. A. Millefolium L. „Tausendblatt“, fr. mille-feuille, e. milfföll.
- Achimēnes** R. Br. Vahl (Gesneriaceen, XIV. 2) Achimenes (Leunis st. Achaemēnis „Achaemenide“ — altpers. Name, Plin.: bernsteinähnl. Kraut Indiens), z. B. (Warmh.) cupreata R. Br. (Hängpfl.), patens Benth., longi- u. grandiflora DC., etc.
- 1) **Achras** L., Wallr. (Styracineen od. Sapotaceen, VI. 1) Sapotillbaum, Breiapfel Dietr., fr. sapotier (gr. ἄζωος Mispel, Wurgbirne), z. B. A. Sapōta L. 2) **Achras** (sc. Pirus) Gärtn. (Pomaceen, XII. 4) Holzod. Feldbirnbaum, fr. poirier commun, e. common pear-tree m. v. v. (z. B. fl. pleno Hort.), syn. Pirus L. (Pyraster Bkh.) communis L.
- Achyranthes** L. (Amarantaceen, V. 1) „Spreublume“, fr. cadelari (v. ἄχρῶν Spreu, ἀγρῆ Bl.), z. B. A. Verschaffelti Lem. (Iresine Herbstii Hook.), capituliflora Coll. (Pfäffa s. Brandesia puberula Mart.), lanata Mill. s. villosa Forsk. (Amarantus ind. Pluk.) syn. Illecebrum lanatum L.
- Achyrophorus** Gärtn. D. Don (zu Hypochoeris) Rchb. (Compos. Cichoreen, XIX. 1) Hachelkopf, „Spreutträger“ (s. eb. u. ποοός tragend — näml. d. Fruchtboden), z. B. radicans Scop. (Hypochoeris r. L.), auch s. Seriōla u. Porcellites Cass.
- Acianthus** R. Br. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Spitzenblume“, Borstenpunkt (ἀκίς, -ίδος Spitze — d. äuss. Blütenblättch. begrannt!) s. Epipactis Poir.
- Acinēta** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Steiflippe“ (ἀκίνητος unbeweglich etc.), z. B. Barkeri Paxt., chrysantha Ldl. (Amer.) etc.
- Acinōs** Mnch. (Labiaten, XIV. 1) Basilien-Thymian, e. wild basil (gr. ἄκινος i. q. ὠκισιον lat. Ocimum, Basilienkraut), A. thymoides Mnch. = Calamintha Acinos Clairv. (Thymus Ac. L.).
- Aemella** Pers. Rich. (sc. Spilanthus s. Verbesina) L. (Compos. Anthemid. od. Heliantheen, XIX. 3) „Scharfblatt“, s. g. ABC-Pflanze, Kaublatt W. (dim. v. ἀκμῆ Schärfe — zwergh. Pfl. m. Blätt. v. stechend. Geschmack).
- Aenīda** L. (Chenopodiaceen, XXII. 6) Hanf- od. „Nesselgänsefuß“, s. g. virgin. Hanf, fr. bangué (ἀ pr. u. κνίδη Brennessel — wie Br., sticht aber nicht), Zier. A. cannabina Murr.
- Aeonitum** T. (Ranunculaceen, XIII. 3) Sturm- od. Eisenhut, fr. aconit u. napel, fleur-en-casque, e. monk's-hood, aconite, wolf's-bane (v. ἐν ἀκόναις auf Felsen, ἀκονίτον Theophr.), z. B. Stoerkianum Rchb., fr. chaperon de moine, char de Vénus, etc.
- Acōrus** L. (Acoraceen od. Aroideen, VI. 1) Kalmus (gr. ἄκορος ungeschmückt, od. v. ἄκος Heilung), A. Calāmus L., fr. acore, roseau aromatique od. odorant, e. sweet-flag od. -rush, spicewort, Gartenpfl. A. graminēus Ait. var. variegatus Hort.
- Acotylēa** Grk., Acotyledonēa Juss. DC. „Acotylen“ d. i. Samenlappenlose (Kryptogamen L.) (ἀ pr. u. κοτύλη s. κότυλος eig. Höhlung, Knochenpfanne, Becher etc.).
- Acramphibrya** Endl. „Endumsprosser“ Endl. (ἄκρα Ende, ἀμφὶ um, βούω sprosse).
- Acranthēa** Endl. „Spitzblüter“ (Gräser) (s. eb. u. ἀγρῆ Blüte).
- Acroblastae** Rchb. „Spitzkeimer“ (s. v., βλάστη Keim, Trieb).
- Acrobrya** Endl. „Endsprosser“ Endl. (ἄκρον Ende, βούω sprosse).
- Acroclinium** Hook. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Immortelle, fr. immortelle, e. everlasting-flower (v. ἄκρα Spitze, κλίω neige — vor d. Aufgehen geneigte Spitze!), z. B. Gärt. A. roseum Hook., s. Gnaphalium T.

- Acrocomia** Mart. (Palmen, XXI. 6) „Gipfelbusch“ (s. eb. u. *ζύμη* lat. coma Haarschopf etc. — Blütenbüschel!), z. B. A. sclerocarpa Mart. „Hartnuss“, etc. s. Cocos L.
- Acronychia** Forst. (Rutaceen, VIII. 1) „Spitznäglein“ (s. v. u. *δρυξ*, -γοξ Nagel, Klaue — an d. Kronzipfeln!), z. B. A. laevis Forst. (Neucaled.) s. Lawsonia Acronychia L.
- Acropora** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) Lippensack (s. v. u. *πίρα* lat. pēra Sack, etc.), z. B. Loddigesii Lindl. (Maxillaria galeata Ldl.).
- Acrophyllum** Benth. (Cunoniaceen, X. 1) „Endblatt“ (s. v. u. *φύλλον* Laubblatt) syn. Calycōmis Don u. Weinmannia Cunn., z. B. A. venosum Benth.
- Acroptēris** Sm. Lk. (Farne, XXIV. 1) „Spitzfarn“ (s. v., *πτερίς* Farn v. *πτερόν* Feder — Früchtchen an d. Spitze der Fiedern!).
- Acrostichum** L. (Farne od. Polypodiaceen, XXIV. 1) Zeilenfarn, „Spitzreihe“ (*ἀκροσ* Spitze od. Anfang, *σίγος* Zeile, „Akrostichon“, Vers mit Anfangsbuchstaben — so unterseits d. Wedel!) Zier. A. alcornu L. (Platynerium grande, Neusüdwaes), A. crinitum L. (Antill.) etc. — Acrostichaceae Mett.
- Actaea** L. (Ranunculaceen od. Papaveraceen, XIII. 1) Giftföhre, A. spicata L. s. g. Christophskraut, Schwarz- od. Wolfskraut, fr. actée od. herbe de St. Christophe, e. herb-Christopher od. spiked baneberry (gr. *ἀκταίος* am Ufer, *ἀκταία* eig. Hollunder — Fruchtähnlichkeit!).
- Actinidia** Max. Lindl. (Dilleniaceen, XIII. 1) Strahlennarbe, eig. „Strahlgleiche“ (v. *ἀκτίρ*, -ίρος Strahl, *ἰδουαί* gleiche — Narbe strahlig!), z. B. Zier. A. Kolomikta Maxim. (Mandschur. Str.).
- Actinocyclus** Klotzsch (Rhodoraceen, X. 1) „Strahlenkreis“ (s. eb. u. *κύκλος* lat. cyclus Kreis etc. — bez. d. fünfrüs. Narbe!), z. B. A. secundus Kl. (Pirōla sec. L.).
- Ada** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Edle“ (v. adal althochdeutsch „edel“ geb. weibl. Name, Fem. v. Ado, wie Adela von Adelo!).
- Adamia** Wall. (Saxifragaceen, X. 2) „Adamie“, z. B. (Winterbl.) versicolor Fort. (China) s. Hydrangea (n. d. uralt. landw. Schriftstellern Adami I u. II, Paxton: n. Dr. med. John Adam in Calcutta).
- Adansonia** L. (Malvaceen, XVI. 8) Affenbrodbaum, Riesenbaum Dietr., A. digitata L., fr. pain de singe, calebassier du Sénégal, e. monkey's-bread (n. d. Natf. Mich. Adanson aus Aix, s. d. Aut.).
- 1) **Adelia** L. (Euphorbiaceen, XXII. 13) „Versteckfrucht“ (*ἀ* pr. u. *δηλός* sichtbar — Fruchtteile kaum bemerkbar!), z. B. A. ricinella L., fr. ricinelle „kleiner Wunderbaum“. 2) **Adelia** P. Br. Mchx. (Jasminen, XXII. 2), z. B. acuminata Mchx. s. Forestiera Poir. (Borya W.).
- Adenandra** W. (Rutaceen Diosmeen, V. 1) „Drüsenanthere“ (v. *ἀδής*, -έρος Drüse, *άνθηρ*, -δος Mann, Bot. Staubbeutel — Drüse an d. Antherenspitze!), z. B. fragrans R. u. S. (Diosma fr. Bot. M.), umbellata W. (Diosma cistoides Lam., Hartogia uniflora Berg.) m. v. multiflora.
- Adenanthera** L. (Mimoseen, X. 1) „Drüsenanthere“, Korallenerbse (s. eb. u. *ανθήρα* Staubbeutel — diese mit Drüsen), z. B. A. pavonina L. Korallen- od. Kondorilholz, s. g. Bastard-Pfauenschwanz.
- Adenocalymna** Mart. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Drüsenhülle“, -kelch Rmpl. (s. v. u. *κόλυμα* od. -μα Hülle i. q. calyx), z. B. Zierkletterstr. A. nitidum Mart. (Brasil.), comosum Mart. etc.
- 1) **Adenocarpus** DC. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) Drüsenhülle, „-frucht“ (s. v. u. *καρπός* Frucht — Hüls. m. Drüsen), z. B. Zier. A. wolgensis Spr. (Calophāca wolgarica Fisch., Cytisus w. L. f., Colutea w. Lam.), foliolosus DC. etc. 2) **Adenocarpus** Don (Compos.) (d. warz. Achenien m. zwei spitzhök. Flügeln!).

- Adenophōra** Fisch. (Campanulaceen, V. 1) Schellenblume, Drüsenglocke Leun., fr. cloche glandulée, e. glandulous bell-flower (s. v. u. *φοφός* tragend — näml. a. d. Bas. d. Griffels!), z. B. Zier. liliifolia Ledeb. s. Campanula lil. L.
- Adenostyles** Cass. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Drüsengriffel“, Pestwurz (s. v. u. *στύλιος* od. *-ης* Griffel — lange Griffelnarben m. waz. Drüsen!), z. B. alpina Cass. Alpendost Leun. = *Cacalia alpina* L.
- Adiantum** L. (Polypodiaceen od. Farne, XXIV. 1) Krull- od. Haarfarn, s. g. Frauenhaar, fr. adiante, capillaire, e. lady's hair, maiden — (v. *ἀδιαντός* trocken, n. Plinius beim Eintauchen nicht nass werdend!), z. B. Stubenf. A. capillus Venēris L., e. Venus-hair, A. rubellum Moore, pedatum L. canad. Frauenh., e. pedate-maiden-hair, A. peruvianum u. a.
- Adlumia** Raf. (Fumariaceen, XVII. 2) „Zünd-Erdrauch“ (lat. ad u. lumen, fr. allumer anzünden), z. B. Spalier- u. Mauerpfl. A. cirrhosa DC. rankender E., fr. fume-terre grimpante, e. tendrilled Adlumia s. Corydalis fungosa Vent. (Fumaria f. Ait.).
- 1) **Adōnis** L. (Ranunculac. XIII. 7) Teufelsauge, Blutströpfchen, fr. adonide, oeil de faisan „Fasanenaug“, e. pheasant's od. bird's-eye, „Vogelauge“ (n. Adonis, Liebl. d. Venus, aus dess. Blut die Blume entsprang, Myth.), z. B. Topf. A. vernalis L. Berg- od. Frühlings-A., fr. adonide printanière, e. spring-ph.-eye, Gärt. aestivalis L. Sommer-A. s. g. braune Magd, fr. oeil-de-phaisan, e. summer-ph.-eye, Saat autumnalis L. 2) **Adōnis** Rabh. (sc. Mycena) (Pilze, XXIV. 4) schöner Helmpilz Rabh.
- Adoxa** L. (Araliaceen, VIII. 4) Moschus- od. Bisamkraut, A. Moschattellina L. (*ἀδοξός* unberühmt — unscheinb. Blüten!).
- Aechmēa** Rz. Pv. (Bromeliaceen, VI. 1) „Blütenspitze“-Ananas (v. *αἰχμή*) Lanzenspitze — Zipfel d. Blüten!), z. B. A. Veitchii Morr., fulgens R. P., miniata discolor Hort., s. Chevalliera Beer.
- Aecidium** Pers. (Pilze, XXIV. 4) Rostpilz, Becherrost (v. *αἰκίσιον* miss-handle? od. Paxton: *αἰκίον* Rad u. *εἰδομα* gleiche? — unsicher!), z. B. A. berberidis P. „Berberizen-Rost“ (— eine Generation von Uredo s. Puccinia graminis, s. d.).
- 1) **Aegilops** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) Knopper- od. Ziegenbart-Eiche, fr. chêne à grosses cupules (gr. *αἰγίλων* v. *αἶψ*, *-γο* Ziege, *ἄψ* Aussehn). 2) **Aegilops** L. (Gräser, XXIII. 1) Walch, s. g. wilder Weizen, fr. coquioule, Dünnschwanzgras „Ziegenbart“, s. Rhabdoclōa P. B.
- Aegopodium** L. Umbelliferen, V. 2) „Geisfuss“, Geier, Giersch, fr. pied-de-chèvre, e. goat-wort (s. eb. u. *πόδιον* lat. podium Fusssocke, Fussgestell), z. B. Zier. A. Podagraria L. v. fol. varieg. Hort. s. Seséli Aegopodium Scop.
- Aërides** Sw. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Luft“-Orche, fr. fleur de l'air (v. *αἶρ*, *-έρος* Luft — treibt Luftwurzeln!), z. B. macrostachya Spr. (Epidendron m. Thou., Beclaria m. A. Rich.). — Ähnlich Aëranthus Lindl. u. Aërobium Spr. = Angraecum Thouars.
- Aeschynanthus** Jack (Bignoniac. od. Cyrtandraceen, XIV. 2) Scham- od. Sinnblume, fr. sensitive, e. shame-flower (v. *αἰσχύνουαι* schäme mich od. Wtst. *αἰσχύρω* verunstalte u. *ἄρθος* — sonderb. Blütenform!), z. B. grandiflorus Spr. (Incarvillea gr. Spr., Bignonia gr. Thb.), Hängpfl. Boschianus Jack.
- Aescūlus** L. (Sapindaceen od. Hippocastaneen, VII. 1) Rosskastanie, Sperwe O. W., fr. maron d'Inde, e. horse-chest-nut (v. esca Speise — wie lucus a non lucendo), z. B. A. Hippocastanum L., fr. la hippocastane, e. (s. eb.); Zier. A. rubicunda Lois. (carnēa Lindl., rosēa Hort.) = Aesc. Hippoc. var. rubicunda Schub.; A. Pavia L. s.

- Pavia Boerh., *A. macrocarpa* Hort. m. v. v. coccinea u. marginata Hort.; *A. macrostachya* Mchx., *A. glabra* W., *A. pallida* W., *A. flava* DC. (*Pavia lutea* Poir.), *A. humilis* Lodd. Zwerg-K., fr. chincapin (Amer.) u. a.
- Aethalium** Lk. (Schimmelpilze XXIV. 4) Russpilz od. Russling, Salbenschwamm, s. g. Lohblüte (v. *αἰθάλιον* hitzig, od. *αἰθαλοῦ* od. *-λη* Russ!), *A. flavum* s. *septicum*, fr. fleur de tan, e. tan-flower, = *Fuligo* Hall.
- Aethionema** R. Br. (Siliculosen, XV. 1) „Dürrfaden“, Steinkresse, fr. aethionème (*αἰθιοῦς*, *-εοῦ*: Hitze etc., *ρήμα* Faden — Staubfäd. wie versengt!), z. B. *saxatile* R. Br. (*Thlaspi sax.* L.), Zier. *cordifolium* DC., fr. aeth. à feuilles de Coris.
- Aethiopsis** Barr. (sc. *Salvia*) L. (Labiaten, II. 1) äthiopische od. syrische Salbei (gr. *Αἰθιοπίς*: Äthiopierin), z. B. *A. laciniata* Barr. = *Horminum syriacum* Moris.
- Aethusa** L. (Umbelliferen, V. 2) Gleisse, Hundspetersilje, Gartenschierling, fr. persil des fous, petite ciguë, e. dog's-parsley, *A. Cynapium* L. (v. *αἰθω* brenne etc. Part. Fem.).
- Agallocha** (sc. *Excoecaria*) L. (Euphorbiac. XXII. 3) Blendebaum (*Arbor excoecans* Rumph.), Paradies-Aloesholz, fr. calembac (-bouc od. -part) (v. d. arab. aghaludjy geb.) syn. *Agallochum praestantissimum* u. *secundum* Rumph. (*Aquilaria ovata* L.).
- Agalmula** Blum. (Bignoniac. XIV. 2) „Waldschmuckbaum“ (*ἀγαμία* Prachtstück, *ἴλη* Wald), *A. staminea* Bl., s. *Trichospora* u. *Trichospermum* Blum.
- Aganöta pulchra** autt. = *Andromöda floribunda* Bot. Mag. (*ἀγανός* lieblich).
- Agapanthus** l'Hér. (Liliaceen VI. 1) „Liebesblume“, Schmucklilie, fr. agapanthe, e. african lily (*αγάτη* Liebe, *ἀνθος* Bl.), z. B. Zier. *A. umbellatus* l'Hér. s. g. blaue Tuberose, fr. ag. en-ombelle od. bleu, e. umbellate od. blue african lily, s. *Crinum* L. u. *Maulhia* Thb.
- Agaricus** L. (Pilze, XXIV. 4) Blätterschwamm, fr. agaric, e. agarick (mush-room) (gr. *αγαρικόν* Diosc.), z. B. *A. muscarius* L. Fliegenschw., fr. ag.-de-mouche, e. toad-stool, *A. quercinus* L., fr. chênier u. fausse orange, *A. speciosus* L., fr. orange, *A. pratensis* L., fr. macaron des prés, *A. integer* L., fr. roumonet, *A. campestris* L., fr. champignon, u. a. m.
- 1) **Agarista** Don (Ericaceen, X. 1) Torfheide (*Agarista*, gr. Frauennamen, Wtst. v. *ἀγά* sehr, *ἀριστός* d. beste) = *Andromöda* L. 2) **Agarista** DC. (Compos. Tageteen, XIX. 2), z. B. *maritima* DC. (Südcalforn.) = *Leptosyne maritima* Asa Gray.
- Agathaea** (-thēa) Cass. (Compos. Astereen, XIX. 2) Cap-Aster, Schön- od. Himmelsblume (v. *ἀγαθός* herrlich, Wtst. v. *ἀγαθός*, *-ιδός* Knäuel? — Blütenknäuel!), z. B. Topf. *A. amelloides* DC. s. *coelestis* Cass., s. *Cineraria amelloides* L.
- Agathophytum** Moq. (Chenopodiaceen, V. 2) Gutkraut, Gut-Heinrichkr., *A. Bonus Henricus* Moq., fr. bon Henri (s. eb. u. *γυτὸν* Pflanze — analog *Bonus Henricus*) syn. *Chenopodium* B. H. L. u. *Blitum* B. H. C. A. Mey.
- Agathosma** W. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Gutgeruch“, Duftraute (s. v. u. *ὄσμη* Duft etc.), z. B. *A. hirtum* u. *barbatum* Spr., s. *Bucco*, *Hartogia* u. *Macrostylis* Bartl.
- Agave** L. (Amaryllideen od. Bromeliaceen, VI. 1) Baum- od. Wunderaloe (*ἄγαν*) Herrliche od. Erlauchte, Tochter d. Cadmus v. Theben, Myth.), z. B. *A. americana* L. m. v. *marginata* Hort., *Gilbeyii* Hort., filifera, fr. lin d'Amérique, u. a.
- 1) **Agerätum** L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) Leberbalsam, Bastardhanf Dietr., fr. agérate, eupatoire de Dioscoride od. bleue u. Célestine, e. blue maudlin (gr. *ἀγρήατος* nicht alternd — bekommt keinen w.

- Pappus!), z. B. Zier. A. coelestinum Sims od. coeruleum Desf. var. (Coelestina coerulea Cass.) u. A. mexicanum Vilm. v. coelest. nanum Hort. (Zwergform), fr. Célestine naïve, e. dwarfsky-coloured-maudlin.
- 2) **Ageratum** (sc. Achillēa) L. (Comp. Anthemid. XIX. 2) Gewürzgarbe Mössl. Rehb., Balsamgarbe, fr. eupatoire de Mésué.
- Aggregatae** Endl. Rehb. Bartl. Ord. d. Häufelblütigen od. Häufelblütler Rehb. (aggregatus zusammengesellt).
- Agnostus** Cunn. (Proteaceen, IV. 1) Fremd-Silberbaum (*ἀγνωστός* unbekannt), z. B. Gewächsh. sinuatus Cunn. u. integrifolius ds., s. Stenocarpus R. Br.
- Agrāphis** Lk. (Lilaceen, VI. 1) „Unbezeichnete“, Hasenglöckchen Grck., Bastardhyazinthe, fr. hyacinthe bâtarde (Bastard v. Hyacinthus u. Scilla) (*ἀγραφίς*, lat. non scriptus unbeschrieb., d. i. ohne Zeichen auf d. Kronbl.), z. B. Zier. A. cernuus Rehb. Hoffm. m. v. v. (Hyacinthus belgicus Hort. s. cernuus L., Scilla non scripta Bot. Mag., Eryndymion non scr. Grck.), A. nutans Lam. s. coerulea Hort., s. Hyacinthus non scr. L.
- Agrimonia** T. (Rosaceen, XI. 2) Odermennig, Leberklette, fr. aigremoine, e. agrimony (n. Einigen eig. Argemonia v. *ἀργεμῶνα* Augenkrankheit, wohl v. *ἀργός* Acker, *μονή* Wohnort).
- Agropyrum** G. (zu Triticum L.) (Gramineen, III. 2) „Ackerweizen“, Quecke, fr. chiendent „Hundszahn“ od. panic rampant, e. quitch-grass „Queckengras“ (s. v. u. *πυρός* Weizen), z. B. A. repens, caninum etc.
- Agrostemma** L. (Sileneen, X. 4) „Ackerkranz“, Kornrade, fr. fausse nielle („Nigelle“) od. nielle des blés, gerzeau u. coquelourde, e. corn-rose, cockle, corn-bottle (s. v. u. *στέμμα* Kranz, Krone = Nebenkronen um d. Schlund d. Krone!), A. Githago L., Zier. A. Coeli-rosa L., fr. coquel. Rose du ciel, e. rose of heaven „Himmelsröschen“, A. flos Jovis L., fr. coquel. fleur de Jupiter, e. Jove's flower, s. g. Bergrade (Lychnis coronaria alpina Barr.).
- Agrostidēae** Kth. Strauss- od. Windhalmgräser, s. sogl.
- Agrostis** L. (Gramineen, III. 2) Straussgras, fr. agrostide od. éternue (gr. *ἀγροστίς*), z. B. Zier. A. capillaris Hort. s. nebulosa Boiss., fr. a. capillaire od. nébuleuse, e. common bent-grass, wild A. spica venti L. Windhalm, fr. éternue éventée (Apēra Spica venti P. B.), A. alba L. v. stolonifera E. Mey, s. g. Fioringras, fr. terre-nue, A. canina L. u. vulgaris With. (stolonifera L.).
- Ajacis** (sc. Delphinium) L. (Ranunculac. XIII. 3) Garten-Rittersporn (grosser R.) (d. Kronmittellappen mit dem gr. *ΑΙΑ* bezeichn., Vergil's Eklogen).
- Aigeiros** Dub. (zu Populus L.) (Salicaceen, XXII. 7) Schwarzpappel (gr. *αἰγείρος* Schwarzpappel).
- Ailantus** (nicht -thus) Desf. (Terebinthaceen od. Xanthoxylen, XXIII. 1) Götzen- od. Götterbaum, persischer Sumach, japanischer Firmisbaum (n. d. molukk. ailanto „Himmelsb.“) Zier. A. glandulosa W. (procēra Salisb.), fr. ailanthe du Japon (Vernis -), e. ailanto, s. Rhus sinense Elly s. cacadendron Ehrh., „Unglücksbaum“.
- Aira** W. (Gramineen, III. 2) Schmiele, Schmelengras, fr. erbin, canche, e. bulrush (Wtst. v. *αἶρω* nehme weg — nämll. d. Leben!), z. B. Zier. A. pulchella W. (elegans Gaudin, Avena eleg. M. K.), fr. canche élégante od. délicate, e. nice corn-grass.
- Aitonia** L. f. (Rutac. od. Meliaceen, XVI. 4) „Aitonsstrauch“ (s. d. Aut.) A. capensis Thb. (Zierstr.) = Cotyledon fol. linear. Burm.
- Aizoidēae** Rehb. Spr. (zu Ord. Succulentae Bartl.) s. sogl.
- 1) **Aizōon** L. (sc. Saxifraga) Jacq. (Saxifragaceen, X. 2) „ewiglebender“ od. kleiner Steinbrech (*ἀεζῶος*; ewiglebend). 2) **Aizōon** Jacq. (Ficoi-Glaser, Botan. Wörterbuch.

- deen Juss. Aizoideen Spr. XII. 4) Immergrün Dietr., e. ayegreen, z. B. *hispanicum* L. = *Aizonia* Tausch. 3) **Äzōon** (sc. *Sedum*) L. (*Crassulaceen*, X. 5) s. *Aiz. peregrinum* Rchb.
- Ajūga** L. (Labiaten, XIV. 1) Untermäulchen, Günsel, fr. bugle, herbe de St. Laurent, e. bugle ( $\alpha$  priv. u.  $\zeta\upsilon\gamma\omicron\nu$  lat. *jugum* Joch — näml. Obermaul, welches fehlt! Leunis u. K. König: v.  $\acute{\alpha}\gamma\upsilon\iota\omicron\varsigma$  gliederschwach — geg. Gicht!? Wtst. u. K. König: st. abīga v. abīgo treibe ab — ?), z. B. *genevensis* L. (*Bugula montana* Riv.), fr. bugle de Genève, e. Genevian b., reptans L., fr. petite consoude.
- Akebia** Decsn. (Menispermac., XXI. 6) „Akebie“ (n. d. japan. Nam. d. Pfl. akebi), z. B. *Zierschlingpfl.* A. quinata Thb. (Japan).
- Alaternus** T. (sc. *Rhamnus*) L. (subg. v. *Rhamnus* Mill.) (Rhamnaceen, V. 1) Alaternbaum, immergrüner Wegdorn, fr. nerprun alaterne, A. latifolius (*Phylīca elatior* Bauh.) (Südeur.) (v. alterno wechsle ab — näml. Blattstellung, Wtst.).
- Albersia** Kth. (Amarantaceen, XXI. 5) Wegfuchsschwanz Seub., „Albersie“ Grck. (n. J. Chr. Albers, Med.-Rat in Berlin, g. 1795) A. Blitum Kth. = *Amarantus Blitum* L. (*Euxölus viridis* Moq.).
- Albüca** L. (-cēa Rchb.) (*Amaryllideen* od. *Liliac.* VI. 1) „Weisslilie“, Stiftblume (v. albus weiss), z. B. *nutans* Rchb. (*Ornithogalum* n. L.) Zier. A. major Dryand., cornuta Desf. u. a.
- 1) **Aleanna** (Alk.-) Rumph. Tausch. (Boragineen, V. 1) „Alkana-“ od. Rotwurz, e. alcanna-root (arab. N.), A. tinctoria L. 2) **Alkana** spinosa G. = *Lawsonia spin.* L. (*Lythrarieen*, VIII. 1). 3) **Ale-** Munt. (*Berberideen*, VI. 1) = *Prinos verticillatus* L. (*Aquifolium* fol. deciduus Duham.).
- 1) **Alcēa** (sc. *Malva*) L. (*Malvac.* XVI. 8) spitzblättr. Malve Grck. s. g. Siegmarswurz. 2) **Alcēa** L. (zu *Althaea* Rchb.) Zier. A. rosēa L. Stockrose, grosse Gartenmalve, fr. mauve de jardin, passe-rose (rose tremière od. d'outre mer), e. rose-mallow u. hollihock (holy-oak), s. *Althaea sinensis* Cav. (v.  $\acute{\alpha}\lambda\chi\eta$ ) Wehr, Hülfe). 3) **Alcēa** L. (*Malvac.* XVI. 8) Heil-M., z. B. *rosēa* L. u. *ficifolia* L.
- Alchemilla** T. (*Rosaceen*, Dryadeen, IV. 1) Sinau, Frauenmantel, fr. mantelet des dames, alchimille, e. lady's mantle, alchimilla, auch Löwenfuss, fr. léontopétalon „Löwenblatt“, Bärenfuss Vilm. (v. d. arabisch. Namen d. Pfl. alkemelyeh, nicht v. Alchemie!).
- Aldrovanda** Mont. (bess. -dia Grck.) (*Droseraceen*, V. 5) Blasenfaden, A. vesiculosa L. (*Lentiscūla palustris indica* Pluk.) (n. Ulyss. *Aldrovandi*, s. d. Aut.) s. *Drosera* L. (*Drosophyllum* Lk.).
- Alectorolōphus** Hall. (*Rhinanthaceen*, XIV. 2) „Hahnenkamm“, s. g. Klapper, fr. galinette, e. cock's-comb (-weed) (v.  $\acute{\alpha}\lambda\acute{\epsilon}\zeta\tau\omega\omicron$  Hahn,  $\lambda\omicron\phi\omicron$ ; Kamm, Schopf), z. B. major Rchb. u. minor Wimm. Grab., s. *Rhinanthus Crista Galli* L. (var. a u. b).
- Alētris** L. (*Liliaceen* od. *Smilaceen*, VI. 1) Mehlilie, „Müllerin“, Runzelblume D. ( $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\tau\omicron\iota$ ; v.  $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\iota\omega\omicron$  Mehl — mehliges Überzug!), z. B. Zier. capensis L. (*Veltheimia* c. Réd. s. *viridifolia* Jacq.), japonica (*Funkia lancifolia* Spr.), A. fragrans L. (*Dracaena* fr. Gawl.), *Rotheana* (Drac. R.) (moderne Blattpfl.), A. Uvaria L. (*Tritōma* Uv. Ker) u. a.
- Aleurites** Forst. (*Euphorbiac.* XXI. 9) „Mehlbaum“ (v.  $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\upsilon\sigma\iota\tau\eta\varsigma$  von Weizenmehl etc. — B. wie mit Mehl bedeckt!), z. B. *laccifera* Gummilackbaum = *Croton lacciferum* L. (*Halecus terrestris* Rumph.), A. molluccana W. (*Jatropha* mol. Sw.) u. a.
- Algae** Juss. DC. Klasse der Algen, Algīnae Bartl. Ord. d. Algen (Wtst. v. allīgo fessele, umbinde).
- Algarobia** (-ba) DC. (*Mimoseen*, XXIII. 1) Johannisbrod-Mimose od. Algarobenbaum (v. d. span. algarrobo Johannisbrod), z. B. A. juliflōra W.

- Alhagi** T. Desv. (sc. Hedysärum) L. (Leguminos. Hedysareen, XVII. 4) Mannaklee, persisches od. Juden-Manna, türk. Süssklee, wilder Honig, fr. manne d'Alagi (- en grain, - de Perse) (arab. Name dafür!). — Alhagēae DC.
- Alhenna** Walt. (Lythrarieen, VIII. 1) echte Alkana, „Alhenna“ der Türken = *Lawsonia inermis* L.
- 1) **Alisma** L. (Alismaceen od. Helobien, VI. 4) Froschlöffel, A. Plantāgo L., fr. alisme, plantain d'eau, flûteau, e. frog-spoon, water-plantain, A. natans L. (*Damasonium repens* Vaill.), fr. flûteau d'eau, pain de grenouille (n. d. celt. alis Wasser, Paxton). 2) **Alisma** pratorum Columm. = *Primula veris* L. — Alismacēae Rich. DC. (Ordn. Helobiae Bartl.).
- Alkana** s. Alc.-
- Alkekengi** Feuill. Dill. (sc. Physālis) L. (Solaneen, V. 1) Judenkirsche, Schlutte, fr. coqueret, e. alkekengi od. winter-cherry (arab. i. q. lat. Halicacābi, sc. bacca). A. virginiana Feuill. (*Physalis pubescens* L.), A. bonariense repens Dill. (*Physalis viscosa* L.).
- Allamanda** L., W. (Apocynaceen, V. 1) brasilian. Hundswürger (nach d. Prof. Fr. Allamand in Leyden). A. cathartica L. (*Orelia grandiflora* Aubl., *Apocynum scandens* Plum.) = Aloë *Dracaena* Lam.
- Allantodia** R. Br. (Farne, XXIV. 1) „Wurst“ od. Puddingfarn (v. ἀλλὰ ἄζ. - ἄζοζ Knoblauchswurst, mit *Allium* — bez. d. Sori!), z. B. A. tenēra, australis etc. R. Br.
- Alliaria** Trag., Ad., R. Br. (sc. Erysimum) L. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Knoblauchshederich“, „Lauchkraut“, Rampen M. Rehb., fr. alliaire, herbe aux aulx „Lauchkr.“ (Pl. v. ail, lat. allium), e. hedge-mustard „Heckensenf“, A. officinalis Andr. (s. sogl. *Allium*).
- Allium** L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Lauch, Zwiebellauch, fr. ail, e. leek, garlic (gr. ἀγγάδιον, lat. allium, n. Paxton v. d. celt. all, d. i. brennend. Geschmacks!), z. B. fistulosum L. Winterzwiebel, A. Cepa Sommerzwiebel, A. sativum L. Knoblauch, fr. ail, e. buck-rams od. ramson (-sen), A. Porrum L. Porrē, fr. porreau, e. porret, Zier. A. ursinum L. „Bärenlauch“, fr. ail d'ours, e. bear's-garlick, A. nigrum L., fr. ail noir, e. black-garlick, A. azurēum Ledeb. s. caerulēum Pall., fr. ail azuré, e. bluish-garlick, A. fragrans Vent. „Vanillelauch“, A. Moly L. Goldl. u. a.
- Alloplectus** Mart. DC. (nicht Alop.-) (Gesneriac., XIV. 2) „Umeinandergeflochtene“, Urnenröhre Rmpl. (v. ἀλλήλων; wechselseitig u. πλεξ- τος geflochten — Staubfäden einander umschlingend!), z. B. Gewächsh. A. Schlimii Pl. u. Lind., speciosus u. capitatus Hook. etc.
- Allosorus** Bernh. (nicht -urus autt.!) (Farne, XXIV. 1) Roll- od. Krullfarn (ἀλλος anderer, σάκος Haufen — näml. Sporenbhälter, diese erst rund, dann linearisch, Wtst.).
- Alnaster** Spach (Betulaceen, XXI. 4) Grünerle, A. viridis Spach (Alnus v. Grek.) (deter. Alnus).
- Alnus** T. (Betulaceen, XXI. 4) Erle, Eller, fr. aulne, guerne od. vergne, e. alder (-tree) u. aller, z. B. A. glutinosa G. Schwarzerle (Betula Alnus L. var. glutinosa L.) m. v. v., z. B. laciniata Ait., auch Else Vilma., A. incana W., Grau- od. Weisserle (Betula Alnus L. var. b, incana L.), A. serrulata W., undulata W., cordifolia Lodd. (cordata Tenore) etc.
- Aloë** L. (Liliaceen, VI. 1) Aloë, fr. aloë (-ès), e. aloes (a. d. arab. alloeh, hebr. halal, d. i. glänzend und bitter), z. B. picta DC., ferox DC., variegata L. etc.
- Aloëxylon** Lour. (Cassieen, X. 1) Bitter- od. „Aloëholz“ (s. eb. u. ξύλον Holz), z. B. A. Agallochum Lour.
- Alōna** Lindl. (Solaneen, V. 1) Glocken-Nachtschatten, A. coelestis Ldl. (Anagramm v. Nolana, v. nola „Glöckchen“).

- Alonsōa (-zoa)** Rz. Pv. (Scrophularineen, XIV. 2) Halbkroner, Nesselblatt (n. Alonso od. -zo Zanonī, peruan. Bot. schr. in Fl. Peruv.), z. B. Topf A. Warscewiczii Reg. (compacta Hort.) u. incisifolia R. P., s. Hemimēris urticifolia W. (Celsia u., Hemitōmus u. Desf.).
- Alopeūrus** L., W. (Gräser, III. 2) Fuchsschwanzgras, Wiesenfuchsschwanz, fr. queue de renard, e. fox-tail (ἀλώπιγξ, -εζος Fuchs, οὐρά Schwanz), z. B. pratensis L., agrestis L., „Acker“-F., fr. chiendent, queue de rat.
- Aloysia** Ortega (Verbenaceen, II. 1 od. XIV. 2) Citronenstrauch, s. g. „Citronengeruch“, A. s. Lippia citriodōra Pers. (n. d. Königin Marie Louise v. Spanien, † 1819), s. Verbēna triphyllos l'Hér.
- Alpinia** L. (Amomeen, I. 1) Galgant, A. Galanga Sw., fr. cachibou, e. galangal (-lingal) (n. d. Prof. Prosper Alpinus in Padua, s. d. Aut.).
- 1) **Alsinastrum** (sc. Elatine) L. (Elatineen, VIII. 4) quirliger Tännel Grck. (deter. Alsine, Wtst. Alsine u. ἄστροον Stern od. Bild. 2) A. (sc. Anachāris) Babingt. (Elatineen, VIII. 4), s. g. Wasserpest = Elodēa canadensis Mchx.
- 1) **Alsine** Wahlb., L. (Caryophyllen od. Alsinaceen, X. 3) Miere, fr. morgeline, e. alsine od. alciue (v. ἄλσιος Hain? — wahrsch. v. ἄλις Salz, Alsine marina Sm. Salzmiere). 2) **Alsine** (sc. Stellaria) Hoffm. mierenart. Sternkraut, s. Larbrea aquatica St. Hil. — Alsinēae Rchb. Bartl., -nacēae DC. (zu Ord. Caryophyllināe Bartl.).
- Alsodia** P. Th. (-dēa Spr.) (Violaceen Alsidineen, V. 1) „Blattbusch“-Veilchen (ἀλωδία blättrig, buschig), z. B. A. Piparea P. Th. (Piparea dentata Aubl.), sessilis Spr. (Pentalōba s. Lour.), arborēa P. Th. — Alsidinēae (sc. Violacēae) Rchb.
- Alsohila** R. Br. (Baumfarne, XXIV. 1) „Hainfarn“ (ἄλσιος; Hain, φίλος Freund), z. B. australis Lab., martinicensis Sieber, medullaris R. Br.
- Alstroemēria** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Alstroemer's“-Lilie, fr. Alstroemère, fleur de Lucas „Inkasblume“ (n. d. schwed. Baron A. Alstroemer, † 1794), z. B. Zier. A. peregrina L. Inkaslilie, psittacina Lehm., plantaginēa Mart. (Anden v. Peru).
- Altagāna** l'Hér. (sc. Robinia) Pall. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Sand-Robinie, daurischer Erbsenbaum, s. Caragāna Alt. Poir. u. macrophylla Lam. (n. d. Altaī-Gebirge ben.).
- Alternanthēra** Forsk. (Amarantaceen, XXI. 5) „Antherenwechsel“-Fuchsschwanz (v. alterno „alterniere“ od. wechse ab, ἀνθῆρα Staubbeutel — abwechs. fruchtbare u. sterile Antheren!), z. B. Blatt-Zierpfl. A. amoena Hort., spathulata Ch. Lem., amabilis Hort., s. Telanthēra Reg.
- Althaea** L. (Malvaceen, XVI. 8) Eibisch, fr. althée od. gummauve, e. marsh-mallow (v. ἀλθαίω od. ἀλθέω helfe, heile), z. B. officinalis L., Zier. A. (Alcēa) rosēa Cav. Stockrose, -malve, Rosenpappel, fr. rose-tremière, e. holly-hock, A. sinensis Cav. Zwerg-Stockrose, fr. rose trem. de la Chine, e. dwarf-hollyhock.
- Altingia** Noronha (Coniferen, XXI. 9) „Altingie“ (n. d. deutsch. Bot. Alting, Paxton), z. B. A. excelsa Pers. (Araucaria excelsa Hort.), s. Lignum Papuanum Rumph.
- Alyssum** T. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) Schild- od. Steinkraut, fr. alisson (i pr. u. λίσσα Wut-beschwichtigende Kraft<sup>1)</sup>, od. viell. bess. v. ἀλύσσων traurig), z. B. Zier. A. saxatile L., s. g. Goldkörbchen, fr. goujon saxatile, corbeille d'or, e. rock-mad-wort.
- Amanita** W. (Pilze, XXIV. 4) Wulstpilz, -scheide, Manschettenpilz Kummer, Fliegenpilz, A. muscaria W. (Agaricus musc. L.), fr. tue-

1) G. Frank's Kräuter-Lex.: Alyssum Berufswant, in Häus. aufgeh. u. Menschen u. Vieh um den Hals geg. Behexung! D. V.



mouche, e. toad-stool „Krötenstuhl“ (Helm. u. Rabh.: nach d. Berg Amanus in Cilicien).

**Amarantaceae** R. Br., DC., **-anthi** Juss., **-anthēae** (sc. Aizoidēae) Rehb., s. sogl.

**Amarantus** T. (nicht -thus!) (Amarantaceen, XXI. 5) „Amarant“, Fuchschwanz, Tausendschön, fr. amarante, fleur de jalousie (- d'amour) u. brède, e. amaranth, flower-amour, life-everlasting (gr. ἀμάραντος: unverwelklich v. ἀ priv. u. μαράνω welke), z. B. Zier. tricolor L. s. g. Papageifeder, e. prince's-feather, caudatus L. Fuchsschwanz, speciosus Sims, sanguineus L., cruentus L., u. a. m.

**Amaryllidēae** R. Br. (Narcissēae Rehb.) zu Ord. Ensatae Bartl. DC. Narzissenschwertel, s. sogl.

**Amaryllis** Herb., L. (Amaryllideen, VI. 1) Narzissen- od. Schönlilie, fr. amarylles (altgriech. Frauen-Name, Wtst. schöne Nymphe!), z. B. Zier. (Cap) A. Belladonna L. Belladonna-Lilie Rnopl. m. v. v. (z. B. rosea, spectabilis, bicolor etc.), fr. Bella d'automne, e. Belladonna-lily, formosissima L. schöner Ritterstern od. s. g. Jakobsllilie, fr. am. lis de St. Jacques, reine de beauté, e. very-nice Amaryllis (s. Sprekelia form. Heist.); A. sarniensis L. Jersey-L., fr. lis du Japon, u. a. m.

**Amerbōa** DC. Lam. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Bisam-“ od. „Muschelblume“ (zu Centaurēa Rehb.) (v. ambr wohlriech. Seeprodukt u. βοῖ) Gebet, Anruf d. Götter, Wtst. fr. amberboi Bisamblume). A. s. Centaurēa moschata L. (suaveolens W.), s. Cyanastrum Cass. „unechte Cyane“!

**Ambrina** Spach (Chenopodiaceen, V. 2) „Ambrakraut“, A. ambrosioides Sp., s. Chenopodium ambros. L. (s. eb.).

**Ambrosia** L. (Composit. Ambrosiaceen, XIX. 5) Traubenkraut (nicht n. d. Götterspeise Ambrosia. sond. nach St. Ambrosius, Herausg. v. Basilius' Hexameri (libri VI), Paris 1721—30). — Ambrosiaceae Lk. Rehb. Spitzkletten Leun. (nicht Götterbrodgewächse!).

**Amelanchier** Medic. (zu Pyrus Aronia Rehb.) (Pomaceen, XII. 4) Felsenbirne, od. -mispel, Quantel O. W. (α<sup>2</sup> int. μήλον Apfel od. Birne, ἄγγω würge — Wurgbirne!), z. B. Zier. A. vulgaris Mnch. (Aronia rotundifolia Pers., Mespilus s. Pyrus Amelanchier L., W.), fr. néffier à feuilles rondes, amélanches, e. common Am.; A. ovalis DC. (Aronia ov. Pers.), A. Botryapium DC. „Traubenbirne“ (Mespilus canadensis).

**Amelia** Alfld. (Hypopytyaceen Kltzsch., X. 1) „Übersehene“ (ἀμελής; vernachlässigt etc.), z. B. media u. minor Alfld., s. Pyrola media Sw. u. minor L.

1) **Amellus** W. (Compos. Astereen, XIX. 2) Mella-Aster (an d. Ufern d. arkad. Flusses Mella, Paxton), z. B. lychnitis L. (Verbesina asteroides L.), fr. oeil du Christ, e. amellus-star-wort. 2) **Am.** (sc. Aster) L. Virgil's Aster, Berg-, s. Aster acris Leyss. (in Virgil's Georgika, lib. IV, beschrieben). 3) **Am.** (sc. Calēa) R. Br. „Schönrrute“.

**Amentaceae** Bartl. Ord. d. Kätzchenträger (v. amentum Kätzchen, vgl. Terminologie).

**Amethystēa** L., W. (Labiaten od. Solaneen, II. 1) „Amethystblume“, Bläuling D. (ἀμέθυστος bl. Edelstein, Amethyst), z. B. caerulea L. sibir. Bl. Rehb. s. Lycopus amethystinus Steven.

**Amherstia** Wall. (Legum. Cäsalpinieen, X. 1) „Amlierstie“ (z. Ehr. d. Countess Amherst u. der. Tocht. Lady Sarah Amherst), z. B. Warmh. A. nobilis Wall. (Südlind.) s. g. Thoca.

**Amicia** Hb. Bpl. Kth. (Legum. Hedysareen, XVII. 4) „Amicie“ (n. d. ital. Naturf. u. Mikrosk. J. B. Amici, Erf. d. achromat. Mikr. 1812), z. B. Gewächsh. A. Zygomeris DC. (planta pulcherrima Schlechtendal).

**Ammadenia** Rupr. (Alsineen, X. 3) „Sand-Sattkraut“ (ἄμμος Sand,

- ἄδος* (Sättigung), z. B. *peplodes* Rupr. = *Alsine* (Honckenya) *peplodes* Wihlg. u. Ehrh.
- Ammi** T. (Umbelliferen, V. 2) Steifstrahl, e. amney, bishop's-weed, bull-wort (v. *ἄμιμος* Sand), z. B. *majus* L. = *Libanotis* u. *Bunium*.
- Ammobium** R. Br. (Comp. Senecionideen, XIX. 2) Sand-Immortelle (s. v. u. *βιώ* lebe), z. B. *Zier. alatum* R. Br. (Neuholl.), fr. A. *ailé*, e. winged A.
- Ammophila** Host (Gramineen, III. 2) Sandhalm, -rohr, Helmgras O. W. (s. v. u.  *φίλος* Freund), z. B. *arenaria* Lk. s. *Psamma* u. *Arundo* ar. L.
- Ammysine** Pursh (Ericaceen, X. 1) „Sandmyrte“ (s. v. u. *μυσίνη*, Myrte), z. B. *buxifolia* Bot. Reg. = *Ledum buxif.* Ait. (*Leiophyllum* b. Ell.).
- Amomēae** Rich. (Ord. Scitamineae Bartl.) Bananen, Gewürze Leun., s. sogl.
- 1) **Amomum** L. (Scitamineen Amomeen, I. 1) Gewürzllilie, Ingwer, fr. amome, e. amomum (arab. hamama, nicht *á* pr. u. *μώμος* Schande etc.), z. B. A. Zingiber L. gem. Ingwer (Ostind.), A. Malaguetta Paradieskorn-Ingwer (A. granum paradisi L.), fr. *poivron d'Afrique* (Madagask., Guin.) s. g. Cardamome, fr. auch manigette (malaguette).
- 2) **Am.** (sc. Sison) L. (Umbelliferen, V. 2) Gewürz-Sison, fr. berle aromatique = *Sium* s. *Seséli* Am. Roth u. Scop.
- Amorpha** Duh., L. (Legumin. Galegeen Rchb. XVII. 4) Uniformstrauch, „Ungestalt“ Vilm., Bastard-Indigo (*á* priv. u. *μοοφή* Gestalt — näml. d. Blüte nicht als Schmetterl.-Bl. kenntlich!), z. B. *Zierstr. A. fruticosa* L. m. v. *Lewisii* Lodd., *glabra* Desf., *nana* Nutt. (*microphylla* Pursh), *fragrans* Sweet u. a.
- Amorphophallus** Blum. (Araceen, XXI. 1) „Uniformpfahl“ (s. v. u. *φαλλός* Pfahl, männl. Glied), z. B. *Warmh. A. campanulatus* Decsn. (*Arum* c. *Roxb.* d. i. *Glocken-Aron*) (Ostind.).
- Ampelidēae** DC., -**dacēae** Hb. Bpl. Kth., Grck. (Ord. Ampelidēae Bartl.) Rebengewächse (v. *ἀμπελις*, -*ίδος* Weinstock).
- Ampeloprasum** (sc. *Allium*) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Sommerod. Rebenlauch, breitblättr. wilder Lauch, All. *Ampelopr. Kit.* = *Allium rotundum* L. (*ἀμπελος* Weinstock, *πράσων* Lauch).
- Ampelopsis** Mchx. (Ampelideen od. Vitaceen, V. 1) Wildrebe, Rebling O. W., Zaun- od. Jungfernrebe, fr. *vigne-vierge*, e. *virginian-wine*, *virginian creeper*, *Zier. A. hederacēa* Mchx. (*quinquefolia* R. Sch. (s. v. u. *ὄψις* Aussehn), s. *Hedera quinquef. L.* (*Vitis hederacēa* W., *Cissus hed. Pers.*), A. *bipinnata* Mchx. (*Vitis arborēa* W., *Cissus stans Pers.*), *cordata* Mchx. herzblättr. Wildrebe, fr. *vigne-vierge à feuilles en coeur*, u. a.
- Amphibrýa** Endl. „Umsprosser“ (*ἀμφί* um, herum, *βρίω* keime, sprosse).
- Amphicarpantēae** (sc. *Compositae*) Rchb. „Ringsfruchtblütige“ (XIX. 4. L.).
- Amsonia** Walt. (Apocynen, V. 1) „Amsonie“, fr. Amsonie (n. d. Bot. Charl. Amson, Reis. in Amerika), z. B. A. *virginiana* Walt. (*Apocynum* v. Pluk.) = *Tabernaemontana Amsonia* L., *Zier. A. salicifolia* Pursh (*Tabernaemont. elliptica* Thb.), fr. A. *à feuilles de saule*, e. willow-leaved A.
- Amygdalacēae** Rchb., -**lēae** Bartl. (zu Ord. Rosiflorae Bisch.), s. hern.
- Amygdalopsis** Carr. (Amygdalaceen, XII. 1) „Mandelgleiche“ (*Amygdälus* u. *ὄψις* Aussehn), z. B. *Zier. A. Lindleyi* Carr., s. *Prunus triloba* Lindl.
- Amygdälus** L. (Rosac. Amygdaleen, XII. 1) Mandelbaum, fr. amygdalé od. amandier, e. amond-tree (gr. *ἀμυγδάλη* Mandel v. *ἀμύσσω* zerhöhle — Furchen im Stein, Wst. syrisch ah-mygdala d. i. schöner Baum), z. B. A. *communis* L., *Zier. A. nana* L. (*Prunus inermis*

- Gmel.) m. v. georgica DC. (aus Georgien), communis L. var. fl. pleno Hort., v. pendula Hort. etc., A. sibirica Pall. (Persica vulgaris Mill.), Gartenobst A. Persica L. Pflrsich, fr. pécher commun, e. peach-tree, Zier. Persica L. m. v. v., z. B. fl. plen. Hort., camelliaeflora Fort. etc.
- Amyridäe** R. Br., Endl. Salben- od. Myrrhenbäume (zu Terebinthaceae Rehb.), s. sogl.
- Am̄yris** L. (Terebinthac. Amyrideen, VIII. 1) Myrrhe, Balsambaum (-strauch) u. amyride, e. myrrh (*á* int. *μύρον* Balsam od. Myrrhensaft), z. B. A. balsamifera L., elemifera L. etc., s. Icica Aubl.
- Anabasäe** Bunge, s. Anabasis L. sogl.
- Anabasis** L. (Chenopodiaceae, V. 2) Kalistrauch (*ἀναβάσις* d. Aufsteigen, gr. i. q. lat. Equisetum), z. B. A. aphylla L. = Salsöla articulata Cav. s. baccifera Gm. (Kali baccif. Buxb.).
- 1) **Anacampseros** Ehrh. (sc. Portulacae) L. (Portulacaceen, XI. 1) Liebeskraut (gr. *ἀνακάμψεως* Liebe zurückbring. Kraut, v. *ἀνακάμπτω* u. *ἔρω*), z. B. A. arachnoides Sims, s. Ruelingia ar. Haw. (Talinum Anac. W.). 2) **Anac.** (sc. Sedum) L. (Corniculat. Sedeen, X. 5) rundblättr. Mauerpfeffer, s. g. Wundkraut, s. Sedum rotundifolium Lam. u. Sedum Aizöon L. (Anacampseros flore flavo Amm.). 3) **Anac.** orientale T. = Crassula crenata Desf. oriental. Liebeskraut.
- Anacamptis** Rich. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) Pyramiden- od. Straussorche, Hundswurz Leun. (v. *ἀνακάμπτω* biege in d. Höhe — bez. d. Pollenmasse, Wtst.) = Orchis pyramidalis L.
- Anacardium** Roxb. (Terebinthac. Anacardiaceen, XXIII. 2) Herznuss- od. Nierenbaum, fr. anacardier, e. kidney-nut-tree (v. *ἀνά* nach oben, *καρδία* Herz — in d. Höhe gebog. Herz- od. Nierenfrucht!), z. B. A. orientale L. Malaccanuss od. echte Acajou, fr. acajou, pomme sauvage od. noix-de-marais, s. Semecarpus Anacardium L. f.
- Anachäris** Rich. (Hydrocharideen, XXII. 8) s. g. Wasserpest (v. *ἀνά* durch, *χαίρις* Freude od. v. *ἀναχαίρω* freue mich darin — durchwuchert d. Wasser, Wtst. anas Ente u. *χαίρω*?). A. Alsinastrum Bab. auch Wasserthymian, s. Elodäa canadensis Rich. (Tropperara pestifera autt.).
- Anacyclus** Pers. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Kreis“- od. „Ringelblume“ (Ringblume Grck.), deutscher Bertram Leun. (v. *ἀνακυκλώω* drehe im Kreis herum, Wtst. st. Ananthocyclus — Blüth. im Umkreis unfruchtbar!), z. B. geb. A. officinarum Hayne, Zier. A. radiatus L. = Anthemis purpurea Hort. etc., s. Santolina u. Anthemis L.
- Anaectochilus** Sm. Lindl. (Anoect.- Blum.) (Orchideen Neottieen, XX. 1) „Offenlippe“, s. Anoectochilus.
- Anagallis** T. (Primulaceen, V. 1) Gauchheil, eig. Kucks- (Kukuks-) Heil Mej., Ackerzier, fr. mouron, miroir du temps „Wetterspiegel“, e. brook-lime (v. *ἀγγάλλω* schmücke, n. Paxton v. *ἀναγέλω* lache auf — vertreibe d. Melancholie, daher — Gauchheil!), z. B. A. arvensis L. Kolmar O. W., Zier. A. collina Schousb., fr. mouron à grandes fleurs.
- Anaḡyris** T. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Zirkelhülsenbaum“, Stinkb. (-strauch Lauche), fr. bois-puant u. fève de trèfle, e. stinking bean (-trefoil) (v. *ἀνά* rückwärts, *γῆρος* Ring etc. — Hülsenform!), z. B. A. foetida L. (griech. Inseln), latifolia Brouss. (Bactrylobium l. Dietr.).
- Anamirta** Colebr. (Menispermaceen, XXII. 6) „An“- od. Scheinmyrte (v. *ἀνά* u. *μύρον* an, gleichsam Myrte), z. B. A. Cocculus Wight = Menispermum Cocculus L. Kokkelsstrauch.
- Ananassa** Thb. (Bromeliaceen, VI. 1) Ananas (v. d. brasil. Nam. nanas od. anana) = Bromelia Ananas L. (Ananas aculeatus Trew), z. B. A. sativa Lindl. Gartenbeet-A., e. pine-apple (Südünd.).

- Anarrhīnum** Desf. (Scrophularineen, XIV. 2) Lochschlund-Löwenmaul, fr. muflet, gueule de lion, e. lions-mouth (v. ἀνά auf, δόν, -νος Nase, Rüssel, n. Paxton á priv. od. Wtst. ἀνευ ohne — einer Schnauze nicht gleichend!), z. B. bellidifolium W. (Linaria odorata Dodart, Dodartia Mill.).
- Anastatica** L. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Auferstehungskraut“ (v. ἀναστατός wiederauflebend — d. eingetrockn. Kraut bei Feuchtigk.), A. hierochuntica L., s. g. Jerichorose, fr. jérose.
- Anchüsa** L. (Boragineen, V. 1) Ochsenzunge, Zier. O. W., fr. langue de boeuf, buglosse u. orcanette, e. bugloss, ox-tongue, orchanet u. bullace (gr. ἄγγουσα od. ἔγγουσα Schminkwurz), z. B. Zier. A. sempervirens L., fr. buglosse toujours verte, e. evergreen-oxentongue, A. italica Retz., geb. A. tinctoria L. rote O., fr. alcannette (alkunet) „Alkannawurzel“ (s. Alcanna!), e. alkanet.
- Andreaea** Ehrh. Spr. (Moose, XXIV. 2) Steinmoos (n. d. Apoth. Andreaë, s. d. Aut.), z. B. alpina Hedw., rupestris ds. etc., s. Lichenastrum Dill. u. Jungermannia rup. L. — Andreaeaceae DC.
- Andrewsia** Spr. (Gentianeen, V. 1) Andrews-Enzian (n. d. Pfl.-Maler Andrews, s. d. Aut.), z. B. verna Spr. u. autumnalis Spr. = Centaurella verna Mchx. u. C. autumnalis Pursh (paniculata Mchx.).
- Andromēda** L. (Ericaceen, X. 1) Torf- od. Rosmarinheide, Gränke O. W., fr. Andromēde (n. der von Perseus befreiten Jungfrau Andromeda, Myth.), z. B. polifolia L., fr. A. à feuilles répliées, A. calyculata L. (Chamaedaphne c. Mnch. Buxb.), Zier. A. floribunda Bot. M. (Leucothoë fl. D. Don) u. speciosa-Mchx. (Zenobia sp. D. Don).
- Andropōgon** W. (Gramineen, XXIII. 1) „Männerbart“, Bartgras, fr. barbon, e. beard-grass (v. ἀνήρ, -ρός; Mann, πάγων Bart), z. B. Zier. A. formosus Hort., argentēus DC. u. a.
- Androsäce** T. (Primulaceen, V. 1) „Mannschild“, fr. androsace u. androselle, e. man's-shield (s. eb. u. σάκος, -εος Schild), z. B. Zier. A. villosa L., fr. A. velue, e. shaggy sea-navel-wort, lactea L., lanuginosa Wall.
- Androsaeum** All., G. (sc. Hypericum) L. (subgen. v. Hyp. Lauche) (Hypericineen, XVIII. 2) „Männerblut“, Bluthheil, Grundheil, fr. toute-saine, e. tutsan (gr. ἀνδροσαμμον, s. v. u. αίμα Blut), Zier. A. vulgare G. s. officinale All. s. bacciferum Lam., echtes Konradskraut, offizinelles Mannsblut Vilm.
- Anecochilus** fehlerh. st. Anoectochilus!
- Anemagrostis** Trin. (Gräser, III. 2) „Windhalm“ ἀνεμος; Wind, ἄγρωστι; Feld- od. Ackergras = Agrostis (Apēra P.B.) spica venti L.
- Anemia** (Anemia) Sw. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) Nackt-Mondraute, -Rispenfarn (v. ἀνείμων kleiderlos), z. B. Warmh. adiantifolia Sw.
- Anemōne** L. (Ranunculaceen, XIII. 6) Windröschen, fr. u. e. anémone, fr. auch fleur aux dames, passe-fleur („Pascha“- od. Osterbl.), e. wind-flower (v. ἀνεμος; Wind), z. B. A. nemorosa L., fr. paquette (Osterbl.) od. sylvie, e. limon, pash-rose (pass-) „Osterbl.“, Zier. nemorosa var. alba u. rubra plena Hort., e. double-grove-wind-flower, A. fulgens Gray, fr. briotte (fleischf. Sammt), pavonina DC. (hortensis Hort.), coronaria L. m. v. v. Blumisten-Anemone Rmpl., A. japonica S. Z. m. v. Honorine Jobert, fr. a. du Japon, e. Japanese-w.-fl. u. a. m.
- Anēthum** L. (Umbelliferen, V. 2) Dill, fr. anet, e. dill (gr. ἀνήθον jon. ἀνήσον i. q. ἄρισον Anis, Paxton v. ἄνω adv. hinauf, θέω renne — aufschieß. Wachstum? Wtst. auch αἶθω brenne! — unsicher!).
- Angelica** L. (Umbelliferen, V. 2) „Engelwurz“, Brust-Seub., fr. angélique, e. herb-gerard, ling-wort (long-) (v. ἄγγελος lat. angēlus Engel, davon d. Eigennam. Angelika!).

- Angelōnia** Hb. Bpl. Kth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Angelonie“ (in Caracas, Südamer. angelon), z. B. Gewächsh. A. salicariaefolia Hb. (Caracas), hirta Cham., procumbens Mart. (Schelveria arguta Nees).
- Angianthus** Wendl. (Compos. Leontopodieen Cass., XIX. 2) „Gefäß“- od. Urnenblume (*ἀγγιον* dem. *ἄγγος* Gefäß — jed. Blütch. in besond. Kelch!), z. B. tomentosus W. = Cassinia tom. R. Br.
- Angiospermae (mia)** L. „Hüll“- od. „Decksamige“ (s. eb. u. *σπέρμα* Samen).
- Angophōra** Cav. (Myrtaceen, XII. 4) „Urnen-trägerin“, -myrte (*ἄγγος* s. v., *γορὸς* tragend — verholzter Kelch als Fruchthülle!), z. B. Decorat. A. albicans, florida u. buxifolia, s. Metrosideros G.
- Angraecum** (-grēcum) P. Thouars (Orchideen Vandeen, XX. 1) Angrek- od. Angrek-O. (v. d. malay. angrek od. angrec), z. B. sesquipedalis P. Th. „Anderthalb“-Schuhsporn, s. g. Bourbonthee od. Faamblätter Leun.
- Anguīna** Mehx. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Schlangengurke (anguis Schl.), A. sinensis Mehx. = Cucumis anguinus L. (Trichosanthes ang. L.).
- Angulōa** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Anguloe“ (n. d. span. Nat. Franz. de Angulo), z. B. superba Hb. Bp., grandiflora Kth., Clowesii Ldl., Rueckeri u. Hohenlohi Ldl. (Südamer.).
- Anguria** Hb. Bpl. (sc. Cucumis) L. (Cucurbitac., XXI. 2) Arada-Gurke (*ἀγγούριον* eine Art Melone), z. B. rosca u. umbrosa Hb. Bpl. Stachelgurke (Cuc. echinatus Herm.).
- Anigosanthus** Réd. (**Anoegos.-, Anigozanthus**) Lab. (Amaryllideen od. Hämodoraceen, VI. 1) Röhrenschwertel, „Spalthilie“ (v. *ἀνοίγω* öffne, spalte, *ἀνθος* Wst. v. *ἀνέγω* erhebe — auf hohem Schaft!), z. B. Zier. pulcherrimus Hook. (Neuholl.), coccineus H. P., cruentus Ldl. etc. s. Schwaegrichenia Spr.
- 1) **Anisum** G. (sc. Pimpinella) L. (Umbelliferen, V. 2) „Anis“-Pimpernelle, fr. u. e. anis, e. aniseed (gr. *ἀνισον* i. q. *ἀνιθον* lat. anethum, arab. anysum, Anis u. Dill), s. Anisum vulgare G. 2) **Anisum stellatum** Mat. Med. (Magnolieen od. Illicieen, XIII. 7) Stern-Anis, s. Illicium anisatum L.
- Annona** L. s. Anona Adans.
- Annularia** Sternb. (foss. Equisetaceen, XXIV. 1) „Ring“-Schafthalm (v. annulus Ring).
- Anoectochilus** Blum. (Orchideen Neottieen, XX. 1) „Offenlippe“, s. Anaectoch.- (*ἀνοικτός* geöffnet, *χείλος* Lippe — Form des Labells!).
- Anomathēca** Ker (Irideen, III. 1) „Wunderkapsel“ (*ἀνομάς* sonderbar, *θήκη* Behälter — d. Kaps. öffnet sich nur an der Spitze), z. B. Stuben A. cruenta Lindl. u. juncea Ker; s. Anomaza excisa Laws., Gladö-lus Andrz., Anigozanthus Lab.
- Anōna** Adans. Kth. Spr. (Anonaceen, XIII. 6) Flaschenbaum, Flaschen-, Rahm-, Schuppenapfel Dietr., fr. assimine (-nier) u. ateira, corrossolier u. sappadille (Paxton von menona, Wst. manoa, seinem Nam. in Banda oriental!), z. B. muricata u. squamata L. (Ind. etc.), s. Porcelia Pers. — Anonaceae Rich. DC., -nae Rchb., -ōnae Juss. (zu Ord. Trisepalae Bartl.).
- Anophŷta** DC. Endl. Gefäßlose, eig. „Obergewächse“, Übererdige (*ἀνω-φυτον* Gewächs über der Erde).
- Anoptērus** Lab. (Ribesiaceen od. Gentianeen, V. 1) „Emporflügel“ (*ἄνω* hinauf, *πτέρον* Flügel — Samenspitze geflügelt!), z. B. glandulosus Lab. (Baum, Neuholl.).
- 1) **Antennaria** R. Br. (zu Gnaphalium Rchb.) (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Fühlerpappus“, Katzenpfötchen, fr. antennaire, pied-de-chat, e. chast-weed (v. antenna Antenne od. Fühlhorn eines Insekts — bez. d. Pappus!), z. B. dioeca R. Br. (Gnaphalium dioecum L.)

- m. v. tomentosa, Zier. margaritacëa R. Br. (Gnaph. marg. L.), fr. ant. perlée, immortelle blanche (- de Virginie), e. pearly-antennaria.
- 2) **Antennaria** Lk. Spr. (Schimmelpilze) „Fühler-Schimmel“.
- Anthadenia** Van Houtte (Personaten Sesameen, XIV. 2) „Blumendrüse“ (*ἀνθος* u. *ἀδύη*, -έρος Drüse etc. — Blütendecke zehnstrahlig!). A. sesamoides Van Houtte.
- Anthēmis** L. (Comp. Anthemideen) XIX. 2) Kamille Vilm. Hundskamille, Hermel O. W., Gillen (Schilling, 13. Ausg.), fr. camomille (— romaine, — fétide), e. camomil od. mathes (*ἀνθεμίζ* v. *ἀνθεμύορ* i. q. *ἀνθος*; Wst. *ἀνθος* u. *ἡμύς* halb — alle Strahlenblütch. s. g. Halbblüten!), z. B. Zier. A. nobilis L. römische K., fr. cam. romaine, s. Ormenis nobilis J. Gay; A. artemisiaefolia W. (Chrysanthēnum indīcum Curt.) s. g. Winteraster, u. a.
- Anthericum** L. (Liliaceen, VI. 1) Zaublume, -lilie, Graslilie, Spinnenkraut, Silling O. W., nicht Grasnelke Leun. (was Dianthus Caryophyllus L.!), fr. phalangère, herbe à l'arraignée, e. spider-wort (v. *ἀνθεροίξ*, -ίος Halm — Halmart. Schaft! Wst. v. *ἀνθερόν* blumenreich (?), vielm. *ἀνθηρόν* blühend!).
- Anthistiria** W. (Anthest.-Spr.) (Gramineen, XXIII. 1) „Steifhalmgras“ (v. *ἀνθίστιριμι* widerstehe od. bess. v. *ἀνθη* u. *στέϊρος* steif, straff — steife Halme), z. B. A. glauca W., s. Heteropogon Pers. (zu Andropogon) Rchb. — Anthistiriei Anders.
- Anthoceros** E. Bot. (Lebermoose, XXIV. 2) „Blumenhorn“, Nadel- od. Hörnerschorf, Rosetten-Leberm., Fruchthorn (*ἀνθος* u. *κέρος* od. -ας Horn — hornförm. Blütenträger!), z. B. laevis L. u. punctatus Hoffm.
- Antholyza** L. (Irideen, III. 1) Rachenlilie Rchb., Steinblume D. (s. v. u. *λίσσα* Wut — aufgeriss. Rachen!), z. B. Zier. fimbriata Klatt (Babiana f. Bak.).
- 1) **Anthoxanthum** L. (Gräser, II. 2) Ruchgras, eig. „Blütengelb“, fr. flouve (s. v., *ξανθός* gelb — Staubbeutel gelb!), A. odoratum L. gem. R., A. aculeatum L. f. = Cynopsis acul. Ait. stachl. Scheidenähre. 2) A. (sc. Rumex) Murr. i. q. Rumex maritimus L. (acutus Poll.) goldgelber Ampfer Grck.
- 1) **Anthriscus** Pers. (Umbelliferen, V. 2) Kerbel, Klettenkerbel, fr. cerfeuil, e. bastard-parsley „Bastard-Petersilie“ (gr. *ἀνθρισκος* oder *-θουσζορ*), z. B. A. Cerefolium L. Garten-Kerbel, A. vulgaris Pers., fr. céroflé. 2) A. (sc. Torilis) L. (Umbellif. V. 2) Wald-Borstdolde.
- Anthurium** Sm., Schott (Araceen, IV. 1) „Blütenschweif“ Leun., Schwanz- oder Zipfelblume (*ἀνθος* u. *οὐρά* Schwanz — Blumenscheiden mit Schwanzzipfel!), z. B. Warmh. A. Scherzerianum Schott, leuconeurum Lem., rubrinervium Kth. (äquat. Anden).
- Anthyllis** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Wundklee, Wollblume D., Ive O. W. (v. *ἀνθος* u. *ἰούλος* Milchhaar — flaumige Hüllblätter!), A. Vulneraria L.
- Antiäris** Leschen. (Artocarpeen, IV. 2) „Pfeilgift“ od. Antscharbaum, Upasbaum, fr. bohon-upas (*ἀντί* für, gegen, *αἰγίς* Pfeilspitze — lief. Gift für d. Pfeilspitzen d. Malayen), A. toxicaria Leschen.
- Antidesma** L., P. Br. (Urticac. od. Stilagineen, V. 1 od. XXII. 5) Strickrindenbaum, Bitterstrauch D., s. g. Giftstiller (-mischer), A. alexiteria L. „Abwehrstrauch“ (*ἀντί* gegen, *δέσμα* od. -μός Fessel, Band — weg. d. Gebrauchs d. Rinde).
- Antirrhinum** T. (Scrophularineen, XIV. 2) Löwenmaul, fr. muflet (-flieger), gueule de lion, mufle de veau, e. lion's-mouth, snap-dragon (v. *ἀντί* gleich od. ähnl., *ῥίς*, -ρος Nase — Blumenform!), z. B. Zier. A. majus L. m. v. v., z. B. Däumling od. Tom Pouce, gross. od. welscher Dorant (Orant) Vilm. — Antirrhinēae DC.

- Apargia** Scop. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Löwenzahn, „Apargie“ (v. ἀπό fern, ἀργία Feier etc.? — ungewiss!), z. B. A. hirta Hoffm. (Colobium h. Roth).
- Aparine** T., Mnch. (sc. Galium) L. (Rubiaceen, IV. 1) Klebkraut, Kletten = Labkr., s. g. Bettlersläuse G. Frank, fr. grippe od. rièble (rèble), grateron, e. cleaver, goose-grass (gr. ἀλαρίνη v. ἀλαίρω ergreife — hängt sich an!).
- Apëra** Ad. (Gräser, III. 2) Windhalm, A. spica venti Ad., fr. épi du vent od. éternue éventée, e. addle-oats? (v. ἀπύρος od. -ής nicht verstümmelt — bez. d. zweiten Blütchenansatzes!).
- Apetälæ** Raj. Juss. Kl. der Kron- od. Blumenblattlosen (ἀ priv., λέταλον lat. petalum Kronblatt).
- Aphæca** Presl (sc. Lathyrus) L. (Legumin. Viciaen, XVII. 4) Grossehrwicke, fr. lisette (v. ἀ pr. u. γάκη Linse — unechte Linse!), A. vulgaris Presl, s. Oröbus Aphæca Döll.
- Aphænes** L. (sc. Alchemilla) Leers (Rosac. Dryadeen, IV. 1) Feld-Sinau Grck., A. arvensis L., fr. brise des Anglais (v. ἀφανής unscheinbar), s. Alchemilla arvensis Scop.
- Aphelandra** R. Br. (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Einzellen-Anthere“ (ἀγε-λής einfach, ἀρήφ. -ιδος Mann, Staubbeutel), z. B. Warmh. u. Stube A. variegata Morel, aurantiæca Nees, Liboniana Hort. Lind. etc., s. Ruellia u. Justicia.
- Aphyllæ** (sc. Cryptogamæ) DC. Blattlose Kryptogamen (ἀ pr. u. φύλλον Laubblatt).
- Apiëra** W. (Liliaceen Aloideen, VI. 1) „Ohnbitter“-Aloe (ἀπιζος nicht bitter), z. B. A. viscosa (Aloë v. L.).
- 1) **Apios** Boerh. Pursh (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Birnwurz“-Süßbohne, Erdbirne (-nuss), Knollenwicke D. (v. ἀπιον Birne, — essb. birnf. Wurzelknollen), A. tuberosa Pursh, fr. apios tubéreux, e. tuberous-rooted Apios, s. Glycine Apios L. 2) **Apios** (sc. Euphorbia) L. (Euphorbiac., XI. 3 od. XXI. 1) Birn-Wolfsmilch, fr. apios od. fausse angélique „Erdmaus“-Euphorbia Wolff.<sup>1)</sup>
- Apium** Hoffm., L. (Umbelliferen, V. 2) „Eppich“ od. Sellerie, fr. célerie od. esprault, e. celery (selery) (v. d. celt. apion Wasser, Paxton, od. ἀπιον Birne, od. st. apiacum „Eppich“ v. apis Biene? — ungewiss!), A. graveolens L., fr. persil des marais „Wassereppich“ Wolff<sup>1)</sup>, s. Sium Apium Roth, Sesëli graveolens Scop. u. Apium Celeri G.
- Aplüda** L. (Gräser, XXIII. 1) „Spreugras“, Stumpfgr. D. (ἀπλοῖδα Spreu, Plinius: Gras m. klein. dünn. Halm, v. ἀπλοῖς einfach etc.), z. B. A. mutica L. etc.; A. gigantëa Spr. = Calamüna g. P. B., s. auch Andropögon.
- Apocynëae** Juss. R. Br. DC. Rchb. (zu Contortae Rchb.), -nacëae R. Br., Grck. Hundswürgerartige, fr. apocynées.
- Apocynum** L. (Apocynen, V. 1) Hundswürger, -kohl, -wolle D., fr. apocyn u. cynangue, étriangle-chien, e. dog-bane (gr. ἀπόκυνον Hundetod v. ἀπό weg, ab u. κύων, κύνος Hund), z. B. androsaemifolium L. Mückenwürger od. Fliegenfalle, fr. a. gobe-mouche, e. tutsan-leaved apocynum.
- Aponogëtum** (-on) Thb. (Piperaceen od. Alismaceen, VII. 3 od. XI. 3) „Wasserkraut“ (v. d. celt. apion Wasser u. γέτω; Verbaladj. v. γέτω erzeuge), z. B. Zier. A. monostachyum L. (Saururus natans L. f.), distachyum Thb. etc.
- Aposëris** Neck. (zu Hyosëris Rchb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Drahtstengel (-, Endivie<sup>1)</sup>), Sengel O. W., Schweinesalat Seub. (ἀπό

1) S. das neue Franz.-deutsche etc. Wörterbuch v. Dr. H. Leng u. Dr. O. L. B. Wolff, Weimar, Paris u. Strassb. 1836 (Neue Aufl. Wolff).

weg, ohne, *σέλις* Salat — keine ord. geniessb. Blätter), z. B. foetida Neck. (Hyosérís f. Rehb., Lapsana f. W.).

**Aquatīcae** Endl. Kl. d. Wasserkräuter od. -quirle (-sterne).

**Aquifoliaceae** DC. Rehb. Græk. (zu Sapotacae Rehb., Ord. Tricoccae Bartl.), s. sogl.

1) **Aquifolium** (sc. Plex) L. (Aquifoliaceen, IV. 4) Stechpalme, -eiche, eig. „Wasserblatt“ (— weg. d. Glanzes!) (aqua u. folium, Wtst. st. acuifolium v. acus Spitze — Stachelblatt!), fr. laurier épineux, houx, épine verte, e. holly-tree. 2) **Aquifolium** foliis deciduis Duham., s. Prinos verticillatus L. (Sapotac., IV. 1) (Str. Virgin.).

**Aquilaria** Lamb. (Thymeläen od. Aquilarien, X. 1) Adler- od. Aloëholz D., fr. aquilaire, bois de calambac, e. eagle's-wood (v. aquila Adler), z. B. ovata L., malaccensis, fr. calambour grünl. Adlerh.

**Aquilegia** L. (Ranunculac., XIII. 5) Agley od. Ackelei, eig. „Wasser-sammlerin“, fr. ancolie, fleur de parfait amour, e. columbine (v. aquila? wahrsch. v. aqua u. lægo sammle — Wassertropfen in d. Blattwinkeln, latinis. Ackelei Mej.), z. B. Zier. A. vulgaris L. Frauenschuh od. Pantöffelchen, s. g. Narrenkappe Vilm., fr. aiglatine od. colombine, A. anemonoides W. (Isopyrum anem. Hort.), A. sibirica Lam. v. fl. pl., A. Skinneri Hook., chrysantha Gray, canadensis L., etc.

**Arabis** L. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) Gänsekresse, -kraut Seub., Gonne O. W., fr. arabette, e. wallcress (*Ἀραβ.*, -βος Araber, Wtst. viell. veränd. st. Iberis — ?), z. B. Zier. alpina L. (verna Hort.), fr. ar. printanière, corbeille d'argent, tourette, e. rocky-wall-cress, A. arenosa Scop., fr. ar. de sable, e. sandy-w.-cr.

**Aracacha esculenta** DC. (Umbelliferen, V. 2) „Arakatscha“ (südamer. Culturpfl. — vaterländisch!).

**Aracaeae** Græk. i. q. Aroidae Juss. DC. Arongewächse, s. Arum.

**Arachis** L. (Cäsalpinieen, X. 1 od. XVII. 4) Erdeichel (-nuss), A. hypogaea L. (Südamer.), fr. arachide, pistache de terre (pois de terre), e. ground-nut (v. ἄ priv. ῥάχις Grat, Dorn, gr. ἀράχιδνα eine Hülsenfrucht, Fr. Riemer's Lex.).

**Aractium** Monn. Neck. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Schüsselbl.“ (?), A. paludosum Neck. (Hieracium p. L., Crepis p. Mnch.) (schwerl. v. ῥόαχις i. q. γιάλις Schale etc., sond. Wtst. nur d. veränd. Hieracium!).

**Aralia** L. (Araliaceen, V. 5) Doldeneppich, fr. aralie (v. d. canadischen Namen), z. B. papyrifera Hook. Reispapierpfl. Leun. (China), edulis Zucc. Beeren- od. Bergangelika Leun., spinosa L. (japonica Hort.) Angelikabaum, fr. Angélique épineuse, e. Angelica-tree, Stuben A. Sieboldii Hort. (japonica Thb.), elegantissima Hort. (Neucaledon.) etc. — Araliacae DC.

**Araucaria** Rz. Pv., Juss. (Coniferen, XXI. 9) Schuppen- od. Chilitanne Vilm., Schmucktanne (n. Arauca, dem Lande der Araukaner im südl. Chili), z. B. Zier. A. imbricata Pv. echte Sch., „Ziegel“-Araukarie, A. excelsa Ait., s. g. Norfolkfichte, brasiliensis Pv., Gewächsh. A. Bidwillii Hook. u. a.

**Arbutus** L. (Ericaceen, X. 1) Sandbeere, Meerkirsche, Erdbeerbaum, fr. arboise (-bousier), e. strawberry-tree (n. d. celt. ar rauh, but Busch, od. d. celt. arboise Herbbeerenbusch, Paxton), z. B. unedo L. u. uva ursi L., fr. cracra, bousserolle, raisin d'ours; s. Arctostaphylos Adans.

**Archangelica** Hoffm. (sc. Angelica) L. (Umbelliferen, V. 2) „Erzengelwurz“, fr. archangélique (vgl. Angelica) (v. ἀρχάγγελος; Haupt- od. Erzengel — Hervorheb. ihr. Heilkraft!).

**Arctium** L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Klette, fr. glouteron, e. bur, burdock (hardock) (v. ἀρκτηίος vom Bären — stachel. Köpfe!), z. B. A. Bardanum L., fr. bardane, u. a.



- Arctocālyx** Fenzl (Gesneriaceen, XIV. 2) „Klettenkelch“ (*ἀροτος* Bär, *καλλιξ* Kelch), z. B. *Endlicherianus* Van Houtt.
- Arctostaphylos** Adans. (Ericaceen, X. 1) „Bärentraube“, Grante O. W., fr. raisin d'ours, e. bear-berry (s. eb. u. *σταφυλή* Weintraube), z. B. *A. uva ursi* Spr. s. *officinalis* Wimm. Grab. = *Arbutus* u. u. L.
- Arctotis** L. (Compos. Calendulac. od. Arctoideen, XIX. 4) „Bärenohr“ (s. v., *ὄτις*, *ὄτος* Ohr), z. B. *calendula* L. var. *tristis* etc.
- Ardisia** Sw. W. (Myrsineen od. Sapotaceen, V. 1) „Pfeilspitzkrone“, Spitz- od. Spitzenblume (v. *ἀοδίζ* Pfeilspitze — bez. d. Kronzipfel!), z. B. *Stuben crenulata* u. *mollis* s. *villosa* Sw., *excelsa* W. (*Angullaria bahamensis* G.). — *Ardisiaceae* Juss. (Ord. Myrsināe Bartl.).
- Arēca** L. (Palmen, XXI. 8) Betelnusspalme, Catechu- od. Pinangnuss-P., fr. arec (-quēr) (n. d. malabarisch. Nam. arec, ganz jung *per-rynga*, Paxton), z. B. *oleracēa* L. Kohlpalme, fr. palmiste franc, chou-palmiste, e. cabbage-tree, Gewächsh. *A. alba* Bory (Ins. Bourbon), *rubra* Bor. (Mascarenen), *Catechu* L. (Ostind.) u. a. — *Arecināe* Mart.
- Arenaria** L. (Alsineaceen, X. 3) „Sandkraut“, fr. sabline od. sablonnière, e. sand-wort (*arēna* Sand).
- Arenga** Lab. (Palmae. Phoenicieen, XXI. 8) „Arenge“-Palme (*areng*, d. vaterl. Name!), z. B. *saccharifera* Spr. (*Gomutus saccharifer* autt.) echte Zucker- od. Gamouti-P., s. g. Sagueer, Weinpalm, s. Borassus.
- Arethusa** Sw. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Arethuse“, Runzelbart D. (*Arethusa*, die in eine Quelle verwand. Nympe der Diana, Myth.), z. B. *Warmh. A. capensis* L., *bulbosa* L., etc.
- Aretia** W. (Primulaceen, V. 1) Alpen-Mannsschild (n. Bened. Aretius, Prof. in Bern, † 1574), *A. helvetica* L. (*Diapensia* h. Jacq.), s. *Androsāe alpina* Lam.
- Argania** Schousb. (Sapotaceen, V. 1) marokkan. Eisenholz, *A. Sideroxylon* Schousb. (v. *argan*, d. marokk. Nam.), s. *Sideroxylon spinosum* L. u. *Elaeodendron Argan* Retz (*Rhamnus siculus* L.).
- Argemone** T. (Papaveraceen, XIII. 1) Sand- od. Stachelmohn, fr. argémone, pavot épineux, e. prickly-poppy, s. *Papaver spinosum* Bauh., Zier. *A. grandiflora* Sweet (gr. *ἀργεμώνη* v. *ἀργεμα* Stopfen auf d. Auge — wogeg. gebr.!).
- Aria** Crantz (sect. Sorbus Host) (Pomaceen, XII. 3) Mehlbaum (-beere, -birne), fr. viorne, e. mealy-tree (v. Arien in Persien), z. B. *A. latifolia* Pers. s. *Crataegus A. L.*, *Pirus A. Ehrh.*, *A. intermedia* Pers. (*Crat. Ar. β. suecica* L.), *alpina* W. (*Pirus alp.*) u. *hybrida* L. (*Crat. Ar. β. fennica*).
- Arisarum** T. (Aroideen, XXI. 9) kleiner Aron (gr. *Ἀρίσαρον*, eine Aronart), *A. vulgare* Targ. Tozz. = *Arum Arisarum* L. s. *serpentinum* Barr., *A. potamogetonifolium* Bocc. = *Ambrosinia Bassii* L.
- Arisēma** Benth. (nicht -aema Mart.) (Aroideen, XXI. 1) Flecken-Aron, „Aron“-„Zeichen“ (*Arum* u. *σήμα* Zeichen etc.), z. B. Zier. *A. prae-cox* de Vries (Jap.) u. *ringens* Schott.
- Aristēa** (-aēa) Ait. Ker (Irideen, III. 1) „Grannen“-Schwertel, Borstenlilie D. (v. *arista* Granne — so zugespitzte Blätt.), z. B. *cyanēa* W. (*Ixia* s. *Moraea africana* Hort.), *angolensis* Bak. (Nied.-Guin.).
- Aristolochia** L. (Aristolochieen, XX. 3) Osterluzey, Heberblume Rmpl., Hohlwurz, fr. poire à putin, aristolochie, e. aristolochy, birth-wort „Geburtswurz“, auch sarrasine (gr. *ἀριστολογία* Kraut zur Beförd. d. Geburt, *λογεία*), z. B. Zier. *A. Siphon* l'Hér. (*macrophylla* Lam.) gem. Heberbl., Pfeifenstrauch, -kopfstr. (Nordamer.), *tomentosa* Sims (daselbst), *sempervirens* L. s. *Pistolochia cretica* Moris. — *Aristolochiāe* Juss., -iāe Bartl. Ord. d. Osterluzeygew., -iacēae Grck.
- 1) **Aristotelēa** W. (Tiliaceen, XI. 1) Aristotelesstr., chilenischer Jasmin,

A. macqui l'Hér. (glandulosa Rz. Pav.) echter. 2) **Aristotelia** Lour. (Orchid. XX. 1), z. B. spiralis (Neottia sinens.). 3) **Aristotelia** l'Hér. (Ribesiaceae). 4) **Aristotelia** Ad. (Compos.) (n. d. griechischen Philosophen Aristoteles, † 322 v. Chr.).

**Armeniäca** T. (sc. Prunus) L. (Juss. subgen. v. Prunus) (Amygdalac. od. Drupaceen, XII. 1) Aprikosenbaum, fr. abricotier, e. apricot (-cock) -tree (n. d. Lande Armenien, arab. alberkuk, span. orient. barcock etc., Mej.), z. B. A. vulgaris Lam. (epirotica Fl. Wett.) m. v. v., brigantiäca Vill. Aprik. v. Briançon, tomentosa Thb. etc.

1) **Armeria** W. (Plumbagineen, V. 5) Gras- od. Sandnelke, Nelkengras, Pinke O. W., fr. gazon d'Espagne (v. d. celt. ar nahe u. mor Meer), z. B. A. vulgaris W. (maritima Mill., pubescens DC.), e. common sea-lavender, s. Statice Arm. L. 2) **Armeria** (sc. Silene) L. (Silenac., X. 3) Garten-Silene, Klebbuschnelke, s. g. Morgenröschchen, fr. Silène à bouquets, e. Lobel's Catchfly od. Fleabane „Fliegengift“. 3) **A.** (sc. Dianthus) L. (Caryophyllen, X. 2) rauhe od. Büschelnelke Grck., M.-Rchb.

**Armeriopsis** Boiss. (Plumbagineen, V. 5) „Nelkengrasgleiche“ (zu Statice L.) (s. eb. u. ὄψις Aussehen).

**Armillaria** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Armband-“ od. Ringpilz (armilla Armband, Manschette), z. B. melléa Honiggelbling, s. g. Hallimasch Kumm. (essb.) etc.

1) **Armoracia** Fl. Wett. (sc. Cochlearia) L. (Crucifer. Siliculos. XV. 1) Meerrettig (Mähr-, Mer-), Kreen O. W. (s. Armeria od. v. Armoracium Bretagne), A. rusticana Fl. Wett. s. sativa Hell., fr. raifort-sauvage, moutarde des Allemands, grand raifort, e. horse-radish, russ. chren. 2) **Armoracia** Bl. u. Fing., F. W. Mey (zu Nasturtium R. Br.) (Crucifer. Siliquos. XV. 2), z. B. amphibia F. W. M., austriäca Bl. Fing.

**Arnica** L. (Compos. Radiaten, XIX. 2) Wolverlei (Wohlverleih), fr. arnique, plantain de montagne. A. montana L. (v. ἀρνίον Lämmchen od. ἀρνάκι; Lammpezl — weg. d. Blätt., Paxton).

**Arnosëris** G., Bernh. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Lämmersalat“, Lammkraut Grck. (ἀρνός Gen. v. ἀρνῶν Widder, σέρις Salat), s. Hyoseris L.

**Aroidëae** DC. (Aracëae Grck.) Bartl. Ord. d. Arongew., fr. aroides (εἶδομαι gleiche).

1) **Aronia** Pers. (zu Pirus Rchb.) (Pomaceen, XII. 4) Felsenbirne, -mispel Leun., Schwarzbirne Rmpl., Bastard-Eberesche (Abänd. d. Worts Aria, s. d.), z. B. wild u. Zier. A. rotundifolia Pers. (Amelanchier vulg. Mnch., Sorbus Amelanchier Crantz, s. Aronia K. Koch), arbutifolia Pers. (floribunda Spach, Pirus florib. Lindl. Mespilus arbutifol. var. melanocarpa Mehx.), grandifolia Spach (Pirus gr. Lindl.), pirifolia Pers. (Crataegus p. Lam. s. serrata Poir.) etc. 2) **Aronia** (sc. Crataegus) Bosc. Aronia-Dorn (Mespilus Aronia W.).

**Arrhatherum** P. B. (zu Holcus Rchb.) (Gräser, III. 2) Glatt- oder Wiesenhafer, A. elatius P. B., fr. ray-gras de France „franz. Ray-gras“, e. french reed-grass, auch fr. avoine élevée (Avena elatior L.) u. faux-fromental (fromental) „falscher Weizen“ s. Holcus avenaceus Scop. (v. ἀρονη männlich u. ἀρόη Spelze, Hachel- — näm. an d. männl. Blüthen! Wst.).

**Artemisia** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Beifuss<sup>1)</sup>, fr. armoise, herbe de Diane (n. d. Göttin Artemis od. Diana, als Lucina Göttin der Geburt, — zur Beförd. früher Mannbarkeit angewandt), e.

1) Nach Schmitthenners deutsch. Etymologie: pipôsz dazu gestossen, also „Gewürz“, v. pôszan stossen; aus pôsz später „Fuss“!

mug-wort, moth- od. worm-wort, z. B. *A. glacialis* L. Gletscher-B., fr. gênépi, *A. campestris* L., fr. armoise des champs „Feld“-B., *A. vulgaris* L., fr. auch herbe de St. Jean; Zier. *A. Stelleriana* Bess., *argentæa* Ait., *annua* L., *gracilis* Hort. (procœra W.), *Abrotanum* L. u. *Absinthium* L. (s. d.) u. *salina* W. — *Artemisiæ* DC. Less.

**Arthrolobium** Desv. (Leguminos. Hedysareen, XVII. 4) „Glied“- od. „Gelenkhülse“ (*ἄρθρον* Glied etc., *λίγιον* dem. *λίγιος* Hülse etc.), z. B. *scorpioides* Desv. s. *Ornithöpus scorp.* L.

**Artocarpus** L. (Urticaceen Artocarpeen, XXI. 1) „Brotfruchtbaum“, fr. artocarpe u. jaquier (*ἄρτος* Brot, *καρτὸς* Frucht), z. B. *A. incisa* L., *integrifolia* (Warmh.) *imperialis*; s. *Rademachia incisa* etc. Thb. — *Artocarpæe* Bartl. DC. (zu Ord. *Urticinae* Bartl.).

**Arum** L. (Aroideen od. Callaceen, XXI. 9) Aron, Aronswurzel Seub., Dutenkolbe, Zehrwurz Leun., Zahnkraut Rmpl., fr. arum, gouet, piéd de veau, pain de lièvre, chou-poivre, e. aron, wake-Robin, cuckoo-pintle „Kukukszapfen“, calves-foot, fever-root, séguine (gr. *ἄρον*, v. *ἄροω*, lat. *aro* ackere, zeuge?), z. B. *A. maculatum* L. Pfaffenkind, deutscher Ingwer Leun., *A. dracunculū* L. „Drachenzwurz“, fr. gouet serpenteire, e. snake- od. hare-mint, *A. crinitum* Ait., fr. gouet chevelu, *italicum* Mill. etc.

**Aruncus** (sc. *Spiræa*) L. (Rosaceen Spiræaceen, XII. 4) Geisbart, Berg-Geiswedel, Johannswedel etc.), fr. barbe-de-chèvre (- de bouc), e. goat's-beard (lat. *aruncus* Geisbart).

**Arundinaria** Mchx. (Gramineen, III. 2) Ludolphsrohr, fr. arundinaire, e. reed-grass (-plant) (v. *arundo*, -inis Schilfrohr), z. B. Blattpfl. *A. falcata* Nees (Bambusa s. *Arundinacea falc.* Hort.) „Sichelbambus“, s. *Ludolphia* W.

**Arundo** P. B. (Gramineen, III. 2) Schilfrohr, fr. roseau od. canne, e. reed, z. B. Zier. *A. Donax* L. (*Donax arundinacæa* P. B.) n. v. *variegata* Hort., fr. roseau des jardins, canne de Provence, e. large-leaved reed; mauretanic Desf., fr. roseau d'Algérie.

**Asa foetida** Kämpf. (nicht Assa!) (sc. *Ferula*) L. (Umbelliferen, V. 2) Stinkasant, Teufelsdreck = Steckenkraut, e. benjamin (v. *ἄσση* Ekel).

**Asarca** Lindl. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Fleischlose“, Magerorchis (*ἄσαρξος* fleischlos), z. B. Warmh. *speciosa* Ldl. (*Serapias gavilu* Pav.).

**Asarinæe** R. Br. (zu *Aristolochiæe* Rchb.), s. sogl. *Asarum*.

**Asarum** L. (Aristolochiæen Asarineen, XI. 1) Haselwurz, eig. Asarwurz Mej., fr. asare, calavet, oreille d'homme, échalotte, échaloinne, nard-sauvage, épi sauvage, rondelle etc., e. hazel-wort, wild spike-nard, assaraback (-bacca), cabarick (*ἄσαρος* astlos) *A. europæum* L., s. *Hypocistis* Beckm.

**Ascalonicum** (sc. *Allium*) L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Schalottenzwiebel, fr. ascalonite, e. eschalot od. scallion (v. Askalon in Palästina).

**Asclepiadæe** R. Br., Rchb. -**dacæe** Grck. (zu Ord. *Contortae* Bartl.), s. sogl. *Asclepias*.

**Asclepias** L. (Asclepiadeen, V. 2) Seidenpflanze, Schwalbenwurz, fr. asclépiade, dompte-venin, herbe de St. Laurent, fleur à mouche, e. swallow-wort, milk-weed (n. *Ἀσκληπιῶς* od. Aeskulap, d. Gott d. Ärzte), z. B. Zier. *A. syriaca* L., fr. ascl. de Syrie, herbe à la ouate (- à coton) „Wattenkr.“, e. virginian sw.-w. od. milk-w., *tuberosa* L., *curassavica* L., e. blood-flower, *incarnata* L., fr. couleur de chair, e. incarnate sw.-w., *carnosa* L. (*Hoya carn.* R. Br.).

**Ascobolus** Pers. Nees (Pilze, XXIV. 4) „Schlauchschneller“ (*ἄσπος* u. *βόλος* Wurf — d. Sporenschläuche springen auf u. werfen d. Sporen umher), z. B. *furfuracæus* Pers., s. *Peziza*.

**Ascophōra** Tod., Nees (Pilze, XXIV. 4) „Schlauchträger“, fr. ascophore

- (s. eb. u. *φορὸς* tragend), z. B. Mucēdo Schimmel. — Ascophōri (zu Hymenomycetes) Corda.
- 1) **Ascyron** (sc. Hypericum) L. (Hypericineen, XIII. 2 od. XVIII. 4) „Männerblut“, fr. ascyre (v. *ἄσχυρον* i. q. *ἀνδρῶσαιμον* Manns- od. Männerblut, Wtst. i. q. *Hypericum perforatum* L. — d. Blütenknospen geben zerdrückt blutroten Saft von sich! n. Paxton: *ἀ* priv. u. *σχυρὸς* od. *σχυρῶς* hart — also weich anzufühlen!) s. Androsaceum (s. d.). 2) **Ascyrum** L. (sect. v. *Hypericum*), z. B. *Crux Andree* L. „Andreaskreuz“.
- Asimīna** Adans. (Anonaceen, XIII. 6) Flaschenbaum, Papau (canad. Name) (Etym. umbek.), z. B. *A. triloba* Dun. nordamer. Papau s. *Anōna* tr. L. (*Uvaria* tr. Torr. Gr., *Orchidocarpum arietinum* Mchx. u. *Porcellia* tr. Pers.).
- Aspalathus** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Dornhülsenstr., s. g. Witschen D., fr. aspalathe, pied d'oise (gr. *ἀσπιάλαθος* ein Dornstr.), z. B. *A. spinosa* L., *indica* L. Ebenholz v. Madagaskar, s. *Lotus tenuifolius* Pluk.; *A. Ebēnus* L. amerik. Ebenholz (Bstr. Westind.).
- Asparagi** Juss., fr. Aspariginées, Asparagoïdes Spargelartige, s. sogl.
- Asparagus** T. (Liliac. Asparigineen, VI. 1) Spargel, fr. asperge, e. asparagus (sparagus), sparagrass, sparrow-grass (gr. *ἀσπιάραγος* n. Paxton: *ἀ* int. u. *σπιαράσσω* zerzupfe — bez. d. Blätter!), z. B. *A. officinalis* L. (altilis Aschers.).
- Aspasia** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) *Aspasia* (*Aspasia*, Freundin v. Perikles in Athen, Wtst. v. *ἀσπιάσιος* angenehm, nicht Paxton v. *ἀσπιάζομαι* umfasse), z. B. *epidendroides* Ldl. (Amerika).
- Asperifolia** L., -foliaceae Rchb. „Scharfblättrige“, i. q. Boraginēae Juss. (*asper* u. *folium*).
- Asperugo** L. (Boragineen, V. 1) Scharfkraut, Schärfling O. W., fr. rapette, porte-feuille (v. *asper* rauh etc.).
- Asperula** L. (Rubiaceen od. Stellaten, IV. 1) Waldmeister, Meister O. W., Meierkraut Viln., fr. aspérule, rubéole, hépatique étoilée, moscateline, muguet od. hépatique des bois (s. eb.), z. B. *A. odorata* L. s. g. Maitrank, fr. auch reine des bois, e. wood-ruff, sweet-scented-Squinancy, *A. cynanchica* L. Bräunewurz, fr. herbe à l'esquinancie (petite garance, rubéole), *A. arvensis* L. (Rubeōla coerulēa Bauh.), Zier. *A. azurea* Spach, e. sky-coloured-wood-ruff.
- Asphodelēae** Bartl. DC., -li Juss. (zu Liliacēae Bartl.) „Affodile“, Lauchartige.
- Asphodelīne** Rchb. (zu *Asphodēlus* L.), z. B. *lutēa* Rchb., fr. fleur od. belle d'un jour, s. *Asphodēlus*.
- Asphodēlus** L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Affodil“, Lauch, Gilbwurz, Schopflilie, fr. asphodèle, e. asphodel u. daffodil (daffodil-lily) (gr. *ἀσφῳδέλος*), z. B. *A. lutēus* L., fr. fleur od. belle d'un jour, e. day-lily.
- Aspidīstra** Ker (Liliac. Asparigineen od. Acoraceen, VIII. 1) Schild- od. Wurzelblume, Korbstempel (v. *ἀσπιδίον* Rundschildchen u. Wtst. *ἀστρον* Stern u. Bild), z. B. *Stuben A. elatior* Decsn. = *Plectogyne variegata* Hort.
- Aspidium** Sw. (Polypodiaceen-Farne, XXIV. 1) Schildfarn, fr. aspidie, e. shield-fern (s. eb. — Schildform d. Sporenbälter!), z. B. Zier. *A. aculeatum* Sw. (*Polystichum* ac. DC.), *A. angulare* Kit. (*Polyst.* ang. Presl), *A. Filix mas* Sw. (*Polyst.* s. *Polypodium* F. m. L.), Bandwurm-Waldfarn W. „Farnkrautmännchen“ m. v. v. etc., s. *Nephrodium* Rich. „Nierenfarn“.
- Aspidosperma** Mart. (Contorten, V. 1) „Schildsamem“ (*ἀσπις*, -είδος Rundschild, *σπέρμα* Samen), z. B. *macrocarpon* Mart., *Quebracho* (Q. blanco = Rinde) (Brasil.).

- Asplenium** L. (Farne, XXIV. 1) Strich-, Streifen- od. „Milzfarn“, fr. asplénion, e. scal-fern (v. ἀσπληνον Milzkraut — strichförm. Sporangien!), z. B. Decor. A. Adiantum nigrum L., Kalth. bulbiferum Forst., falcatum Lam. (Ostind.), flabellifolium Cav. (Neuholl.), Warnuh. cicutarium Sw. (Jamaika), pulchellum Radd. (Bras.) etc.
- Aster** L. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Aster“, Sternblume, fr. astère, étoilée, reine Marguérite, e. aster, cod- od. star-wort (gr. ἀστὴρ. -έρος lat. aster Stern), z. B. Zier. A. chinensis L. v. v., fr. Reines Marguêrites couronnées „Cocardenastern“, Rosenaster, Topf. A. alpinus L., ferner Gart. formosissimus Hort., fr. a. très-élégant, e. very-nice a., A. Novi-Belgii Nees, Novae-Angliae Ait., horizontalis Hort. (pendulus Ait.) u. a. — Asterœae DC., -inœa Rich.
- Asterocephalus** Vaill. Spr. (Dipsaceen, IV. 1) „Sternkopf“, Grindrose od. Scabiose (s. eb. u. ζεφάλη Kopf), z. B. A. Columbaria Vaill. = Scabiosa Col. L. (Trichera C. Schrad.).
- Astilbe** Hamilt. (Saxifragaceen, X. 2) „Ohnglanz“ (à pr., στῆλη Glanz — keine besond. schöne Blüt. Wtst.), z. B. Zier. A. rivularis G. Don, fr. A. des rivages, e. bearded-Spiraea, s. Hoteia japonica Decsn. (Spiraea jap. Hort. s. barbata Wall.).
- Astragalus** L. (Legumin. Astragaleen, XVII. 4) Wirbelkraut, Traganth, Stragel Seub., Bocksdorn Vilm., fr. astragale, adragant (dragant), barbe de renard, e. milk-vetch „Milchwicke“ (ἀστρογάλος Halswirbel — die untere Hülsennaht eingedrückt!), z. B. Zier. galegiformis L., e. goat's-rue-like milk-vetch, A. Tragacantha L., fr. tragacanth, e. tragacanth „Bocksdorn“.
- 1) **Astrantia** T. (Umbelliferen, V. 2) Sterndolde, Doldenstern, Thalstern, schwarze Meisterwurz, fr. astrance, radiaire, e. master-wort (v. ἀστὴρ u. ἀντιος entgegenkommend — Gegenstück bildend!), z. B. major L., fr. astr. élevée, sanicle fenelle, e. greater master-wort, A. Epipactis L. f. (Hacquetia Ep. DC.), helleborifolia Salisb., minor Scop., e. smaller m.-w. 2) **Astrantia** africana Mor. (Ranunculac., XIII. 7) = Adonis capensis L.
- Astrapea** Lindl. (Malvaceen, XVI. 7) „Blitzmalve“ (αστραπαῖος blitzend — brillante Blume!), z. B. A. speciosa Ldl. (Pentapetes speciosa W., B. Ostind.).
- Astrocephalus** Vaill. s. **Astero-**
- Astrocarpa** (-on, -um) W. Mey., Mart. Spr. (Palmaceen Phoeniceen, XVI. 1) „Sternnuss“ (s. v., ζάκρον Nuss), z. B. A. Borsigianum C. Koch, s. Stevensonia.
- Ataccia** Presl (Aristolochiëen Taccaceen, VI. 1) Arrowrootpflanze (à int. u. Tacca), z. B. cristata Presl, s. Tacca integrifolia autt.
- Athamanta** Koch (Umbelliferen, V. 2) Bären- od. Heilwurz M.-Rchb. Grundheil, Augenwurz Grck., fr. athamante od. grande-berce, e. fluellin, speed-well (v. Ἀθάμας, -αντος Myth. Vater v. Phrixus u. Helle), z. B. A. cretensis L. (Libanotis cr. Scop.), s. Mëum.
- Athanasia** Cass. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Unsterblichkeitsblume“ (?), Athanasius-Rainfarn, Immortelle, Jüngling D., fr. athanasie (gr. ἀθανασία v. à u. θάνατος Tod? od. n. Athanasius, s. d. Aut.), z. B. Zier. annua Hort. (Tanacetum ann. L., Balsamita a. DC.), Athanasiœae Less. DC.
- Athyrium** Roth (Polypodiac.-Farne, XXIV. 1) Frei-, Bogen- (Seub.), Strichfarn Rmpl.; fr. athyrium fougère femelle, e. lady's fern (v. ἀθύριος ohne Thüre, frei — nämlich d. Sporangien!), z. B. A. Filix femina L. m. v. Goeringianum pictum u. v. Elworthii Hort., s. Aspidium Filix femina L.
- Atossa** Alfld. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) Zaunwicke, fr. vesceon, e. hedge-vetch (persischer Frauenname!), s. Vicia sepium L.

- Atractylis** Scop. L. (zu Carthämus Rchb.) (Compos. Carduaceen oder Carlineen, XIX. 1) „Spindel“- od. Rockendistel, Wollen-Saffor, fr. quenouillette (v. ἀτρούλιος dem. ἀτρούλιον Spindel etc. — Stengel wollig, wie eine solche u. ebenso benutzt, Wst.), *A. lanata* Scop. s. *Acarna* W., s. *Carthämus lanatus* L. (*Heteracantha lan.* Lk., *Centrophylum* l. Rchb.).
- Atragène** L. (Ranunculac. Clematideen, XIII. 6) Alpenranke, -rebe Seub., Doppelblume D., Kletterrose, fr. atragène (ἀτραγενή Theophr. n. Wst. *Clematis cirrhosa*! nicht ἀτραγίς, eine Distel), Zier. *A. alpina* L. (*Clematis alp. geraniifolia* Moris.), *austriaca* Scop., *Clematidis Crantz*, *sibirica* L. (*Clematis sib.* Müll.), *americana* Sims (*Clem. verticillaris* DC.).
- Atraphaxis** L. (Polygoneen, VI. 2) Knöterichmelde, Strauchm. D., s. g. Bockswitzen (ἀτραφαξίς, lat. *Atriplex* v. *a* priv. u. *τρέγω* nähre — ohne sonderl. Nahrung!), z. B. *undulata* L. (*Polygonum atraphaxoides* Thb.), s. *undulatum* Berg.
- Atriplex** L. (Chenopodiaceen od. Atriplicaceen, XXIII. 1) Melde, Mille, fr. arroche, e. arrach (arach) u. orach, auch notch-weed „Kerblatt“ (v. *ater* in comp. *atro-* schwarz? od. *α* intens. u. *triplex* dreifach — näml. Fruchthülle — unsicher!), z. B. geb. *A. hortensis* L. m. v. v., z. B. (Zier.) *atrosanguinea* Hort. Blutmelde u. *cupreato-rosa* Hort., erstere fr. Belle Dame (Bonne-) u. Follette, e. dark purple-coloured Garden-Orach. — *Atriplicaceae* Rchb., -*caceae* R. Br.
- Atropa** L. (Solaneen, V. 1) Wolfs- od. Tollkirsche, fr. morelle furieuse, bouton-noir, e. mad-apple, s. g. *Belladonna*, *A. Belladonna* L. (Mittel z. Verschön. d. Augen), fr. belle-dame od. belladonne u. follet (v. ἀτροπιος unabwendbar — näml. d. Tod!).
- Attalä (-lia)** Hb. Bpl. Kth. (Palmen, VI. 1) „Attalus“-P. (n. Attalus I., Kön. v. Pergamus, † 198 v. Chr., n. Paxton v. attalus prächtig (?), vielm. attalicus attalisch, auch glänzend etc.), z. B. Warmh. *A. funifera* Mart. „Seilpalme“ (Bras.), *compta* Mart., *excelsa*, *humilis* u. *speciosa* Mart. (Bras.).
- Aubrietia** Adans. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Aubrietie“, fr. Aubriétie, z. B. Zier. *deltoidäa* DC., *purpurea* Hort. (*grandiflora* Hort.) etc. (n. d. franz. Blumenmäler Aubriet, Tournefort's Begleiter, † 1743), s. *Alyssum*, *Draba* u. *Heliophila*.
- Aucuba** Kämpf. Schreb. (Loranthaceen od. Cornaceen, XXII. 4) Fleck-Hartriegel, s. g. Goldorange, fr. aucube (n. aukuba, d. jap. Namen), z. B. Zier. *japonica* Kämpf. u. *himalaica* Hook.
- Aucuparia** Med. (sc. Sorbus) L. (sect. v. Sorbus Med.) (Pomaceen, XII. 3) Eberesche, Vogelbeerbaum, s. g. Quitscheren, *A. sylvestris* Med., fr. sorbier sauvage, e. service-tree, quick-beam, quicken-tree, roan-tree, *A. americana* W. (*Sorbus microcarpa* Pursh, *Pirus amer.* DC.) (*aucuparius* Vogelfang betr. v. *avis* Vogel, *capio* fange).
- Aulacomnium (-on)** Schwägr. (Moose, XXIV. 2) „Furchen“-M., Streifen-Sternmoos Leun. (v. ἀύλαξ, -ακος Furche u. *μνιον*, lat. *Mnium* Sternmoos, -höker. Kapselbasis, Wst.), z. B. *androgynum* Schw. (am Grund d. Bäume), s. *Mnium* Dill.
- Aulax** Berg. (-axis Haw.) (Proteaceen, IV. 1 od. XXII. 4) „Furchenblatt“ (?), „Furchenblüher“! (s. eb., Wst. Staubgef. in d. Kronenfurchen, od. Blattunterseite gefurcht!), z. B. Zier. *pinifolia* R. Br. (*Protea p.* L.), *umbellata* R. Br. (*Protea aulacæa* Thb.).
- Aurantiacæae** Corr. DC. Rchb., -*iae* Juss. (zu Ord. *Terebinthinae* Bartl.) Orangen, s. sogl.
- Aurantium** (sc. Citrus) L. (Aurantiaceen, XVIII. 2) Orange, Pomeranze (*pomum aurantium*), fr. u. e. orange (fr. oranger, e. orange-tree) (v.

- aurum Gold), z. B. Gewächsh. C. Aurantium L. echte Or., nur v.: C. Aur. Bigaradia Risso, saure od. Warzen-Or., v. chinensis (sinensis) Risso, süsse Or. od. „Apfelsine“, v. decumana L. Pompelmus, v. nobilis Lois. Mandarin-Or., Zier. Aurantium v. crispa Hort., s. g. Bouquet-Or. (v. v. fl. pleno, salicifolia etc.).
- 1) **Auricula** T. (sc. Primula) L. (Primulac., V. 1) „Aurikel“ (eig. „Öhrchen“), fr. oreille d'ours, e. bear's-ear, french-cow's-lip (dem. v. auris Ohr). 2) **Auricula** (sc. Hieracium) L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) = Hieracium dubium Sm. 3) **Aur.** (sc. Peziza) L. (Pilze, XXIV. 4) Judasohr, fr. oreille de Judas, e. jew's-ear, s. Exidia Auricula Judae Fr.
- Avellana** (sc. Corylus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) gem. Haselstrauch, fr. avelinier (avellunier), coudrier, abelanie, noisetier, e. hazle-nut (-tree) (v. Avella i. q. Aquila in Oberitalien, Wtst. n. Avellino in d. Prov. terra di Lavoro, Neapel).
- Avena** L. (Gräser, III. 2) Hafer (Haber), -gras, fr. avoine, e. oats (unbek. Etymologie!), z. B. geb. A. sativa L. gem. H. u. orientalis Schreb. türkischer od. s. g. Fahnen-H., wild A. fatua L. Flug- od. Windh., fr. haveron, A. sterilis L. (macrocarpa Mnch., sensitiva Hort.) hygrometrischer od. Wetter-H., u. s. f.
- 1) **Averrhoa** (-oea) L. (Gruinalen od. Bombaceen, X. 4) Karambolabaum, Baumstachelbeere, A. Carambola L. (n. d. arab. Arzt Averrhoes zu Cordova, † 1217). 2) **Av. acida** L. (Cicca disticha Spr.) (Euphorbiac., XXI. 4) Gröps-Wolfsmilchbaum.
- Axolöpha** Alfd. (-ia DC.) (Malvaceen, XVI. 5) rauhhaariger Eibisch, A. hirsuta Alfd. (Althaea h. L.) (v. ἄξωφ, -ορος Achse? λόφος Haarschopf — dann fehlerh. gebildet! od. ἄξος adj. schleppend v. ἄγω i. q. ἔλζω ziehe, schleppe? Wtst. d. Fruchtbod. strahlig kammförmig!).
- Ayenia** Mut. L. (Büttneriaceen, V. 1) „Ayenie“ (n. d. duc d'Ayen de Noailles ben.), z. B. Treibh. pusilla Rz. Pv. (Dayenia inermis Mill.), aculeata Mut. (Byttneria mollis H. B. K.) (Str. Südam.), cordifolia Sess., etc.
- Aylanthus** Juss. st. Ailantus Desf.
- Azadirachtha** A. Juss. (sc. Melia) L. (Meliaceen, X. 1 od. XVI. 5) Manna- baum, Paradies-, Paternosterbaum, grossblättr. „Zedrach“ D., s. Azadiracta indica Breyn. (ἄζα Dürre, δια wegen u. ζάσσω spalte? Wtst. arabisch! — unsicher!).
- Azaläa** L. (Ericaceen, V. 1) „Azalee“, Felsenstr. Leun. Rmpl., Bergröschen, fr. azalée (v. ἄζαλέος trocken, dürr — bez. d. Standorts!), z. B. Treibh. A. indica L. m. v. v., pontica L. (arborëa L., Rhododendron flavum G. Don), mollis Blum. (China), wild: procumbens L. Zwergporst, s. g. Gamsennach (südd. Alpen) (Chamaerhododendron Buxb.).
- Azaleastrum** Planch. (subgen. v. Rhododendron) (Ericaceen, V. 1) Azaleen-Alpenröschen, Rh. ovatum Lindl. (China) (deter. Azalea).
- Azara** Rz. Pv. (Bixaceen od. Homalineen, XIII. 1) südamer. Orleans- strauch (n. d. Spanier Jos. Nic. Azara benannt), z. B. dentata u. serrata R. P.
- Azarölus** Scop. Borkh. (Pomaceen, XII. 2) „Lazarole“, welsche Espeln D. (v. ἄζα Dürre — Standort? Wtst. arab. azzarur od. al zarur wild. Apfel!), z. B. A. alpinus Borkh., fr. aubépin Azérolier, épine d'Espagne, e. azarole thorn, s. Crataegus Azarölus W. Azarolbirne u. Crat. s. Pyrus alpina Dur. „Alpenbirne“.
- Babiana** Ker (Irideen, III. 1) Pavianswurz (v. babianus Pavian, Wtst. Babia, Göttin d. Kindheit in Syrien — nieder. Kraut!), z. B. Thunbergii u. plicata Ker (Antholyza plic. L., Cap), aurea Ker = Tritonia aur. Pappe, u. a.

- Bacchäris** L. (Compos. Astereen od. Baccharid., XIX. 2 od. XXII. 14) Bachusstrauch, Kreuzstr. Lauche, fr. bois-Guillaume, s. g. Leistenholz (Landmann's Spiek-Narde, Paxton) (D. Mariae Chirothea G. Frank) (gr. *Βάχχοις* od. *Βάσσαοις*; Diosc. v. *Βάχχος*, Pflanze m. wohlriech. Wurzeln, Riemer), z. B. Zier. *halimifolia* L. (cuneif. Mnch.) meldenblättr. Kreuzstr.
- Bacillaria** Ehrbg. (Stückelalgen od. Diatomeen, XXIV. 3) „Stäbchenalge“, fr. bacillaire (dem. v. *bacillus* Stab).
- Baetris** Jacq. (Palmen, XXI. 6) Rohr- od. „Stabpalme“ (v. *βάκτρον* Stab — zu Spazierstöcken, Wtst.), z. B. Warmh. *caryotaefolia* Mart., *setosa* M. (m. Borstenwimpfern an d. Fiedern!), *longifrons* Mart., etc.
- Bacomycēs** Pers. Ach. (Flechten, XXIV. 3) Schwamm- od. Korallenflechte, Becherfl. W. (*βαυός* klein, *μύκης* Pilz), z. B. *cocciferus* Ach. = *Herba ignis* Offiz. (Nord-Eur.), s. *Cenomycē* Ach. u. *Cladonia* Hoffm.
- Baeothryōn** Nees (sc. *Scirpus*) Ehrh. (Cyperaceen, III. 1) „Kleinbinse“ (s. v. u. *ῥόϊον* Binse), s. *Scirpus pauciflorus* Lightf.
- Baeria** Fisch. Mey. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Baer'sblume“ (n. d. russ. Staatsr. u. Prof. C. E. v. Baer, † 1872), z. B. Zier. *chryso-stōma* F. M., fr. Baerie dorée s. g. „Goldmund“ (Californ.).
- Balanites** DC. Del. (Zygophylleen, X. 1) Zahnbaum (*βυλαρίτης* eichelartig), z. B. *aegyptiaca* Del. Hadjilidj-Gewürz, s. *Ximenia aeg.* s. *ferox* Poir.
- Balanophōra** Forst. (Balanophoreen, XXI. 1) „Eichelträger“, Kolbenschosser (*βάλλανος* Eichel, *φορός* tragend), z. B. *fungosa* Forst. = *Cynomorium* Bal. — *Balanophorēae* Rich.
- 1) **Balantium** Kauf. (Farne, XXIV. 1) „Beutel“- od. „Börsen“-F. (gr. *βαλάντιον* Geldbeutel — Form d. Fruchtschleierchens!), z. B. Gewächsh. *B. antarcticum* Presl. 2) **Balantium** Hamilt. (Chrysobalaneen, XII. 1) (— meist leer. Eierstock, Wtst.).
- Baldingera** G., Fl. Wett. (Gräser, III. 2) Glanz- od. Bandgras (n. E. G. Baldinger, Prof. in Marburg, † 1804), Zier. *B. colorata* Fl. Wett. Bandgras d. Gärten, s. *Phalaris arundinacea* var.
- Ballōta** L. (Labiaten, XIV. 1) „Ballote“, Schwarz- od. Stink-Andorn, fr. ballotte u. marrube, (gr. *βάλλωνη* v. *βάλλω* werfe zurück — durch üblen Geruch, Paxton), z. B. *nigra* L. v. *variegata* Hort., fr. marrube noir (marrubin n.) od. fétide, e. hare-hound, *B. suaveolens* L. s. *Bystropogon* l'Hér.
- 1) **Balsamina** Riv. (sc. *Impatiens*) L. (Balsamineen, V. 1) gem. „Balsamine“, fr. fruit élastique, e. balsam od. balsamine (gr. *βαλσαμίνη* Balsamische, v. arab. *balassan*?). 2) **Balsamina** (sc. *Momordica*) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Balsamapfel, Wunderapfel Vilm., fr. momordique pomme de merveille, e. balsam-apple, balm-Momordica. — *Balsaminēae* A. Rich. (zu Ord. *Gruinales* Bartl.).
- Balsamifluāe** Blum. Jess. „Balsamfluss“- od. Amberbäume (zu Ord. *Iteoidēae* Bisch. Weidengehölze) (*βάλλσαμον* u. flūo).
- 1) **Balsamita** Vaill. Desf. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Balsamblume“, fr. balsamite, z. B. *B. vulgaris* W. = *Tanacetum Balsamita* L. (Südfrankr.) s. g. Frauenminze D., fr. menthe coq, e. spearmint. 2) **Balsamita** DC. (sc. *Chrysanthemum*) L. (Comp. Anthem. XIX. 2) Strahl-Balsamblume, *B. annua* DC. (Athanasia a. Hort.).
- Balsamodendron** Kth. (Burseraceen, VIII. 1) „Balsambaum“, echter Myrrhenbaum, fr. balsamier (baumier), e. balsam-tree (-shrub), *B. Myrrha* Lk. (*βάλλσαμον* u. *δένδρον* Baum).
- Bambüsa** Schreb. (**Bambos** Retz.) (Gramineen, VI. 1) Bambusrohr, Bambos, fr. bambou, e. bamboo-cane, auch Riesengras Leun. (v. d. ind. bambos od. d. malay. bambu), z. B. Zier. *B. arundinacea* L. (Südchina) Riesen-B., (klein) *B. Fortunei* fol. varieg. s. *nivei-vittat.* Van Houtt., v.



- aureo- u. argenteo-striata Hort., B. aurēa Hort., B. nigra Hort. Paris., fr. b. à bois noir, e. black-stemmed b.-c., etc.
- Banisteria** L. (Malpighineen, X. 3) Liane od. brasil. Kletterstrauch, fr. quapurier (B. Quapara W.) (n. d. engl. Mission. John Bainster ben.), z. B. B. Quapara W. u. dichotōma L. (Acer scandens etc. Plum.).
- 1) **Banksia** R. Br., L. f. (Proteaceen, IV. 1) Bank's-Silberfichte (n. d. engl. Nat. u. Reis. in Austral. Jos. Banks, † 1820), z. B. Gewächsh. collina R. Br., Cunninghamii Sieb., littoralis R. Br. 2) **Banksia speciosa** Kön. (Scitamineen, I. 1) Costwurz = *Costus speciosus* Sm. 3) **Banksia** Forst. (Thymeläen). 4) **Banksia** Domb. (Lythraeiden).
- Baphia** Afz. Spr. (Mimoseen, XXIII. 1) „Farb“- od. Klingholz (v. *βαφειου* Färberei), z. B. nitida Spr. afrik. Rotholz, e. bar-wood.
- Baptisia** Vent., R. Br. (Cassieen, X. 1) „Farbstrauch“, wilder Indigo (v. *βαπτω* färbe), z. B. Zier. B. australis R. Br., s. Podalyria Vent. s. Sophōra austr. L.
- Barbaraea** (rēa) R. Br. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Winter- od. Erdkresse, Kreissig O. W., Senf- od. Barbarakraut, Barben-Hederich, fr. roquette, herbe de St. Barbe (n. d. St. Barbara ben.), B. vulgaris R. Br. = *Erysimum Barbaraea* L.
- 1) **Barbula** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Bärtchen“, Bartmoos (dem. barba). 2) **Barbula** Lour., Pers. (Verbenaceen, XIV. 2) „Bärtchen“-V. (— haarfransige Blüthen, Wtst.).
- 1) **Bardana** Offiz. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) gebräuchl. Klette Grck. (v. d. ital. barda Pferdeharnisch? od. st. pordona = *Onopordon?* Wtst.) i. q. B. major Off., s. *Arctium Lappa* L. s. *Lappa major* (Lappa officinalis All.), fr. lapourdier, bardane, fusilage, herbe aux teigneux „Gründigenkraut“. 2) **Bardana** (sc. *Arctium*) W. = *Lappa tomentosa* Lane, filzige Kl. Grck.
- Barkeria** Lindl. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Barker's“-O. (n. Barker-Webb, s. d. Aut.), z. B. spectabilis Batem. (Guatem.), elegans Knowl. Westc.
- Barkhausia** Mneh., DC. (-hausenia Hoppe) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Schnabelpippau Seub. (n. d. Prof. J. G. Barkhausen in Utrecht, † 1723), z. B. intybacēa DC. = *Crepis int. Brot.*, s. *Borkhausia* Böhm.
- Barleria** L. (Acanthaceen, XIV. 2) „Barlerie“ (n. d. Dominikaner James Barrelier in Paris, s. d. Aut.), z. B. B. longifolia L., B. Prionitis L. fussangelf., etc., s. *Justicia* L.
- 1) **Barosma** W. (**Baryosma** R. Sch.) (Rutaceen Diosmeen, V. 1) Duft- raute, Bukkostrauch (*βαροι*; stark etc., *οσμη*) Duft etc.), z. B. odorata D. (nicht -um), serratifolia (*Adenandra cordata* Lk.). 2) **B. Tonga** Pers. (Dipteryx T. W.) (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3).
- Barringtonia** Forst., Thb. (Myrtac. Melaleucac., XVI. 8) Myrtenpflaume (n. d. engl. Nat. Dan. Barrington, † 1800), z. B. Gewächsh. B. speciosa L., s. *Butonia* Juss. (*Mammea asiatica* L., *Commersonia* Sonner.) (schönst. B. des Australoceans!). — *Barringtoniæae* (sc. *Melaleucacæae*) Rehb.
- 1) **Bartonia** Mühlenb., Pursh (Loasaceen, IV. 1) „Bartonie“ (n. Dr. S. Barton, Bot. in Philadelphia), z. B. Zier. aurēa Lindl. (*Mentzelia Lindleyana*) m. v. nana (Californ.), fr. Bartonie dorée, e. golden Bartonia. 2) **Bartonia** Sims, W. (Gentianeen, IV. 1), s. *Andrewsia* Spr. u. *Centaurium Bartonia* Sims.
- Bartramia** Dill., Hedw. (-ēa DC.) (Moose, XXIV. 2) „Bartram's“-M. (von Dillen n. W. Bartram, Colonist in Pennsylvanien, ben. s. d. Aut.), z. B. pomiformis Flörke (Salzb. Alp.). — *Bartramiacæae* Schimp.
- Bartsia** (-tschia) L. (Scrophularineen, XIV. 2) Alpenkamm, Quell-

- Hahnenkamm (n. Joh. Bartsch, s. d. Aut.), z. B. alpina L., s. Staehelina alp. Crantz (Euphrasia rubra Raj.).
- Baryxylon (-um)** Lour. (Cassieen, X. 1) „Schwerholz“, Eisenholz v. Cochinchina, fr. baryxyle (*βαρύς* schwer, *ξύλον* Holz), B. rufum Lour.
- Basella** L. (Chenopodiaceen od. Phytolaccaceen, V. 3) Malabarspinat, Beerblume (v. einem malabar. Wort abgeleitet.), z. B. B. rubra L. u. vesicaria Lam. (— schwarze Beeren z. Rotfärben!), s. Anredra spicata Juss.
- Basilaea** Lam., Juss. (Liliaceen, VI. 1) Kaiserkrone (Corona Regalis Dill. = Fritillaria imperialis), B. bifolia Poir. etc. (*βασίλειος* königlich) s. Eucömis L.
- Basilicum** (sc. Ocimum) L. (Labiaten, XIV. 1) „Basilienkraut“, gem. Basilien, fr. basilic, plante-romaine, e. basil (gr. *βασιλικόν* v. *βασιλεύς* König — königl. weg. Geruch u. Heilkraft!).
- Basillum** Mnch. (Labiaten, XIV. 1), gem. Basilien = Basilicum.
- 1) **Bassia** Juss., Kön. (Sapotaceen, XI. 1) Butterbaum, B. butyracäa Kön. (n. d. Bot. Ferd. Bassi in Bologna, † 1774), s. Philippe malabaricus Kön. 2) **Bassia** muricata Allion. (Chenopodiaceen, V. 2) s. Salsöla mur. L. 3) **Bassiana** (sc. Botrytis) Mich. (Pilze, XXIV. 4) Muscardinepilz d. Seidenraupen.
- Batatas** Lam. (Convolvulaceen, V. 1) Batatenwinde, Camote, fr. patate od. batattes (malayisch!), B. edulis Chois. = Convolvulus Batatas L. (Ipomoea Bat. Rchb.).
- Batrachium** E. Mey. (zu Ranunculus L.) (Ranunculaceen, XIII. 3 od. 7) „Froschkraut“, -veilchen, -blume Mej., Haar- od. s. g. Löffelkraut, Wasserranunkel, fr. grénouillette, z. B. aquatile u. fluitans Oed., fr. brouille-blanche (*βατραχίος* Frosch, *βατραχίο* — *ιον* Veilchen, Mej.).
- 1) **Batschia** Mich. (Boraginäen, V. 1) „Bätschie“, s. Lithospermum Lehm. (Rindera carolinensis Pers.). 2) **B.** Mnch., Cass. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1). 3) **B.** Thb. (Menispermeeen, XXII. 12), z. B. racemosa u. spicata Thb. (Trichoa etc. Pers.) (n. d. Prof. J. G. Batsch in Jena, s. d. Aut.).
- Bauhinia** Plum., L. (Cassieen, X. 1) „Bauhinie“, Fassholz, fr. bois à barrique (n. Joh. u. Kasp. Bauhin, s. d. Aut.), z. B. scandens L., porrecta W. (Sennae spuriae Sloan.) (Indien).
- Beaufortia** Ait., R. Br. (Myrtac. Melaleucac., XVIII. 2) Tristan-Myrte (n. d. Herzogin Mar. v. Beaufort), z. B. splendens u. decussata Ait., s. Tristania R. Br.
- Beccabunga** (sc. Veronica) L. (Scrophularineen, II. 1) Bachbunge, fr. beccabunga, salade de chouette „Kauz-Salat“, véronique mourronnée, e. brook-lime (latinisiert „Bach-Pungen“ od. „Bunge“).
- Beckmannia** Host (Gräser, III. 2) Raupenähre (n. J. Beckmann, s. d. Aut.), B. erucaeformis W. (Cynosurus erucaef. Ait.) s. Phaläris L.
- Befaria** Sm. Druckfehler st. **Bejaria** Sm.
- Begonia** L. (Polygonaceen od. Begonien, XXI. 9) Schiefblatt, fr. bégonie (n. Mich. Begon, franz. Intendant auf St. Domingo, geb. 1638), z. B. Blattpfl. R. Rex J. Pz., falcifolia Hort., incarnata, argentea Lind., discolor R. Br., fr. b. à deux couleurs, e. two-coloured Beg. etc. — Begoniaceae R. Br.
- Behenantha** Otth., DC. (-the Schur) (Silenaceen, X. 3) „Behenblume“, s. g. Taubenkropf, fr. carnillet (-niolet), e. calves-foot = Cucubalus Behen L. (Behen vulgaris Mnch.), s. Silene inflata Sm. s. vulg. Grck. (behen, eig. eine Pfl. am Libanon, *άνθη* Blume).
- Bejaria** Sm. (Ericaceen, X. 1), „Bejar's“-Rhododendron (n. e. Spanier, Namens Bejar).
- Belis** Salisb. (Conifer. Araucarieen, XXI. 9) Spiesstanne Lauch. (v. *βέλος*

Geschoss — spießförm. Nadeln u. Zapfenschuppen!), z. B. lanceolata Sweet (jaculifolia Salisb.) (China).

- 1) **Belladonna** (sc. Atropa) L. (Solaneen, V. 1) Wolfs- od. Tollkirsche (ital. bella donna, fr. belle dame, schöne Dame — Mittel für schöne Augen etc.). 2) **Belladonna** Sweet (sc. Amaryllis) L. (Amaryllideen, IV. 1) Belladonna-Lilie.
- Bellevalia** Lapeyr. (Liliaceen, VI. 1) röm. Hyacinthe od. Meerzwiebel (n. d. Bot. P. R. Belleval in Montpellier, † 1598), B. romana Lap.
- Bellidiastrum** Mich. Cass. (zu Arnica) Rchb. (Compos. Bellidieen, XIX. 2) Stern- od. Alpen-Masliebchen, Maslieb-Wolverley, Ruckel O. W. (deter. Bellis, -idis od. Bellis u. *δοττορον* Bild, Wstst.), z. B. B. Michellii Cass. (Arnica s. Doronicum B. L., W.).
- Bellis** (G. -idis) L. (Compos. Radiaten od. Bellidieen, XIX. 2) Masliebchen, Tausendschön, Gänseblümchen, fr. paquerette, petite marguerite, fleur printanière, e. daisy (-zy), margarites od. margaronet (v. belle, lat. bellus, allerliebste), Zier. B. perennis L. v. fl. pleno, e. velvet-flower „Sammetbl.“, wild fr. auch liane rade u. margueritelle, e. argentine- od. bone-flower.
- Bellium** L. (Compos. Radiaten, XIX. 2) italienisches od. See-Maslieb (Bellis maritima Bocc.) (s. v.), z. B. bellidioides L. (Bellis annua minima Triumf.), minutum L. (Bellis cretica T.).
- Benedicta** DC. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Benedikten“-Distel, fr. bénoite, chardon bénit u. galliotte, e. bennet, holy-thistle (benedictus gesegnet, „benedeit“ — Heilkraft!), s. Cnicus B. Vaill. (Centauria B. Rchb.).
- Benincasia (-ciza)** Savi (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Benincasia“ (n. d. ital. Grafen Benincasa), z. B. cerifera Savi „Wachsurke“ (Ostind.).
- Benthamia** Lindl. (Cornaceen od. Hederaceen, IV. 1) „Benthams“ Cornel- od. Erdbeerstrauch (n. G. Bentham, s. d. Aut.), z. B. B. fragifera Ldl. (Cornus capitata Wall.) (Nepaul).
- Benthamidia florida** Spach (Cornaceen, IV, 1) Blumen-Hartriegel (s. eb. u. *ειδομαι* gleiche), s. Cornus fl. L.
- 1) **Benzoïn** Hayne (Sapotac. od. Styracineen, X. 1) Benzoebaum, echte Benzoe, fr. badamier od. belzof, auch assa-doux, e. benjamin (fr. bien-joint) (n. d. franz. Bot. Benzoin, beschr. 1556 die echte Benzoe, Benzonia Schum.), B. officinale Hayne (Benzonia Schum.), s. Storax Benzoin Dryander. 2) **Benzoïn** (sc. Laurus) L. (Lauraceen, IX. 1) Benzoïn-Lorbeer. 3) **Benzoïn** (sc. Terminalia) L. (Combretaceen, XXIII. 1) Benzoe-Croton, s. Croton Benzoe L. (Terminalia angustifolia Jacq.).
- Berberidæae** Vent., DC., Rchb. Berberitzensträucher, s. sogl.
- Berberis** L. (Berberideen, VI. 1) Berberitzenstr., Sauerdorn (-rach), fr. vinetier, épine-vinette, e. piperidge-tree, barberry (barberry, bearberry) = Bärbeerstr. Mej. (v. d. arab. berberi? Berberis Berber? — ungewiss!), z. B. B. vulgaris L. (Oxyacantha Galeni Tabern.) m. v. v. (z. B. atro-purpurea Hort.), B. canadensis Pursh (caroliniana Hort.), B. repens Lindl., B. Mahonia Nutt. (Aquifolium Pursh) u. a.
- Berchemia** Neck. (Rhamnaceen, V. 1) „Berchemie“ (n. ein. franz. Bot. Berchem), z. B. Gart.-Schlingstr. volubilis DC. (Virgin.), s. Rhamnus s. Zizyphus vol. L.
- Bergenia** Mch. (zu Saxifraga Rchb.) (Saxifrageen, X. 2.) sibir. od. Dickblatt-Steinbrech (n. d. Prof. K. A. v. Bergen in Frankf. a. O., schr. Fl. Francofurt, † 1760), Zier. B. bifolia Mch., s. Saxifraga crassifolia L. (Geryonia Schrk.).
- Berisia** Spach (zu Ribes) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) Alpen-Johannisbeeren (Anagramm v. Ribesia!), z. B. Zier. R. alpinum u. orientale Desf.
- Bermudiana** Feuille., Dill. (s. Sisyrinchium) L. (Irideen, XX. 2) „Ber-

- muden“ -Rüsselschwertel (n. d. Bermudes-Inseln ben.), z. B. *coerulĕa* Feuill. (*Anthericum coer. D.*), s. *Bermudiana graminĕa* Dill.
- Berterōa** DC. (zu *Farsetia* Rchb.) (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Berteroe“, Grauschildkresse, Gernsel O. W., fr. cresson des sables, *B. incāna* DC. = *Alyssum incanum* (Farsetia s. *Moenchia inc.* autt.) (n. d. ital. Bot. u. Reis. in Südamer. Jos. Bertero, s. d. Aut.).
- Bertholletia** Hb., Bpl. (Melaleuceaceen, XVIII. 2) Brasilianer- od. Rahm-Nussbaum (n. d. Chemik. Graf Cl. L. de Berthollet in Paris, † 1822), z. B. *B. excelsa* H. B. (Südamer. B.).
- 1) **Bertolonia** Raddi, Spr. (Melastomaceen, XI. 5) „Bertolonie“ (n. d. ital. Bot. Bertoloni in Bologna, s. d. Aut.), z. B. *Warmh. marmorata* u. *aenĕa* Naud., *paniculata* Spr. (Str. Brasil.). 2) **B.** DC. (Compos. *Cichoriac.*, XIX. 1). 3) **B.** Spin. (*Verbenac.*, XIV. 2), z. B. *glandulosa* = *Myoporum viscosum* R. Br. 4) **B.** Spr. (Guttiferen). 5) **B.** Moç. Sess. (*Rosaceen*). 6) **B.** Del., Spig. (*Polygalaceen*).
- 1) **Berula** Hoffm., Koch (Umbelliferen, V. 2) „Berle“, fr. berle (latinis. Berle), z. B. *angustifolia* Koch (*Sium ang. L.*) Wassereppich. 2) *Berula major* autt. = *Veronica Anagallis* L.
- Beschornesia** Lindl. (Liliaceen *Agaveen*, VI. 1) „Beschornes“-Agave, z. B. *Gewächsh. yuccoides* Lindl., *argyrophylla* etc. (n. d. Nam. *Beschornes* geb.).
- Besleria** L. (*Gesneraceen*, XIV. 2) „Beslerie“ (n. Bas. Besler, s. d. Aut.), z. B. *violacĕa* Aubl. (Kletterstr. Guianas), s. *Cyrtandra* Forst.
- 1) **Bessera** (-ia) Schult. (*Boragineen*, V. 1) „Besser's“-Lungenkraut (s. d. Aut.), z. B. *azurĕa* Schult. (*Pulmonaria az. Bess.*). 2) **Bessera** Spr. (Capparid. *Flacourtieen*, XIII. 1) s. *Limacia* (Koelera W., *Rumea* Poit.). 3) **Bessera** Schult. f. (*Amaryllideen*, VI. 1), z. B. *elegans* (Brasil.).
- Beta** T. (*Chenopodiaceen*, V. 2) Mangold, Scharpkraut, Dick- u. Runkelrübe etc., fr. bette u. poirĕe, réparĕe, racine de disette „Dickrübe“, rĕve-male, e. beet (beet-rave, better-rave) „Runkelrübe“, red-beet „Rotrübe“ (n. d. celt. bet rot), z. B. *Zier. B. vulgaris* L. v. *rubra* Hort. rotripp. M., fr. poirĕe à corde rouge, e. red-ribbed b., brasilian *Swiss-Chard*, *B. vulgaris* v. *lutĕa* Hort. gelbrüpp. M., fr. poirĕe jaune du Brésil (Chili).
- Betonia** T. (*Labiaten*, XIV. 1) „Betonie“, fr. bĕtoine, e. betony (v. d. celt. ben Kopf u. ton gut — als Niessmittel, Paxton), z. B. *Zier. grandiflōra* W. (*Stachys gr. Benth.*) (Sibir.), m. v. *rosea* Hort., *B. officinalis* L. etc.
- Betula** T. (*Amentaceen*, XXI. 5) Birke, fr. bouleau, e. birch (v. d. celt. betu Birke), z. B. *Zier. B. alba* L. v. *pendula* Ehrh., *odorata* Bechst. (*pubescens* Hort.) „Ruch“-B., *verrucosa* Ehrh. (beide *B. alba* L.) etc.
- Betulus** (sc. *Carpinus*) L. (*Amentaceen*, XXI. 5) gem. Weiss- od. Hainbuche, Hornbaum, fr. charme, e. horn-beam, yoke-elm (s. eb.).
- Bicornes** Endl. Kl. der „Zweihörnigen“ (bi- zwei, cornu Horn — bez. d. Antheren).
- Bidens** T. (Compos. *Heliantheen*, XIX. 3) „Zweizahn“, Wasserdost, fr. bident (bi — zwei, dens Zahn — zweispitz. Achänen!), z. B. *tripartitus* L., fr. tête cornue, langue de chat, s. g. Frauenspiegel, Wolff, etc., s. *Coreopsis Bidens* L.
- Bifolium cordatum** Fl. Wett. (*Smilacineen*, VI. 1) „herzblättr. Zweiblatt“, Schattenblume, s. *Convallaria bifolia* L. (*Majanthemum bif. Schmidt*).
- Bifora** Hoffm. (*Umbelliferen*, V. 2) „Bifore“ Grck., „Zweihohl-Samen“ bess. *Bifōris* Spr. (bi- u. fōro durchbohre), z. B. *fusculosa* M. B., *radians* ds. (*Taurien*), s. *Coriandrum testiculatum* L.
- Bifrenaria** Lindl. (*Orchideen* *Vandeen*, XX. 1) „Zweizügel“-O. (bi- u. frenum Zaum, Zügel — d. vier Pollenmassen an zwei besonderen Schwänzchen, Wtst.), z. B. *atro-purpurĕa* Ldl. (*Maxillaria a.*) (Bras.).

- 1) **Bigelovia** Spr. (Oleaceen Foresterieen od. Samydeen, XXIII. 1) „Bigelowie“ (n. d. nordamer. Bot. Bigelow, s. d. Aut.), z. B. *B. ligustrina* Rees (Forestiera l. Poir., Borya l. W., Adelia l. Mchx.), *B. acuminata* Rees (Forestiera ac. Mchx.). 2) **B.** Sm. (Taxaceen). 3) **B.** DC. (Compos.).
- Bignonia** L. (Scrophularineen Bignoniace., XIV. 2) Trompetenblume, fr. Bignone (n. d. Abbé Bignon, † 1743, s. d. Aut.), z. B. *Zier. capreolata* L., fr. B. à vrilles, e. tendrilled Bignonia „Klimm“-Tr., Gewächsh. *venusta* Ker, *Carolinae* Lindl., *Chamberlaynii* Sims, u. a. *B. Catalpa* L. (*Catalpa bignonioides* Walt. s. *syringifolia* Sims m. v. nana Hort., nägleinblättr. Trompetenbaum. — Bignoniaceae R. Br.
- Bihl** (sc. Musa) L. (Musaceen, XXIII. 1) „Bihai“-Banane, fr. bi-hai (Südamer.), s. *Heliconia Bihai* (vaterl.).
- Bilimbi** (sc. Averrhoa) L. (Gruinalen od. Bombaceen, X. 4) Reizblatt-Av., „Blimbingbaum“ = *Bilimbum teres* Rumph. (ostind. Bstr.) (vaterl. — reizempfindl. Blattstiele, R. Bruce).
- 1) **Billardiëra** Sm. (*deria* Spr.) (Pittosporeen od. Polygaleen, V. 1) Blaubeer-Schlinge, fr. billardiëre (n. Labillardiëre, s. d. Aut.), z. B. *fusiformis* Lab. (*Sollya heterophylla* Lindl.), *paniculata* Sm. (*Froelichia p. W.*), *explanata* Mch. (*Verbena grandiflora*, *Buchnera canadensis* L.). 2) **Billardiera** (Labillardiëra R., Sch.) (Rhamnac., V. 1), z. B. *angustifolia* DC. 3) **B.** Vahl (Rubiaceen, IV. 1).
- Billbergia** Thb. (Bromeliaceen, VI. 1) Greisenbart (n. d. schwed. Bot. J. G. Billberg), z. B. *Stuben B. pyramidalis*, *zebrina* Ldl. = *Tillandsia z.*, *B. Chantini* Carr.
- Biöta** D. Don, Endl. (Cupressineen, XXI. 9) Lebensbaum, fr. arbre de vie, e. arbor vitae (gr. βίονη Leben), s. *Thuja* L. u. *Phyllocladus Spach*, z. B. *Zier. orientalis* Don v. *aurea* Hort. *Waterer* u. v. *filiformis* Hort. s. *erecta* Lodd. (fadige Zweige) u. *pendula* Endl.
- Biotia** Cass., DC. (Compos. Sigesbeckien, XIX. 2) „Biot's“-Aster (n. d. Astronomen Biot), *Zier. B. latifolia* DC. (*Aster lat. Desf.*), *commixta* DC., *corymbosa* DC. etc., s. *Aster* u. *Eurybia*.
- Bipinnula** Commers. (Orchideen, XX. 1) „Zweifeder“-O., Runzelbart (dem. bipinnus zweifederig), s. *Arethusa*.
- Bischoffia** Blum. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Bischoffsbaum“ (n. d. Bot. Bischoff, s. d. Aut.).
- Biscutella** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) Brillenschötchen, fr. lunettière (bi- zwei u. dem. scutum Schild, -ellum Schildchen — Schötchenform), z. B. *aureolata* L.
- Biserrula** (fehlerh. Bisserula) L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Doppelsägenhülle“, fr. scie od. double scie (bi- u. dem. serra Säge — Hülle an d. beid. Kanten gesägt!), z. B. *Pelecinus* L. Sägekraut D., fehlerh. *Bisserula* u. *Bicerrula* autt.!
- Bismalva** Mch. (zu *Malva*) Rchb. (Malvaceen, XVI. 8) „Doppelmalve“, fr. guimauve (bis zweimal od. doppelt — dopp. Kelchhülle!), z. B. *B. Alcea* L. u. *moschata* L., s. *Malva*.
- 1) **Bistorta** (sc. *Polygonum*) L. (Polygoneen, VIII. 3) Wiesenknöterich, Natterwurz, s. g. Schlippen (als Gemüse), fr. bistorte, e. adder's-wort od. bistort, auch snake-weed (*bistortus* zweimalgedreht — nämli. d. Blumenähre!), s. *Bistorta major* autt. 2) **Bistorta** Rchb. (sectio v. *Polygonum* L.), z. B. *B. vivipara* kleine Natterwurz M. Rchb. (*Polygonum bistortoides* Pursh).
- 1) **Bivonaea (-nëa)** DC. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Bivonä“, Gelbtäschel (n. Bivona-Bernardi, s. d. Aut.), *B. lutea* DC. (Sibir.) s. *Thlaspi* l. *Biv.* 2) **Bivonëa (-ia)** Spr., Raf. (Euphorbiaceen, XXII. 5), z. B. *axillaris* Spr., s. *Adelia Martii* Spr. (bras. Str.).
- Bixa** L. (Cistifloren Bixaceen, XIII. 1) Orleanbaum, *B. Orellana* Rumph.

ostind. O. (nicht Orleana!), (n. d. bras. Nam. d. Pfl. biché), B. Uru-curana W. brasil. O., fr. roucouyer (orléan od. roucou, Orleana terra der Apoth.). — Bixaceae Rehb., -xinéae Kth. Orleanbäume.

- 1) **Blaeria** L. (bess. **Blairia** G.) (Ericaceen od. Viticeen, XIV. 2 od. IV. 1) „Blairie“ (n. Patrick Blair, Arzt in Boston, Lincolnshire), z. B. Treibh. ericoides Ait. (Erica Blaeria Thb.). 2) **Blairia** Houst. (Verbeneen, XIV. 2), s. Priva Ad. (Tortula W., Streptium Rxb., Verbena Dill.).
- Blakea** L. (-ckeae P. Br., -ckia Schrk.) (Lythrarieen od. Melastomaceen, XI. 1) „Blakee“ (n. Mart. Blake, Verbr. nützl. Kenntnisse, Paxton, n. Steph. Blake, schr. 1664 d. prakt. Gärtner, Wtst.), z. B. trinervia L. (Str. Jamaica), quinquenervia Aubl. (triplinervia) (B. Guiana), latifolia u. rosca Don (Str. Peru) u. a.
- 1) **Blandfordia** Sm. (Amaryllideen, VI. 1) „Blandfordie“ (n. Georg Marquis v. Blandford, Smith's Freunde), z. B. Gewächsh. B. flammēa Hook., Cunninghamsi Ldl., aurca Veitch, nobilis Sm. (Neusüdwales). 2) **Bl. cordata** Andr. (Saxifragaceen), s. Solenandra cordifolia Vent.
- 1) **Blattaria** (sc. Verbascum) L. (Scrophularieen od. Solaneen, V. 1) „Schaben“- od. Mottenkraut, fr. herbe aux mites (v. Blatta Schabe u. Motte — geg. solche angew.). 2) **Blattaria zeylanica** Comm. (Sterculiaceen, XVI. 7) Schabenmalve, s. Pentapetes phoenicea L. (Dombeya s. Cavanillea ph.).
- Blechnum** L., W. (Farne, XXIV. 1) Rippen-, Kamm-, Streifenfarn, fr. blegne (gr. βλήζνον), z. B. Baumf. B. brasiliense Desv., australe L., occidentale L. u. a.
- Blepharis** Juss. (Acanthaceen, XIV. 2) „Wimper“-Acanthus, fr. bléphares (gr. βλεφαρίς: Augenswimper — Brakteen gewimp., Wtst.), z. B. boerhaaviaefolia Juss. (Acanthus maderaspatensis L.), arborea Spr. (Acanthus arb. Forsk.), linariaefolia Pers. (Senegal) u. a.
- Bletia** Rz. Pv. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Bletie“, Erdorchis (zu Orchid. terrestres Bot.) (n. d. span. Apoth. u. Bot. Don Louis Blet in Madrid), z. B. catenulata R. P., ensiformis L. (Peru), bicallosa Don (Stelis racemosa Sw., Empusa paradoxa Lindl.).
- Blighia** Kön. (Sapindaceen, VIII. 1) Akeebaum (n. d. Capt. Bligh, dem Verpflanz. dess. n. Westind., schr. Reise im Südmeere, 1792), z. B. B. sapida Kön., s. Akeesia africana Tuss.
- 1) **Blitum** L. (Chenopodiaceen, V. 2) Erdbeerspinat, Beermelde, Schminkbeere Rnpl., Schmirbel O. W., fr. blette od. épinard-fraise, e. strawberry-spinache (gr. βλίτον Melde), z. B. capitatum L., fr. bl. capitée. 2) **Blitum** (sc. Amarantus) L. (Amarantac., XXI. 5) wilder Amarant M. Rehb., fr. amarante-blette, s. Blitum album minus Pluck.
- Blysmus** Panz. (Cyperaceen, III. 1) Quellriet (βλυσμός d. Hervorquellen — wächst im Wasser), z. B. compressus Panz. (Scirpus compr. Pers.).
- Bobartia** L. (Cyperac. od. Irideen, III. 1) „Bobartie“, fr. bobart (n. d. Prof. Jak. Bobart in Oxford, † 1679), z. B. Zier. B. indica L. (Schoenus Bobartii Retz.), s. g. Bermudienne od. bunte Moräe, s. Moraea chinensis Thb. (Ixia ch. Ehret).
- Boca** (Bocca) prouacensis Fl. Flum. (Bixaceen, XIII. 1) „Bocco“- od. Rebhuhnholz (vaterl.), s. Banara Aubl.
- Bocconia** Plum. (Papaveraceen, XI. 1) „Bocconie“, fr. bocconie (n. d. Sicilianer Dr. med. Paolo Boccone, gen. Sylvius, schr. Icones pl. rar. Sicil., Melitae, Galliae et Italiae, Oxf. 1674, s. d. Aut.), z. B. Zier. B. cordata W. (Macleya c. R. Br.), fr. B. à feuilles en cœur, e. cordate-leaved B.
- Boebēra** W. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Boeber's“-Stinkblume, s. Dysodia Cav. (n. d. russ. Prof. d. Bot. Boeber, † 1820), z. B. Zier.

- chrysanthemoides W. (Dysodea glandulosa u. Tagētes papposa Mchx.), s. pumila Hort. Pis. (N.-Amer.).
- Boehmera** Lk. (-ia Jacq.) (Urticaceen, XXI. 4) Nesselbaum, Kätzchenschwanz, s. g. Ramie, B. ramiflora Jacq. (n. d. Bot. G. R. Böhm, s. d. Aut.), s. g. Caturus s. Procris ramiflora, B. utilis Rmpl. u. nivēa Jacq., s. g. Ramée od. Chinagras (geb. Gespinnstpfl. Hint.-Ind.). B. cylindrica Sw. (Urtica c. L.) u. a.
- 1) **Boerhavia** L. (Nyctagineen, II. 1) „Boerhavia“, fr. tassole (n. Boerhave, Prof. in Leyden, s. d. Aut.), z. B. africana Lour., arborēa Lag. (Mex.), tuberosa L., erecta L. (Solanum bacciferum Pluk.) u. a.
- 2) **Boerhavia** Vahl (Valerianeen, II. 1) B. chaerophylloides (Valeriana ch. Pers. u. laciniata Rz. Pv.), scandens L. (dichotoma Vahl), s. Valeriana s. Anisophyllum sc. Forsk.
- Bohea** (sc. Thea) L. (Theaceen, XIII. 1) brauner Thee W., e. bohea (bohi) „Theebuh“, s. Thea flor. hexapetalis Amoēn. acad. (n. d. chines. Berg vui geb. Name).
- Bojeria** DC. (Compositen Bojerieen) „Bojerie“, z. B. speciosa DC. (n. d. Prager Bot. u. Reis. Wenzel Bojer, s. d. Aut.). — Bojeriēa DC.
- Boissiaea** Vent. (Cassieen, X. 1) „Boissieu“-Cassie (n. C. V. Boissieu de la Martiniere, Begl. Lapeyrouse's, Wtst.).
- Boissieria** Domb. (Convolvulac. od. Boragineen, V. 1) Brustbeerbaum, B. trinervata Domb. = Cordia Boissieri autt. (n. d. Bot. Edm. Boissier in Genf, s. d. Aut.).
- Bolax** Comm., Juss., Spr. (Umbelliferen, V. 2) „Bollendolde“ (βόλαξ Kloss, Bolle — Pfl. als halbkugelf. auf d. Erde lieg. Klumpen, Wtst.), s. Azorella Cav.
- Bolbitius** Tode (Pilze, XXIV. 4) Gold-Dungpilz Kumm. (βόλιβιτος Mist), z. B. vitellinus Tode, s. Agaricus v. L.
- Bolbophyllum** P.-Thou. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Bollenblatt“ (βολβός lat. bulbos Zwiebelbolle, γέλλορ Laubblatt), z. B. leopardinum u. mutabile Lindl., s. Diphyes, Tribachia Ldl. u. Dendrobium Sw.
- Boldoa** Lag. Cav. (Nyctagineen, III. 1) „Boldoblume“ (n. d. span. Bot. Dr. Boldo ben.), z. B. fragrans Lag. (folia Boldo Offiz.), s. Salpianthus H. B. K. „Trompetenbl.“
- Bolētus** Dill. (Pilze, XXIV. 4) Löcher- od. Röhrenpilz, fr. bolet (gr. βωλίτης essb. Pilz), z. B. edulis L., fr. brugnet, B. buglossoides, fr. glue des chênes.
- Bollēa** Rehb. f. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Bollēa“ od. Bolle“-O. (n. d. deutsch. Reis. auf d. Azoren etc. 1853, Bolle), z. B. violacea Ldl., s. Vanda R. Br.
- Boltonia** Schreb., l'Hér. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Boltonie“ (n. d. schott. Bot. J. Bolton, s. d. Aut.), z. B. Zier. B. asteroides l'Hér. (Matricaria ast. L.), glastifolia l'Hér., fr. à feuilles de Pastel, e. wood-leaved „waidbl.“ B.
- Bolus** autt. (verdrückt?) st. Bolētus, s. d., z. B. scaber, ovinus etc.
- Bomarēa** Mirb. (Liliaceen, VI. 1) „Bomaree“ (n. Jacq. Christophe Valmont de Bomare, Bot. zu Paris, † 1807, schr. Dict. univ. d'hist. nat.), z. B. multiflora Mirb. (Alstroemeria m.), Gewächsh. edulis Mirb., Carderi, Caldasina, Salsilla (windend) etc.
- Bombacēae** DC. (zu Oxalidēae Rehb.) s. Bombax.
- Bombax** L. (Oxalid. Bombaceen od. Sterculiac., XVI. 8) Seiden- od. Baumwollenbaum, Wollsame D., Käsebaum, fr. fromager od. bombax, gossampin u. baquier (βουβάξ Baumwolle — Samenwolle), z. B. pentandrum L., fr. capouquier, s. Gossypium javanense Bauh. (Eriophōros javana Rumph.), B. Ceiba L. starker W., Wollorn, s. Xylon caule aculeata Hort. Cliff. (Gossypium arborēum Sloan.) (Südamer.).
- Bombycella** DC. (Malvaceen, XVI. 8) Seiden-Eibisch (βόμβυξ, -ος

Seide etc. — Staubgef. in Seide gehüllt!), s. *Hibiscus* L. u. *Bombyx* Med.

**Bonannia** Raf. (Sapindaceen, VIII. 1) „Bonannie“ (n. Bonanni, wandte zuerst Spiegellicht b. Mikroskop an, schr. Observationes etc., Rom 1699, Wtst. n. d. span. Guinea-Insel Bonanno od. Anabon).

1) **Bona nox** (sc. *Smilax*) L. (Smilacineen, XXII. 6) „Gute Nacht“. 2) **B. n.** (sc. *Ipomoea*) L. (Convolvulac., V. 1) prächt. Trichterwinde (— bei Tag geschlossene Krone!).

**Bonopartēa** Rz. Pv. (Bromeliaceen, VI. 1) „Bonapartee“ (n. Napoleon I. Bonaparte), z. B. *juncēa* R. P., s. *Misandra* j. autt. (*Yucca Boscii* Desf.).

**Bonatēa** (bess. -tōa) W. Lindl. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Bonatos“-O. (n. d. Prof. Ant. Bonato in Padua, † 1837), z. B. *speciosa* W. (Orchis sp. Sw.) (Capland).

**Bonaveria** Scop., Neck. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) „Bonaverie“ (n. J. B. Bonaveri im 18. Jahrh., schr. Verz. d. Pfl. um Comachio), z. B. *Securidaca* Scop. (*Securidaca vera* G. „beilkrautart.“ B.), s. *Coronilla Securid.* L. u. *Securilla* Pers.

**Bonduc** Plum. (sc. *Guilandina* L.) (Legum. Cäsalpinieen, X. 1) prächt. Theodore, s. *Theodora speciosa* Med. (fr. bon duc, guter Führer od. Herzog), s. auch *Bonduccella* L.

**Bongardia** C. A. Mey. (Berberideen, VI. 1) „Bongardie“, B. Rauwolfi Mey. (n. d. Bot. H. G. v. Bongard, russ. Staatsr., † 1839, s. d. Aut.), s. *Leontice* L.

**Bonjeania** Rchb. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Faltenklee (n. d. Bot. Bonjean in Chambery), z. B. *hirsuta* Rchb., s. *Lotus tomentosus* Rhod.

**Bonnetia** Schreb. (Ternstroemiaceen od. Guttiferen, XIII. 1) „Bonnetbaum“ (n. d. Pfl.-Samml. Ch. Bonnet), z. B. *meridionalis* u. *racemosa* Sw., s. *Mahuria palustris* Aubl. u. *speciosa* Choisy.

**Bonplandia** Cav., W. (Rutac. od. Polemoniaceen, V. 1) „Bonpland'sbaum“, Angosturarindenbaum Rchb. (n. d. Bot. u. Reis. Ronpland), B. trifoliata W., s. *Galipea Cusparia* St. Hil. (Cusp. febrifuga Hb.) = *Angostura Cuspare* R. Sch.

1) **Bontia** L., W. (Myoporineen od. Polygalac., XIV. 2) wilder Ölbaum, B. daphnoides L. (Olēa sylvestris Pluk.) (Antill.) (n. d. Bot. Jak. Bontius, † 1631 in Batavia). 2) **Bontia** Petiv. (Orchideen).

**Boöpis** Juss. (Compos. Amphicarpanthen Rchb., XIX. 4) „Rinds“- od. „Ochsenaug“, fr. boöpis, e. eye of an ox (v. βούϛ, βούϛ Rind etc., ὄψ, ὄπος Auge, βοόπιϛ grossäug. Blume!).

**Bootia** Neck., DC. (Caryophylleen od. Silenac., X. 2) „Kuhnelke“, s. *Vaccaria* Med. (βοώτης Ochsentreiber, Wtst. v. Boot, s. sogl.). 2) **Bootia** Wall. (Hydrocharideen) (n. Arn. Boot, Arzt in London, † 1650, od. Ans. de Boot, ein Flamänder, Abb. v. Pfl. 16. Jahrh., Wtst.). 3) **B.** Bigel. (Potentilleen).

**Boraginēae** Juss., DC. Boraschgew. i. q. *Asperifoliae* Rchb. Scharf- od. Rauhblättrige, s. Borāgo (-īnis).

**Borāgo (Borrāgo)** L. (Boragineen od. Asperifolien, V. 1) „Borasch“, Borretsch, fr. bourrache, e. borage od. burrage (v. βορά Speise od. borra kurzes Haar, Wtst. d. verand. corago (cor u. ago) d. i. herztärkend! — unsicher!).

**Borassus** L. (Palmen, XXII. 6) Weinpalme (βόρασσοϛ lat. borassus = Fruchthülle d. Palmen, Diosc.), z. B. *flabelliformis* L., fr. lontar od. bang, u. rondier „Fächer“-P., s. *Lontarus domestica* G.

1) **Borkhausenia** cava Fl. Wett. (Fumariaceen, XVII. 2) Hohlwurz, s. g. Kukuksblume (n. Borkhausen, s. d. Aut.), s. *Corydalis bulbosa* Pers. (*Fumaria cava* Ehrh.). 2) **Borkhausenia** Roth (Personaten, XIV. 2) Ziegenkraut, Herzblume, s. *Capraria lucida* W. (*Teedia* Pers.).



- Borkhausia** Böhm. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) i. q. Barckhausia Mch. (n. Barckhausen, s. d. Aut.), z. B. graveolens Lk. (Barkh. gr. Rehb.), s. Mysesris purpurea u. Crepis foetida L. (Hieracium foet. Karsch).
- Boronia** Sm. (Rutaceen, VIII. 1) „Boronie“ (n. Franc. Boroni, ital. Beleit. v. Dr. Sibthorp, † 1794), z. B. Stuben: elatior Bartl., pinnata u. serrata Sm., Drummondi etc., s. Heterandra u. Tetratheca Sm.
- 1) **Borŷa** W. (Urticaceen od. Euphorbiac., XXI. 4) „Bory'strauch“ (n. Bory de St. Vincent), z. B. Zierstr. ligustrina W. u. acuminata W. (Adelia ac. Mchx. u. Forestiera Poir.). 2) **Borya** Lab., R. Br. (Commeleynen, III. 1), s. Baumgartenia Spr. 3) **Borya** Brid. (Moose, XXIV. 2), s. Weisia vulcanica.
- Boscia** Lam., Thb. (Capparideen od. Terebinthac., IV. 3) „Bosc's“ Kappertbaum (n. d. Prof. d. Agricultur L. Bosc, s. d. Aut.), z. B. undulata Thb. (B. in Capland).
- Bosēa** L. (Phytolacceen, X. 5) „Bose's“ Kermesbeerbaum, Goldrutenbaum D. (n. ein. Prof. d. Bot. E. G. Bose od. Kaufm. Kasp. Bose z. Leipz., schr. 1728 üb. d. Beweg. d. Pfl.), z. B. Yermamora L. canar. Maulbeer-Erve (span. yervo Erve u. Moro Maulbeere).
- Bossiaea** Vent. (Boissiaea) (Cassieen, X. 1) „Boissieu's“ Hülsen (n. d. Nam. Boissieu geb.), z. B. Treibh. plumosa, disticha, vera, heterophylla Sm. (Platylobium Sm.) (Neuholl.).
- Boswellia** Roxb. (Terebinthac. Bursereen, X. 1) indischer Weihrauchbaum (n. Joh. Boswell, Bot. in Edinb., schr. üb. Ambra 1736), z. B. serrata Rxb., thurifera Colebr. (glabra Rxb.), balsamifera Spr., s. Canarium W.
- Botor** Ad. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Vierkantbohne, eig. „Hirtin“ (v. βώτωρ Hirt od. -in, Wtst. malayischer Name!), z. B. B. tetragonolobus Ad., s. Dolichos t. L.
- Botria** (-trŷa) africana Lour. (Ampelideen, V. 1) afrik. Weinstock, s. Vitis afr. autt. (βότρως Weintraube).
- Botryanthe** Kl. (Euphorbiaceen, XXI. 1) „Traubenblüt“-E. (s. eb. u. άρθη Bl.).
- Botrycarpum** Rich. (s. Botryocarpum).
- 1) **Botrychium** Sw. (Ophioglosseae -Farne, XXIV. 1) „Traubenfarn“, Mondraute, B. Lunaria Pers., s. g. Walpurgiskraut (βότρως Traube od. βότρωνιον lat. viticulae Geringel d. Weinstocks, Locke). 2) **B.** Fr. (Pilze) Traubenpilz, s. Cytospora Fr.
- Botryocarpum** Rich. (zu Ribes) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) Ahlbeerensstrauch (βότρως, -vos s. v., καρπός Frucht), z. B. nigrum (Ribes n. L.) m. v. v., schwarze Johannisbeere.
- 1) **Botrys** (sc. Chenopodium) L. (Chenopodieen, V. 2) Eichenblatt-Gänsefuss, „Traubenkraut“, fr. botrys. 2) **B.** (sc. Teucrium) L. (Labiaten, XIV. 1) Trauben-Gamander. 3) **Botrys africana** Lour., s. Botrya (Vitis afr. Spr.) (s. v.).
- 1) **Botrytis** Mich., Nees (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Traubenschimmel“ (gr. βοτρŷitis traubig — traub. gehäufte Sporen!), z. B. vulgaris Pers. 2) **Botrytis** (sc. Brassica) Metzg. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) Blumenkohl, fr. chou-fleur, e. cauliflower (colly-) (traub. Ansehen d. Wucherung!).
- Bougainvillēa** Comm., G. Don (nicht -ginvillea Paxt.) (Nyctagineen, V. 1) „Bougainville's“ Wunderblume (n. d. franz. Seefahrer 1766/69 Bougainville), B. spectabilis W., s. Tricycla Lam.
- Boussingaultia** H. B. K. (Aizoideen od. Chenopodieen Baselleen, V. 3) Blumen-Gänsefuss (n. d. Nat. u. Reis. in Südamer., Prof. in Bogota J. B. Boussingault, nicht Chemiker M. Boussingault), z. B. Zier. baselloides Kth., fr. Baselle tubéreuse „beerblumenart.“

- Bouvardia** Salisb. (Rubiaceae. Cinchonaceen, IV. 1) „Bouvardie“ (n. Dr. Bouvard, Aufs. d. bot. G.'s z. Paris. Wtst. n. Ch. Bouvard, Leibartz Ludw. XIII, † 1780), z. B. Zier. B. Jacquini u. splendens (Houstonia coccinea), leiantha u. longiflora.
- Bovista** L., Pers. (sc. Lycoperdon) L. (Balgpilze, XXIV. 4) „Bovist“ od. Kugel-Balgpilz (d. latinis. bofist od. Bubenfist, d. i. Ochsenfurz, in Niederdeutschl., Jürgens).
- Bowdichia** H. B. K. (Cassieen od. Sapotaceen, X. 1) „Bowdichie“ (n. Edw. Bowdich, Secr. d. afr. Gesellsch. in Coast-Castle, † 1824), z. B. virgilioides H. B. K. (B. Südamer.), speciosa Spr. (Moldenhawera floribunda Schrad., Dolichonema speciosa Nees).
- Bowiëa** Haw. (Liliaceen, VI. 1) „Bowie's-Lilie (n. J. Bowie, Sammler d. Kew-Gärten) B. africana Haw. (Saftpfl.).
- Bowlesia** Rz. Pv., R. Sch. (Umbelliferen, V. 2) „Bowles' Dolde“ (n. ein. irisch. Bot. Bowles, schr. üb. Spanien, † 1780), z. B. lobata R. P., incana u. palmata ds. (Peru).
- Brabëjum** L. (Proteaceen, IV. 1 od. XXIII. 1) „Blumenscepter“-Baum (v.  $\beta\rho\alpha\beta\epsilon\iota\omicron\nu$  lat. praemium Kampfpfeis — Ansehn d. Baums!), z. B. stellifolium L. (stellatum Thb.) (B. Capl. u. Aethiop.), s. Brabyala capens. L. f. (Amygdalus Breyne).
- Brabýla** L. f. (Proteaceen, XXIII. 1) Blumenscepter-Baum ( $\beta\rho\alpha\beta\epsilon\iota\omicron\nu$  s. eb.,  $\upsilon\lambda\eta$  Holz), s. Brabëjum L.
- Brachycôme (-ma)** Cass. (Compos. Bellidieen, XIX. 2) „Kurzhaar“, -schopf ( $\beta\rho\alpha\chi\upsilon\varsigma$  kurz,  $\rho\acute{o}\mu\eta$  lat. coma Haupthaar — Pappus sehr kurzhaarig!), z. B. iberidifolia Benth., e. candytuft-leaved Br.
- Brachylóbus (-os)** All., Desv. (zu Nasturtium Rchb.) (Crucifer. Siliquos. XV. 2) „Kurzschote“ (s. eb.,  $\lambda\omicron\beta\acute{o}\varsigma$  Hülse etc.), z. B. austriacum Crantz, amphibium R. Br. etc., s. Nasturtium u. Sisymbrium.
- Brachypodium** P. B. (Gräser, III. 2) „Kurzfuß“, -stiel, Zwenke (s. v.,  $\rho\acute{o}\delta\iota\omicron\nu$  dem. v.  $\rho\omicron\upsilon\varsigma$ , - $\acute{o}\delta\omicron\varsigma$  Fuss — kurz gestielte Ährchen!), s. Festuca u. Bromus.
- Brachysëma** R. Br. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Kurzfahne“ (s. v.,  $\sigma\tilde{\eta}\mu\alpha$  Zeichen, Fahne — vexillum d. Blüte!), z. B. Gewächsh. latifolium R. Br., longifolium u. speciosum (mennigr., Neuholl.).
- 1) **Bradlëa** Adans. (Papilionaceen, XVII. 4) „Bradley's“-Hülse (n. Rich. Bradley, Prof. in Cambridge, † 1732, s. d. Aut.). 2) **Bradleia** G. Schr. (-leya DC.) (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Bradleye“, z. B. glauca Lab. (Neucaled.), philippensis W. (-lippica Cav.) (Str., Philippinen), Glochidion G. (Gl. ramiflorum Forst.) etc. 3) **Bradlaeia** Neck. (Umbelliferen, V. 2).
- Bragantia** Pers. (Aristolochieen, XX. 5) „Bragantie“ (n. d. portug. Prinz. Joh. v. Braganza, Stift. d. Akademie z. Lissabon, † 1806), z. B. Treibh. racemosa Lour. (Str. Cochinchina), s. Apama Lam.
- Brahëa** Mart. (Palmen, VI. 1) „Brahe's“ Fächerpalme (n. d. Astron. Tycho de Brahe, † 1601), z. B. calcarata Liebm., dulcis Mart. (Corypha frigidã, Mexiko).
- 1) **Brassavóla** Ait., R. Br. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Brassavola's“ O. (n. d. ber. Bot. Ant. Musa Brassavola in Rom, † 1555), z. B. cucullata Ait. etc., s. Epidendron u. Cymbidium. 2) **Brass.** Ad. (Compos. Inuleen, XIX. 2), s. Helenium.
- 1) **Brassia** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Brass“-O. (n. ein. Reis. u. gesch. Zücht. W. Brass), z. B. maculata R. Br. (Centralam.). 2) **Br.** Benth. (Labiaten, XIV. 1) — Brassiëae Wall. (zu Labiatae).
- 1) **Brassica** L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) Kohl, fr. chou, e. keal, cabbage, swort, cole-wort (v.  $\beta\rho\acute{\alpha}\varsigma\omega$  koche? od.  $\beta\rho\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega$  rausche? Paxton: n. d. celt. bresic „Kohl“, Varro: v. praeseco schneide vor — unsicher!), B. oleracea L. „Gemüsekohl“, m. v. v. (acephala DC.

Winterk., gemmifera DC. „Rosenk.“, sabauda L. Savoyer K. od. Wirsing, fr. chou de Savoie, e. crisped cabbage, capitata L. Kopfk. od. „Kappis“, fr. chou-cabu od. pommé, gongylodes L. Kohlrabe, e. cole-rape, botrytis L. Blumenkohl, fr. chou-fleur, e. colliflower etc.), Zier. B. oleracea v. acephala crispa Hort., fr. chou frisé vert, e. curled-german greens, B. oler. v. atropurpurea Hort., v. prolifera Hort. Sprossk., v. laciniata variegata Hort. scheck. Schlitzk., v. palmifolia Hort. Palmk. — Brassicæae Rich. Kohllartige. 2) **Brassica** marina autt. (Convolvulac., V. 1), s. Convolvulus Soldanella L. Meerstrands-Winde. S. Napus u. Rapa!

**Brassicastrum** (zu Brassica) Rchb. (Crucif. Siliq., XV. 2) Levkoi- u. levkoiblüthiger Kohl, B. Cheiranthus Vill. u. cheiranthiflora DC. (deter. v. Brassica).

**Braya** Sternb. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Bray's“ Rauke, Kriechrauke (n. d. Bot. Fr. Gabr. de Bray, Gesandter etc., † 1831), z. B. supina Koch (Sisymbrium s. L.), alpina Sternb., glabella Richards.

**Brayera** Kth. (Spiræaceen, XII. 2) „Brayer's“ Spiræe (n. D. Brayer in Constantinopel, zuerst geg. d. Bandwurm 1822), B. anthelminthica Kth. s. g. Kusso (Bstr. Abyss.).

**Bredemeyera** W. (Polygalac., XVII. 3) „Bredemeyer'strauch“ (n. d. Hofgärt. z. Wien, Fr. Bredemeyer), B. floribunda W. (Südamer.).

**Brexia** P. Th., Nor. (Sapotac. Aquifoliac., Wtst. Saxifrageen, V. 1) „Regenblatt“ (v. βρέξις Nassmachen — Schutz geg. Regen, Wtst. madagass. Name!), z. B. B. madagascariensis Ker, s. Venana mad. Lam. Poir. (B., Madag.).

1) **Breynia** Plum., Schreb. (Capparideen, XXIII. 2) „Brey'n's“ Langod. Dünnhülse (n. Jak. Brey'n in Danzig, s. d. Aut.), B. indica L. f. s. Capparis Breynia L., B. disticha Forst. (Neucaled.), arborescens R. Br. (Capparis torulosa). 2) **Br.** Forst. (Euphorbiaceen, XXI. 9).

**Brignolia** Bertol. (Umbelliferen, V. 2) „Brignoli's“ Dolde, fr. brignole „Brunelle“ (n. d. Prof. J. L. Brignoli von Brunhof in Modena), z. B. pastinacaefolia Bert. s. Sium siculum.

**Brillantasia** (-taisia) P. B. (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Brillantaise“ (n. Brillantais, Rheder d. Compagnie von Oware, Westafri.), z. B. B. owariensis P. B.

**Briza** L. (Gräser, III. 2) Zitter- od. Flittergras, fr. brize (brise), e. quaking-grass (βράζα v. βράζω od. βράζω nicke), z. B. Zier. B. maxima L. u. minor L. (Bouquets), s. gracilis Hort., Wiesen B. media L.

**Broccoli** s. Brassica asparagoides Metzg. „Spargelkohl“ (ital. Name dafür!), fr. u. e. broccoli (e. bore-cole).

**Brodiaea** Sm. (Liliac. od. Irideen, III. 1) „Brodiaë“, fr. Brodiée (n. d. schott. Kryptogamisten James J. Brodie), z. B. Zier. grandiflora, congesta u. coccinea (Nordwestamer.) s. Hookeria coronaria u. Dichelostemma congestum Kth.

**Bromelia** L. (Liliaceen, od. Bromeliac., VI. 1) Ananas, Br. Ananas L. (Ananassa autt.), fr. bromélie, e. pine-apple (n. d. schwed. Bot. Olaus Bromel, † 1705, schr. Chloris gothica), B. nudicaulis, fr. perroquet „Papageien“-An., lucida W. (lucide-virens Dill.), coarctata (Pitcairnea c.), Pourretia, lanuginosa etc. Bromeliaceae Lindl. Ananaslilien.

**Bromus** L. (Gräser, III. 2) Trespel, Dord, fr. brome u. fêtu, e. cockle, tare, darnel, auch ray (gr. βρόμος wild. Hafer), z. B. Bouquetgr. brizaeformis Fisch., Mey., in Saaten secalinus L., fr. seigle-bâtard, Bastardrogen.

**Brosimum** Schreb. (Artocarpeen, XXIII. 2) Brotnussbaum, B. Alicastrum Sw. essbarfrücht. od. rindiger Br. der Antillen (βρόσιμος essbar), s. Alicastrum arborëum P. Br.; B. (Alic.) spurium Sw.

- Brossaea** L. (Ericaceen, V. 1) „Brossäe“ (n. Gui de la Brosse, Arzt Ludw. XIII. v. Frankr.), z. B. Treibh. Br. coccinea L. (Str. Südam.).
- 1) **Brotëra** W., Spr. (-teröa DC.) (Compos. Sigesbeckieen, XIX. 2) Brotero'stblume (n. d. portug. Bot. Felix A. Brotero, Prof. z. Coimbra, † 1828), z. B. trinervata Pers., contrayerva Cav. (Millera c. ds.).
- 2) **Brotëra persica** Spr. (Labiaten, XIV. 1), s. Hyptis p. Pers. 3) **Brotëra ovata** Cav. (Büttneriaceen, XVI. 7), s. Pentapetes ov. L.
- Broughtonia** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Broughton's“-O. (n. d. engl. Bot. Arth. Broughton, Insp. d. bot. Gart. auf Jamaica im 18. Jahrh.), z. B. sanguinea, alba u. grandiflora, s. Maxillaria u. Dendrobium.
- 1) **Broussonetia** Vent. (Urticac. Moreen, XXII. 4) Papiermaulbeerbaum, Wautistrauch, fr. broussonétier (n. d. Arzt u. Nat. Broussonet in Montpellier, † 1807), B. papyrifera Vent., fr. mûrier à papier, e. papermulberry. 2) **Br.** Orteg. (Cassieen, X. 1), s. Virgilia secundiflora Cav. 3) **Br.** Gratel. (Confervac., XXIV. 3).
- Browallia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Browallie“ (n. d. Bischof J. Browallius z. Abo in Finnland, † 1737), z. B. Stuben. abbreviata, humifusa Forsk. (Buchnera h.), elata L. m. v. fl. albo Hort., Czerwiakowska Warez., demissa L.
- Brownaea** L. (-nea Jacq., W.) (Polygalaceen, XVII. 3) „Browne's“-Rose (n. Patrick Browne, s. d. Aut.), Gewächsh. B. coccinea L. „Elffaden“ (stamina naturaliter sunt XI, Pers.), Rosa de Monte W. (Hermesias vulgo Rosa de M. Loeff.).
- Brucea** l'Hér., Mill. (Rutac. Zanthophylleen, XXII. 4) „Bruce's“ Gelbholzbaum (n. d. Reis. in Abyss. J. Bruce, † 1794), B. antidysenterica l'Hér. (ferruginea ds.), trifoliata Spr., s. Evodia drupacea Lab.
- Bruchia** Schwägr. (Moose, XXIV. 2) „Bruch's“- od. Faulmoos (n. d. Apoth. Bruch in Zweibrücken, s. d. Aut.), B. vogesiaca Schwäg. (Saproma vog. Brid., v. σατρώω mache faul). Bruchiaceae Schimp.
- Brugmansia** Pers., Bernh. (Solaneen, V. 1) Stechapfelbaum (n. d. Prof. Brugmanns in Leyden, † 1819), z. B. Zier. candida Pers. (Datūra arborëa Hort.), bicolor Pers. (Dat. sanguinea R. P.) u. Knightii Horst (Dat. cornigera Hook.). 2) **Br.** Blum., Fisch. (Rhizantheen od. Cytineen, X. 1) neben Rafflesia!
- 1) **Bruguiera** Lam. (Rhizophoreen od. Caprifoliaceen, XI. 1) „Bruguieres“ Wurzelbaum (n. d. Arzt u. Reis. J. Guill. Bruguieres in Montpellier, † 1798), z. B. B. gymnorrhiza R. Br. (Rhizophora g. L.) (Ostind.) „Nacktwurzelbaum“.
- 1) **Brunellia** Hb. Bpl. (-nelia Rz. Pv.) (Terebinthac. od. Zanthoxylëen, XI. 5) „Brunelli's“ Gelbholzbaum, fr. brunellier (n. e. ital. Bot. Gabr. Brunelli z. Bologna), z. B. acutangula Hb. Bpl., aculeata u. inermis R. P. (B. Peru). 2) **Brunella** elatior Sloan. (Acanthac. XIV. 2), s. Ruellia. 3) **Brunella** T. (Labiaten, XIV. 1) s. Prunella L. (v. Bräune, geg. welche!)
- Brunia** L. (Corniculat. Bruniaceen, V. 1), Capheide (n. e. Reis. in Russl. u. d. Levante Corn. Brun, Dietr. Lex., n. Alex. Brun, Wtst. n. Corn. v. Bruyn (Lebrun) v. Haag, Reis. im Orient 1673/74 u. 1701/08), z. B. B. Levisanus L. (Protea Lev. L.), abrotanifolia L. (Levisanus capensis Petiv.), paleacea Berg. s. Berardia.
- Brunfelsia** L., W. (Brunsf.) Plum. (Solaneen, V. 1) „Brunsfels“-Fruchtbaum (n. d. alt. Bot. O. Brunfels aus Mainz, † 1534, s. d. Aut.), z. B. trifida, americana L. etc.
- Brunsvigia** (-wigia) Heist., Ker (Amaryllidëen, VI. 1) Narzissenschwertel od. Blutilie (zu Ehren d. Fam. Brunswick, Paxton, n. d. engl. Dynastie v. Braunschweig, Wtst.), z. B. B. Josephinae Red. (Amaryllis gigantëa Mar.), s. Haemanthus u. Buphane Herb.

- Brya** P. Br. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) „de Bry's“ od. falsches (grünes) Ebenholz (n. Joh. Th. de Bry, Nat. in Lüttich, † 1617).
- Bryacēae** Schimp. u. -inae Schimp. Fam. u. Ord. der Knotenmoose, s. *Bryum* L.
- Bryanthus** Gmel. (Ericaceen, X. 1) „Moosblumen-“ od. Torf-Heide, *B. repens* Gm., s. *Erica* s. *Andromeda bryantha* Thb. L. (v. *βρύον* lat. *Bryum* u. *ἄνθος* — wie Moos ausseh. Str.), *B. erectus*.
- Bryodēa** (-des) Salisb. (Liliaceen, VI. 1) Mooslilie (*βρωώδης* moosartig) (*Bryocles* Salisb. bei Wittstein, v. *βρύον* u. *ζλέος* Ruhm — Kaps. sehr vielsamig!), z. B. *ventricosa* Sal. s. *Hemerocallis coerulea* Andr. (*japonica* β. L.).
- 1) **Bryonia** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10 u. XXII. 3) Zaun- od. Gichtrübe, Entwin O. W., fr. *bryone* (*brionne*) od. *couleuvrée* (*herbe à la femme battue*, auch feu ardent), e. *bryony* (*briony*) u. *shank* (gr. *βρωονία* od. -*ώνη* üppig rank. Gew.). 2) **Bryonia** Mechoacanna *nigra* s. *Convolvulus Jalapa* „Jalapenwinde“. 3) **Br.** *nigra fruticosa* (Asperifolien, V. 1), s. *Tournefortia*. 4) **Br.** *alba geniculata* (Araliaceen, IV. 1), s. *Cissus*.
- Bryonopsis** Hassk., Arn. (Cucurbitaceen, XXI. 10) unechte Zaun- od. Gichtrübe (s. eb. u. *ὑψις* Aussehen), z. B. *erythrocarpa* Naud., fr. à fruits écarlates.
- Bryophyllum** Salisb., Hook. (Crassulaceen, V. 5) „Spross-“ od. „Keimblatt“, „Embryoblatt“, fr. *bryophylle* (v. *βρύον* keime, *φύλλον* Blatt — dies. keimt auf d. Erde liegend!), Zier. *B. calycinum* Sal.
- 1) **Bryopteris** (sc. *Lycopodium*) L. (Bärlappe, XXIV. 1) „Moosfarne“ (Namen für d. Bärlappe) (s. v., *πτερίς* Farn). 2) **Bryopteris** Nees (Jungermanniac. XXIV. 2) (Lebermoose mit Blattunterläppchen).
- Bryum** Dill. L. (Moose, XXIV. 2) Knotenmoos (Birn-, Eichen-, Stamm-, Jungfermoos), fr. *brion* od. *bry* (*brye*) (gr. *βρύον* v. *βρύω* keime — üppige M. mit birnförmigen Kapselknoten!)
- Bubon** L. (Umbelliferen, V. 2) „Scham-“ od. Mutterharzdohle, Steineppich, fr. *persil de Macédoine* (*B. macedonicum* L.), *persil des rochers*, e. *parsley-pert* (*βουβών* Schamleiste — Pfl. geg. Bubonen od. Weichengeschwülste, Wtst.), *B. Galbanum* L. s. *Anisum africanum* Pluk. (Str. Cap.).
- Bubroma** Schreb. (Malvaceen, XVIII. 1) „Ochsenfrass“ (v. *βοῦς* u. *βρώμα* Speise — ordin. Cacao nur für Vieh), z. B. *Guazuma* Juss. (*Theobroma* Guaz. L.).
- Bucco** Wendl. (Rutac. Diosmeen, V. 1) Duftraute (*bucco* Nam. in Südafr.), z. B. *B. obtusa* Wendl. s. *Agathosma obt.* Bartl. (*Hartogia ciliaris* L., *Diosma ciliata* Lam.).
- Bucephalon** (-um) Plum. (Urticaceen, XXII. 4) „Ochsenkopf“ (*βοῦς* u. *κεφαλή*), *B. racemosum* L. s. *Trophis* (*Batis* Jacq.) *americana* L. „Futternessel“ (v. *τροφή* Nahrung).
- 1) **Bucēras** Mnch., Ser. (zu *Trigonella*) (Papilionaceen, XVII. 4) „Ochsenhorn“ (*βοῦς* u. *κέρας* Horn). 2) **Bucēras** P. Br. (sc. *Bucida*) Sw. (*Combretac.* od. *Myrobalaneen*, X. 1) Ochsenhorngriffel.
- Bucērātes** (zu *Astragalus*) Rchb. (Papilionac. XVII. 4) Kaffee-Stragel, *B. baeticus* L. (— als Surrogat) (s. eb.).
- Bucēda** L. (*Combretac.* od. *Myrobalaneen*, X. 1) „Ochsentöter“, Rindsgift, Kuhhornbaum D. (*βοῦς* u. *caedo* töte, in compos. *cido*, subst. *cīda*). *B. Bucēras* Sw., fr. *grisgris*, e. *oxe-bane* (*κέρας* Horn — Äste hornart.!).
- Buchnēra** (Büchnera) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Büchner'sblume“ (n. d. Nat. J. G. Büchner, schr. üb. d. Pfl. d. Voigtlandes), z. B. *Treibh. B. coccinēa* Scop. s. *Achimēnes cocc.* Pers. (*Gesneria pulchella* Sw., *Trevirania cocc.* W.). — *Büchnerēae* (sc. *Personatae*) Rchb.

- Buddlĕa** L. (-leya, -leia, -leja) autt. (Verbenac. od. Loganiaceen, IV. 1) „Buddle'sblume“ (n. d. engl. Bot. Adam Buddle), z. B. Zier. B. globosa L. (capitata Jacq.), curviflora Hook. Arn. (Japan), Lindleyana Fort. (Chin.) etc.
- 1) **Buettneria** Loeffl. (Byttn. — Pers.) (Columniferen od. Büttneriaceen, V. 1) „Büttnerie“ (n. d. Prof. Dav. Büttner in Göttingen, † 1768), z. B. scabra Pers. u. carthagenensis Jacq. (Südamer.). — Büttneriaceae DC. (Rehb. 2) **Büttneria** Duh. (Nyctagineen, V. 1).
- Buglossum littorĕum** Rumph. (Lobeliaceen, V. 1) „Küsten-Ochsenzunge“ ( $\beta\acute{o}\upsilon\zeta$  u.  $\gamma\lambda\acute{\omega}\sigma\sigma\alpha$ ), s. Scaevola Lobelia L.
- Bugrĕna** DC. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) (zu Ononis DC.) „Ochsenkorn“ ( $\beta\acute{o}\upsilon\zeta$  u. grĕnum Korn).
- Bugranoidĕs** DC. (Legum. Genisteen, XVII. 4) (zu Ononis DC.) (s. eb. u.  $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\mu\alpha\iota$  gleiche).
- Bugŭla** Juss. (-jŭla T.) (Labiaten, XIV. 1) Günsel, fr. bugle i. q. Ajuga L. (fr. bugle latinis. = Ajuga, unbek. Etymologie!).
- Bulbine** W. (-na Dietr.) (Liliaceen, VI. 1) „Zwiebel-“ od. „Bollenlilie“ (v. bulbus Zwiebelknolle od.  $\beta\omicron\lambda\beta\acute{\epsilon}\nu\eta$  d. Alten = Muscari comosum), z. B. frutescens L. u. annua W., s. Anthericum.
- Bulbocapnos** Bernh., Drej. (Fumariaceen, XVII. 2) „Knollen-Erdrauch“ (s. eb. u.  $\alpha\alpha\tau\nu\acute{o}\zeta$  Rauch, -knollenwurzl. Erdrauch), B. cavus Drej. = Corydalis cava Wahlbg. „Hohlwurz“.
- Bulbocastĕnum** T. (sc. Bunium) L. (Umbelliferen, V. 2) Ackermuss, Erdkastanie, fr. bulbocastane, terrenoix u. ernote, e. earth-nut (bulbus Knollen, castĕnum Kastanie).
- 1) **Bulbocodium** L. (Colchicaceen od. Melanthac., VI. 1) „Zwiebelglocke“, fr. bulbocode (v. bulbus u.  $\omega\acute{\omicron}\delta\iota\omicron\nu$  Glocke, Wst. v.  $\omega\acute{\omicron}\alpha\zeta$  dem.  $\omega\acute{\omicron}\delta\iota\omicron\nu$  Fell — rauhhaut. Zwiebel), z. B. vernum L. Frühlings-Lichtblume, Uchtblume (d. i. Fröhldämmerungs-), fr. Crocus rouge u. groin de cochon „Saurüssel“. 2) **Bulboc.** (sc. Narcissus) L. (Amaryllideen, VI. 1) Waldglöckchen, -narzisse, fr. campanelle (-nette), s. Bulbocodium campanula autt.
- Bulbophyllum** Lindl. (Bolboph.- P.-Th.) (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Knollenblatt“ od. „Blätterknolle“ ( $\beta\acute{o}\lambda\beta\omicron\varsigma$  lat. bulbus u.  $\varphi\acute{\upsilon}\lambda\lambda\omicron\nu$  Laubblatt — Wurz. m. falschen, blättrigen Knollen), z. B. occidentale Spr., s. Dinĕma Lindl. s. Epidendron polybulbon Sw.
- Bulgarĭa** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Ranzenbecherchen (bulga Sack etc. — Fruchtlager sackartig!), z. B. sarcoides, inquinans etc.
- Bulliarda** (-ia) DC. (Crassulac., IV. 4) Wasserniedlich (n. P. Bulliard, † 1796 z. Paris, s. d. Aut.), B. Vaillantii DC., s. Tillaea aquatica Lam.
- Bumelia** Sw. (Myrsineen od. Sapotac. Lucumeen, V. 1) Eisenholz, s. g. Hochstamm D. ( $\beta\omicron\upsilon\mu\epsilon\lambda\acute{\iota}\alpha$  eine Eschenart!), z. B. B. Manglilla W., foetidissima L., tenax W., L. f. (Chrysophyllum carolinianum Jacq.).
- Buniadĕae** DC. Zackenschotenartige, s. Bunias.
- Bunĭas** L. (Cruciferen Buniadeen, XV. 2) Zackenschote, -kraut O. W., Bergkohl, Meersenf D., fr. buniade (gr.  $\beta\omicron\upsilon\nu\acute{\alpha}\zeta$  kegelf. Rübe, Wst. v.  $\beta\omicron\nu\nu\acute{o}\zeta$  Hügel — wächst auf solchen), z. B. B. Erucago L. (Eruca monspeliaca Bauh.) u. spinosa L. (Crambe spinosissima arabica Shaw), syriaca W. (Anastatica hierochuntica Crantz s. syriaca Jacq.), s. g. „Jerichorose“. — Buniadĕae DC.
- 1) **Bunium** L. (zu Carum) Rehb. (Umbelliferen, V. 2) Ackerkümmel, Knollendolde Leun., fr. bunion (v.  $\beta\omicron\nu\nu\acute{o}\zeta$  Hügel u. Brüste — knoll. Form d. Wurzel), B. Bulbocastĕnum Koch (s. d.) „Ackermuss“, fr. terrenoix. 2) **Bunius** (s. Aethusa) L. (Umbellif., V. 2) Bergkümmel, s. Carum Bunius L. (Saxifraga montana minor Moris.). 3) **Bunius** (sc. Stilago) Burn. (Stilagineen, XXII. 3) Brüste-Griffelbaum (s. v.).
- Buphthalmĕae** Less., DC. Ochsen- od. Rindsaugen, s. sogl.

- Buphthalmum** L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Ochsen“- od. „Rindsauge“, fr. buphthalme od. oeil de boeuf, e. ox-eye (βοῦξ u. ὄφθαλμὸς Auge), Zier. grandiflorum L., cordifolium Waldst. s. speciosissimum Schreb., s. Telekia cordif. DC., speciosissimum L., salicifolium DC., aroescens L. (Asteriscus frutescens Dill.) (Amer.).
- Bupleurum** L. (Umbelliferen, V. 2) Hasenohr, eig. „Ochsenlunge“ (od. -rippe), fr. oreille de lièvre, e. hare's-ear (s. v. u. λευκὸν Seite, Lunge, Rippe), z. B. Gartenstr. fruticosum L. u. perfoliatum L., fr. perce-feuille, s. Buprestis fruticosa Spr. s. sogl.
- Buprestis** Spr. (Umbelliferen, V. 2) Strauch-Hasenohr (gr. βούλοιστις ein Käfer u. eine Pfl. d. Griechen, v. βοῦξ u. ἴσθω blühe auf — Wirk. d. Pfl. auf d. Rindvieh!), B. fruticosa Spr. (Tenorea frut. ds.), s. Bupleurum fr. L. (Orient u. Südeur.).
- Burchellia** R. Br. (Lonicereen od. Rubiaceen, V. 1) Büffelholz, -horn (n. d. engl. Reis. in Südafr. W. J. Burchell, schr. 1822 Beschreib. etc.), B. capensis R. Br. s. Lonicera bubalina L. (Cephaelis bub. Pers.).
- Burlingtonia** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Burlingtonie“, Gräfin Burlington's Prachtorchis (z. Ehr. d. liebl. Countess Burlington), z. B. rigida Lindl., fragrans Rchb. f. (Bras.).
- Burmanna** L. (Hämodorac. od. Amaryllideen, VI. 1) „Burmannie“ (n. Joh. Burmann, Prof. in Amsterdam, s. d. Aut.), z. B. Gewächsh. disticha L. (Ceyl.), biflora L. (Tripterella coerulea Elliott) (Virgin.). — Burmanniaceae Bartl. (zu Ensatae) DC.
- Bursaria** Cav. (Violarien od. Pittosporaceen, V. 1) „Taschenblume“ (bursa Börse od. Tasche — bez. d. Kapsel!), z. B. spinosa (Str. Neuholl.).
- Bursēra** Jacq., Schreb. (Terebinthac. Amyrideen, XXIII. 2) Chibou- od. Weissgummibaum, Simarubab. D., fr. chibou u. gommier (n. Joach. Burser v. Kamenz in Neapel zu Ende d. 16. Jahrh.), B. gummifera L., fr. gomart (Westind.), acuminata W. etc., s. Terebinthus major etc. — Burseraceae DC., -serae (sc. Terebinthaceae) Rchb.
- Butēa** Roxb. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Bute's“ Bohne (n. John Earl of Bute, schr. Botanical tables, 9 Bde. in nur 12 Exempl., ein Prachtwerk), z. B. frondosa Rxb. (Erythrina monosperma Lam., Plaso Rheed.), superba peltata Rxb. etc. (Ind.).
- Butomacēae** Grck., -tomēae Rich., DC. (zu Helobiae DC.) Wasserliesche Leun., s. sogl.
- Butōmus** T., L. (Hydrocharideen od. Butomeen, IX. 3) Wasserliesch, -viole, Blumenbinse, Schwanenblume, Kameelheu, fr. butome, jonc-fleuri (-odorant), e. water-violet (-gladiole), flowering-rush (gr. βούτομος v. βοῦξ u. τόμος v. τέμνω schneide ab — „Ochsen schnitt“ — nämll. weiden sie ab!), B. umbellatus L., fr. butome ombellē, e. water-violet umbellate.
- Butonīca** Juss., Lam. (Myrtaceen, XII. 1) „Ochsenkraft“ (βοῦξ u. τόνιχος v. τόνος Stärke etc., Wtst. v. buton Name d. Baums auf d. Molukken, baeton in Malayschen), z. B. terrestris rubra Rumph. (Eugenia acutangula L.), speciosa Juss. (Barringtonia sp. L.).
- Butyrospermum** DC. (Sapotaceen, VI. 1) „Buttersamen“, -baum (v. βούτυρον Butter u. σπέρμα Samen), B. Parkii s. Micadania R. Br. Scheebaum, Mungo-Park (Sudan).
- Buxbaumia** L., Hall. (Moose, XXIV. 2) „Buxbaum's“-M., fr. buxbaume (n. d. Nat. u. Reis. J. Chr. Buxbaum, † 1730 bei Merseburg). — Buxbaumiaceae Schimp.
- Buxēae** DC., Rchb. (-acēae Klotzsch, Grck.) (zu Butaceae Euphorbiaceae Rchb.) Buxgewächse Grck., s. sogl.
- Buxus** L. (Rutac. Euphorbiac. od. Trikokken, XXI. 4) „Bux“- od. „Buchsb.-baum“, fr. buis (bouis) od. bois-béni, e. box-tree (gr. πύξος v. πυξός fest — weg. d. Holzes, od. πύξις Būchse, Wtst., wozu verarb.), Zier.

*B. sempervirens* L., m. d. Formen arborescens u. suffruticosa („Staudenbux“); v. v. von arborescens: myrti-, thymi-, angusti-, rotundifolia etc., *B. balearica* Lam. s. arborēa ds., etc.

**Byra-Ebēnus** Antillen-Ebenholz, s. Ebēnus (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) (vaterl. byr).

**Byssacēi** Rehb. Faser- od. Schimmelpilze, s. sogl.

**Byssus** Dill., L. (Schimmelpilze, XXIV. 4) Gruft- od. Schwindschimmel, Haar- od. Staubaftermoos D., fr. byssus u. fleur d'eau „Priestley'sche Materie“ (gr. βύσσοϛ Flachs, feinste Faser etc.), z. B. antiquitatis L., Jolithus L., „Veilchenstein“ (— rot. Steinüberz. v. Veilchengeruch).

**Bystropōgon** l'Hér., W. (Labiaten, XIV. 1) Kelch- od. „Stopfbart“, fr. bystropoque (v. βύστροα d. Stopfen, πώγων Bart — Krone durch Haare verstopft!), z. B. suaveolens l'Hér. (Hyptis s. Pers. u. Mesosphaerum hirsutum P. Br.) etc., s. Mentha, Heliotropium canariense Mill.

**Byttneria** Loefl., s. Büttneria L., Pers.

**Cabomba** Aubl. DC. (Nymphaeaceen, XIII. 1) Haar-Nixe (v. d. hebr. kab Hohlmass, Wst. arab. Name, — d. untergetaucht. Blätt. haar-spaltig!), *C. aquatica* Aubl. (Nectris aq.), peltata F. Müll. — Cabombēae Rich. (zu Nymphaeacēae DC. od. Hydropeltidēae Bartl.).

**Cacalia** L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) Pestwurz, fr. cacalie, e. butterbur (*zaxalīa* Diosc. Huflattich, viell. v. *zaxōϛ* schlimm u. *līav* sehr — bös. Unkraut!), z. B. alpina W. (Tussilago *Cacalia* Scop., *Adenostylis viridis* Cass.), fr. c. des alpes, Zier. *C. Kleinia* L. canarische, *sonchifolia* L. (coccinea Sweet) m. v. aurantiaca Hort., s. *Emilia sagittata* Cass., fr. c. écarlate, e. scarlet-Cacalia. — *Cacaliēae* DC.

**Cacāo** T. (-āo Wst.) (sc. Theobrōma) L. (Büttneriaceen, XVI. 4) „Cacaobaum“ (vaterl.), *C. guianensis* Aubl. = Theobr. *Cac. L.*, fr. cacaoyer (-caotier), e. cacao-tree.

**Cachrys** L., Spr. (Umbelliferen, V. 2) „Gersten“- od. Nussdolde (*zázovϛ* Gerste — Samenähnlichkeit od. v. *zāw* brenne, n. Plinius — brennendschmeck. Samen!), *C. maritima* Spr. (*Crithmum marit. L. f.*), *odontalgica* Pall., *microcarpa* Spr., etc., s. *Rumia* Hoffm.

**Cacoucia** Aubl. DC. (Combretac. od. Myrobalaneen, XI. 1) „Cacoucie“, fr. cacouier (vaterl.), *C. coccinea* (Schousbaea c. W.) (Schlingstr. Guiana).

**Cactēae** DC. (-ti Juss.) Cactusartige, fr. cactoïdes (zu Ord. od. Kl. Peponifērae Kürbisfrüchtige, Endl.).

**Cacti** Juss.: a) Melocacti, b) Echinocacti, c) Mamillariae, d) Opuntiae, e) Cerēi, f) Epiphylla, g) Rhipsales.

**Cactus** L. (Cacteen, XII. 1) Fackeldistel, fr. cacte, cardasse (gr. *zákτος* v. *zaxōw* behandle übel od. *zaxōūmai* bin verletzt, Wst. — weg. d. Stacheln!), z. B. coccinellifer L. (Opuntia c. T.) Cochenillen-C. od. Nopal, fr. raquette, *C. Ficus indica* L. indian. Feige, e. pimpillo, *C. alatus* L. (Epiphyllum al. Haw.) „Flügel“-C., *C. truncatus* Lk. (Epiph. trunc.) stutzästiger, *C. speciosus* Cav. (-sissimus Desf.) = *Cereus speciosus*, fr. cierge specieuse, *C. grandiflorus* L. (*Cereus* gr.), s. g. Königin d. Nacht, fr. serpent, *C. Melocactus* L., fr. melonchardon, *C. triangularis* L., fr. liane à vers, u. s. f.

**Cadaba** Forsk. (Capparideen, V. 1) „Cadaba“-Kapper (v. d. arab. kadhab), z. B. *farinosa* Forsk. (Bornu, glücl. Arab.), s. *Stroemia* far. Vahl, *C. glandulosa* Forsk. (*Stroemia* gl. Vahl) etc.

**Caelestina** s. Coelestina!

**Caesalpinia** Plum., L. (Legumin. Cäsalpinieen od. Cassieen, X. 1) Brasilienholz, Fernambukholz, e. brasil-wood (fernambuck-) (n. d. Aristo-



teliker Cäsalpinus Aretinus 1519—1603, s. d. Aut.), z. B. C. echinata Lam. rotes Bras., C. (Haematoxylon) campechiana L. Campecheholz, e. campeche (-pesh) od. indian wood, C. Sappan L. Java- od. Bimas-Rotholz, C. vesicaria L. Brasilienholz, fr. brésillot. — Caesalpinieae (sc. Cassiäe) R. Br., Rchb.

- Caesia** R. Br. (Liliaceen, VI. 1) „Cäsium“-Lilie (n. d. Nat. Friedr. Cäsus, schr. tabulae philos. etc. Romae 1651), z. B. vittata, corymbosa etc. R. Br. (Neuholl.), s. Anthericum pusillum etc.
- Caesulia** Roxb. (Compos. Rolandreen, XIX. 5) „Tretblume“ (v. caesus erschlagen, οὐλλή Narbe — wie zertreten ausseh. Pfl. Paxton, Wtst.: malabar. Namen!), C. orientalis Rxb. (Meyera or. DC.), radicans W. (Meyera guineens. Spr.), s. Cryphiospermum reptans (zoίγιος versteckt — „kriechend. Verstecksamen“). — Caesuliäe DC.
- Cajanus** Spr., DC. (Cajan Ad.) (sc. Cytisus) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Taubenbohne (v. d. malab. catjang = Taubenfutter, Paxton), z. B. Kalth. C. tricolor, argentëus, C. scarabaeoides P. Th. = Dolichos Catjang L. ind. Bohnenstr., etc., s. Cytisus.
- Cajophora** Presl (Loasaceen, XIII. 1) „Brennkraut“ (v. Caja Nesselbär od. Juckhaarraupe, v. *καίω* brenne — Paxton u. Wtst. — weg. d. Brennhaare unangreifb.!), C. lateritia Presl (Loasa lat. Jacq. s. aurantiäca Hook.).
- Cakile** T. (Cruciferen Lomentaceen, XV. 2) Meersenf, Rocket OW., fr. caquillier u. roquette de mer (v. *κακός* schlimm, *κίλη* Knäuel od. *κίλη* Geschwulst, Wtst.? Leun: arab. Wort!). — Cakilineäe Rchb.
- Caladenia** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Schöndrüse“ (*καλός* u. *ἀδύνη*, -έρος Drüse — Glandelreihen auf d. Lippenscheibe!), z. B. alba, carnëa, coerulëa etc. R. Br. (Neuholl.).
- Caladium** Vent. (Araceen, XXI. 1) Schönblatt-Aron (*καλός* u. *ἀδύνη* genug, sehr, Vilm. u. Wtst. aus ein. indisch. Wort geb.), z. B. Zier. C. esculentum Vent. karaïbischer Kohl od. Tarro, essb. Zehrwurz, fr. chou caraïbe od. calocasie, auch taro (tallo, tayó) u. gouet comestible, e. eatable cole, violacëa Desf. u. macrorrhizon (Stube). C. seguinum Vent. Schierlings- od. Schweigrohr, fr. sogue od. cigue (lat. cicuta Schierling).
- Calamagrostis** Roth, Ad. (Gräser, III. 2) Reith- od. Schilfgras (v. calämus Schilfrohr u. *ἀρωόστις* Gras), z. B. litorëa DC., epigeios Rth. „Land“-Sch. etc.
- Calamariae** Endl. Kl. d. Schafftarne (s. eb.).
- Calamita** P.-B. (Gräser, III. 2) Riesenrohr (gr. *καλάμιτος* von Halmen od. Rohr), z. B. gigantëa P. B. = Apluda gig. Spr.
- Calamintha** Pursh, Mch. (Labiaten, XIV. 1) „Schönminze“, Basilienquendel Leun., Kölme O. W., fr. calament, e. calamint (*καλαμίνθη* v. *καλός* u. *μίνθα* lat. mentha Minze od. Münse!).
- Calamites** Suck. (foss. Equisetaceen) foss. Schafthalm, „Calamit“ (gr. *καλαμίτης* z. Halm gehör.).
- Calampelis** D. Don (Bignoniaceen od. Sesameen, XIV. 2) „Schönrebe“, Hängfrucht (*καλός* u. *ἀμπελις* Rebe etc.), z. B. Zier. C. scabra Don, fr. bignone du Chili, e. rough-podded E., s. Eccremocarpus scaber Rz. Pv.
- 1) **Calämus** (sc. Acörus) L. (Juncaceen od. Acoraceen, VI. 1) „Kalamus“, deutscher Zittwer, fr. acore, e. wild ginger (v. d. arab. kalam od. Wtst. kalem, lat. calämus Rohr, Halm). 2) **Calamus** L. (Palmen, VI. 1) Schilf- od. Rotangpalme, s. g. spanisches Rohr, fr. rotang (rotin u. raton), e. ratan, auch s. g. Palmried, Zier. C. Draco W. Drachen-Rotang, s. g. Drachenblut.
- Calandrinia** H. B. K. (Portulacaceen, XI. 1) „Calandrinie“ (n. dem schweizer. Bot. J. L. Calandrini, schrieb Thesen etc. 1734), z. B. Topf.

- C. umbellata DC., grandiflora Ldl. (glauca Schrad.), speciosa Ldl., discolor Schrad. (elegans Hort.) etc., s. Talinum Ad.
- Calanthe** Lindl., R. Br. (Orchid. Vandeën, XX. 1) „Schönblüte“ (s. v. u. ἀρχή — schöne Bl., besond. gross. Labell! Wtst.), z. B. angraeciflora Rehb. f., veratrifolia R. Br. (Limodorum v. W.), purpurea Ldl. (Ceyl.) etc.
- Calathëa** G. F. W. Mey. (Scitamineen od. Marantaceen, I. 1) „Korb- lippe“ (v. κάλαθος Handkorb — Form d. höhl. Labells! Wtst.), z. B. zebrina Mey. (Maranta z.), leopardina Reg., lutëa Spr. etc.
- Calbõa** Van Houtt. (Convolvulaceen, V. 1) „Calboe“, Langfaden (n. J. Calbo, span. Arzt in Valencia, 16. Jahrh.), z. B. globosa, s. Macro- stëma Pers.
- 1) **Calceolaria** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Pantoffelblume“, fr. cal- cëolaire, e. calceolaries (v. calcëolus kleiner Schuh), z. B. Zier. ru- gosa Rz. Pv., Youngii hybrida Hort., scabiosaefolia Sims, plantaginëa Sm. 2) **Calceolaria** Loeffl. (sc. Viola) L. (Violariëen, V. 1) Pantoffel- Veilchen.
- 1) **Calceõlus** (sc. Cypripedium) L. (Orchideen, XX. 1) „Frauensschuh“ (calceõlus dem. v. calcëus Schuh). 2) **C. Benth.** (Labiaten, XIV. 1) „Schuhchen“, s. Plectranthus l'Hër. u. Germanëa Poir.
- 1) **Calcitrãpa** G. (sc. Centaurëa) L. (Comp. Centaureen, XIX. 3) „Fer- senangel“, s. g. Sterndistel, fr. chausse-trape (v. calx, -cis Ferse, trapa Fussangel, fr. trape — weg. d. lang. Kelchstacheln!), s. Calc. Hippophaestum G. (v. ἵππος Pferd, φαιστός leuchtend). 2) **C.** (sc. Centranthus) DC. (Valerianeen, III. 1) Stachelspornblume, s. Va- leriaana Calcitr. L. (— weg. d. stachelförm. Nektarien!).
- Caldcluvia** G. Don (Corniculaten Cunoniaceen, VIII. 2) „Caldcluvie“ (n. Alex. Caldclough, Samml. in Chili 1819—25), C. paniculata Don, s. Weinmannia p. Cunn.
- Calëa** R. Br. (Compos. Solidagineen, XIX. 2) „Schönaster“ (?) (καλός? od. st. Callea, Hahnenbart, gr. κάλλεα, lat. palea Bart, Kamm d. Hahns, Riemer? — unsicher, viell. v. G. Caley, st. Caleya! s. sogl.), z. B. solidaginëa R. Br. „Schönrute“ (?), lobata Ow. (Co- nyza l.), javanensis Spr. (oppositifolia L.), s. Isocarpha opp. R. Br.
- Caleãna** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Caley's“-O., s. Caleya Ait. (n. George Caley, Insp. d. bot. G. St. Vincent, Reis. in Austral. anf. dies. Jahrh.).
- Calecstasia** R. Br. (Juncaceen od. Bromeliac., VI. 1) Blaubinse, Ana- nasbinse, C. cyanëa R. Br. (Str. Neuholl.), s. Huttia elegans (v. κα- λός u. ἐξοτασι; d. Ausrecken — Saum d. Blumendecke bild. einen Stern! Wtst.). — Calecstasiëae Endl.
- Calendõla** L. (Compos. Calendulaceen, XIX. 4) Regenrose, Ringel- od. Totenblume Vilm., fr. calendule u. souci, e. marigold (corn-gold) (dem. v. calendae Kalender — zeigt Regen an!), z. B. C. arvensis L., Zier. C. officinalis L. m. v. v., z. B. ranunculoides, v. Meteor, v. fl. pleno Hort., fr. souci-double des jardins, e. double-flowering common marigold, v. complanata Hort., fr. Le Proust, e. level-mari- gold; C. pluvialis L. s. hybrida Sweet (Meteorina gracilipes Cass.) m. v. fl. pl. — Calendulacëae Rehb.
- Calepina** Ad. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Schötchen-Löffelkraut, Brach- schötchen, Wendich O. W. (st. Chalepina i. e. Pfl. aus Chalep od. Haleb [Aleppo] in Syrien).
- Caleya** Ait. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Caley's“-O., s. Caleãna R. Br., z. B. major u. minor R. Br. (Neusüdwaless). Vgl. Caleana!
- Calimëris** DC., Nees (Compos. Astereen, XIX. 2) „Schönschnitt“, fr. calimëride (καλός u. μερίς Schnitt — elegant geschn. Blätt., Wtst. Anthodium aus 2 bis 4 Reihen krautiger Schuppen!), Zier. C. incisa

DC. (Aster inc. Fisch.), fr. c. à feuilles incisées, e. cut-leaved c., s. Aster Cassiarabicus.

- Calinča** Aubl. (Dilleniaceen, XIII. 4) Raspelstrauch (v. *καλινός* hölzern, v. *κάλον* Holz, Wtst. guian. Name!), z. B. scandens Aubl. s. Tetracera Calinea W. (Doliocarpus Cal. F. Gmel.).
- Calla** L. (Araceen, XXI. 1) Schlangenwurz Seub. (Drachen-), Dutenbeere, fr. calle (chou-calle), e. dracon's-wort (v. *κάλλος* Schönheit? st. Cala v. *καλός* schön?), z. B. C. palustris L. Wasser-Aron, fr. c. des marais, e. marsh-Calla. Stube: C. aethiopica L. (Richardia aeth. Kth.). — Callacæe DC. Bartl. (zu Ord. Aroïdeae Bartl.) Callagewächse.
- 1) **Callicarpa** L. (-us autt.) (Labiaten od. Viticeen, IV. 1) „Schön“- od. Wirbelbeere, fr. callicarpe (*κάλλος* s. eb. u. *καρπός* Frucht etc.), z. B. Zier. Murasacki (fälschl. Deutzia gracilis), purpurea (Porphyrea dichotoma Lour.), umbellata Lour. (Str. Cochinch.), americana L., arborča Roxb. (Nepaul) etc. 2) **C. lanata** autt. (Lauraceen, XI. 1) s. Tomex tomentosa L.
- Callichrōa** Fisch., Mey. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Schönfarbblümchen“, Schönstrahl Rmpl. (*κάλλος* u. *χρῶμα* Farbe etc. — schön gelbe Bl.!), z. B. Zier. C. platyglossa F. M., fr. c. à larges ligules, e. broad-tongued C. „breitstrahl.“
- Callicocca** Schreb., DC. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1) „Schönbeere“, Brechwurz (s. v. u. *κόκκος* Korn etc.), C. Ipecacuanha Brotero, s. Cephaelis „Kopfbeere“, s. d.
- Calliōre** Lk. (Amaryllid., VI. 1) „Schönmädchen“ (s. v. u. *κόρη* od. *κόρη* [κοίρη] Mädchen).
- Calligonum** L. (Polygonaceen, XI. 4) „Schönknöterich“, s. g. Hackenkopf D. (s. v. u. *γόρυ* Knie, Knoten — st. d. Blätt. mit merkw. ausseh. Auswüchsen, Wtst.), z. B. asperum Lour. (Trachytella Callig. DC.), polygonoides Pall (Armen.), s. Pallasia l'Hér. (Pterococcus „Flügelkorn“).
- 1) **Calliopsis** Rehb. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Schön“- od. Mädchenauge (s. v. u. *ὄψις* Auge, Antlitz etc.), z. B. Zier. C. bicolor v. purpurea, v. nana, v. Drummondii T. u. Gr. u. marmorata, s. Comropsis tinctoria Bart. 2) **Calliopsis** Sweet (Geraniaceen, XVI. 5) „Schöngesicht“, s. Eumorpha DC. (Pelargonium elegans, grandiflorum u. variegatum W.).
- Calliparia** Rehb. (zu Aconitum) Rehb. (Ranunculac., XIII. 3) „Schönwangen“-Sturmhut (*καλλιπαρεία* schönwangige), z. B. delphinifolia DC.
- 1) **Callirrhōe** Nutt., A. Gray (Malvaceen, XVI. 8) „Kallirrhōe“, „Schönfluss“-M. (n. d. Oceanide Kallirrhōe, d. i. „Schönfließende“, *καλός* u. *ὄρη* Fluss), z. B. digitata, pedata A. Gray (Nuttallia p. Hook., Sida p. Spr.), involucrata A. Gr. (Malva inv. Torr. Gr.) etc. 2) **Callirrhōe** Lk. (Narzisseen, VI. 1).
- Callisia** L. (Commelynaceen, III. 1) Schön-, Blau- od. Kriechlilie (s. v. u. fr. lis Lilie), z. B. C. repens L. s. g. Zärtling D.
- 1) **Callistachya** Sm. (-ys Vent.) (Cassieen Cäsalpinieneen, X. 1) „Schönähre“ (*κάλλος* u. *στάχυς* Ähre), z. B. Gewächsh. C. lanceolata Vent., ovata Bot. Mag. etc., s. Oxylobium Andr. 2) **Callistachya** Raf. (Scrophulariineen, II. 1) s. Veronica virginica L.
- Callistemma** Cass., R. Br. (fehl. -stema!) (zu Aster) Rehb. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Schönkranz“, Schönkrone *κάλλος* u. *στῆμμα* Kranz, Krone — d. Borst. d. äuss. Pappus bilden einen solchen, Wtst.), s. Aster chinensis (sinensis) L. u. indicus L.
- Callistemon** R. Br. (Myrtaceen Melaleuceaceen, XII. 1) „Schönfaden“,

Reiherbusch, Flaschenbürste (s. v. u. *στῆμον* ὁ lat. stamen Faden — sehr lange Staubfäden!), *C. speciosus* DC., *lanceolatus semperflorens* etc., s. *Metrosideros* G.

- Callithamnion** (-um) Lyngb. (Florideen-Tange, XXIV. 3) „Schönbusch“ (*γαυρίον* dem. *γαύρο*; Busch — stark verzweigte purp. Fäden!).
- Callitriche** L., W. (Onagreen Callitrichineen, I. 2) Wasserstern, eig. „Schönhaar“, fr. morgeline d'eau (s. v. u. *θρίξ*, *τρίχος* Haar). — Callitrichaceae Rehb. (zu Onagraridae Juss.).
- Callitris** Vent. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Schmuck-Cypresse (st. *Callitrix* gr. *καλλιθρίξ*, Wtst. *τρίξ* dreimal — dreizähl. Quirlblätter!), z. B. *australis* Vent.
- Callixène** Juss., Lam. (Smilacineen, VI. 1) „Schönfremde“, -myrte (*ξενός* fremd), z. B. *marginata* G. (Str. Südamer.), s. *Enargëa marg.* Schreb.
- Callocoeca** (sc. *Cordia*) L. (Convolvulac., V. 1) „Schönpflaume“, *Sebeste* (*κόκκος* Korn, Beere etc.).
- 1) **Callopisma** Mart. (Gentianeen, V. 1) „Schönsaft“-Blume (*ὄπισμα* Pflanzen-Milchsaft), z. B. *perfoliata* M., s. *Dejanira* Schlichtd. 2) **C. de Not.** (Flechten, XXIV. 3) „Schönsaft“-Fl. (Wtst. *ὄπισμα* Ansehen (?), *ὀπίζομαι* habe Acht!).
- Callūna** Salisb. (Ericaceen, VIII. 1) „Besenheide“, fr. *bruc* od. *bruyère*, e. heath, sweet-broom u. furze, z. B. *Zier. C. vulgaris* Sal. (*Erica* vulg. L.), e. common ling, m. v. v. (*καλλύνω* reinige — als Besen!). — Callunaceae (sc. *Ericaceae*) Rehb.
- Calobotrya** Spach (zu *Ribes*) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) „Schöntrauben“-Johannisbeerstr. (*καλός, βότρυς, -υος* Traube), *Zier. C. s. Ribes sanguinèum* Pursh m. v. v. *atro-sanguinèum, coccinèum* u. *rosèum* Hort.
- Calocasia** fehlerh. st. *Colocasia*, s. ḍ.
- Calocëra** Fr. (-cëras Cord.) (Pilze, XXIV. 4) „Schönhorn“ (*κερός* od. *κέρας*; Horn), z. B. *essb. furcata* u. *viscosa* Fr.
- Calochilus** R. Br. (Orchideen, XX. 1) „Schönlippe“ (*χαίλος*; Lippe — hier Labell!), z. B. *campestris* u. *paludosus* R. Br. (Neuholl.).
- Calochortus** Pursh (Juncaceen od. Liliaceen, VI. 1) „Schöngras“-Lilie (*χόστος* Gras, Futter — Kraut m. schönen Doldentrauben, Wtst.), z. B. *Zier. elegans* Pursh (Louisiana), *venustus* s. *ilacinus* Bak., *glaucus* Reg., *splendens* Benth.
- Calodendron** Thb. (Rutaceen, X. 1) Rauten- od. „Schönbaum“ (*δένδρον* B. — schöne bleib. Blätt. u. fleischf. Blüten, Wtst.). *C. capense* Thb.
- 1) **Calodracon** Van Houtt. (Araceen, XXI. 1) „Schöndrachenwurz“ (*δράκων* Drachen), *C. nobilis* Van Houtt. 2) **Calodracon** Benth. (Labiaten, XIV. 1) zu *Dracocephalum* L. „Schöndrachenkopf“.
- Calogyne** R. Br. (Campanulaceen, V. 1) „Schöngriffel“-Glockenbl. (*γυνή* — Griff. dreispaltig, jede der drei Narben mit einer Decke).
- Calonyction** Choisy. (Convolvulac., IV. 1) „Nacht“- od. „Pracht“-Trichterwinde (*νίξ, -ντος* Nacht — über Nacht offen!), *Zier. C. speciosum* Choisy. (*Ipomoea Bona Nox* L., fr. *Ipomée bonne-nuit* od. *Calonyction élégant*, e. excellent *Ipomoea*), *macrantholeucum* Colla s. *Ipom. mexicana* v. *grandiflora* alba Hort.
- Calophāca** Fisch. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Schönlinse“ (*φακός* od. -νή Linse), *Zier. volgarica* Fisch., s. *Cytisus pinnatus* Pall. (*Colutea* volg. Lam., *Adenocarpus* wolgens. Spr.).
- Calophyllum** L. (Guttiferen Garcinieen, XIII. 1) „Schönblatt“, fr. *calaba* (*φύλλον* Laubblatt — prächt. Bl.!), z. B. *Inophyllum* W. „Schönaderblatt“ (*Tacamahaca* W.) grosses Sch. W., bourbon'scher od. grüner Balsam Leun., *C. Madrunno* H. B. K. (Fruchtb.), *nagassarium* Burm., s. *Mesua ferrëa* Nagasbaum od. ceylonsches Eisenholz.

- Calopogon** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Schönbart“, Fransenlippe (καύγων ὁ d. Bart — auf dem Labellum). *C. pulchellus* R. Br., s. *Cymbidium* p.
- 1) **Calosanthus (-us)** Haw. (Kalos.- autt.) (Sedeen od. Crassulac., V. 5) „Schönblüte“ (ἀνθή od. ανθος), Zier. *C. coccinea* Van Houtt. 2) **Calosanthus** Blum. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Schönblütenrispe“ (— schöne endständ. Blütenrispen!).
- Calospira** Ser. (Spiräaceen, XII. 4) „Schönspiräe“ (zu *Spiraea* L.), Zier. *callosa* Thb. s. *Fortunēi* Planch., *crataegifolia* Lk., *cuneifolia* W., *bella* Sims etc. (σπείρα lat. spira Windung).
- Calostemma** R. Br. (Amaryllideen, VI. 1) „Schönkrone“ (στέμμα Krone etc. — um d. Schlund d. Bl. ein röhr. Kranz od. zwölfzäh. Mündung), z. B. *Gewächsh. C. purpureum* R. Br., *lutēum* Ker, *album* R. Br. etc. (Austral.).
- Calothamnus** Lab. (Myrtac. Melaleucaceen, XVIII. 3) „Schönstrauch“ (θάμνος Strauch), z. B. *quadrifida* Lab.
- 1) **Calothyrsus** Spach (zu *Aesculus*) L. (Sapindaceen, VII. 1) „Schönstrauss“ (θύσος Strauss etc.), z. B. Zier. *californicus* Nutt. 2) **Calothyrsus** R. Br. (Proteaceen, IV. 1).
- Calotis** R. Br. (Compositen, XIX. 4) „Schönohr“, z. B. Zier. *brevisetā* Benth., *cuneifolia* R. Br. (Neuholl.) (ὠϊς, ὠϊος Ohr — 2 häut. Ohrchen d. Samenkronen).
- 1) **Calotropis** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Schönkiel“ (τρόπις Schiffski — d. Blättch. d. corona staminēa nachenförm. Wtst.), z. B. Zier. *procera* R. Br. e. *mudar*, Riesenwachspfl. od. grosse Schwalbenwurz (Ind.), s. *Asclepias gigantēa* L. 2) **Calotr.** Don (Papilionaceen, XVII. 4) (— grosse carina!).
- 1) **Calpodendron** (sc. *Mespilus*) Ehrh. (Pomaceen, XII. 4) „Urnbaum“ (κάλλος Gefäss etc., δένδρον B.), s. *Crataegus pyriformis* W. (Nordamer.). 2) **Calpod.** subgen. v. *Crataegus* Lauch. Scheinmispeln, z. B. *Cr. grandiflora* C. Koch, *mexicana* Moc. u. a.
- 1) **Caltha** L. (Ranunculaceen, XIII. 7) *Dotterblume*, *Schmalz-* od. *Butterblume*, fr. *populage*, *coccusēau*, e. *marsh-marigold* u. *cucullate-flower* (v. κάλαθος Handkorb), z. B. *C. palustris* L. m. v. fl. pl. Hort. 2) **Caltha** G. Frank (Compos. Calendulac., XIX. 4), *C. vulgaris* st. *Calendula arvensis* Acker-Regenrose. — *Calthēa* Rehb.
- Calycanthae** Rehb. Kl. d. „Kelchblütigen“; *Calycanthēa* DC., Rehb. (sc. *Nyctagineae*) Ldl. *Calycanthus*artige.
- Calycanthinae** DC. Bartl. Ord. d. „Kelchblümler“ Leun. i. q. *Calycanthae* Rehb.
- Calycanthus** L. (Nyctagineen *Calycantheen*, XII. 5) *Würz-* od. *Gewürzstrauch*, eig. „Kelchblume“, fr. *calycanthe*, e. *allspice* (κάλλυξ, -κος Kelch, ἄνθος — Kelch gefärbt wie eine Krone!), z. B. Zier. *C. floridus* L. (*sterilis* Walt.), fr. c. de la *Caroline*, *praecox* L. s. g. *Winterblume*, *laevigatus* W. (*ferax* Mchx.).
- Calycēra** Cav. (Compos. *Amphicarpantheen*, od. *Calycereen*, XIX. 4) „Kelchhorn“ (s. eb. u. κερὸς Horn — Kelchteile hornförm., Wtst.). — *Calycerēa* R. Br., DC.
- Calyciflorae** Endl., DC. Kl. d. „Kelchblütigen“ (Endl. zu *Dialypetalae* als Cohorte).
- Calycotome** DC., Lk. (Legumin. *Galegeen*, XVII. 4) „Kelchschnitt“ (s. v. u. τομή Schnitt — nach d. Abfallen d. Bl. wie abgeschnitt.), z. B. Zier. *villosa* Poir. (*Cytisus lanigērus* DC., *Spartium* l. Desf.), fr. *cytise laineux*, *spinosa* Lk. (*Spart. spin.* L.) etc.
- Calymenia** Nutt. = *Calyxhymenia* Ortég., s. d.

- Calyplectus** Rz. Pv. (st. Calycopl.-) (Salicariaceen, XII. 1) Falten-, Dreh- od. „Schlingkelch“ (*πλεκτός* gedreht etc. — gefalt. Kelchsaum!), z. B. *acuminatus* R. P. (*speciosus* Kth., B. Peru).
- 1) **Calypso** Salisb. (Orchid. Vandeem, XX. 1) „Calypso“, „Hüllen“-O. (v. *καλύπτω* verhülle = Calypso Myth., Oceanide od. Meernymphe — einz. schöne Endblüte), z. B. *borealis* Sal., s. *Cymbidium* b. Sw. (Norna bor. Wahlb., *Cypripedium bulbosum* L.). 2) C. P. Th. (Hippocrateen od. Malpighiaceen, Theaceen, III. 1) (- das  $\subseteq$  versteckt in d. Blüte!).
- 1) **Calyptanthus** Schreb., Sw. (-us Juss.) (Myrtaceen, XII. 1) Deckelmyrte Leun., „Schleierblüte“ (v. *καλύπτω* Haube etc., *ἀνθη* od. -ος — Kelchdeckel fällt b. Aufgehen ab!), z. B. *brasiliensis* Spr. s. *paniculatus* Spr. (nicht Rz. Pv.), *caryophyllata* Pers. (Myrtus car. Sw.) nägleinart. Myrte M. Rchb. 2) **Calyptanthus** P.-Th. (Capparideen, XIII. 1), s. *Capparis panduriformis*.
- Calyptaria** Naud. (Melastomaceen Davyeen, X. 1) „Schleierblume“ (s. v.), z. B. *Zier. C. haemantha* Van Houtt., s. *Melastoma Mutisii* Bpl., *Calyptrella* Naud.
- Calyptrion** Ging. (Violaceen, XIX. 6) „Schleierveilchen“ (s. v. u. *ἴον* Veilchen — d. unt. Kronblatt wie eine Haube!), s. *Corynostylis Berterii* Mart.
- Calyptrocalyx** Blum. (Palmen, XXI. 6) „Kappenkelch“-P. (s. v. — Kelchblätt. kappenförmig!).
- Calyptrostigma** Trautv., Mey. (Lonicereen, V. 1) „Haubennarbe“ (s. v. u. *στέγμα* Narbe etc.), z. B. *C. Middendorffiana*, s. *Diervilla* Carr. u. *Weigela* Midd. Hort.
- Calyphtrum** Bung., Mey. (Lonicereen, V. 1) „Kelchknöchel“ (*ἀλυσξ*, -νος u. *σφύρον* Knöchel, Ferse — Kelchröhre stielf.), z. B. *Zier. roseum* Mey m. v. v., e. rose-coloured *Diervilla*, s. *Diervilla* s. *Weigela rosea* L.).
- Calystegia** R. Br. (st. Calycost.-) Lour. (Convolvulaceen, V. 1) Bärenwinde, fr. *calystégie*, e. bear-bind (v. *ἀλυσξ*, -νος u. *στέγη* Decke etc. — Bl. in zwei schön. Brakteen eingeschl.), z. B. *sepium* (Convolvulus sep. L.) Zaunwinde, fr. *manchette de vierge*, *Zier. pubescens* Lindl. u. *dahurica* Choisy.
- Calythrix** Lab. (st. Calycothrix) Schauer (Myrtaceen, XII. 1) „Kelchhaar“-M. (s. v., *ῥοιξ* Haar), z. B. *conferta* Schau., *tetragona* Lab., *glabra* R. Br. (Neuholl.).
- Calyxhymenia** Orteg. (**Calymenia** Pers.) (Nyctagineen, III. 1) „Kelchhautblume“, s. g. Sauerwurz (*ἀλυσξ* u. *ἑμῆν*, -έρος Häutchen — kelchförm. Involuturum), s. *Oxybaphus l'Hér.* s. *Mirabilis* Cav.
- Camāra** Plum. (sc. *Lantāna* L. (Verbenaceen, II. 1) Schneeball-Verbene, amer. *Lantane*, s. g. Wandelröschen, fr. *camara* „Gewölbr.“ (v. *καμάρα* Wölbedecke, Wtst. südamer. Name!), ferner *Zier. C. arborescens* *Salviae folio* Plum. = *Lantāna odorata* L., Ait.
- Camarēa** A. St. Hil. (Malpighiaceen, X. 3) „Camaree“ (n. Don Man. *Fereira de Camara* Bethencurt e Sa, Dir. d. Diamanten-Distr. in Brasilien).
- Camaridium** Lindl. (Orchid. Vandeem, XX. 1) „Wölb“-O. (s. v. u. *εἶδομαι* gleiche — Unterlippe concav), z. B. *ochroleucum* Ldl., *purpureum* Spr. etc., s. *Cymbidium ochrol.* Sw. u. *vestitum* Sw.
- Camarophyllus** Kumm. (Pilze, XXIV. 4) „Krebs“- od. „Garnelenpilz“ Kumm. (*cammarus* od. *gammarus* Garnele, *κάμμαρος* Krebs), z. B. *virginicus*, „Jungfern“-P. (viell. „Wölbblatt“, s. v. — Lamellen sehr weitläuf. Kumm.).
- Camarōtis** Lindl. (Orchid. Vandeem, XX. 1) „Wölbohr“ (s. v. u. *οὐξ*,

ὠτὸς Ohr od. *ζαμαρωτὸς* gewölbt — Labellspitze gewölbt), z. B. purpurea Ldl. (Sylhet, Ostind.).

**Camassia** Lindl. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Schönblumen-Lauch (n. d. amer. Wort quamash od. camass, eine schöne, grosse Blume), z. B. *C. esculenta* Ldl., fr. *camassie comestible*, e. *eatable C.*, s. *Anthericum* esc. Spr., *Phalangium* esc. Nutt., *Scilla* esc. Hook.

**Camax** Schreb. (Proteac. od. Asperifolien, IV. 1) Pallisadenholz (v. *ζάμαξ* Stange etc.), z. B. *C. fraxinea* W., s. *Rapourea* Aubl.

1) **Cambessedea** W. (Terebinthaceen, X. 1) „Cambessedie“ (n. *Cambessedes*, s. d. Aut.), *C. simplicifolia* Kth. (Mauria s. Kth., Str. Peru).

2) **Cambessedesia** DC., Mart. (Melastomac. X. 1), z. B. *purpurata* DC.

**Cambogia** L. (Guttiferen Garcinieen, XIII. 1) Gummiguttbaum, fr. guttier u. camboje, e. gamboge, *C. Gutta* L., s. *Stalagnites cambogioides* W. (gutta Tropfen — hervorquell. Saft!) (n. d. indisch. Gebiet Camboje jens. d. Ganges).

**Camelina** Crantz (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Leindotter, fr. *cameline* od. *sésame bâlard* (— d'Allemagne), e. dotter u. gold-pleasure (st. *Chamaelina*, v. *ζαμαί* an der Erde u. *λίνο* Lein — Flachsunkraut!), s. *Myragrum* L. — *Camelinaceae* Rehb. Leindotterartige.

**Camellia** L., Ker (Theaceen Camellieen, XVI. 8) „Camellie“ (n. d. mähr. Jesuiten G. J. Kamell, latin. *Camellius*, auf Manila), Zier. *C. japonica* Ker, jap. Rose, Stuben: v. v. *paoniaeflora*, *alba plena* u. *anemoniflora alba*, *axillaris* Sims (*Gordonia anomala*). — *Camelliaceae* DC., -ae Rehb.

1) **Cameraria** L. (Apocynen, V. 1) „Camerarie“, fr. *caménaire* (n. d. nürnberg. Arzt u. Bot. Joach. Camerarius, s. d. Aut.). *C. dubia* Sims (Wrightia d.), *lutēa* Lam. (*Tabernaemontana odorata* Vahl).

2) **Cameraria** Dill., Mch. (Portulacac. Samoleen, III. 3), s. *Montia*.

**Cammaroidēa** (zu *Aconitum*) Rehb. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) „Cammarum“-Sturmhut (s. sogl.), z. B. *cernuum* s. *flexicaule* Hoppe.

**Cammarum** DC. (-us Jacq.) (sc. *Aconitum*) (Ranunculaceen, XIII. 3) „Krebs“- od. „Käfer“-Sturmhut (v. *ζάμμαρος* lat. *gammärus* od. *camm.*-, Krebs od. Käfer — weg. d. ober. Teils d. Krone, d. ein. gekrümmten Krebschwanz gleicht).

**Chamissonia** Lk. (st. *Chamisso*-) (Oenothereen Gaureen od. Onagrarien, VIII. 1) „Chamisso“-Kerze (n. d. Dicht. u. Bot. Chamisso), z. B. *C. flava* Lk.

**Campanula** L. (Campanulaceen, V. 1) „Glockenblume“, Glocke O. W., fr. *campanule* od. *gantelée*, *fleur en clochette*, e. bell-flower, *canterbury-bell* (dem. v. *campāna* Glocke), z. B. Zier. (Anpelpfl.) *fragilis* Cyrill.; Topf. *turbinata* Schott, Gartenbl. *C. Medium* L. *Mariette*, fr. *mariette*, *Carillon* od. *Violette de Marie*, e. *coventry-bell* od. *mariet*, *violet-marian*, *pyramidalis* L., *nobilis* Ldl., *carpathica* Jacq., *macrostylā* Boiss. etc., wild. in Wald u. auf Wies. *patula* L., *persicifolia* L., *Trachelium* L., *Rapunculus* u. *rapunculoides* L., als Zier. verw. *rotundifolia* L. v. *soldanelliflora plena* u. *ranunculiflora plena* Hort. — *Campanulaceae* DC., Rehb., -nacēae Rehb., -nulināe Bartl., -nulinēae Endl. Ord. od. Kl. der Glöckler.

**Campanulacea** (nicht -moea) Blum., Don (Campanuleen Jasioneen, V. 1), „Milchglockenblume“ (*campāna* u. *μαία* Säugamme — mit Milchsaft!).

**Campderia** Benth. (Polygoneen, VIII. 3) „Campderie“ (n. F. Campder, schr. Monogr. des *Rumex*, Par. 1819).

**Campella** Rich. (Commelyneen, III. 1) „Sonnenneigblatt“ (v. *καμπή*) Krümmung u. *ἥλιος* Sonne — d. Blätt. d. Perigons neigen zu einander, od. v. *ἔλω* rolle? — ungewiss!), z. B. *C. Zanon* Rich. s. *Tradescantia Zanon* Sw.

**Campella** Lk. (Gräser, III. 2) Rasenschmiele (nicht etwa v. *campus*

- Feld, sond. v. Deschamps, eig. Loiseleur des Longchamps, analog Deschampsia P.-B.), z. B. caespitosa Lk. (Aira s. Deschampsia P.-B. caesp.).
- Camphöra** Nees (sc. Laurus) L. (Laurineen, IX. 1) „Kampher“-Lorbeer, fr. camphrier, e. camphire (-phore) (v. d. arab. kanfur, ind. kanpura „Kampher“), C. officinarum Nees s. Laurus Camphöra L.
- 1) **Camphorosma** L. (Chenopodiaceen, V. 2) „Kampherduftkraut“, fr. camphrée (s. eb. u. *δομη* Duft), C. monspeliensis L. (monspeliäca Pollich) s. Kochia arenaria Roth (Willemetia ar. Märk.), ruthenica M. B., annua Pall., ovata W. etc. 2) **Camphorosma** paleacea L. f. (Cinchonaceen od. Aquifoliac., IV. 1) „Kampherduftstr.“ s. Monetia pal. Spr.
- Campteria** Presl (Campderia Lag.) (Farne, XXIV. 1) „Biegungs“- od. Krummfarn, Zweiohr-F. (v. *καμπτήρ* Krümmung — näml. d. Wedelvenen in ihr. Verlauf), s. Pteris baurita L. (— d. unterste Wedelfieder zweiteilig!).
- Camptosäma** Hook., Arn. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Krummfahne“ (*καμπτός* gekrümmt, *σῆμα* Fahne etc. — Fahnenbasis beiders. m. Anhang, Wtst.), z. B. Zier. rubicundum L. (Dinoclea glycinoides DC., Kennedyia splendens Hort.).
- Campylobötrys** Lindl. (Rubiaceen, IV. 1) „Krummtraube“ (*καμπυλός* krumm, *βότρυς* Traube), z. B. Warmh. C. regalis Ldl. (Mexiko).
- Campylocaryum** DC. (Asperifolien, V. 1) „Krummnüsschen“ (*καρόον* Nüsschen — diese krumm!).
- Cananga** Rumph. (Anonaceen, I. 1) Traubenbaum, äthiop. Pfeffer, fr. canang (vaterl. guian. Name!), s. Guanabanus Plum., z. B. Ouregou Aubl. (Aberemoa ds.), s. Uvaria monosperma W.
- Canarina** Juss. (-rinia L.) (Campanulaceen, V. 1) „Canarienglocke“, fr. canarie campanulée, Stuben. C. Campanula L. (C. Zanguebar Lour.) Strichelblume, s. Campanula Canarina L. s. canariensis L. f. (n. d. canarischen Inseln ben.).
- Canarium** L., W. (Terebinthac. Bursereen, X. 1 od. XXII. 5) „Canariumbaum“ (malay. canari), z. B. C. commune L., balsamiferum W., bengalense W. ostind. Copal, s. Boswellia Colebr.
- Canavalia** DC. (-vali Ad.) (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Canavalie“, Canavali-Langbohne (vaterl. Nam. auf d. Südseeinseln!), z. B. ensiformis DC. (Dolichos ens. Thb.), obtusifolia DC. (Dol. rotundifolia Vahl) etc.
- Cancellaria** DC. (Malvaceen, XVI. 8) „Gittermalve“, fr. cancellaire (v. cancelli, -orum Gitter — Kelch im Hüllblatt eingeschl.) (zu Pavonia Cav.)
- Candēla** Catesb. (Rhizophoreen, XI. 1) „Leuchterbaum“, fr. chandèle (lat. candēla Kerze etc.), C. americana Cat. s. Rhizophöra Candel L. (Rhiz. Mangle Pluk.).
- 1) **Candollēa** Lab. (Dilleniaceen, XVIII. 2) „Candolle's“-Strauch (n. d. Prof. Aug. Pyramē de Candolle in Genf, s. d. Aut.), z. B. cuneiformis Lab. (Neuholl.), peduncularis u. fascicularis R. Br. (das.), s. Hibbertia Salisb. 2) **Candollēa** Armeria Rich. u. umbellata Lab. (Stylidiaceen od. Plumbagineen, V. 1), s. Stylidium Arm. etc. 3) **Candollēa** Baumg. (Ericaceen, VIII. 1), s. Menziēsia pilosa. 4) **Cand.** Batard. (Gräser, III. 2), s. Agrostis. 5) **Cand.** Mirb. (Farne, XXIV. 1), fr. Candollée (candolline), s. Cyclophorus Desv. 6) **Cand.** Raddi (Jungermannieen, XXIV. 2).
- Canella** P. Br., L. (Garcinieen od. Hesperideen, XI. 1) „Canell“- od. Winterrindenbaum, wild. Zimmet, fr. fausse-canelle, e. canel (v. d. span. canela Zimmet), C. alba L., Sw. Weiss-Z., fr. canelle blanche



- (-bâtarde poivrée, -du Pérou), s. *Winterania Canella* L. (Can. Winterana G.), *axillaris* Mart. (Str. Brasil.). — *Canellacëae* DC.
- Canephōra** Juss. (Rubiaceen, IV. 1) „Korbträgerin“, fr. canéphore (*κα-νηφόρος* v. *κάνης* Matte, Korb etc., *φορός* tragend — Blumenstiele nach oben korbf.), z. B. *axillaris* Lam.
- Canistrum** Morr. (Bromeliaceen, VI. 1) „Rohrkorb“ (lat. *canistrum*), z. B. *aurantiæcum* Morr.
- Cankrienia** de Vriese (Primulaceen, V. 1) „Cankriensblume“ (n. B. F. Cankrien, Pfeiffer), z. B. *chrysantha* de Vr.
- Canna** L. (Marantaceen od. Cannaceen, I. 1) Blumenrohr, fr. canne (-d'Inde), faux-sucrier, e. cane, flowering-reed, indian-cane (-shot) (lat. *canna*, gr. *κάννα*, celt. can = Rohr), Zier. C. *indica* L. n. v. *Annaei* Hort., C. *iridiflora* Rz. Pv., fr. basilier à fleur d'Iris, e. iris-flowered Flowering-reed, C. *glauca* L. (blass gelbblum.) u. a. — *Cannacëae* DC. (-nae Juss., -cæ Rchb.) blumenrohrartige (zu Ord. *Scitaminicæae* Bartl.).
- Cannabacëae** Endl., Grck. hanfartige, **-binçae** Endl. Ord. d. Hanfartigen, s. sogl. *Cannabis*!
- Cannabis** L. (Urticaceen *Cannabaceen*, XXII. 5) Hanf, fr. canabé (-bou) od. chanvre (altfr. *chambrie*), e. hemp (gr. *κάνναβις*, arab. *kaneb*), geb. C. *sativa* L. Zier. var. *gigantica* Hort.
- Cantharellus** Ad., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Krug“- od. Faltenschwamm, s. g. Pfifferling (dem. *cantharus*, gr. *κάνθαρος* Trinkgeschirr — Trichterform d. Huts!), z. B. *essb.* C. *cibarius* Fr. Speise-Pf., fr. *escaville* (*escarville*), e. blobber, gift. *aurantiæcus* Eierschwamm, e. *paddock-stool* „Krötenstuhl“, s. *Merulius* Hall.
- 1) **Cantua** Juss. (Polemoniaceen od. *Convolvulac.*, V. 1) „Cantue“ (peruan. *cantu*), z. B. *Treibh.* C. *splendens* s. *buxifolia* Lam. (*Witheringia superba* l'Hér.), *dependens* u. *foetida* (*Periphragmos* Rz. Pv.), *cordata* Juss. (*uniflora* Pers.), *ovata* Cav. (*Periphragmos uniflora* R. P.) (Zaunstr., Peru), s. *Gilia*, *Hoitzia* etc. 2) **Cantua** W. (*Loasaceen*, XIII. 1).
- Capanèa (-nia)** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) Wagenblume (*καπάνη* thessal. Wagen — Blumenform), z. B. C. *grandiflora* Decsn.
- Capellia** Blum. (Dilleniaceen, XIII. 7) „Capellie“ (n. d. Bot. Carlo Capelli, schr. Cat. stirpium in horto Taurinensi, Turin 1821, Wtst. n. Philem. Bar. van der Capellen, Gen.-Gouv. v. Batavia bis 1828), z. B. *multiflora* Blum. (B. Java).
- Capillus Venëris** (sc. *Adiantum*) L. (Farne, XXIV. 1) „Venushaar“ (*capillus* Haupthaar, *Venëris* Gen. v. *Venus* — schön lichte, feinflättr. Wedel!).
- Capitata** (sc. *Brassica*) Metzg. (Crucifer. *Siliquos.*, XV. 2) „Kopf“- od. „Haupterkohl“, s. g. *Kappis* (Weiss- u. Rotkraut) (v. *caput*, -itis Kopf, Haupt).
- Capnites** DC. (Papaverac. *Fumariaceen*, XVII. 2) „Erdrrauch“ (v. *καπνίζω* mache Rauch, *καπνός* — bez. d. duft. *Belaubung!*).
- Capnorchis** Borkh., DC. (Papaverac. *Fumariac.*, XVII. 2) „Orchis-Erdrrauch“ (v. *καπνός* s. eb. u. *Orchis* — wein. d. ähnl. *Blumen!*), z. B. Zier. C. *spectabilis* DC. (*Dielytra* s. *Dicentra spect. autt.*) s. g. *Herzblume*, *chrysantha*, *formosa* etc.
- Capparidastrum** DC. (Capparideen, XIII. 1) unechter Kappernstr. (zu *Capparis* L., wovon *deter.* od. *Wtst.* *αστρον* Bild).
- Capparidicæae** Vent., DC., Rchb. (-ræae Rchb., -ridēs Juss.) (zu Ord. *Rhoeadæae* Bartl.) s. sogl.
- Capparis** L. (Capparideen, XIII. 1) „Kappernstrauch“, fr. *cappa* (*caprier*), e. *bean-caper* (gr. *κάππαρις*, arab. *kabar*), C. *spinosa* L. echter K. (*essbare Kappern*), *ovata* Desf., *sodata*, afrik. *Salzkapper*.
- Capraria** L. (Personaten, XIV. 2) „Geis“- od. „Ziegenkraut“, fr. *capraire*

- (v. capra Ziege, die d. Kr. gern frisst!), z. B. Zier. hirsuta Hb., Bpl. u. lanceolata Lk., Otto, s. g. Herzblume od. Antillenthee Leun., C. lucida W. (Teedia luc. Rudolph).
- Capřea** (sc. Salix) L. (Salicineen, XXII. 2) Sal- od. Sohlweide, Palmweide, fr. marsault od. gnĕdie, e. sallow-tree od. goat-villow (v. capra Ziege, von der ihr Laub gern gefr. wird), Zier. var. pendula u. tricolor Hort.
- Caprifoliaceĕa** Bartl., DC., Rehb., Endl. (-folia Juss.) Geisblattgew. (zu Ord. Rubiacinae Bartl. DC.).
- Caprifolium** Röhl., Lam., R. Sch. (sc. Lonicĕra) L., Ad. (Lonicereen od. Caprifoliac., V. 1) „Geisblatt“, Je länger je lieber, welsche Specklilie Vilm., fr. chĕvre-feuille romaine, e. goat's-leave, herb-trinity u. heart's-ease, garden-wood-bine od. -honey-suckle, s. Caprif. hortense Lam. (perfoliatum Röhl.) u. C. italicum R. Sch. (Periclymĕnum it. Mill.) m. v. v. (v. capra Ziege u. folium Laubblatt).
- Caproniana** (sc. Cerĕsus) Risso (Amygdaleen, XII. 1) „Eberkirsche“, Bocksk. (v. *záπooz*) Eber od. Bock, ital. caprone, oder v. fr. capron = Riesenerdbeere — bez. d. Geruchs!), z. B. C. rubra Risso, s. Cerĕsus dulcis autt.
- Capsella** Vent., Mnch. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Hirtentäschchen“, Täschel O. W., fr. boursette od. mallette à berger, e. shepherd's-purse od. cass-weed (dem. v. capsula Kapsel). C. bursa pastoris Mnch. Säckelkr., fr. tabouret od. moufette, C. ceratocarpa Mnch. etc., s. Thlaspi L.
- Capsicum** T. (Solaneen, V. 1) „Beissbeere“, fr. poivre du Brĕsil (- d'Espagne „span. Pfeffer“) u. corail, e. cockspur-pepper (*záψιz* v. *záπτω* beisse, d. Beissen, od. capsicum v. capsula (-sula) Kapsel-Beerenform!), z. B. C. annuum L. s. g. span. Pfeffer (ungar. Paprika), Zier. C. longum DC. m. v. v., C. grossum W. m. v. lutĕum, C. tomatiforme Hort., violacĕum Hb., Bpl., Kth., chilense Hort., cerasiforme L. m. v. v., etc.
- Caracalla** Lam., Endl. (sc. Phaseolus) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Kappenbohne“, fr. caracalle (lat. caracalla i. q. cuculla Kappe, gr. *καρακάλλοz*, Wtst. *κάρα κάλα* Haupt u. *κάλλη* od. *κάλλεια* schöne Kleider etc.), s. Caracalla arborescens Lam.
- Caragana** Lam. (sc. Robinia) L. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Erbsenstrauch, -baum, fr. caracan od. arbre aux pois, e. pea-tree (tatarisch so viel als Schwarzohr Leun.), Zier. C. arborescens Lam. (sibirica Ray) m. v. v., frutescens DC. (digitata Lam.) m. v. v. u. ferox Pall. s. spinosa DC. (Robinia spin. L.).
- Caraguĕata** Plum., Pis. (Bromeliaceen, VI. 1) „Caraguĕate“ (südamer. Name!) = Bromeli Acanga L. sparrige Ananas D., s. Tillandsia lingulata Jacq.; musaica E. Andrĕ „pisangart.“, latifolia u. clavata Plum. (Tillandsia serrata L.), splendens etc.
- Carallia** Roxb. (Rhizogoreen od. Pomaceen D., XI. 1) Wurzelbaum (n. d. hindostan. Telingasprache carillie Paxton), z. B. C. lucida Rxb. (B. Ostind.).
- Caralluma** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) Saft-Wachspfl. (carallum der Telingasprache), z. B. adscendens R. Br., umbellata Haw. (Str. Ostind.), s. Stapelia L.
- Carambĕla** Aubl. (sc. Averrhĕa) L. (Oxalideen Bombaceen, X. 5) s. g. Blimbing (v. d. franz. carambole Rot- od. Beiball, Billard).
- Carĕpa** Aubl. (-raipa Zucc.) (Meliaceen od. Ternstroemiace., VIII. 1) „Carapĕ“- od. Crapholzbaum (n. d. guian. Nam. caraipe Paxton), z. B. paniculata Zucc., s. Xylocarpus Schreb.
- Carapichĕa** Aubl. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1) „Carapichĕe“ (nach d. caraib. Nam. carapiche!). C. guianensis Aubl. = Cephaelis involu-crata W.

- Cardamindum** Mch. i. q. Tropaeolum Kapuzinerkresse (v. Cardamīne u. indus).
- Cardamīne** L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Schaumkraut, Wiesenkresse, Gauch- od. Kukuksblume Vilm., fr. cresson des près, e. meadow-cresses (-cuckoo) (gr. *σαρδαμύνη* v. *σαρδία* Herz u. *δαμάω* bändige, Paxton), z. B. C. pratensis L. Zier. var. fl. pleno.
- Cardaria** Desv. (zu Lepidium) Rchb. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Herzschötchen“, Hungerblümchen-Kresse (v. *σαρδία* s. eb.), s. Lepidium Draba L. (Draba umbellata Mor.) u. Cardiolēpis Wallr.
- Cardiaca** T. (sc. Leonurus) L. (Labiaten, XIV. 1) „Herzgespann“, fr. cardiaque (gr. *σαρδιαζος* Herz betr. od. *σαρδία* u. *ἀζη* Heilung, Ruhe).
- Cardinalis** (sc. Lobelia) L. (Lobeliaceen, XIX. 6) „Cardinalblume“, fr. cardinale (Blume scharlachr.).
- 1) **Cardiolēpis** Wallr. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Herzschuppe“, s. Cardaria Desv. (s. v., *λεπίς* Schuppe, — Schötchenform!). 2) **Cardiolēpis** Raf. (Rhamnaceen, V. 1).
- Cardiospermum** L., Sm. (Sapindaceen, VIII. 3) „Herzsamen“, -erbse D., fr. cardiosperme, e. heart-pea (s. v., *σπέρμα* Samen), z. B. elegans Hb. Bpl. (Schlingstr. Peru), Halicacabum L. blasenfrücht. od. gem., fr. pois-de-coeur (cor-inde, Alkekenge), s. Pisum vesicarium Bauh. (Wst.: kugl. Same mit weiss. herzf. Keimwarze!).
- Cardopatiēae** Less., DC., s. sogl. Cardopätum.
- Cardopätum** Pers. (-tium Juss., -thum od. -thium?) (Compos. Carlinneen, XIX. 1) „Wegtritt-Distel“ (v. carduus u. *πάτος* betretner Pfad, Wst. *πάθος* Leiden — früher geg. Herzleiden!), z. B. corymbosum Pers., s. Brotēra W., Carthämus L. u. Camalium (Chamalium) Juss. — 2) **Cardopatia** officinalis W. i. q. Carlina acaulis L. „Eberwurz“.
- Cardopētus** Forst. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Muldendistel“? (*ζάδοπος* Mulde etc.?). C. serratus Forst., s. Cardopätium (Chamalium, Carlina) s. eb.
- Carduacēae** = Compositae Homoianthae Rchb. XIX. 1 (Aequalia L.) Distelartige „Gleichblütler“ (nur Röhrenblütchen etc.!).
- Carduncellus** Ad., Lob. (sc. Carthämus) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Cardun-Saffor“ (dem. v. Cardunculus), s. Carthämus mitissimus L. (minutissimus Paxt.!).
- 1) **Cardunculus** (sc. Cynara) L. (Compos. Carduac., XIX. 1) „Cardone“, spanische od. „Cardun“-Artischoke M.-Rchb., fr. chardonnette (cardonète) (v. Carduus Distel, auf Candia cardun u. chardonna). 2) **Cardunculus** Ad. (Comp. Card.) „Cardun-Saffor“, s. Onobroma G. u. Carthämus Carduncellus, s. v.
- Carduus** L. (Compos. Carduac., XIX. 1) Kopfdistel, fr. cardère u. chardon, e. cardoon u. thistle (lat. carduus überh. Distel, v. d. celt. ard Spitze, gr. *ἄρδις*). C. nutans L., s. g. Moschusdistel, fr. épine-blanche sauvage.
- Carēum** Plin., Ad. (Umbelliferen, V. 2) Kümmel = Carum L.
- Carex** L. (Cyperaceen, XXI. 3) Segge, Riedgras, fr. caret (-reiche) u. laiche „Liesch“, e. sedge, reit, reed (-grass) (v. careo entbehre, Paxton, Wst.), z. B. arenaria L. (Offiz. Rhizōma Caricis Grck.), etc.
- Careya** Roxb. (Myrtaceen, XII. 1) „Carey's“-M. (n. d. Bot. W. Carey bei Calcutta), z. B. arborea Rxb. (Pelvu Rheed.) (Gespinnstpfl. Ind.).
- 1) **Carica** L. (Cucurbitaceen Papayaceen, XXII. 9) Melonenbaum (lat. Caricus Karier, aus Caria in Kleinasien). C. Papaya L. gem. Melonenb. (Papaya vulgaris Lam.). 2) **Carica** (sc. Ficus) L. (Urticac. Artocarpeen, XXII. 9) gem. Feigenbaum, fr. figuier, e. fig-tree (— lief. d. carica d. Apoth.).
- Caricēae (-cinēae)** Nees Seggen od. Riedgräser (v. Carex, -icis).

- Carissa** L. (Apocynen, V. 1) „Wachsbaum“ (v. *Κάρισα* Karierin? Paxton, wahrsch. v. *κηρός* Wachs, lat. cera, Wtst.: östind. Namen!), z. B. C. Carandas L. (ind. carandas!), spinarum L. (Spina Rumph.), etc., s. Echites Burm. — Carissae (sc. Contortae) Rehb. Krähenaugen- od. Wachsbaumartige.
- Carlina** T. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Karlsdistel“, Eberwurz, fr. carline, e. carline-thistle (st. Carlina n. Karl d. Gr., dess. Heer davon geheilt wurde, Paxton (?), viell. st. Cardina (ital. = kleine Distel, cardo) als Druckfehler, Leun.!), z. B. Zier. C. acaulis L. Zwergdistel. — Carlinæe Rich.
- Carludovica** (Carlud.-) Rz. Pv. (Palmen, XXI. 9) „Karl-Louisen“-P., fr. carludovique, Panama-P. (n. d. span. König Karl IV. u. dess. Gemahlin Mar. Louise, † 1819), z. B. C. palmata (Salmia p. W., Bombonaxa, Jipijape Leun.), Warmh. humilis, latifolia R. P., Plumieri Kth., etc.
- Carlowitzia** (-zia) Mnch. (Compos. Carlineen, XIX. 1) Eselsdistel (n. H. K. v. Carlowitz, s. d. Aut.), z. B. C. (Carthamus) salicifolia Mnch.
- Carmichaëlia** R. Br., Spr. (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Carmichael's“-Hornklee (n. d. Capt. Dugald Carmichaël, s. d. Aut.), z. B. C. australis R. Br. (Lotus austr. s. arborëus Forst.).
- 1) **Carolinæa** L. f. (Oxalid. Bombaceen, XVI. 8) „Carolinen“-Wollbaum (n. Caroline, Markgräf. v. Baden, † 1783), z. B. alba Lodd. u. princeps L. Pracht-W., s. Bombax grandiflora. 2) **Carolinia** Gaud. (Urticaceen, XXI. 4) (N. pr.).
- Carota** (sc. Daucus) L. (Umbelliferen, V. 2) Möhre, Mohrrübe, Mohrenkummel, Carote, fr. carotte, e. bird's-nest „Vogelnest“ (— zusammengezog. Dolden nach d. Verblühen!) u. carrot (gr. *καρωτόν* viell. v. *κάριον* Kopf — Gestalt d. Dolde).
- Caroxylon** Thb. (Portulacaceen, V. 1) „Kümmelholz“?, Karostrauch (v. caroo = heisse Ebene d. Caplandes, Wtst.). C. Salsöla Thb. (Salsöla aphylla L. f.) Salzstr. v. Cap (schwerl. *κάρον* Kümmel! *ξύλον* Holz).
- 1) **Carpesium** L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Strohkelch“, Kragenblume, fr. carpésie (gr. *καρπίσιον* Holz, Stroh — weg. d. äusseren Kelchschuppen!). 2) **Carpesium** G. Fr. = Valeriana v. Cubæbae.
- Carpinus** L. (Betulaceen od. Cupuliferen, XXI. 8) Hain- od. Weissbuche, Heister O. W., Hornbaum Rmpl. (v. d. celt. car Holz, pinda Kopf — „Kopfholz“, zu Jochen dienend, gr. *ζυγία* Diosc. v. *ζύγιος* z. Joch. geh., Wtst. = Carpinus). C. betulus L., gem. Hainb., fr. carpin od. charme, e. yoke-elm, carpy, horn-beam (hard-), quick-tree (-beam, quicken-beam) m. v. v., C. Ostrya L., C. virginiana Lam. (beide Ostrya vulgaris u. virg.), C. orientalis Lam. (duinensis Scop.), fr. charme d'Orient, e. oriental horn-beam, etc.
- Carpoböli** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Fruchtschneller“ (zu Ord. Basidiomycetes de By) (*καρπός* u. *βόλος* Wurf v. *βάλλω* werfe — d. Fr. springt mit Gewalt ab!).
- 1) **Carpobölus** Mich. (sc. Lycoperdon) L. (Bauchpilze, XXIV. 4) (s. eb.). 2) **Carpobölus** Sw. (Ricciaceen-Moose, XXIV. 2) „Fruchtschnell“-M.
- 1) **Carpodëtus** Forst. (Rhamnaceen od. Celastrineen, V. 1) „Band“- od. Ringbeere (*καρπός* Frucht u. *δετή* Band — Beere mitt. v. e. Ring umgeben, Wtst.), z. B. Treibh. C. serratus Fr. 2) **Carpodëtes** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) (v. *δετή* od. *δέτις* Fackelbündel — Frucht scharf dreikantig! — unklar!), s. Pancreatum recurvatum Rz. Pv.
- Carpoliza** Salisb. (st. -lyza, wie Antholyza, s. d.) (Amaryllideen, VI. 1) „Fruchtrachen“-Lilie (*καρπός* u. *λίσσα* Wut — d. Frucht springt in 3 Klappen wie ein Rachen auf). C. spiralis Sal., s. Haemanthus spiralis Ait.
- Carthämus** T. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Safflor, fr. carthame, e. safflower (arab. quartom od. korthom, hebr. kartami färben). C. tinc-

- torius L., fr. graine de perroquet, fleur de safran, safran bâtard (- d'Allemagne), safranon, e. dyer's-safflower (zafran, zaffir, -fre, -far) u. saphara.
- Carum** Koch (Umbelliferen, V. 2) Kümmel, altd. Garbe od. Karve Mej., fr. carvi (gr. *κάρων*, nach Plinius v. *Κάρια* carische Dolde, Paxt. u. Wtst.), C. Carvi L. gem. Kümmel od. Carve, fr. faux-chervi, e. caraway od. skirwort.
- Caruncularia** Haw. (Asclepiadeen, V. 2) „Karbunkel“- od. Schwären-Wachspfl. (v. caruncula Fleischgeschwür — d. corona staminea mit Carunkeln). C. peduncularis Haw., s. Stapelia L.
- Carvi** T. (sc. Carum) L. (Umbelliferen, V. 2) Kümmel, fr. faux-chervi u. carvi, vgl. Carum.
- Carvifolia** Vaill. (sc. Selinum) L. (Umbellif., V. 2) „Kümmelblatt“, fr. carvifeuille (Carvi u. folium Blatt).
- Carya** Nutt. (Terebinthac. od. Juglandeen, XXI. 4) Pekan- od. Hickory-nussb. (gr. *κάρων* Nuss), z. B. Zier. C. amara Nutt. (Juglans am. Mchx.), fr. noyer amer, e. bitter-nut-hickory, C. tomentosa Nutt. (Jugl. alba Mill., tomentosa Mchx.), fr. noyer tomenteux, e. mocker-nut-hick., C. alba Nutt. (Jugl. squarrosa Mchx. s. alba ds.), C. olivaeformis Nutt. (illinoënsis Wang., rubra G., Jugl. cylindrica Lam. etc.), fr. noyer-Pécanier, C. porcinus Nutt. (glabra Mill.) „Ferkelnuss“, etc., s. Juglans L.
- Caryocār** L. (Oxalid. Rhizoboleen od. Bombaceen, XIII. 4) Höckernussbaum (s. v. u. *κάρια* Kopf), z. B. C. nuciferum L., fr. porte-noix, s. Pekea tuberculosa Aubl., C. villosum Pers. (Saouari Aubl.) (Str. Guiana).
- Caryophyllacēae** Grck. (-phyllēae Gay, DC. Rchb., -phyllinae Bisch. Ord. d.) Hornblattgew. Rchb., eig. „Nussblattartigen“, Hornkapseligen (*κάρων* u. *φύλλον*).
- Caryophyllaster** Rumph. (Rubiaceen, IV. 1) „Nelkenstern“ (Caryophyllum u. *αστήρ* Stern, Bild — wie ein kleiner Nelkenbaum!).
- Caryophyllastrum** Ser. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Nelkenwurz, i. q. Geum urbanum (deter. v. Caryophyllum L. Gewürznelke), s. sogl.
- 1) **Caryophyllata** T., Scop. (zu Geum) Rchb. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) „Nelkenwurz“ (s. v.), z. B. urbana Scop. (Geum urb. L.). 2) **Caryophyllata alpina** Bauh., s. Anemone narcissiflora L. 3) **C.** (sc. Myrtus) L. Nelkenrinde, fr. capelet.
- Caryophylloides** Blum. (Laurineen, IX. 1) Rot-Näglein, Rot-Zimmet, s. Cinnamomum rubrum (sogl. u. *εἶδομαι* gleiche).
- Caryophyllum** Ser. (Caryophylleen, X. 2) Gartenmelke = Dianthus Caryophyllum L. (s. sogl.).
- 1) **Caryophyllum** L. (Myrtaceen, X. 1) Gewürznelkenbaum. C. aromaticum L. s. Tangu Pluk., Gewürznäglein, fr. girofle (gir.-), e. clove (gr. *καρυόφυλλον* „Nussblatt“ — nämli. Kopf dess. aus Blätt. gewölbt, Wtst.), s. Eugenia caryophyllata Thb. (Jambolifera c. L.). 2) **Caryophyllum** (sc. Dianthus) L. (Caryophylleen od. Sileneen, X. 2) Gartenmelke (— riecht wie Gewürznäglein!), fr. astropole, e. clove-gillyflower, m. v. v. (Rümpfer: Saum-, Strich-, Band-, Flammen-, Tuschnelken, besond. schön Souvenir de la Malmaison). 3) **C. saxatilis** Bauh. = Arenaria tetraquetra L.
- Caryota** Thb., L. (Fieder-Palmen, XXI. 8) „Nussdattelpalme“, fr. caryote (*καρυωτός* wie e. Nuss gestalt. — palmula caryota d. Alten), z. B. Zier. C. urens L. ostind. Brennp., fr. ayri.
- Caryotaxus** Zucc. (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) „Nusseibenbaum“ (s. v. u. Taxus). C. nucifera Zucc., s. Taxus s. Torreya nucif. Kämpf.
- Cascarilla** Ad. (sc. Croton) L. (Rutaceen Euphorbiac., XXI. 9) Cascarillen-Croton, fr. cascarille (chacarille), e. cascarilla (dem. des span. cascara Rinde), s. Croton linearis Jacq.

- Casearia** Jacq. (Samydeen od. Peponiferen, X. 1) „Casearie“ (n. d. holl. Missionair in Cochinch. u. auf Malabar, Joh. Caserius, schr. d. Text zu d. ersten Bänd. d. Hort. Malab.), z. B. C. esculenta Jacq., s. Iroucana guianensis, C. parviflora (Samyda p. L.) etc., s. Chaetocrater R. P.
- Casparia** Kth., DC. (Cassieen, X. 1) „Casparbaum“ (zu Bauhinia Plum.) (n. d. Bot. Caspar Bauhin, s. d. Aut.), z. B. C. pes-caprae H. B. K. (Bauh. p. c. Plum.).
- Cassäva** W. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Mandiocapfl. Seub., Maniokwurz, „Cassavebrot“, e. cassavi od. cassada (vaterl.), s. Jatropha Manihot u. Janipha L.
- Cassebeera (-ia)** Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Cassebeer's-F. (n. d. Bot. Cassebeer, s. d. Aut.), z. B. triphylla Kf. (Montevideo), pinnata Kf. (Bras.) etc., s. Pteris, Adiantum, Cheilanthes etc.
- 1) **Cassia** L. (Leguminos. Cassieen, X. 1) Cassie, Sennesblätterstr., Gewürzrinde, fr. casse (-sier) od. laurier casse (n. Olaus Celsius von d. hebr. keziothi, gr. *κασσία* Gewürzrinde), C. Senna Lam. (obovata Collad. s. obtusata Hayn.) Senna-C., C. Fistula L., fr. caneficier (Cathartocarpus Fistula Pers., Bactyrilobium Fist. W.), C. lanceolata Forsk., etc. Zier. C. marylandica L., fr. casse de Maryland, e. M.-Cassia etc. 2) **Cassia** (sc. Laurus) L. (Laurineen, IX. 1) Cassien-od. Kanehl-Zimmet, s. Persëa Cassia. — Cassiëae Rchb. zu Caesalpinieae R. Br. (zu Kl. Leguminosae Endl.).
- Cassine** L. (Sapotaceen od. Terebinthineen, VI. 3) „Cassine“, fr. cassine od. herbe de la St. Barthélemi (cassine von d. Indianern in Florida gebr. Name), z. B. C. Gongonha Mart. Paraguay-Thee, fr. matté od. thé du Paraguay, s. Ilex paraguariensis autt., C. Maurocena L. Instrumentenholz, C. caroliniana Lam. (Prinos ambigüus Mchx., Ilex vomitoria Ait.) etc., s. Celastrus L.
- Cassinia** R. Br. (Compos. Inuleen od. Gnaphalieen, XIX. 2) „Cassinie“ (n. d. franz. Bot. Henri Cassini, s. d. Aut.), z. B. C. aurea R. Br. (Angianthus tomentosus Wendl.), spectabilis (Calea Lab.) etc. (Neuholl.). — Cassiniacëae Schultz-Bip. i. q. Compositae Kl. d. Korbblütler.
- 1) **Cassiöpe** D. Don (zu Andromëda L.) (Ericaceen, X. 1) Zwergheide (Cassiope, Mutt. d. Andromeda, Myth.), z. B. tetragöna Don, hypnoides ds. 2) **Cassiöpëa** Don (Compositen).
- Cassuviëae** DC., R. Br. i. q. Terebinthi Juss. (zu Terebinthacëae Rchb.) Sumachgew., s. sogl.
- Cassuvium** Lam. (Terebinthac. Cassuviëen od. Anacardieen, IX. 1) abendländ. Nierenbaum, „Leertraube“? (v. cassus leer — unfruchtbar, uva Traube? Wtst. malay. cadju!), z. B. C. pomiferum Lam. (Anacardium occidentale L.).
- 1) **Cassyt(h)a** L. (-sita?) (Lauraceen od. Myristiceen, IX. 1) „Flachsseiden“- od. Schlinglorbeer, fr. cassite (v. *κασσιώ* flicke zusamm., wovon auch Cuscuta Flachsseide!), z. B. glabella R. Br., melantha ds. etc. (Neuholl.), C. corniculata L. (Cassuta cornëa Rumph.). 2) **Cassyttha** Gray (Phytolaccaceen, X. 5), s. Cuscuta.
- 1) **Castalia (-lis)** Salisb., DC. (Nymphäaceen, XIII. 1) „Quellnymph“ (n. d. schön. Nymphæ Castalia, Myth. u. Quelle am Parnass). C. alba Lk. (Nymphæa alba L.). 2) **Castalis** Less. (Compos. Calendulac. XIX. 4), s. Dimorphothëca Mch.
- Castanëa** T. (sc. Fagus) L. (Cupuliferen od. Amentac. Fageen, XXI. 8) wahre od. zahme Kastanie, s. g. Marone, fr. marron (veralt. castagnon), châtaigner, e. eatable chest-nut (sweet —, spanish —), C. vesca G. m. v. v., C. americana G. Don (vesca var. amer. Mchx.), fr. châtaigner d'Amérique, C. pumila Mill. (Fagus p. L., nana Dur.),

fr. ch. chincapin, e. dwarf-ch.-n. (gr. *καστανὸν* v. *Κάσταννα* Stadt in Thessalien, lat. castanēa). — Castaneaceae Lk.

- Castillēja Mut.**, L. f. (bess. **-jia**) (Scrophularin., XIV. 2) „Castilleje“ (n. Don Castilleja, Freund v. Mutis), z. B. *grandiflora* Spr. (Euchroma gr. Nutt.), *coccinea* Mut. (*Bartsia* c. L.), *sibirica* L. f.
- Castillōa Cerv.** (Urticac. od. Euphorbiac., XI. 3) Kautschukbaum, Holquachtl d. Mexikaner (n. d. span. Bot. Castillo; n. Don Castilleja, s. eb., Wtst.), *C. elastica* Cerv. (*Siphonia* el. s. Cahuchu W.).
- Casuarīna L.** (Myricaceen od. Casuarineen, XXI. 1) „Casuar“- od. Keulenbaum, Streitkolbenb., Sumpfeiche Leun., fr. *filao* (n. d. ind. Straussvogel Casuar — Ähnl. mit dess. Federn, blätterlose, keulenf. Äste!), z. B. *equisetifolia* Forst., *africana* Lour., *paludosa*, *nana* etc. — Casuarinēae Mirb. DC.
- Catabrōsa P.-B.** (zu Poa) Rchb. (Gräser, III. 2) Quell- od. „Futtergras“ (*καταβρώσις* Futter, v. *καταβίβρωσω* zehre auf), z. *aquatica* P. B., s. *Aira* aq. L. (*Glyceria* aq. Presl s. *Catabrosa* Kl. Richt.).
- Catalpa Juss.** (zu *Bignonia* Rchb., L.) (Bignoniaceen, II. 1 od. XIV. 2) Trompetenbaum, -blume, Zier. *C. syringifolia* Sims m. v. *nana*, s. *Bign. Cat. L.*), fr. *Bignone* de Virginie, *C. longissima* Sims, etc. (Nam. d. Pfl. in Carolina!).
- Catananche L. (-ance T.)** (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Zwangkraut“, Rasselblume, Stärkekraut, fr. *catanche* od. *cupidone* (*κατανάγκη* Zwangmittel, Liebestrank u. Pfl. dazu!), Zier. *C. coerulēa* L., fr. *cupidone bleue*, m. v. *alba* Hort.
- Catappa G., DC.** (Combretac. od. Myrobalaneen, XXIII. 1) Büschelblattbündel (auf d. Molukken *catappan*), s. *Terminalia Catappa* L. (*Amygdalus indica* Raj.).
- Cataputia major G. Fr. i. q.** *Ricinus communis* (Euphorbiac. XXI. 9), davon *Cataputöl* u. *semina Cataputiae* d. Apoth. (vaterl.).
- Cataria T., Hall., Mnch.** (Labiaten, XIV. 1) „Katzenkraut“, chinesischer Ysop (v. *catus* Kater — Wtst. die Katzen wälzen sich darauf herum!), s. *Hyssopus Lophanthus* L. „Schopfbüte“.
- Catasētum Rich.** (Orchid. Vandeem, XX. 1) „Sieborche“ i. q. *Catachaetum* autt. (v. *κατασέω* zersiebe — durchlöch. Lippe?, Wtst. *κατὰ* herab u. *seta* gr. *γαίτη* Borste — columna an d. Basis rankig!), z. B. *tridentatum* Hook., *Hookeri* Ldl. etc. (Südamer.).
- 1) **Catēchu** (sc. *Mimōsa*) L. (Mimoseen, XXIII. 1) „Catechu“-Mim., fr. *cachou* (liefert *Succus Catechu* s. *Terra japonica* der Apotheken, W. — vaterl. Name!). 2) **Catēchu** (sc. *Arēca*) L. (Palmen, XXI. 5—10) *Catechu-P.* (Ind.), s. *Arēca* Tafel G., Rumph.
- Catha Forsk., Hassk.** (Cada?) (Celastraceen, V. 1) Bügelholz, fr. *catha* (Wtst. v. d. arab. *kat*, schwerl. v. *κάδος* Fass!), z. B. *C. edulis* Vahl = *Celastrus* ed. autt.
- Catharanthus G. Don** (Contorten od. Apocyneen, V. 1) „Reinblume“, Rosen-Sinngrün (v. *καθαρός* rein, lauter, *ἄνθος* Bl.), Zier. *C. rosēus* G. Don (*Vinca ros.* L.) m. v. *alba* Hort., s. *Lochnera ros.* Rchb.
- Cathartocarpus Pers.** (Legumin. Cassieen, X. 1) „Reinigungsfrucht“ (v. *καθάριος* Reiniger u. *καρπός* Fr. — zum Abführen), *C. Fistula* Pers. s. *Bacillus Lindl.*, s. *Cassia Fistula* L.
- Cathcartia** (st. **-tia**) Müll. (Papaveraceen, XIII. 1) „Cathcart's“-Keulenmohn (n. d. engl. Lord Cathcart, Gesandter etc. zu Anfang des 19. Jahrh.'s), *C. villosa* Müll.
- Catiang DC.** (sc. *Dolichos*) L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) kleine Faseln (vaterl.), s. *Phaseolus minor* Rumph.
- Catinga Aubl., Juss.** (Myrtaceen, XII. 1) „Catinga“-M. (bei den Garipons in Guiana heisst d. Baum *iva-catinga*).

- 1) **Catonia** Mnch., Cass. (zu *Crepis* Rehb.) (Composit. Cichoriac. XIX. 1) „Caton's“-Pippau (n. d. Römer Cato dem Älteren, † 140 v. Chr.), z. B. *C. crocēa*, *aurea*, *alpestris* Rehb. etc. 2) **Catonia** Juss. (Personaten, XIV. 2), z. B. *Brownēi* Poir. s. *marginata* St. Hil. (Str. Jamaica). 3) **Cat.** Vahl (Convolvulac. V. 1).
- Cattleya** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Cattley's“-Pracht-O. (n. d. Bar. W. Cattley, Mitgl. d. Lond. Gart. Soc. u. Lindley's Freund), z. B. *crispa*, *Grahami*, *maxima* Ldl. (Bras.), *citrīna* (Sobralia citr. La Ll.) (Mexiko) etc.
- Catūrus** L. (Euphorbiac. od. Urticac. Humulineen, XXII. 3) „Katzenschwanz“, fr. cature (v. catus Wildkatze etc.), οὐρά Schwanz — Ansehen d. Blumenähre!), z. B. *ramiflorus* L. (*Boehmeria* ram. Jacq.) u. *spiciflorus* L. (*Acalypha hispida* Burm.).
- Caucalinēae** Koch, Haftdoldenartige, s. sogl.
- Caucālis** Hoffmg. (Umbelliferen, V. 2) Haftdolge, fr. *caucalide* (-lier) u. persil bâtard (gr. *καυκαλῖς* v. *κείω* krieche u. *καυλός* Stengel — mehrere Arten sehr niedr., Wtst.), Zier. *C. orientalis* L. s. *pulcherrimus* Koch.
- Caulerpa** Lamx. (Fadenalgen. XXIV. 3) „Kriechstengel“-Alge (*καυλός* Stengel u. *ἔλω* krieche).
- 1) **Caulinia** W., Pers., DC. (Ceratophyllen, XXI. 8) „Caulinie“, Zwergnixe (-najade) (n. d. ital. Bot. Caulini, schr. Dissert., Napoli 1792), z. B. *fragilis* W., s. *Fluvialis minor* Mich. (*Najas* Schrk., *Kernera* W., *Ittnera* Gm. minor). 2) **Caulinia** Mnch. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Caulinis-Bohne“, s. *Kennedya rubicunda* Vent.
- Caulophyllum** W., Mchx. (Berberideen, VI. 1) „Stengel“- od. Löwenblatt D., fr. *caulophylle* (*καυλός* Stengel etc., *φύλλον* Laub — Blätt. in d. Stiel auslaufend, wie eins damit!), z. B. *thalictroides* Mchx. (*Leontice* th. L.).
- 1) **Cavanillēa** Thb., Lam. (Sapotaceen od. Leguminosen, XVII. 4) „Cavanillee“ (n. d. Prof. Cavanilles in Madr.), z. B. *C. scandens* (Moldenhauera sc., Capstr.), *philippensis* Lam. (*Diospyros discolor* W.). 2) **Cavanillēa** Gmel. (Malvac. od. Sterculiac. XVI. 7) „Cavanilles“- od. Scharlachmalve, s. *Pentapetes phoenicēa* L. (*Dombeya* ph. Cav.), s. sogl.
- Cavanillesia** Rz. Pv. (Bombaceen, XVI. 8) „Cavanillesie“ (s. eb.), z. B. *cordata* s. *umbellata* R. P., *arborēa* W., *platanifolia* H. B. K. etc. (Str. Südamer.).
- Cavendishia** Lindl. (Ericaceen, VIII. 1) „Cavendishie“ (n. d. Chemik. Henry Cavendish, Entd. d. Wasserstoffs, † 1810).
- Ceanothus** L. (Rhamnaceen, V. 1) „Seckelblumenstrauch“, fr. *céanothe* (gr. *κεάνωθος* Scharte v. *κεντέω* steche od. *κείω* brenne, steche), z. B. Zier. *C. americanus* L. m. v. v., amer. Thee, e. New-Jerseytea od. *american red-rod*, z. B. v. *azurēus* Hort. s. *tardiflorus* Hornem. u. *rosēus* Hort., *C. thyrsiflorus* Eschsch., *ferrēus* W. „Eisenholz“, *discolor* Vent. (*Pomaderris* disc. Desf., Str. Falklandsinseln) etc.
- Cebatha** Forsk. (Menispermaceen, XXII. 10) „Kebathbaum“ (v. d. arab. *kebath*, Pfeiffer).
- Cecidodaphne** Nees (Laurineen, VIII. 1) „Gallen“-Seidelbast (*κηκῖς*, *-ιδος* Gallapfel u. *Daphne*, s. d.).
- Cecropia** L. (Artocarpeen, XXII. 2) Ameisenbaum, Armleuchter-, Kanonen- u. Trompetenbaum Leun., fr. *coulequin* (v. *καάω* schreie etc. — d. hohle Stamm als Blasinstrument u. s. f.), z. B. *C. concolor* W. u. *peltata* Jacq.
- 1) **Cedrēla** L. (Ampelid. Cedreleen od. Hesperid. Meliaceen Rehb., V. 1) „Cedertanne“, Cuba-Cedernholz, Paternosterbaum, fr. *cédrel* (v. *Cedrus* Ceder u. *ἔλατη* Tanne — Geruch des Holzes nach Ceder!), z. B.



- C. odorata L., s. g. Cigarrenkistenholz, C. montana Bleistifholz.  
 2) **Cedrela** Lour. (Myrtaceen, VIII. 1), s. Baeckea frutescens L. — Cedrelēae R. Br. Mahagonibäume (zu Ord. Ampelidēae Bartl.).
- Cedronella** L., Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Citronen“-Bienenaug, fr. cédronelle (dem. cedro span. Citrone), z. B. Zier. C. mexicana Benth., cana, triphylla Mnch. (Dracophyllum canariense L.).
- 1) **Cedrus** T., Barrel, Lk. (sc. Pinus) L. (Coniferen, XXI. 9) „Ceder“, fr. cèdre, e. cedar (n. d. Bach Kidron od. Kedron in Judäa, Paxton, v. ζέω brenne, räuchere, Wtst.), z. B. C. libanensis Juss. (Libani Barrel.) i. q. Pinus Cedrus L. Libanon-C. od. Cedernfichte W., C. atlantica Man. Atlas-Ceder, C. Deodara Loud. Himalaya-C.  
 2) **Cedrus** Mahagoni Mill. (Hesperideen, X. 1), s. Swietenia M. L. Mahagonibaum.
- Celiba** B., Plum., St. Hil. (sc. Bombax) L. (Oxalid Bombaceen, XVI. 8) fünfblättr. Wollenbaum (amer. Name!), s. Eriodendron jasminodorum DC.
- Celastrēae** R. Br., -inēae DC., -acēae Grck. Fleischmantelgew. (zu Ord. Tricoccae Bartl., Kl. Frangulacēae Endl.).
- Celastrus** L. (Theaceen Celastrineen od. Rhamnaceen, V. 1) Baumwürger, -mörder, Bügelholz, Kletterstr., fr. célastre, e. staff-tree (zu Stöcken!) (gr. ζήλαστορον v. ζήλας Herbst — späte Frucht), z. B. Zier. C. scandens L. (Nordamer.), fr. bourreau des arbres, e. bitter-sweet „Bittersüss“, C. ceriferus autt. „Wachs“-Kletterstr. (Südostasien), e. wax-word, etc.
- 1) **Celosia** L. (Amarantaceen, V. 1 od. XXII. 5) Hahnenkamm, fr. célosie od. passe-velours, e. cock's-comb of the Florist v. ζηλώω brenne — wie eine Flamme anzusehen, Wtst. ζήλεος verbrannt — Blum. wie vertrocknet!), z. B. Topfbl. C. cristata L., plumosa m. v. v. Federbusch-H., fr. C. à panache cramoisi, e. feathered crimson-Celosia, C. argentēa L. m. v. linearis Sweet, s. spicata Hort., C. margaritacēa L., fr. Cél. perlée, u. C. japonica. 2) **Celosia** (sc. Iresine) L. (Amarantaceen, XXII. 5) Hahnenkamm-Wollast.
- Celsia** L. (Scrophularineen od. Verbascineen, V. 1) Bärenschwanz (n. Olaus Celsius, s. d. Aut.), C. Arctūrus Vahl (Verbascum Arct. L. f.), betonicifolia W. (Blattaria hispanica Dodart), linearis (Hemimēris coccinea) etc.
- Celtidēae** (sc. Urticāe Rchb. s. Ulmaceae Endl.) Zürgelbaumartige, s. Celtis.
- Celtis** T., L. (Urticac. od. Ulmac. Celtideen, XXIII. 1) Zürgelbaum (Zirgelb.), fr. micocoulier, fabrecoulier, e. lote- od. nettle-tree u. bitter-oak „Bittereiche“ (v. ζέλιτις Peitsche — zu Peitschenstielen geb.), z. B. Zier. C. australis L., e. european n.-tr., C. occidentalis L. (obliqua Mnch.), fr. m. de Virginie, e. north-american n.-tr. (in Amerika sugar-berry „Zuckerbeere“) m. v. v., C. aculeata Sw. (Rhamnus ignanēus Jacq.), laevigata Spr. (Momisia l. D.), etc.
- Cembra** Scop. (sc. Pinus) L. (Coniferen, XXI. 9) Zürbelkiefer, Arve od. Zutsche, fr. cembro od. cimbre, flammet, auch Eouve (Alvies) od. Auvier, e. cembran-pine m. v. pygmaea Fisch. (n. d. ital. Nam. d. Pfl. cembro od. cirmölo geb.).
- Cenchrus** L. (Gräser, XXIII. 1) Stachel- od. Klebgras, fr. racle (gr. ζέγγροζ Hirse), z. B. tribuloides L. (Panicastrella americ. minor Mch.), s. Crypsis Ait., Natia Ad. u. Manistūris Sw.
- Cenolophium** Koch (Umbelliferen, V. 2) Hohlrippe, -,kamm“ (v. ζενόζ hohl, λόφιον Schopf etc. — aufgeblas. hohle Joche), z. B. C. Fischeri Koch (Russl. Lappl.).
- Centaurēa** L. (Composit. Centaureen, XIX. 3) Flockenblume, Tremse O. W., fr. centaurée, e. centauray, bull-weed, globe-flower od. knap-

weed (v. *Κένταυρος* d. Centaur), Zier. C. americana Nutt., suaveolens Hort., Cineraria L., candidissima Lam., macrocephala W., gymnocarpa Moris., orientale L., moschata L., fr. fleur de Grand-Seigneur „Sultansbl.“ od. bluet du Lévant, e. musk-centaury, m. v. fl. alb. Hort.; wild u. Gart. C. Cyanus L. blaue Kornbl. od. „Cyane“ u. montana L. (Pflaumengeruch!). — Centaureae Rchb.

**Centaurella** Mchx. (Gentianeen, V. 1) „Kleinentaure“ (dem. Centaurium, s. hern.), z. B. i. q. Gentiana L. s. Erythraea Pers. Centaurium L. Tausendguldenkr. (Chironia Cent. Curt. s. Gerardi Schmidt). C. (Andrewsia) verna u. autumnalis Spr. „Andrews' Frühlings- u. Herbst-Enzian“.

**Centaurem** (sc. Centaurēa L. s. Jacēa Pers.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Scharfen-Flockenblume (habitus Serratulae Pers.).

**Centauridium** Torr.-Gr., Endl. (Compos. Inuleen, XIX. 3) „Scharfen-flockenblumgleiche“ (s. eb. Centaurēm u. *είδομαι* gleiche), z. B. C. Drummondii T.-Gr., s. Centaurium Ad.

1) **Centaurium** Rich. (sc. Erythraea Pers. s. Gentiana L.) (Gentianeen, V. 1) Tausendguldenkraut, fr. chancelague, e. centaury (v. centum = 100 u. aurum Gold — hund. Goldstücke, Wtst.), s. Chironia L., Centaurella Mchx. u. Exäcum L. 2) **Centaurium** Ad., Cass. (Compos. Centaureen, XIX. 3) i. q. Centaurēa Centaurēm L., fr. centauree, épine jaune „Golddistel“.

**Centifolia** (sc. Rosa) L. (Rosaceen, XII. 5) „Hundertblattrose“ od. „Centifolie“, Garten-(Bauern-)Rose m. v. muscosa Mill. „Moosrose“ (v. centum = 100 u. folium Blatt).

**Centinodia** Bauh. u. **Centinodium** Rchb. (zu Polygonum L.) (Polygonaceen, VIII. 3) „Hundertknoten“, Wegtritt-Knöterich, z. B. aviculare L. „Vogelknöterich“ (centum u. nodus Knoten — der Stengel-gelenke!).

**Centradenia** G. Don (Lythraeiden od. Melastomaceen, VIII. 1) „Stachel-drüse“ (*ζέιτρον* Stachel, *ἀδύνη* -έρος Drüse — d. Connektiv d. kleineren Antheren läuft in eine Drüse aus, das d. gröss. in einen Sporn), z. B. Warmh. C. floribunda Planch. (Centralamer.), grandifolia u. rosea Ldl. (Mex.), divaricata G. Don, etc.

1) **Centranthēra** Scheidw. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Antherensporn“-O. (s. eb., *ανθήρα* Staubbeutel), s. Acianthēra. 2) **Centranthēra** R. Br. (Personaten, XIV. 2), z. B. hispida R. Br. (Neuholl.).

**Centranthus** DC. (Valerianeen, III. 1) „Spornblume“, -Baldrian, fr. centranthe (s. v. u. *κέντρος* — lange spitze Nektarien!), Zier. C. ruber DC. m. v. fl. albo (Valeriana rubra L., fr. Valériane rouge).

**Centrocarcha** D. Don (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Stachelspreu“ (s. v. u. *κάρχη* Spreu etc.), s. Rudbeckia.

**Centrochilus** Schauer (Orchideen, XX. 1) „Stachelippe“ (s. v., *χειλος* Lippe — Labell m. ein. lang. keuligen Sporn), z. B. gracilis Schau.

**Centroclinium** D. Don, Endl. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Stachelboden“ (s. v., *κλίση* Lager, Bett — näml. Blumenboden m. stachel. Fransen), z. B. altissimum Pöpp., Endl., reflexum Hook, etc., s. Hipposēris Cass. u. Onosēris Less.

**Centrolēpis** Lab. (Commelyneen od. Restiaceen, I. 1) „Stachelschuppe“ (s. v., *λεπίς* Schuppe — d. mittl. Schuppe stachlig! Wtst.), z. B. fascicularis Lab. (Van Diemensl.), pulvinata R. Sch. (Desvauxia p. R. Br.).

**Centrophylum** Neck. (**Kentroph.**) DC. (Compos. Cynareen, XIX. 1) „Stachelblatt“ (s. v., *φύλλον* Laubblatt), z. B. lanatum DC. Wollsafter, s. Carthāmus lan. L.

**Centropogon** Benth., Presl (Lobeliac., XIX. 6) „Spornbart“ (s. v., *πώγων* Bart — d. beid. unt. Antheren in ein. Stachelbart ausl., Wtst.),

- z. B. Stuben *C. speciosus* Planch., *surinamensis* Presl, *tovarensis*, etc., s. *Siphocampylus* „Krummröhre“, u. *Sphaerocarpa* „Kugelfrucht“.
- Centrosia** Rich. (-sis P.-Th., Sw.) (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Stachel“-O. (s. v., *ᾠοις* Stoss — Labell gespornt, Wtst.), z. B. *sylvatica* P. Th. (*Calanthe* s. Lindl.), s. *Alismorchis centrōsis* A. Rich.
- Centrosolenia** Van Houtt. (?) „Stachelfutteral“, „-scheide“ (s. v., *σωλήν* Rinne, Scheide etc.), z. B. *bracteata* u. *picta*.
- Centunculus** Dill. L. (*Lysimachieen*, IV. 1) Kleinling (*centunculus* dem. v. *cento*, -ōnis Lumpen), z. B. *minimus* L.
- Cepa** T. (sc. *Allium*) L. (*Liliac. Asphodeleen*, VI. 1) gem. od. Sommer-Zwiebel, fr. *centenille*, *ciboule* u. *oignon*, e. *cibol* (*ciboul*) u. *onion* (lat. *cepa* Zwiebel od. Bolle, v. d. celt. *cep* Kopf, gr. *κεφαλή* od. v. *κητος* Garten? Wtst.).
- Cepaea** (sc. *Sedum*) L. (*Crassulac. Seden*, X. 5) rispige Fetthenne (v. *κηπαιος* im Garten gezogen), s. *Sedum spatulatum* W. portulakblättr. Fetth. M. Rchb.
- Cephalidēae** DC. Kopfbeerartige, s. sogl.
- Cephaëlis** Sw. (*Rubiac. Cinchonaceen*, V. 1) „Kopfbeere“, Brechwurz (v. *κεφαλή* K. u. *εἶλεω* wickle ein — Blütenst.), z. B. *C. Ipecacuanha* Tuss., eigentl. *Ipecacuanha* M.-Rchb., s. *Callicocca* Ip. Broter. „Schönbeere“, *alba* W. (*Tapogomea alba* Aubl.), *glabra* W. (*Tapog. gl. Aubl.*), etc.
- Cephalandra** Eckl., Zeyh. (*Cucurbitac.*, XXI. 10) „Kopfanthere“ (*κεφαλή* u. *ἀνήρ*, -δρός Mann, Staubbeutel), z. B. *Zier. C. grandis* Kurz (*Bryonia* gr. L.), *Balkon C. quinqueloba* Schrad. „Balkonepheu“, etc.
- Cephalanthēae** DC. „Kopfblumenartige“, s. *Cephalanthus*.
- Cephalanthēra** Rich. (Orchid. *Arethuseen*, XX. 1) „Kopfkölbchen“, ständel, *Orant* O. W. (s. v., *ἀνθηρά* Staubbeutel — dieser gestielt, gipfelständig!), z. B. *grandiflora* Babingt., *Xiphophyllum* Rchb. f. s. *ensifolia* Rich., *rubra* Rich., etc., s. *Serapias* u. *Epipactis*.
- 1) **Cephalanthus** L. (*Rubiac. Caprifoliac.* od. *Dipsaceen*, IV. 1) „Kopfblume“, Knopfbaum, fr. *cephalanthe*, e. *button-wood* (s. v. u. *ἀνθος* Blume — in ein. Kopf vereinigt!), z. B. *Zier. occidentalis* L. amerik. *Kopfblumenstr.*, *C. chinensis* Lam. (*Nauclea purpurea* Roxb.), *C. orientalis* Lour. (*Acrodrÿon* or. Spr.). 2) *C. procumbens* Lour. (*Plantagineen*, IV. 1 od. XXIII. 2), s. *Stilbe* pr. 3) **Cephalanthus** Cham. Schldl. (*Scrophularin.* od. *Loganiac.* IV. 1), z. B. *Sarandi*, s. *Buddlea glabra*.
- Cephalaria** Gren., Schrad., DC. (*Dipsaceen*, IV. 1) „Kopfblume“, Sternkopf, Grindrose u. Karde, s. *Dipsacus* L., *Scabiosa* L., *Succisa* M. K. u. *Asterocephalus* Wallr. (s. v.), z. B. *pilosa* Gren., s. *Dipsacus pilosus* L.
- Cephalotaxus** Sieb., Zucc. (*Cupressineen*, XXI. 9) „Kugeleibe“, -taxus (s. v. u. *Taxus* — bez. d. Blüten!), z. B. *drupacea* s. *Fortunei* Hook.
- Cephalōtus** R. Br., Lab. (*Crassulac.* od. *Corniculat. Seden*, XI. 5) Drüsenköpfchen, Kopfanthere (*κεφαλωτός* mit ein. Kopf versehen — Kelch inwend. m. kopftrag. Haaren bes., Wtst.), z. B. *Zier. C. follicularis* Lab. (Schlauchpfl. Neuholl.).
- 1) **Ceranium** Lyngb., Rochel (-on Ad.) (Tange, XXIX. 3) „Horn“- od. Knotentang W. (v. *κέρας* Horn? Leun. od. *κεράμιον* Thongefäß?), z. B. *hirsutum* Roth, s. *Callithamnion coccineum* Lyngb. (*Polysiphonia* cocc. Spr.). 2) **Ceranium** Blum. (*Aristolochieen*, XX. 5). 3) **Ceranium** Reinw. (*Polypodiac. Farne*, XXIV. 1), s. *Togularia*.
- Cerasēae** (sc. *Amygdalacēae*) Rchb. Kirschbäume.
- Cerasifera** (sc. *Prunus*) L. (*Amygdalac.*, XII. 1) „Kirschpflaume“, amerik. Kirsche, fr. *cerisette* (*cerasus* u. *féro* trage).
- Cerastium** L. (*Alsinaceen*, X. 4) „Hornkraut“, fr. *céraise*, e. horn-

weed (*ζέρας* Horn — Form d. vorrag. Kapsel!), z. B. Zier. C. grandiflorum W. Kit. s. argenteum M. B. (incanum Hoffm.), fr. Argentine, tomentosum L., fr. oreille de souris, etc.

- 1) **Cerasus** (sc. Prunus) L. (Amygdalac., XII. 1) Sauerkirschbaum, fr. c  risier, e. cherry-tree, s. Cerasus acida Fl. Wett. (Prunus austera Ehrh.), fr. bigarreau, rote od. weisse (span.) Herzkirsche (gr. *ζερασός* u. *ζερασία*, fr. cerise Kirsche — v. Cerasunt in Kleinasien am Schwarzen Meer). 2) **Cerasus** (sect. v. Prunus) Rehb.   berh. Kirschbaum, auch S  sskirsche, C. dulcis Fl. Wett., fr. guigne (-nier).

**Ceratosicyos** Nees, Eckl. u. Zeyh. (Passifloren, XX. 4) „H  rchen-Stichling“ (*ζεράτιον* dem. v. *ζέρας* Horn, u. Sicyos — schotenf. Kapsel).

- 1) **Ceratocephalus** Mch. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Hornk  pfchen“, Sichelsamen Leun. (*ζέρας*, -ατος Horn, *ζεγαλή* Kopf — Form d. Fr  chtchen!), z. B. falcatus Pers. (Ranunculus f. L.) u. orthoceras DC. (Ran. falc. M. B.). 2) **C.** Rich. delphiniifolius Ehret. (Compos. Heliantheen, XIX. 3), s. Coreopsis verticillata L. (Bidens pilosa L.).

**Ceratochilus** Lindl., Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Hornlippe“ (s. v., *ζεΐλος* Lippe — diese beiderseits geh  rt, Wtst.), z. B. grandiflorus Lodd., s. Stanhopea gr.

**Ceratochl  a** DC. (Gr  ser, III. 2) „Horngras“, -samengras (s. v., *γλ  α* Gras — d. unt. Spelze gegrannt, Wtst.), z. B. C. unioloides DC. (Uni  la stricta Torr.) etc., s. Festuca.

**Ceratodon** Brid. (Moose, XXIV. 2) „Hornzahn“-M. (s. v., *  δων* Zahn — Z  hne zweih  rnig!), z. B. purpureus Brid., s. Dieranium s. Trichostomum purp. Hedw.

**Ceratolobus** Mart. (Palmen) „Hornh  lsen“-P. (s. v., *λοβός* H  lse etc.), z. B. C. glaucescens Mart.

- 1) **Ceratonia** L., W. (Cassieen Ceratonieen, XXIII. 3) Johannisbrotbaum, C. Siliqua W., fr. pain de St. Jean od. caroube (-rouge, -rouche), -roubier, e. carob, St. John's-bread (— lief. Siliqua dulcis d. Apoth.) (v. *ζέρας*, -ατος Horn — Form d. H  lse!). 2) **Ceratonia** (sc. Mimosa) L. (Mimoseen, XXIII. 1) Johannisbrot-Mimose.

**Ceratophyllac  ae** Gray, -llac  e DC. Igellockgew., **Ceratophyllinae** Bisch. Ord. d. Hornblattgew., s. sogl.

**Ceratophyllum** L. (Urticaceen od. Ceratophylleen, XXI. 5) „Horn“- od. „H  rnerblatt“, Igellock, Zinken O. W. Wasserzinke, Hirschhorn-Nessel, fr. c  ratophylle od. cornifle, auch mille-feuille cornue-d'eau (s. v., *γυλλορ* Blatt — diese knollige Locken m. Widerhaken!).

**Ceratozamia** Miq. (Cykadeen, XXII. 12) „Horn“-Zapfenpalme (s. v. u. Zamia), z. B. terrestris u. mexicana Miq.

**Cerb  ra** L. (Apocynaceen, V. 1) „Gift-Hundsw  rger“, Schellenbaum (n. d. giftig beissend. H  llenhund Cerberus d. Myth.), z. B. C. manghas L. (Arbor lactaria Rumph. Ostind.) Milchbaum, fr. manglier    fruit v  nimeux, s. Ochrosia manghas Burm., C. chinensis Spr., s. Dissolena verticillata Lour.

**Cercis** L. (Cassieen, X. 1) Stammh  lsenbaum (v. *ζερκις* Pflock, Spule — Frucht wie ein Weberschiff od. eine Messersch  ide, Wtst.), z. B. Zier. C. Siliquastrum L. europ. Judasbaum, fr. gainier, e. Judas-tree, C. canadensis L. u. japonica v. Sieb. (chinensis Bunge), C. canadensis L., fr. bouton-rouge, Salatbaum v. Canada.

**Cerealia** Agric. Saatfr  chte od. „Cerealien“ (cerealis die Ceres, G  ttin d. Ackerbaus, betr.).

**Cerefolium** (sc. Scandix) L. (Umbelliferen, V. 2) Gartenkerbel, fr. cerfeuil, e. chervil (Cerefolium Plin., gr. *χαιρ  φυλλον*, fr. cerfeuil, deutsch „Kerbel“).

- Ceresia** Pers. (Gräser, III. 2) „Ceresgras“ (n. d. Göttin Ceres ben.), z. B. Zier. *C. elegans* Pers. u. *fluitans* Elliott (Peru), s. *Paspalum membranaceum* Lam. u. *repens*.
- Cerëus** Haw., Mill., DC. (sect. v. *Cactus* Rchb.) (Cacteen, XII. 1) Säulen- u. Schlangencactus Leun. (gr. *κηρίων* lat. *cerëus* Wachs- oder Fackel, daher *Cactus* = Fackeldistel!), z. B. Stuben *C. speciosissimus* Desf. Prachtblumen-Cactus, *phyllanthoides* (*Cactus* s. *Phyllanthus alatus*) Flügel-C., *C. grandiflorus* s. g. Königin der Nacht, *C. Ackermannii*, *senilis* „Greisenhaupt“, *flagelliformis* Schlangen- od. Peitschen-C. u. a. m.
- Cerinthe** T. (Boragineen, V. 1) „Wachsblume“, Wabel O. W., fr. *cérinthe* (mêliné) (v. *κηρός* lat. *cera* Wachs u. *ἄσθη* Bl. od. *κηρίων* Bienenbrot — d. Bienen besuchen d. wachsgelben Bl. gern, Wtst.).
- Ceropegia** L. (Asclepiadeen, V. 1) „Quell-Wachspflanze“, fr. *céropége* (*κηρός* Wachs, *πηγή* Quelle — sondert Wachs ab — wie ein m. Wachskerzen besetzt. Leuchter, abhängende, aufgebog. Zweige Wtst.). z. B. Warmh. *C. Gardneri*, *elegans* u. *stapeliaeformis* Haw., *C. Candelabrum* L. „Leuchterbaum“.
- Ceroxylon** Hb. Bpl. (Palmen, XXI. 5—10) „Wachspalme“, fr. *céréoxyle*, e. *wax-palm-tree* (s. v., *ξύλον* Holz — lief. Wachs!), *C. andicola* ds.
- Cerris** (sc. *Quercus*) L. (Cupuliferen, XXI. 8) burgundische od. „Zerreiche“, fr. *chêne Cerris* od. de Bourgogne, e. bitter od. mossy-cupped Oak m. v. v., z. B. v. *austriaca* Loud. Borkh. österr. Zerreiche (*Q. austriaca* W.) — lief. s. g. franz. od. istrische Galläpfel (v. *cerrus* od. -is eine Art Eiche, viell. v. *cirrus* Franse, weg. des fransigen Becherchens!).
- Cervaria** G., Lap. (sc. *Peucedänum*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Hirschwurz“ (v. *cervus* Hirsch), e. *hart's-horn* (-root), s. *Athamanta Cervaria* L., *C. nigra* Fl. Wett. (*C. rigida* Mnch., *C. alsatica* Gaud. (*Peucedänum* als. L.).
- Cervicaria** (sc. *Campanula*) L. (Campanulaceen, V. 1) „Halskraut“-Glockenbl., fr. *cervicaire* (v. *cervix*, -icis Nacken — analog *Trachelium*, s. d.).
- Cervispina** Dill., DC. (Rhamnaceen, V. 1) „Hirschdorn“, gem. Weg- od. Purgierdorn Vilm., fr. *nerprun purgatif* od. *commun*, e. *purging-buckthorn*, *yellow-berry* „Gelbbeere“ (*cervus* Hirsch u. *spina* Dorn).
- Cestracëae** DC. (zu *Solanëae* Rchb.), s. *Cestrum*.
- 1) **Cestrum** L. (Solaneen od. Cestraceen, V. 1) „Hammerstrauch“, fr. *cestrau* (*galant de jour*, - *de nuit*) (v. *κείρα* Hammer — d. Staubfäd. mit Zahn, nicht Paxton: *κείρα* Grabstichel u. Betonike), z. B. *C. vespertinum* Hort. Valenc. (*Cantua foetida*, *Vestia lycioides* W.), *C. petiolare* Kth. (*Sessëa petiolaris* R. P.), *C. venenatum* W. Bohon-Upasbaum Thb. (Cap). 2) **Cestrum** *spermacifolium* W. (*Rubiaceae*, IV. 1), s. *Bouvardia triflora* Hb. Bpl.
- Ceterach** Bauh., W. (Polypodiaceen, XXIV. 1) Milz-, Schuppen- od. „Zechfarne“ O. W., *Ceterach*, fr. *cétérac*, *doradille* od. *herbe daurade*, e. *cerach* (*ceterach*) altdeutsch *Zecht* (arab. *cheterak*), Zier. *C. officinarum* W. (*Asplenium Ceterach* L.), *C. capense* Kze., etc.
- Cetraria** Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Tartschen“- od. Moosflechte, fr. *cétraire*, e. *oyster-green* (v. *cetra* kurzer Lederschil, s. g. *Tartsche*), z. B. *C. islandica* Ach., „isländisches Moos“, e. *Iceland-moss*.
- 1) **Chaenostöma** Benth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Gaff“- od. „Klaffmund“, *Weitmund* Rmpl. (v. *χαίρω* gähne, *κλάω*, *στόμα* Mund — weiter Schlund!), z. B. *Gewächsh. polyanthum* Benth., *fastigiatum* Benth. m. v. *album* Hort. 2) **Chaenostöma** Mart., Rchb. (fehlerh. *-stemma*) (*Melastomaceae* od. *Merianieen*, X. 1).

- Chaerophyllum** Hoffing., L. (Umbelliferen, V. 2) Kälberkropf, -kern, Körfel O. W., eig. „Lustblatt“, fr. cerfeuil (v. *χαίρω* freue mich, *γυλλορ* Laub — schöne Fiederform! od. d. deutsche „Kerbel“, lat. *cerifolium*, gräcisirt!), z. B. C. *sylvestre* L. (*Anthriscus* s. Hoffm.), fr. *cerfeuil sauvage* od. persil d'âne „Esel-Petersilje“.
- 1) **Chaetospora** Ag. (Nostochineen od. Gallertalgen, XXIV. 3) „Borstenspore“ (*χαίτη* los. Haar, Borste, *σπορά* Samen, „Spore“). 2) **Chaetospóra** Hb., R. Br., Rchb. (Cyperaceen, III. 1) Samenhaar-Cypergras (— an d. Basis des Fruchtknotens Borsten! Wtst.), s. *Rhynchospora* Vahl s. *Schoenus ferrugineus* L.
- 1) **Chaetūrus** Lk. (Gräser, III. 2) „Borstenschwanz“, Katzenschw. (s. eb. u. *ούρά* Schwanz — unt. Spelze begrannt!), z. B. *fasciculatus* Lk., s. *Polypogon fasc. Pers.* 2) **Chaetūrus** Ehrh. (Labiaten, XIV. 1) Katzenschweif, s. *Leonūrus Marrubiastrum* L.
- Chamaebuxus** DC. (sc. *Polygala*) L. (Polygalaceen, XVII. 3) „Zwergbux“ (*χαμαί* an der Erde, niedrig u. *Buxus*), z. B. C. *Karensium* Kurz.
- 1) **Chamaecerasus** Pers. (sc. *Prunus* L., sc. *Cerasus* Lois.) (Amygdalaceen, XII. 1) „Zwergkirsche“, sibirische Strauchkirsche, Erdweichsel, s. g. Ostheimer Weichselk., fr. *faux cérisier*, e. ground-cherry-tree od. Siberian cherry (s. v.), s. *Cham. alpigéna* Delarb. 2) **Chamaec.** T., Med. (Lonicereen, V. 1) Heckenkirsche, z. B. C. *Xylostemum* Med. u. *tatarica* Med., s. *Lonicera Xylostemum* u. *tatarica* L.
- 1) **Chamaecistus** Mill. (sc. *Helianthemum*) (Cistaceen, XIII. 1) „Erdciststrauch od. gem. Sonnenröschen, s. *Cistus Helianthemum* L. (Hel. vulgare G.). 2) **Chamaecistus** (sc. *Rhodothamnus*) Rchb. (Ericaceen, VIII. 1) drüsiges od. Zwerg-Alpenröschen, s. *Rhododendron*. 3) **Chamaec.** Sloane (Turneraceen, V. 3), s. *Turnera cistoides* L., *Chamaec. Petiv.*, s. *Turnera punilea* L. 4) **Chamaec.** Barrel., s. *Cistus thymifolius* L. (s. v. u. *Cistus*).
- Chamaecypāris** Spach (zu *Cupressus*) (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Zwergcypresse“, s. g. weiße Ceder (*χαμαί* niedrig, *κυπάρισσος* Cypresse), z. B. Zier. C. *sphaeroides* Spach m. v. v., s. *Cupressus thujoides* L. (*Thuja sphaeroidalis* Rich.), C. *nutkaensis* Sp. (*Cupr. americana* Trautv. s. *Thujopsis borealis* Fisch.), fr. *cuprès d'Amérique*.
- Chamaecyparissias** DC. od. **Chamaecyparissus** (sc. *Santolina*) L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) gem. Heiligenpflanze, eig. „Zwergcypresse“ (s. v. — der Blätt. wegen, wie eine kl. Cypresse!), s. *Santolina virens* Mill.
- 1) **Chamaedaphne** Mitch. (Rubiaceen, Cinchonaceen, IV. 1) „Zwerg-Seidelbast“ (s. v. u. *Daphne*), z. B. C. *repens* L. (*Syringa baccifera* Pluk.), s. *Mitchella* L. 2) **Chamaedaphne** Mnch., Catesb. (Ericaceen, X. 1) *Ch. sempervirens* Catesb., s. *Kalmia angustifolia* L., *Ch. calyculata* Mnch., s. *Andromeda cal.* L.
- Chamaedorëa** W. (Palmen) „Zwergpalme“ (s. v. u. *δούρον* Baum, Lanze — kleine P. m. rohrhart. Stamm, Wtst.), z. B. *Ch. Ahrenbergiana* Berg-P., *elatior* Mart., *elégans* etc.
- Chamaedryon** Ser. (zu *Spiraea*) (Rosaceen, XII. 4) Zwerg-Eich-Spiräen od. gamanderblättr. Rmpl. (*χαμαί* niedrig, *δρύς* - *νός* Eiche — m. Blätt. ähnl. denen d. Eiche!), z. B. *Sp. chamaedryfolia* Jacq. (ulmifol. Scop.), *chamaedryfolia* L., *hypericifolia* L. etc.
- 1) **Chamaedrys** T. (sc. *Teucrium*) L. (Labiaten, XIV. 1) gem. Gamander (— *Chamaedrys germanisirt!*), Schafkraut, fr. *chamédrys* od. *chénette* (s. v. — weg. der Eichenblattform!). 2) **Ch.** (sc. *Veronica*) L. (Scrophularineen, II. 1) Gamander-Ehrenpreis („Vergissmeinnicht“), fr. *germandrée*, e. *germander*.
- Chamae-Iris** (sc. *Iris*) Bertol. (Irideen, III. 1) falsche od. Erd-Schwertlilie, fr. *Iris faux-Iris*, e. *false I.*

- Chamaelaucium** Desf., DC. (Myrtaceen, X. 1) „Zwergpappel“, fr. chaméleuce od. pas d'âne (s. v. u. *λεύκη* Weisspappel), z. B. ciliatum u. plumosum Desf. (Str. Neuholl.). — Chamaelauciae Rchb.
- 1) **Chamaelëa** (sc. Tragia) L. (Rutac. Euphorbiac., XXI. 3) Schiller-Bocksblatt, span. Zeiland (*γαυαίλος* od. *γαυαίλειον* schillerblättr. Pfl., Riemer od. Chamäleon Zool. od. *γαυά* u. *έλαία* Ölbaum, „kleiner Ölbaum“), z. B. C. tricoeca G., s. Cneōrum tricoccon L. 2) **Chamaelëa** T., Borm. (Rhamnaceen, V. 1) „Chamäleon“-Heidenmyrte, C. pilosa = *Phylica stipularis* L. 3) **Ch.** *africana* Herm. (Thymeläaceen, VIII. 1), s. *Grubbia rosmarinifolia* Berg., C. *indica* = *Daphne pilosa* s. *villosa* L.
- Chamaemespilus** Med., DC. (sect. v. Sorbus) Ser. (Pomaceen Sorbeen, XII. 4) „Zwergmispel“, Strauch-Mehlbeere Rmpl., s. *Mespilus Chamaemespilus* L. (Sorbus Ch. Crantz).
- Chamaemorus** (sc. Rubus) L. (Rosaceen, XII. 5) Sumpf-Himbeere M. Rchb., „Zwergmaulbeere“, s. g. Moltebeere (Multe-), e. cloude-berry (s. v. u. Mōrus, gr. *μούρον* od. *μούρον* Maulbeere).
- Chamaenerion** T., Schreb. (-ium T., Scop.) (zu *Epilobium*) Rchb. (Onagrarien, VIII. 1) Weidenröschen, „Zwergoleander“ (s. v. u. *Nerium*, gr. *νηρίον* Oleander), z. B. C. *hirsutum* Scop. u. *montanum*, s. *Epilob. hirs.* u. *mont.* L.
- 1) **Chamaepeuce** (sc. *Serratula* s. *Stachelina*) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Erd“- od. „Zwergfichte“ (gr. *γαμαίπεικη* i. q. *-λεύκη* Hufblattich, lat. *Tussilago* F. W. Riemer — Blätt. nadelförm. etc., Wtst.). 2) **Ch.** *Prosp. Alp.* (Compos. Carduac., XIX. 1) Topfbl., C. *diacantha* DC., fr. Cham. à deux épines, e. double-prickled Ch., s. *Carduus diac.* Lab.
- 1) **Chamaepitys** T. (sc. *Ajūga*) Schreb. (Labiaten, XIV. 1) „Erd“- od. „Zwergfichte“, gelber Günsel, fr. *chamépitys* od. *Ive musquée* u. *ivette*, e. ground pine (s. v. u. *πίτυς* Fichte), s. *Teucrium Chamaepitys* L. 2) **Ch.** *incana* autt. (Convolvulac., V. 1) Harzkraut, s. *Cressa cretica* L.
- Chamaeplium** Wallr. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) (zu *Erysimum* L.) „Erdfüll“-Hederich (s. v. u. *πλειον* voll).
- Chamaeranthemum** Reg. (Acanthaceen, XIV. 2) „Zwerg-Menderle“ (*γαμαί* u. *Eranthemum*), C. *ignëum* Reg. = *Eranthemum ignëum* Hort.
- Chamaerops** L. (Palmen, VI. 1) „Zwergpalme“ (s. v. u. *ώνυμ. -ότος* Strauch), z. B. *Gewächsh. humilis* L. mittelmeer., C. *chinensis* s. *excelsa* Thb. s. *Fortunei* Hort., s. g. Hanfpalme.
- Chamagrostis** Borkh. (Gräser, III. 2) „Zwerggras“ (s. v. u. *άγρωστis*), C. *minima* Bkh., s. *Mibōra* v. P.-B. (*Sturmia* m. Hoppe, *Knappia agrostidëa* Sm.).
- Chamlagu** (sc. *Robinia* P'Hér. s. *Caragāna* Lam.) (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) mongol. Erbsenbaum (mongol. Name!).
- Chamomilla** Gay, DC. (sc. *Matricaria*) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) echte „Kamille“ od. gem. Mutterkraut, fr. *camomille*, e. *camomile* u. *stitch-wort* (gr. *γαμαίμηλον* i. q. *άρθριμς* eig. „Erdapfel“ v. *μηλον* — riecht wie Quitten, Wtst.).
- Chamorchis** Rich. (Orhideen Ophrydeen, XX. 1) Zwergstendel Seub. (*γαυά* an der Erde u. *Orchis*), C. *alpina* Rich., s. *Ophrys alp.* L. u. *Chamaerëpes* Spr.
- Chara** L., Ag. (Characeen, XXI. 1) Armleuchter, fr. *charagne* (-aigne) od. *charapot*, *girandole* u. *lustre d'eau*, e. *chandelier* (gr. *χαρά* Freude — näml. am Wasser, Wtst.). — Characae Rich. Ord. der Armleuchter (*Siphonocaulae* Bisch. „Röhrenstengler“).
- Charianthus** Don (-tha A. Braun) (Melastomaceen Miconieen, X. 1) „Reiz“- od. „Grazienblume“ (*χαρίεις*, -εσσα reizend etc., *άρθρος* od. *άρθρη* Bl. — schön hochrot!), z. B. *coccinëus* Don, s. *Chaenanthëra* Rich.

- Charieis** Blum. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Holde“, Schmuck- od. Reizaster (s. eb. — schön blau!), z. B. heterophylla Cass., s. Kaulfussia amelloides Nees.
- Chariessa** Becc. (Olacineen, III. 1) „Holdselige“ (*χαρίεις, -εσσα, -ίεν* hold etc.), z. B. Smithii Becc., s. Villaresia Smithii F. Müll.
- Charlwoodia** Sweet (Liliaceen, VI. 1) „Charlwood's“-Dracaene (n. G. Charlwood od. Charleswood, enthus. engl. Bot.), z. B. Topf C. rubra (Dracaena r. Hort.), C. (Drac.) congesta Sägezahn. Dr.
- Chate** (sc. Cucumis) L. (Cucurbitac. XXI. 10) ägyptische Melone Vilm., e. egyptian cucumber (chate, Wtst. d. ägypt. Name, v. *χάτος* od. *-τις* Mangel?).
- Chayōta** Jacq. (Cucurbitac., XXI. 10) essbare Chayote, C. edulis Jacq. (Name d. Pfl. in Westind., Wtst.), s. Secchium P. Br.
- Cheilanthes** Sw. (Farne, XXIV. 1) „Lippenschleierchen“, Schuppenfarn (*χελίος* Lippe od. Rand, *ἀνθή* Blüte — blühen am Rande, Wtst.), z. B. C. odōra Sw., microphylla Sw. etc., s. Notochlaena u. Polypodium.
- 1) **Cheiranthus** L. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) Lack, Levkoje, Veil Vilm. (arab. kheyry, nicht v. *χέιο* Hand, *ἀνθος* Bl., Wtst. die man gern in d. Hand hält), Zier. C. Cheiri L. (kheyry) Goldlack, gelbe Viole od. Veil, fr. cheiranthe u. garranier, e. yellow-stock, C. incanus L. (Matthiōla inc. R. Br.) m. v. v., z. B. v. cocardeau, Winter-Levkoje, C. annuus L. (Matth. ann. R. Br.) m. v. v., z. B. Erfurter, Sommer-Levkoje. 2) **Cheiranthus** (sc. Brassica Vill. s. Sinapis Koch) (Crucifer. Siliq.) Levkoy-Kohl od. -Senf, lackblüt. Senf Grck. 3) **Ch.** (sc. Erysimum) Pers. (Crucif. Siliq.), s. Erysimum cheiranthoides L. lackart. Schotendotter Grck. 4) **Ch.** (sc. Manulea) L. (Scrophularineen od. Lobeliac. XIV. 2) Lack- od. Levkoy-Handblume, s. Lobelia Ch. L. (Manulea lat. für Cheiranthus „Handbl.“ — fünffing. Blatt!).
- Cheiri** Dorst. (sc. Cheiranthus) L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2), s. eb. Goldlack, Gelbeil Vilm., fr. violier jaune od. à fleurs j., giroffé des murailles, auch rameau d'or, Jalousie, Muret etc., e. gilliflower, kelri, common wall-flower, s. Cheiranthus fruticosus L., C. Delileanus Hort. Par., fr. giroffé de Delile (arab. kheyry, nicht *χέιο, -ος*; Hand!).
- Cheiropsis** DC. (Ranunculaceen Clematideen, XIII. 7) Hand-Waldrebe v. *χέιο, -ος* Hand u. *ῥυσις* Aussehen — weg. einer d. Blume wie eine Hand einschliess. Hülle, Wtst.), z. B. montana Ham. (anemonaeflora Don) Himalaya-W., s. Clematis mont. s. anem.
- 1) **Chelidonium** T. (Papaveraceen, XIII. 1) „Schwalbenwurz“, Schell- od. Schöllkraut, fr. chéloïne, e. celandine (-lende) u. swallow-wort, tetter -wort u. silken -cully „Seidenpinsel“ (v. *χελιδὼν* Schwalbe — Plin. blüht bei deren Rückkehr!), z. B. diphyllum Mchx., s. Stylophorum d. Nutt., C. Glaucium L. Hornmohn, e. horned-poppy, s. Glaucium luteum Scop., C. corniculatum L. (Glaucium corn. Pers.). — Chelidoniaceae (sc. Papaveraceae) Rehb. 2) **Chelidonia** Koch (zu Cardamine L.) (Crucifer. Siliquos., XV. 2), z. B. Decor.-Blattpfl. Ch. grandiflora argentea Koch, s. Cardamine chelidonia Pers.
- Chelōne** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Schildblume“ od. „Krotten-schild“, fr. galane u. tortue (gr. *χελώνη* Schildkröte — weg. d. Oberlippe!), z. B. Zier. C. barbata Cav. v. coccinea, C. glabra L. m. v. v., C. obliqua L. (alba Mnch. purpurea Mill.), C. Pentstemon L. s. Pentstemon Ait., s. Pentstemon l'Hér.
- Chenopodiaceae** Endl. Ord. d. Gänsefüssgew. (zu Kl. Oleraceae Endl. Gemüsegew.), s. hern.
- Chenopodiaceae** Vent., **-diaceae** DC. Gänsefüssartige (i. q. Atriplicaceae autt. Meldenartige), s. hern.



- Chenopodiina** Moq.-Tand. (Chenopodiac., V. 2) „Gänsefüsschen“ Grck., z. B. *maritima* Moq. = *Chenopodium* m. L.
- Chenopodium** T. (Chenopodiaceen od. Atripliceen, V. 2) „Gänsefuß“, fr. pate (patte) d'oie, herbe aux vers, e. goose-foot od. belvidere (v. *ζήν. -νος* Gans, *ποδίον* Socke etc. v. *πούς. -δος* Fuss), Gart. C. hortense R. Cch. (Suaeda hort. Forsk.) „Gartenmelde“, Zier. C. scoparium L., s. g. Studentenkraut u. atriplicis L. Purpur-G., C. ambrosioides L., fr. thé de santé (- du Mexique) od. ambrosine, e. hedge-mustard.
- Cherlera (-ia)** L. (Arenarieen od. Alsineen, X. 3) „Cherlerie“ (n. Cherler, Mitarb. d. Joh. Bauhin, Herausg. eines Prodomus von Tabernaemontani Hist. plant. univers. 1619), z. B. C. sedoides Jacq., s. *Lychnis alpina* Pluk., C. sedoides Forsk. = *Arenaria procumbens* Vahl.
- Chilodia** R. Br. (-dium autt.) (Labiaten, XIV. 1) Lippenzahnstrauch (*χειλος* Lippe u. *ὀδὸς* Zahn — halb zweiteil. Unterlippe! Wtst.), z. B. Treibh. C. scutellarioides R. Br.
- Chimaphila** fehlerh. st. **Chimatophila** = **Chimophila** Pursh, s. d.
- Chimatophila**, s. eb.
- Chimonanthus** Lindl. (zu *Calycanthus*) L. (Calycifloreen Bunge, XII. 5) „Winterblume“ (-blüte) (v. *χειμών*, -*ώτος* Winter u. *άνθος* Bl.), z. B. Zier. C. praecox s. fragrans Ldl. (*Calycanthus* pr. L.) — Stuben im Dez. u. Jan.
- Chimophila** Pursh (st. **Chimatophila**) (zu *Piröla* Rchb.) (Ericaceen, X. 1) „Winterlieb“, -grün (*χειμωφίλος* v. *χειμα*, -*αιος* od. *χειμών*, -*ώτος* Winter u. *φίλος* Freund, Liebhaber), z. B. umbellata Pursh = *Pyröla* (*Pirola*) umbellata L.
- China** (sc. *Smilax*) L. (*Smilacina*, VI. 1) „China“-*Smilax* (— Stechwinde) (— lief. d. Chinawurzel d. Apoth.).
- Chiococca** P. Br. (st. **Chionococca**) (Cinchonaceen od. Coffeaceen, V. 1) „Schneebeerenstrauch“, Hohlbeere, fr. chiococque (v. *ζών*, -*όνος* Schnee — Beeren glänz. schneeweiss!), z. B. C. anguifuga Mart. Schlangenstrauch, C. paniculata L. (*Psychotria* p. W. s. alpina, Bstr. Surinam), C. opulina Spr. (*Coffea* op. Forst., Neuceled.).
- Chionanthus** L. (Oleaceen Jasmineen od. Sapotac. Fraxineen Rchb., II. 1) „Schneeblume“, Schneeflockenbaum Rümpl., fr. arbre de neige od. Chionanthe de Virginie, fleur en neige, e. virginian snow-flower (-drop) (v. *ζών*, -*όνος* u. *άνθος*), Zier. C. virginicus L. m. v. *maritima* Pursh, C. compacta Sw. (*Linociera* c. R. Br.), C. tetrandra Vahl (*Maypea guianensis* Aubl.).
- Chirita** Don, Hamilt. (Cyrtandreen od. Scrophularineen XIV. 2) „Handschuhblume“ (v. *χειρίς*, -*ιδος* Ärmel, Handschuh? Wtst. ind. Name!), z. B. Warmh. C. Moonii, Walkeri u. zeylanica Don.
- Chironia** L. (Gentianeen, V. 1) „Chiron's-Enzian, Tausendguldenkraut, fr. chiron (n. d. Centauren Chiron, berühmt. Arzt, Myth.), z. B. Zier. C. frutescens L. „Strauch-Chironie“, Gewächsh. linoides L., floribunda Paxt. s. Fischeri Hort., s. *Erythraea* u. *Centaureum*.
- 1) **Chironium** Scop. (sc. *Laserpitium*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Chiron's“-Dolde (s. eb.). 2) **Opopanax Chironium** Koch = *Pastinaca* *Opopanax* L. (Umbellif. V. 2).
- Chlamydëa** Banks (-dia G.) (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Mantellilie“, Flachslilie (v. *χλάμυς*, -*υδος* Oberkleid — weg. deren Verwendung!), z. B. C. tenacissima G. = *Phormium tenax* L. neuseel. Flachs.
- Chlidanthus** Herb., Lindl. (Amaryllideen, VI. 1) Prunk-Narzisse (v. *χλιδή* Prunk etc., *άνθος*), z. B. fragrans Herb., s. *Pancretium luteum* Poir.

**Chlōra** L. (Gentianeen, VIII. 1) Achtspalt-Enzian, Bitterling, Grünling  
Leun., Gelbkraut Rümpl., fr. chore, e. yellow-wort ( $\chi\lambda\omega\rho\acute{o}\varsigma$  grüngelb),  
z. B. Zier. grandiflōra Griseb.

**Chloranthus** Sw., R. u. Sch. (Piperaceen Chlorantheen od. Caprifoliac.,  
II. 1) „Grünblume“, Grünling, Pflaumenpfeffer (s. eb.), z. B. C. ser-  
ratus u. spicatus R. Sch. (Jap.), s. Nigrina serr. u. spic. Thb.

**Chlorēa (-raea)** Lindl. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Grünorche“ (v.  
 $\chi\lambda\omega\rho\acute{\alpha}\omega$  bin gelb- od. blassgrün), z. B. Austinae Gray.

**Chloridēae** Kth. Fingergräser, s. Chloris.

**Chlōris** Sw., Desv. (Gräser, XXIII. 1) „Grün“- od. Fingergras (v.  $\chi\lambda\omega\rho\acute{\iota}\zeta\omega$  bin grüngelb od.  $\chi\lambda\omega\rho\acute{o}\varsigma$  gelbgrün), z. B. Zier. C. tenella Roxb.,  
s. Ctenium indicum Spr.

**Chlorococcum** Fr. (Nostochineen-Algen, XXIV. 3) „Grünkorn“-Alge  
(— grün. Überzug v. Rinde d. Bäume!) ( $\chi\lambda\omega\rho\acute{o}\varsigma$  u.  $\rho\acute{o}\kappa\kappa\omicron\varsigma$  Korn).

**Chlorocrepis** Griseb. (zu Hieracium L.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1)  
„Grünpipappau“ (s. v. u. Crepis, s. d.), z. B. staticifolia Gris. (Hiera-  
cium stat. Vill.), s. Tolpis st. Schultz-Bip.

**Chloromyron** Rz. Pv., Pers. (Tiliaceen od. Capparideen, XIII. 1) „Grün-  
balsambaum“, Marien-B. (s. v. u.  $\mu\acute{\upsilon}\theta\omicron\omicron\nu$  Balsam- od. Duftöl), z. B.  
verticillatum R. P., s. Oleum s. Balsānum Mariae (B., Peru).

1) **Chlorophytum** Ker (Liliac. Asphodeleen od. Sarmentaceen, VI. 1)  
„Grünlilie“ ( $\chi\lambda\omega\rho\acute{o}\varsigma$  u.  $\varphi\upsilon\tau\acute{o}\nu$  Pfl.), z. B. Zier. Stuben: C. Stern-  
bergianum Steud. (Cordylīne vivipāra Hort.), s. Anthericum s. g.  
fliegender Holländer, C. laxum R. Br., inornatum Ker, elatum R.  
Br. (Phalangium el. Red.). 2) **Chlorophytum** Ag. (Algen, XXIV. 3)  
„Grünalge“. 3) **Chl.** Pohl (Rubiaceen, IV. 1) — Blätt. schön grün!

**Chloroxylon** P. Br., DC. (Hesperideen od. Cedreleen, X. 1) „Grünholz“  
(s. v.,  $\xi\upsilon\lambda\omicron\nu$  Holz), C. Swieteni P. Br., s. Swietenia s. Laurus  
Chloroxylon L. Atlas- od. Seidenholz vom Himalaya, fr. bois satiné.

**Chondrilla** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Knorpelsalat“, Krüm-  
ling O. W., fr. chondrille ( $\chi\acute{o}\nu\delta\rho\omicron\varsigma$  Knorpel u. Klumpen etc. —  
Gummiklumpen an d. Stengeln, Paxton).

**Chorisia** Kth. (Oxalid. Bombaceen, XVI. 8) „Choris“-Wollbaum (n. d.  
russ. Nat. u. Reis. Choris ben.), z. B. ventricosa Kth., insignis  
H. B. K. (B. Südamer.), etc.

**Choristopetalae** DC. „Getrenntkronblättrige“ = Dialypetalae Endl. u.  
Polypetalae Juss. ( $\chi\omega\rho\iota\sigma\tau\acute{o}\varsigma$  getrennt).

**Chorozeḿa** Lab. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Kreisfahne“ (v.  $\chi\omicron\rho\acute{o}\varsigma$   
Kreis,  $\sigma\eta\mu\alpha$  Fahne — zugerund. Vexill!), z. B. Gewächsh. ilicifolium  
Sm., Henchmanni R. Br., varium Benth. etc. (kl. Hstr.), s. Oxylo-  
bium Andr.

1) **Christophoriana** T., DC. (Ranunculaceen, XIII. 1) „Christophskraut“,  
schwarze Christwurz, Giftfahre od. -traube (v.  $\chi\omega\rho\iota\sigma\tau\acute{o}\phi\omicron\rho\omicron\varsigma$ , St.  
Christoph, „Christusträger“, Legende), z. B. C. nigra s. spicata T.  
DC., s. Actaea nigra Fl. Wett. s. spicata L., racemosa T. (Actaea  
rac. L. s. Cimicifuga r. L.). 2) **Christophoriana** arborēa Pluk. (Ara-  
liaceen, V. 5) Angelikabaum = Aralia spinosa L. (Angelica arbores-  
cens Comm.), C. canadensis Moris. = Aralia racemosa L.

**Chronosemium** Desv., Ser., DC. (zu Trifolium Rchb.) (Legumin. Trifo-  
lieen, XVII. 4) Dauerfahne ( $\chi\omicron\rho\acute{o}\nu\varsigma$  Zeit,  $\sigma\eta\mu\epsilon\iota\omicron\nu$  Zeichen, Fahne  
— Blüt. nach d. Verblüh. sitzenbleibend, Wst.), z. B. T. agrarium  
u. procumbens L. etc., s. Lupulina Desf.

**Chroolepidēae** autt. Schorfalgen, s. sogl.

**Chroolēpis (-us)** Ag. (Confervaceen, XXIV. 3) „Hautschorf“ (v.  $\chi\omicron\rho\acute{o}\alpha$   
od.  $\chi\omicron\rho\acute{o}\varsigma$  Haut,  $\lambda\acute{\epsilon}\pi\omicron\varsigma$  Schale od.  $\lambda\epsilon\pi\iota$ ; Schorf etc. — farb. Über-  
züge auf Steinen etc.), z. B. Jolithus Ag. „Veilchenstein“, -moos.

**Chrysanthēnum** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Wucherblume,

eig. „Goldblume“, fr. chrysanthème, e. chrysantenon (χρυσός Gold, ἀργεῖον i. q. ἀργός), z. B. C. segētum L. s. g. böse Blume od. Saatwucherbl., fr. fleur dorée, souci des champs (- des blés), marguërite jaune, e. marigold, C. Leucanthemum L. s. g. Marguerite od. grosse Gänseblume, fr. marguërite grande, oeil de boeuf, e. margarite, Gartenbl. C. coronarium L., fr. chr. des jardins, e. garland chr., m. v. fl. albo Hort., C. carinatum Schousb., fr. chr. tricolore, m. v. v., C. rosēm Lindl. (Pyrethrum ros. Ldl. s. carnēm M. B.), liefert s. g. pers. od. kaukas. Insektenpulver, C. indicum Curt. (japonicum u. ind. Thb.), Ramatuelle od. s. g. Winteraster, s. Anthemis artemisiaefolia L. s. grandiflora Hort., m. v. v. z. B. grandiflorum, Pompon, Bronze-Dragon, Yellow-Dragon etc.

- 1) **Chryséis** Lindl. (Papaveraceen, XIII. 1) „Goldmohn“ (gr. Χρυσήϊς Frauennamen v. χρυσός Gold), C. californica Ldl. = Eschscholtzia cal. Cham. 2) **Chryséis** Cass. (Compos. Centaureen, XIX. 3) Goldblume, -flockenbl., s. Centaurea suaveolens W. (Chrysis Ren.).

**Chrysobalanus** L. (Myrobalanceen, XII. 1) „Goldpflaume“, Icacopflaume (χρυσός u. βάλανος Eichel etc., lat. glans — eichelförmige gelbe Frucht, Wtst.), C. Icacó L. westind. Cacaopflaume.

**Chrysobaphus** Wall. (Orchideen, XX. 1), „Goldfarb“-O. (s. v., βαφή Farbe).

**Chrysobotrŷa** Spach (zu Ribes) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) Gold-Johannisbeerstrauch, „Goldträubchen“ (s. v. u. βότρυς, -νος Traube), z. B. Zier. revoluta Spach (Ribes aurēum Pursh) s. g. Chokoladenstr. (R. fragrans Lodd.), fr. grosseiller doré, C. Lindleyana Sp., s. Ribes tenuiflorum Lindl.

**Chrysocephalum** Walp. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Goldköpfchen“ Rmpl., fr. chrysocephale (χρυσός u. κεφαλή Kopf), z. B. Zier. apiculatum Steetz, s. Helichrysum ap. DC. (Gnaphalium ap. Lab.).

**Chrysocoma** L., DC. (Compos. Astereen od. Eupatorineen, XIX. 1) „Goldschopf“ Seub., -haar, fr. chrysocome (s. v., κόμη lat. coma Haupthaar — gelbe, fein haarf. Blüten, Wtst.), C. coma aurea L. (Conyza Comaurea L.), s. Linosyris Cass. u. Gnaphalium.

**Chrysoglossum** Blum. (Orchideen, XX. 1) „Goldzungen“-O. (— Labell goldfarbig!).

**Chrysophyllum** L. (Sapotaceen, V. 1) Sternapfelbaum, eig. „Goldblatt“, indisches Eisenholz, fr. cañitier (s. v., φύλλον Laubblatt — die Bl. unten rostf. goldglänz. überzogen!), C. ferrugineum s. Cainito L., s. Manglilla Chrysoph. Lam. (Myrsine Manglilla R. Br.), auch Nycterisition ferruginum Rz. Pv.

- 1) **Chrysosplenium** T., L. (Saxifragaceen, X. 2) „Goldmilz“, Milzkraut, fr. hépatique des marais, dorine od. saxifrage hépatique dorée, e. milt-wort (-wast), spleen-wort (s. v., σπλήν, -ηρός Milz — geg. Milzkrankh.!), z. B. oppositifolium L. s. repens Lk. 2) **Chrysosplenium** Walt. (Polygonaceen, VIII. 3) wolliger Knöterich, s. Eriogonum tomentosum Mchx.

**Chrysurus** P.-B., Rich. (Gräser, III. 2) „Goldschwanz“ (s. v., οὐρά Schwanz — schwanzähnl. Ährchen gelb!), z. B. Zier. C. cynosuroides Pers. (Cynosurus aureus) u. a., s. Hymenothecium Lag., Aegopogon Hb.

**Chysis** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Giess“-O. (χύσις d. Giessen od. Schütten — hängt von d. Bäum. herab, Wtst.), z. B. Warmh. C. bractescens Lindl. (Amer.).

- 1) **Cianītis** (bess. **Cyan.**-) autt. (Compos. Centaureen, XIX. 3) Blauflockenblume, „Cyanengleiche“, Berg- od. Wald-Cyane (κυανίτις od. -νοειδής), z. B. C. sylvatica autt. = Centaurea montana L. (Cyānus mont. Fl. Wett.). 2) **Cyanītis** Reinw. (Saxifragac., X. 2) Blausteinbrech (— Blüten u. Früchte blau! Wtst.).

- Ciborium** Endl. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) (zu Pezīza L.) „Becherpilz“ (*κιβώριον* lat. ciborium Becher etc.).
- Cibotium** Kaulf. (Baum-Farne, XXIV. 1) „Kistchenfarn“ (*κιβώτιον* Kiste — bez. d. Sporangien!), z. B. Chamissoi Kaulf. (Sandwichsins.), Billardieri Klf. (*Dicksonia antarctica* Lab.).
- Cicca** L. (Euphorbiac., XXI. 4) Wunderbaum- od. Ricinus-Euphorbium (*κίκυ* Wunderb. — d. Rinde ähnl. wie bei Ricinus purgierend, Wtst.), C. disticha L., s. *Averrhoa acida* L. f.
- Cicendia** Adans. (Gentianeen, IV. 1) Bitterkraut, Fadenblatt Leun., Zindel O. W., Vierspalt-Enzian (n. d. Namen Cicendi geb., Wtst. d. veränd. Gentiana od. Centaurium!), C. filiformis Ad., s. *Ēxācum* fil. W.
- 1) **Cicer** T. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Kicher“, -erbse, fr. pois-chiche u. garranche, e. chick-pea (cicer, -ēris „Kicher“, hebr. kīkar rundlich!), C. arietinum L. u. sativum L. (*Cicerula* sat. Alfd.). 2) **Cicer** (sc. *Astragalus*) L. (Legum. Astragaleen, XVII. 4) kicherart. Traganth. 3) **Cicēra** (sc. *Lathyrus*) L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) rote Platt-erbse M.-Rchb.
- Cicerbīta** Wallr. (zu *Prenanthes*) Rchb. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Krautichorie“ (Cicer od. *Cichoria* u. *herbesco*, Partic. *herbitus*, werde zu Gras od. Kraut, st. *Cichoria herbīta*!).
- Cicercūla** Alfd. s. Cicer (dem. cicer).
- Cicerella** Mnh. (zu *Lathyrus*) L. (Papilionaceen, XVII. 4) „Kicherchen“ (dem. Cicera sc. *Lathyrus* L.).
- Cichoriacēae** Rchb. (-racēae Juss.) cichorienartige Korbblütler (zu Ord. *Compositae* Endl. etc.).
- Cichorium** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Cichorie“, Wegwarte, Warte O. W., fr. cichorée (escarole od. scarole, -riole), e. cichory (succory) (gr. *κικώριον* v. *κίω* gehe u. *χωρίον* Acker, Feld etc., Wtst.), z. B. C. Intybus L. gem. u. geb. Cichoriē, C. Endivia L. „Endivien-salat“.
- Cicla** (sc. Beta) L. (Chenopodiaceen, V. 2) weiße Runkelrübe, w. Mangold, s. g. Römischkohl, var. v. *Beta vulgaris* L. Dickrübe (-wurz) (Wtst. st. sicūla — in Sicilien wild, schwerl. v. *Cilix*, -īcis Cilicier in Kleinasien, od. *κιγκλις* Gitter? *κίγκλος* lat. *cinclus* Wasserstaar?).
- Ciconium** Sweet (Geraniaceen, XVI. 5) „Storchgeranium“ (v. *ciconia* Storch, wie Geranium v. *γέρονος* Kranich), z. B. Zier. *inquāns* Ait. (*Pelargonium* inq.), zonāle L. m. v. *scandens* Ehrh., *acetosum* Ait. etc., s. *Pelargonium*.
- Cicūta** L. (Umbelliferen, V. 2) Wasserschierling, Wüterich, fr. cicutaire od. ciguē, e. water-hemlock u. kecks (kex), C. virosa L., fr. ciguē vireuse (cicuta Plin. Schierling v. *κίω* od. *γίω* bin hohl), s. *Cicutaria* Riv.
- 1) **Cicutaria** Riv., T. (Umbelliferen, V. 2) Wasserschierling, fr. cicutaire (s. eb.). 2) **Cicutaria** Vill. (sc. *Chaerophyllum*) L. (Umbellif., V. 2) schierlingblättr. Kälberkropf, s. *Chaeroph. hirsutum* L., *Cicut. bulbosa* (*Chaeroph. bulb.* L.), C. *palustris tenuifolia* Vill., s. *Phellandrium*.
- Cienfuegia** W. (-fuegosia Cav.) (Malvaceen, XVI. 7) „Cienfuegosie“ (n. d. span. Bot. Bernardo Cienfuegos, Ende d. 16. Jahrh., Pfeiffer), z. B. *digitata* Cav. etc., s. *Fugosa* (-ia) Juss.
- Cimicifūga** L. (Ranunculaceen, XIII. 4) Wanzenkraut, -, „flucht“ od. -tod, fr. chasse-punaise, herbe aux punaises, e. bug-flight (cimex, -īcis Wanze, fūga Flucht — vertreibt d. Wanzen), z. B. C. foetīda L. (*Actaea cim.* L.), *racemosa* Bart. (Act. rac. L.).
- Ciminalis** Ad. s. *Cyminalis* Borkh. (Gentianeen, V. 2) „Kümmel“-Enzian (v. *κίμνον* Kümmel), s. *Gentiana acaulis* u. *Pneumonanthe* L.
- Cināra** T. s. *Cynāra* Vaill.

- Cinchōna** L. (Rubiaceae Cinchonaceen, V. 1) China- od. Fiebertindenbaum, fr. quinquina, e. china- od. peruvian-bark, *C. officinalis* L. (n. d. Gräfin de Cinchon, Vicekönigin v. Peru, welche 1638 davon kuriert wurde, Paxton: nach de la Condamine v. kina od. quina od. Indianer = Rinde). — Cinchonaceae Lindl. (zu Rubiaceae Rchb., Ord. Rubiacinae Bartl.).
- 1) **Cineraria** L. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Aschenpflanze“, Wandelblume Leun., fr. cinéraire, cendriette (v. cinis, -eris Asche — Ansehen d. Stocks!), z. B. Zier. *C. cruenta* P'Hér. s. hybrida W. canarische m. v. hybrida nana Hort., *C. amelloides* L., s. *Agathaea* am. Cass., *C. maritima* L. (Senecio m. Rchb.), fr. c. maritime, e. rag-wort od. silvery-white Cin. etc. 2) **Cineraria** (sc. *Centaurea*) L., Jacq. Aschen-Flockenblume (Teppichpfl.), s. *Centaurea candidissima* Lam.
- Cinnamomēae** Lauch. (sect. v. Rosa) Pfingst- od. Zimmtrosen, z. B. *R. cinnamomēa* L., *alpina* L. etc., s. sogl.
- Cinnamomum** R. Br., Nees (Laurineen, IX. 1) Zimmtlorbeer, fr. cinnamome, e. cinnamom (v. d. arab. kinamom od. china u. amomum Wtst.), s. *Laurus* s. *Persēa Cinnamomum* G., L.
- Circaea** L. (Onagrarien, II. 1) „Hexenkraut“, fr. circée, herbe aux magiciens (- de St. Etienne), e. witch-wort (hag-) (n. d. Zauberin Circe, Myth.), z. B. *lutetiana* L., *intermedia* Ehrh., etc.
- Circināntia** (sc. *Chlorophyta*) Rchb. „Zirkel“- od. „Wickelkräuter“, i. q. *Filices* Farne (*circinus* Zirkel etc. — näml. beim Sprossen d. Wedel!).
- Cirrhaea** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Rankenschnabel“ (v. *cirrus* gr. *ζίφος* Ring, Locke, nicht *ζιφός* gelb — inner. hin- u. hergedreht. Blütenblatt! Wtst.), z. B. *Loddigesii* Ldl. (*Cymbidium* dependens Lodd.), *viridi-purpurea* Ldl. (Bras.), s. *Gongora* v.-p. Hook.) etc.
- Cirrhopetalum** Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Rankenblatt“ (**Cirropet.**) (s. eb. u. *πέταλον* Blütenblatt — d. *columna* m. 2 blumenblattart. Hörnern an d. Spitze, Wtst.), z. B. *Blumēi* Ldl., s. *Ephippium ciliatum* Blume.
- Cirsium** T., Vaill. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Kratzdistel, „Aderkropfkraut“, fr. cirse (v. *ζισσός* Blutaderknoten — bei d. Alten geg. solche gebraucht, Wtst.), z. B. *lanceolatum* Scop. (*Carduus lanc. L.*, *Cnicus l. W.*), *eriphorum* Scop. (Card. s. *Cnic. er. L.*, *W.*), *palustre* Scop. etc., s. *Carduus* u. *Cnicus*.
- Cissampelos** L. (Menispermaceen, XXII. 12) „Epheurebe“, Grieswurz Dietr. (v. *ζίσσος* lat. *Cissus* u. *ἄμπελος* Weinstock — schlingt wie d. Rebe! Wtst.), z. B. *C. Pareira* L. gebräuchl. Grieswurz Leun., *Pareira brava* d. Apoth.
- Cissus** L. (Sect. v. *Vitis* Lauché) (Ampelideen od. Vitaceen, IV. 1) Klimme, griechisches od. arabisches Epheu, Fiederrebe Lauch. (v. d. arab. *quissos*, Paxton), z. B. Gartenspal. *C. antarctica* Vent. (Neuholl.), Warmh. *C. discolor* Blum. (Java) u. *vitigēna* L., *porphyrophylla* Hort., *velutina* Hort., *capensis* W. (*Vitis* c. Thb.), *serianaeifolia* Bung. (*Ampelopsis bipinnata* Mchx.).
- Cistaceae** Dunal, **Cisti** Juss., **-inēae** DC. Rchb., **-stēae** (sc. *Cistinēae*) Rchb. „Cistgew.“, s. *Cistus*.
- Cistiflorae** Bartl. Ord. der Cistusblütler Rchb.
- Cistus** T. (Cistaceen, XIII. 1) „Cist“- od. Sonnenrose, fr. ciste, e. cistus- od. holly-rose (gr. *ζίστος* Kapsel od. *ζίστιη* lat. *cista* Kiste — weg. der Fruchtkapseln!), z. B. Gewächsh. *C. vaginatus* Ait. (*symphytifolius* Lam.), *ladaniferus* L., *laurifolius* L., *purpureus* Lam. etc.
- Citharexylum** L. (**-raexylon** Sm.) (Verbenac. od. Vitaceen, XIV. 2) „Geigenholz“ Leun., fr. guitarin, *citharexylon* u. *cotelet* (*ζιθάρα* Glaser, Botan. Taschenwörterbuch. 9

- Cithere etc., ξύλον Holz — weiss. Eisenholz d. Handels!), z. B. caudatum L., quitense Spr. (Südamer.).
- Citinus** Sm. (bess. Cytinus L., Pers.) (Aristolochiaceen, XX. 8) „Fleischkelch“-Osterluzey (κύτινο; lat. cytinus fleisch. Kelch d. Granatapfels!).
- Citrullus** Neck. (sc. Cucurbita) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Arbuse, Angurien-Kürbis W., Wassermelone M. Rehb., fr. citrouille, melon d'eau, e. citrul od. water-melon, fr. auch pastèque (v. citrus Citrone), s. Anguria Citrullus dicta Blackw.
- Citrus** L. (Aurantiacen, XVIII. 1) „Citronenbaum“, fr. citronier, e. citron- od. lemon-tree (n. d. Stadt Citron in Judäa, Paxton, gr. ζίτρον lat. citrus Citronenb. — wahrsch. vom Pers. kitt, d. Namen für Medien, Schmitthenner), z. B. C. medica L. gem. Citrone m. v. v., z. B. v. Cedro Citronat, fr. cédrat (florentina, macrocarpa, paradisiaca „Paradiesapfel“, umbilicata), v. Limonia s. Limonum „Limonum“ (L. Bergamotta, calabrīca, dulcis süsse Limonen, fl. pleno, vulgaris), C. Aurantium L. Orange od. Pomeranze (pomum aurantium, fr. pomme d'or od. orange) m. v. v., z. B. v. Bigaradia saure Or. od. Pom. (multiflora, myrtifolia Hort. s. g. Myrtorange, nobilis Lois., s. g. Mandarin-Or., v. salicifolia, v. crispifolia (fr. le Bouquetier), v. Aurantium chinensis „Apfelsine“ od. süsse Or., C. decumana L. (Citr. Aurantium decumanum L. f.), s. g. Pompelmus, Topfor. C. chinensis Hort., Zwergor. C. japonica L.
- Cladium** P. Br. (Cyperaceen, III. 1) Schneide, Nussbinse Seub. (gr. κλάδιον dem. v. κλάδος; Schoss etc. — zahlr. verwirrt Wurzeln u. auch Blütensträusse, Wtst.), z. B. Mariscus R. Br. deutsche Schneide.
- Cladonia** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3), „Astflechte“, s. g. Rentiermoos (v. κλάδος Ast etc. — verzweigter Wuchs, Wtst.), Cl. rangiferina s. sylvatica, fr. mousse du nord, C. coccifera Hoffm. Korallen-M., C. alpicornis etc.
- Cladosporium** Lk. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Astspore“, Russtau, Brandpilz, Kettenfaser (s. eb., σπορά Spore — d. zahlr. Zweige laufen in Sporidien aus, Wtst.), C. fumāgo Fr.
- Cladrastis** Raf. (Legumin. Sophoreen, X. 1) „Berstaststrauch“, Gelbholzbaum (κλάδος; Ast etc. u. ὄσσω zerreisse), Cl. tinctoria Raf. s. Virgilia lutea L. u. Sophora tinctoria L.
- Clanbrasiliana** (sc. Abies) DC. (Coniferen Abietenen, XXI. 9) Zwergfichte (N. pr.), s. Abies excelsa DC. var. Clanbrasiliana.
- Clarkia** Pursh (Onagraceen, VIII. 1) „Clarkie“ (wahrsch. n. d. Apoth. Clark in Grantham, Isaak Newton's Lehrherrn, n. Andern n. d. General Dan. Clarke, Begl. d. Statth.'s Lewis in Louisiana durch Nordwest-Amerika), Zier. C. pulchella Pursh, fr. Cl. delicate, e. nice Cl., m. v. pulcherrima, Cl. elegans Dougl. etc.
- Clavaria** Vaill. L. (Keulenpilze, XXIV. 4) „Keulen“- od. Korallenpilz, fr. clavaire od. ganteline, mairotte (v. clava Keule, Kolbe — astige, keulige Form!), z. B. essb. C. delicata, Botrytus u. flava, s. g. Ziegenbart, fr. gallinette (-nole), glossopêtre, langue de terre (-de serpent). — Clavariēi DC. Keulenpilze.
- Claviceps** Fr., s. Cordyceps, s. d. (clava s. v. u. caput, -ceps, -cipitis in compos.) (Pilze, XXIV. 4).
- Claviga (-vija)** Rz. u. Pv. (Myrsineen, V. 1) „Clavigo's“-Myrtenbaum (n. d. span. Nat. J. Clavigo Faxardo, Herausg. v. Buffon's Werk. im Span.), z. B. Zier. C. ornata Van Houtt., s. Theophrasta longifolia Jacq.
- Claytonia** L. (Portulacaceen, V. 3) „Clayton's“-Portulak (n. d. engl. Arzt J. Clayton, † 1773 in Virginien), Cl. Portulacaria L. f. Portulakbaum, s. Crassula P. Dill. (Portulacaria afra Schreb.), C. arctica Adams u. sibirica L. (Limnia arct. Stockh.).

- Cleanthe** Salisb. (Irideen, III. 1) „Schliessblüt“-Schwertel (v. *zλείω* schliesse zu — dreht sich nach d. Verblühen zu, Wtst.).
- Clematidēae** DC. Waldrebengew. (zu Ord. Polycarpiceae Bartl., Fam. Ranunculaceae Juss.), s. Clemātis.
- 1) **Clemātis** L. (Ranunculac. Clematideen, XIII. 7) Waldrebe, fr. *clématite*, herbe aux gueux, e. lady's-bower, climber u. wavering-tree (gr. *zληματις* u. *zλημα* Klimme, Ranke), Zier. *Cl. integrifolia* L., *patens* Morr., Decsn., *azurca grandiflora* Hort., *florida* Thb., *lanuginosa* Lindl. m. v. v., z. B. v. *rubro-violacea* Hort., *Cl. viticella* L. m. v. v. (plena, *Francofurtensis*, *Guascoi u. venosa* Hort.), s. g. ital. W., *C. Viorna* L. (Nordwest-Amer.), *Cl. Vitalba* L. s. g. Hexenzwirn od. gem. W., *C. Flammula* L. — Bastardformen: *Jackmanni*, *Fortunēi Moore*, *rubella* Jackm., *Prince of Wales*, *Lady Bovill* Jackm. u. a. 2) **Clemātis** (sc. *Mutisia*) L. f. (Compos. Mutisieen, XIX. 2) Waldreben-Mutisie.
- Clematītis** (sc. *Aristolochia*) L. (Aristolochieen, XX. 5) gem. Osterluzey (v. *Clematis*, -ītis, s. eb.).
- 1) **Clementēa** Cav. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) Tongabohnenbaum (n. J. R. Clemente, Prof. zu Madrid, schr. üb. d. Weinbau v. Andalusien), *C. nitida* Cav., s. *Dipterix* (Str. Cuba). 2) **Clementēa palmiformis** DC. (Farne, XXIV. 1) Palmenfarne, s. *Angioptēris erecta* Hoffm. (*Polypodium* er. Forst.).
- Cleōme** L. (Capparideen, XV. 2) Pillenbaum, -blume, Senfkapper Leun., fr. *cléome* u. *mosambé* (moz. -), e. bastard-mustard (v. *zλείω* verschliesse, nach Octav. Horatius, Arzt d. 4. Jahrh.'s Cleome dem *Sinapis* verw. Pfl., wovon Linné Gebrauch machte), Zier. *C. spinosa* L., *pungens* W. (Süd-Amer.).
- Cleonia** L. (Labiaten, XIV. 1) „Schliessblüte“, s. g. Kreuzpflanze, fr. *cléonie* (v. *zλείω* v. s. eb. — enger Schlund d. sehr dünnen Blüte, Wtst.), z. B. *C. lusitanica* L. (*Prunella* lus. Moris.), s. *Bugula odorata* lusit. Moris.
- Clerodendron** Hortul. (-drum L.) (Verbenac., XIV. 2) „Loos“- od. Schicksalsbaum (v. *zλήθος* Loos etc., *δέσποον* B. — eine Art als Schicksalspfl.), z. B. Warmh. *C. fragrans* L. (Volkameria fr. Vent.) (trop. Asien), s. *Rhododendron villosum* Roth „Duft-Verbene“, *C. Thomsonae* Balf., *squamatum* Vahl, *calamitosum* L. „unheilbringende“ (Volkameria *alternifolia* Burm.).
- Clethra** L. (Ericaceen Clethreen, X. 1) „Heidenerle“, Scheineller Lauch., Maiblumenbaum, Laubheide (gr. *zλήθηρα* Erle), z. B. Zier. *C. alnifolia* L., *arborca* L., *tinifolia* (Volkameria *arborca*), *C. mexicana* s. *quercifolia* u. a. (Wtst. *zλήθηρα* v. *zλάω* breche — sprödes Holz!).
- Cleyēra** Thb. (fehlerh. *Cleyrea* Dietr.) (Theaceen od. Ternstroemiaceen, V. 1 od. XIII. 1) „Cleyers“-Strauch (n. d. holl. Arzt u. Bot. Dr. Andr. Cleyer in Batavia um 1675), z. B. *C. japonica* Thb. (*Ternstroemia* jap.), *ochracea* DC. (*Ternstr. Lushia* Don) (Nepaul).
- Clianthus** Sol., Endl. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Schliessblume“ (v. *zλείω* schliesse u. *zνθος* — Ansehn d. auflegenden Fahne etc.!) Wtst.), z. B. Zier. *C. Dampieri* A. Cunn., s. g. deutsche Flagge.
- Clidēmia** Don (Melastomaceen, X. 1) „Clidemie“ (n. e. altgriech. Bot. *Clidemus*, schr. üb. Pfl.-Krankh.), z. B. Gewächsh. *C. elegans* Don, s. *Melastoma agreste* Aubl. (Guiana).
- Cliffortia** L., (Rosac. Cliffortieen od. Sanguisorbea, XXII. 12) „Cliffortie“ (n. Dr. jur. G. Cliffort, Bürgermeister v. Amsterd. etc., Gönn. Linné's, † 1750), z. B. *odorata* L. u. *strobilifera* L., s. *Cedrus conifera* *Juniperi folio* Pluk. — Cliffortieae (sc. Rosaceae) Rehb.

- Climacium** Web., Mohr (Laubmoose, XXIV. 2) „Treppen“- od. „Leitermoos“ (v. *κλίμαξ*, -*ος* od. *κλείμαξ* lat. climax Leiter etc. — bez. d. inner. Peristoms, Wtst.), s. Hypnum dendroides L.
- Clinopodium** T., L. (Labiaten, XIV. 1) „Bettfüsschen“, Wirbeldost Grck., Weichdosten (— majoran), fr. clinopode od. pied-de-lit (*κλινοπόδιον* v. *κλίση* u. *πόδιον* — Quiriblüt. wie Bettfussrollen, Wtst.), C. vulgare L., s. Calamintha Clinop. Spenner (Melissa Clin. Benth.).
- Clintonia** Dougl. (Lobeliaceen, XIV. 2) „Clintonie“ (n. d. General Clinton, Oberbefehlsh. geg. G. Washington in Nordamer., od. n. de Witt, Gouvern. v. New-York, Freund d. Naturw., Wtst.), Zier. C. pulchella Lindl., fr. Clintonie gentile, e. nice Cl.
- Clitocybe** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Schiefkopf“, s. g. Trichterling (*κλίτος* Neigung, *κῦβη*) Napf etc.), z. B. suaveolens, fragrans „Anispilz“, etc.
- Clitopilus** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Schiefhut“, Pflaumenpilz Kumm. (s. eb. u. *κίλος* Hut), z. B. Prunulus u. popinalis.
- Clitoria** L. (-ius Petiv.) (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Scham“- od. „Clitorisblume“ D., fr. clitoire (v. *κλειτορίς* Schamzünglein v. *κλείω* verschliesse), z. B. Galactia L. Milch-Cl. (Phaseolus minor lactescens Sloan.), C. Ternatča L. (von Ternate, Molukk.), s. Vilmorinia DC.
- Clivia** Lindl. (Amaryllideen, VI. 1) „Clive's“-Lilie (n. d. Herzogin v. Northumberland, ehem. Lady Clive), z. B. Warmh. C. nobilis Ldl. u. miniata ds. m. v. splendens Hort. (Cap), s. Imantophyllum (Himantoph.) Aitoni Hook.
- Clusia** L. (Guttiferen Clusieen, XXIII. 1) Schweinsgummi v. Jamaica, fr. clusier od. figuier maudit (marron) (n. Charl. de l'Ecluse, lat. Clusius, Prof. in Leyden, s. d. Aut.), Cl. minor L. (fol. venosis Fabr.), s. Decumaria barbāra L. — Clusiāe (sc. Guttiferae) Rehb.
- Cluytia** Ait. (Clutia Boerh., L. f.) (Euphorbiac., XXII. 15) „Cluytie“, fr. clutelle (n. d. Prof. Outgers Cluyt in Leyden, s. d. Aut., † 1650), z. B. androgyna L. f. (Andrachne fruticosa L.).
- Clymēnum** T., DC. (sc. Lathyrus) L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Rank“-Platterbse, fr. clymène (gr. *κλύμενον* v. *κλύω* umranke — eine Schlingpfl.), s. Lathyrus bicolor Mnch.
- Clypeōla** G. (Crucifer. Siliculos. XV. 1) „Schildtäschlein“, fr. clypéole od. bouclier de Narbonne (dem. v. clypēs Schild, C. Jonthlaspī L., s. Jon-Thlaspī DC. (*ζον* Veilchen).
- 1) **Cneōrum** L. (Rutac. od. Terebinthac., III. 1) Zeiland (gr. *κνήωρος* Theophr., Gewächs m. Blätt. wie ein Oelbaum, Wtst.. od. *κνήωρον* Nessel v. *κνήω* jucke), C. tricoccon L. spanischer Z. M.-Rehb., Zwergölbaum (-olive) Wolff, fr. camélée od. garoupe, s. Chamaelēa tricocca Bauh. 2) **Cneōrum** (sc. Daphne) L. (Thymeläac., VIII. 1), s. Thymelaea Cn. Scop. rosmarinblättr. Zeiland od. Zindel, fr. Thymélée des Alpes od. Daphne camélé, e. trailing D. od. garland-flower m. v. v. 3) **Cneōrum** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulac., V. 1) candsche od. Stechwinde.
- Cnestis** Juss. (Camareen od. Terebinthac., X. 5) „Raspel“- od. „Juckstrauch“, Baumbohne, Nesselhaarkapsel (gr. *κνήστις* Raspel etc. v. *κνήσω* brenne, jucke — bez. d. Kapseln!), z. B. C. corniculata Lam. etc., s. Rourča Aubl. u. Robergia Schreb.
- 1) **Cnicus** L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Stech- od. „Kratzdistel“ (v. *κνήω* kratze), s. Cirsium Rehb. 2) **Cnicus** Benedicta Vaill. i. q. Centaurēa Benedicta L. Benedicten-Flockenblume (Compos. Centaureen, XIX. 3).
- Cnidium** Cusson (Umbelliferen, V. 2) „Brenndolde“ (v. *κνίδη* Nessel od. *κνήω* jucke), z. B. venosum Koch, Cn. Silaus Spr. (Silaus pra-



tensis Bess.), apioides Spr. (Ligusticum ap. Lam.) etc., s. Smyrnum, Selinum u. Angelica.

**Cobaea** Cav. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Cobäe“ od. „Cobokletterstr.“, Glockenrebe, fr. cobée (n. d. span. Jesuiten u. Bot. Barn. Cobo, † 1657 zu Lima in Peru), Zier. C. scandens Pv. (Süd-am.), fr. C. grimpanse, e. climbing C.

**Coburgia** Herb., Sweet (Amaryllideen, VI. 1) „Coburgie“, „Coburg's“-Narzisse (n. d. Prinzen Leopold v. Coburg-Gotha, nachmal. König v. Belgien), z. B. trichroma Herb. u. reticulata Herb., s. Amaryllis.

**Coca** (sc. Erythroxylon) L. (Malpighieen, X. 3) „Cocastr.“, bolivisches Kaublatt, fr. coca (vaterl.), s. g. Hunger- u. Durstbaum (— d. Blätt. dienen zum Kauen).

**Coccinea (-ia)** Wright-Arn. (Cucurbitaceen, XXI. 9) „Scharlachbeere“ (gr. κόκκινος, lat. coccineus scharlachrot — Farbe d. Fr.), Zier. C. indica W.-Arn., s. Bryonia grandis L.

**Coccyopselae** Cham., Schldl., s. sogl.

**Coccyopselum** P. Br., Schreb. (Cinchonaceen, IV. 1) „Kugelkapsel“, Hohlbeere, Fachbeere od. Spaltfrucht D. (κόκκος Korn, Beere, κοψέλη Höhlung, Kapsel — Beere m. hohler Krone, Wtst.), z. B. biflorum W. etc., s. Manettia picta W.

**Coccoloba** L. (Polygonac., VIII. 3) „Beerenhülse“, „Beerkelch“ D., Traubenbaum (s. v. u. λοβός Lappen, Hülse — Frucht dreikant., schwammig, Wtst.), z. B. C. uvifera L. Seetraube Leun., e. seaside-grape „Strandtraube“, C. sagittifolia Ort. (Str. Bras.), s. Polygonum acetosaeifolium Vent., C. australis Forst. (Polyg. tamifolium Vent.), nymphaeifolia, etc.

**Coccolinae** Bartl. Ord. d. „Kokkeln“ Leun. s. Cocculus.

**Cocculus** C. Bauh., DC. (sc. Menispermum) L. (Laurineen Menispermaceen, VI. 4) „Kokkels“- od. Fischkörnerstrauch, Cochenillenbeere (κόκκος Korn, Beere, lat. coccus, dem. cocculus), C. caroliniana DC. (Wendlandia populifolia W.), C. palmatus DC., s. g. Columbowurzel d. Apoth.

**Coccyganthe** A. Br. (Caryophylleen od. Silenac., X. 5) „Kukuksblume“ = Lychnis flos cuculi L. (κόκκος, -υγος Kukul, ἀρνίη Bl.).

**Coccygia** Scop. (Cotinus Coccygia autt.) (Terebinthac. Sumachineen, V. 3) Perückenbaum (gr. κοκκυγία δένδρον, lat. Cotinus, κοκκυγιος purpurfarbig).

**Cochlearia** T., L. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Löffelkraut“, fr. herbe aux cuillères, e. spoon-wort (scurry-grass „Scorbutkr.“), fr. auch cranson (lat. cochlear od. -leare Löffel — Form d. Blätter, Wtst.), C. officinalis L. echtes L., C. Armoracia L. Meerrettig, fr. cranson rustique, s. Armoracia rusticana Fl. Wett.

**Cochliostema** E. André (Commelyneen, III. 1) „Schneckenfaden“ (κοχλίον dem. v. κοχλίς Schnecken, στήμα od. στήμων Faden, lat. stamen), Warmh. C. Jacobianum E. Andr.

**Cochlospermum** H. B. K. (Theac. Ternstroemiace., XIII. 1 od. XVI. 8) „Schneckensamen“, Löffelsamen D. (?) (v. κοχλίος Schneckenwindung, σπέρμα Samen — dies. nieren- od. schneckenförm. gewunden, Wtst.), z. B. hibiscoides Kth., s. Bombax s. Maximiliana Gossypium L. falscher Seidenwollb. Leun., C. helicacuba Kth., s. g. Ballonpflanze.

**Cocos** L. (Palmen, XXI. 6) „Kokospalme“, fr. cocotier (gr. κόκκος vaterl., verw. mit κόκκος Korn etc.), C. nucifera L. „Kokosnuss“-P., e. coco (cocoa u. cacao), C. butyracea L. „Butternuss“-P., C. guineensis = Bactris minor Jacq. „Guinea“-Kok., Stuben: C. plumosa s. Romanzoffiana.

**Codiaeum** Rumph. (Euphorbiac., XXI. 9) „Kopf-Wolfsmilch“ (v. κωδία od. -δεία Mohnkopf, schwerl. v. κώδιον Vlies — Zweige zu

- Kränzen, Wtst.), *C. andamanicum* Kurz, s. *Croton* and. s. *variegatum* L. (*Phyllaurëa Codiaeum* Lour.).
- Codon** L. (Convolvulaceen, V. 1) Schellen- od. Glockenwinde (v. *ζώδων* Glocke etc. — Blütenform!), z. B. *C. Boyeni* L. (Cap) etc.
- 1) **Codonia** Spr. (zu *Campanula* L.) (Campanulac., V. 1), z. B. *C. Medium* L. (s. eb.). 2) **Codonia** Vahl (Ebenaceen, XXII. 8) Glockenblüt-Ebenholz. 3) **Codonia** Dumer. (Jungermanniac., XXIV. 2) Glocken-Lebermoos (— *Involucrum* glockig!).
- Codonium** Vahl (Ebenaceen, XXII. 8) i. q. *Codonia* Vahl (s. eb.), *C. arborescens* V. (westind. Bstr.), s. *Schoepfia americana* W.
- Codonoprasum** Rehb. (zu *Allium* L.) (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Glockenlauch“ (s. v. u. *ποιόσον* Lauch — Blütenköpfe vor d. Aufblüh. glockenförmig!).
- Codonopsis** Wall. (Campanulac., V. 1) Dünn- od. Ampelglocke (s. v. u. *ψις* Aussehen), z. B. Warmh. *C. gracilis* Hook. f. s. *Leptocodon* u. *Fischeria* G. Don.
- Codonorchis** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Glocken“-O. (s. v. — Blumenform!).
- Coelestina (-ia)** Cass. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Himmels“- od. *Blaudosten* (coelestinus i. q. coelestis himmelblau — schönblaue Blütenköpfe!), Warmh. *C. ageratoides* Kth. (Sparganophorus ag. Lag., Wickelträger“), s. *Eupatorium coelestinum* L., *C. coerulea* Cass., s. *Ageratum coelestinum* Sims.
- Coeli rosa** Desv. (sc. *Lychnis*) L. (Caryophyllen od. Sileneen, X. 4) „Himmelsrose“, kahlblättr. Lichtnelke M.-Rehb., e. knight's-cross „Ritterkreuz“, s. *Agrostemma C. r. L.* (*Lychnis segutum* Moris.).
- Coeloglossum** Hartm., Lindl. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Hohlzüngel“ O. W. (v. *κοιλός* hohl — wovon *coelum* Himmel, *γλώσσα* Zunge — Labell m. konkavem Nagel, Wtst.), z. B. *viride* Hoffm., s. *Platanthera vir.* Lindl. u. *Satyrium vir.* L.
- Coelogyne** Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Hohlstempel“ (s. v. u. *γυνή* Weib, Stempel — Columna an d. Spitze kappenförm., Wtst.), z. B. *marmorata* Rehb. f. u. *fimbriata* Ldl. (China), *C. speciosa* Ldl., s. *Angraecum nervosum* Rumph.
- Coelospermum** Blum., DC. (Rubiace. Guettardeen, XXI. 7) „Hohlsamen“ (s. v., *στέγμα* Samen — Pyrenen vorn hohl, Wtst.), z. B. *C. scandens* u. *corymbosum* Blum. (Java).
- Coffea** L. (Rubiace. Coffeaceen od. Cinchonac., V. 1) „Kaffeebaum“, fr. cafiar (-feyer), e. coffee-tree (café, coffee) (n. d. afrik. Land Caffa od. Kafa, wo ursprüngl. zu Hause), *C. arabica* L. — Coffeaceae (zu Rubiaceae) Rehb., -fecae DC., -ffeineae Lindl. (zu Ord. Rubiaceae Bartl.).
- Coix** L. (Gramineen, XXI. 3) Thränen gras (*ζοίξ*, -zo: eig. eine Palme), Zier. *C. lacrimans* L. (Lacrima Hort.) Marien-, Christus- od. Hiobsträne Rmpl., fr. larmes de Job, herbe à Chapelets, e. Job's-tears, s. *Lithagrostis* G.
- Colax** Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Schmarotzer“ (*ζόλαξ* Schmeichler, Schmarotzer — schmarotzt auf B.), z. B. *C. aromaticus*, s. *Maxillaria arom.*, *C. palmifolius* Ldl., s. *Dendrobium p.* Sw., etc.
- Colchicaceae** DC. (zu Ord. Liliaceae Bartl.) Zeitlosen, Giftlilien Seub., s. sogl.
- Colchicum** T., L. (Melanthaceen od. Liliac. Colchicac., VI. 3) Zeitlose, fr. colchique, tue-chien, lis vert, e. meadowsaffron (v. Colchis, Heimat der Medea, die daraus Gift bereitete, Myth., Wtst.: wo nach Dioscorides besond. zu Hause!), *C. autumnale* L. „Herbst“-Z., Zier. *C. variegatum* u. *alpinum* L., *byzantinum* Gawl., *orientale* s. g. Herzwurz, fr. hermès od. hermodate „Hermesdattel“.
- Coleanthus** Seidl. (Gräser, II. 1) „Scheidenklappgras“, -blütgras Grck.

(*κολεός* Scheide, lat. *culēus* u. *ἄνθος* — aufgeblasene Blattscheide, Wtst.), z. B. *C. subtilis* Seidl., s. *Schmidtia* s. *Tratt.* s. *utriculosa* Sternb.

- Coleonēma** Wendl. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Scheidenfaden“ (s. eb. u. *νήμα*, -τός Faden — Staubfäden in d. Rinne des Kronblattnagels, Wtst.), *Zier. C. pulchra* Hort. (album Bartl.), s. *Diosma* s. *Adenandra alba* Thb., R. S.
- 1) **Colēus** Lour. (Labiaten, XIV. 1) „Staubfadenscheide“, Braun- od. Buntblatt (*κολεός* od. -or Scheide — Staubfäden als Scheide um d. Griffel, Wtst.), *Zier-Blattpfl. C. Blumi* Benth., *scutellarioides* Benth. m. v. fol. atro-purp. viride-cinctis, *C. nigricans*, *C. Verschaffelii* Lem., *C. multicolor* Veitch, *pictus* ds. etc., s. *Gesnera* u. *Plectranthus* l'Hér.
- 2) **Colēus** Corda (Pilze, XXIV. 4) *Scheiden-Bovist* (— Basis der Fruchtlageräste in einen Stiel verw., Wtst.).
- 1) **Collaea** DC. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Colläe“, „Colla“-Süßbohne (n. d. Bot. Colla, s. d. Aut.), z. B. *speciosa* DC. (*Odonia speciosa* Bertol., *Cytisus spec.* Hort.). 2) **Collaea** *procumbens* Spr. (Compos. Verbesineen, XIX. 2), s. *Verbesina nutica* L. 3) **Collaea** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Colla“-O.
- 1) **Collēma** Hoffm., Ach. (Gallertflechten, XXIV. 3 od. 4) „Gallert“-Flechte (v. *κόλλα* Leim etc., lat. *gluten*). — *Collemaccæ* Fr., DC. Ord. der Gallertflechten. 2) **Collēma** Andr. (Campanulaceen, V. 1) *Klebantheren-Glockenbl.* (— Antheren anfangs etw. zusammenhängend, Wtst.).
- Colletia** Comm. (Rhamnac., V. 1) „Collets“-Dorn (n. Commerson's *Gegner Collet*, schr. Pfl. von Brest, — stachl. Pfl., aus Hass v. Commerson so genannt! Wtst.), *Zier. C. spinosa* Lam. s. *horrida* W. (ferox Gill., Hook.), *C. cruciata* Gill., Hook. s. *bictonensis* Lindl. (Chili), *C. serratifolia* Vent. (*Rhamnus Spartium* Domb.) etc.
- Collinsia** Nutt. (-*linsonia* DC.) (Scrophularineen, II. 1) „Collins“-Blunne (n. Z. Collins, Vice-Präs. d. nat. Ges. in Philadelphia, nicht Newton's Zeitgen. Collins, † 1669), *Zier. C. bicolor* Benth. m. v. v., *C. verna* Nutt., s. *Conochea borealis* Spr., *C. praecox* Vahl (Str. Carolina), *C. tuberosa* Vahl s. *serotina* Walt. (Carol.), *C. tricolor* Benth. m. v. v., *C. candidissima* Nutt., etc.
- Collomia** Nutt. (Polemoniaceen, V. 1) „Kleb“-Enzian, fr. *collomie* (v. *κόλλα* Leim u. *ᾠμος* Schulter — nämll. Deckblatt, das klebr. anzufühlen, Vilm. u. Pfeiffer: *seminis qualitas*, Wtst.: Sam. m. zähklebr. Überzug!), *Zier. C. coccinea* Lehm., fr. c. écarlate, e. scarlet-Coll. (Calif.), *C. grandiflora* Dougl. s. *glutinosa* Dietr. (verwild. an Flussufern!).
- Collybia** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Münz“- od. „Pfennigpilz“ Kumm. (v. *κόλλιβος* klein. Geldstück — flachrund. Hut!), z. B. *C. esculenta* (*Agaricus prunulus*) s. g. Krösling od. Mousseron.
- Colocasia** Schott u. Endl., Catesb. (sc. Arum) L. (Aröideen, XX. 9) essb. Zehrwurz, Tarro od. Kalo Leun. (arab. *kolkas*), fr. *manteau de Ste. Marie* (gr. *κολοκασιά* od. -ίον, eine Art Arum! Wtst. v. *κόλον* Speise u. *κόζω* versehe, schmücke — Blätt. zu Kränzen!), z. B. *Blattzier. C. esculenta* Schott, s. *Caladium escul.* Vent.
- Colocynthis** T. (sc. Cucūmis) L. (Cucurbitac., XXI. 10) „Coloquinten“-Gurke, fr. *coloquinte* (pomme de -), *coloquinnelle* unechte Coloq., e. bitter-gourd (-apple), *coloquintida* (gr. *κολοκυνθίς* v. *κόλον* Eingeweide u. *κινέω* bewege — drastische Wirkung, Wtst.!), s. *Trichosanthes amara* L.
- Columbaria** Thouill. (Dipsaceen, IV. 1) *Taubengrindrose* (v. *columba* Taube), *C. vulgaris* Presl = *Scabiosa Columbaria* L.

- Columnă** Plum. L. (Gesneraceen, XIV. 2) „Columnee“ (n. Fab. Columna, aus d. ital. Geschl. d. Colonna, neapol. Bot., s. d. Aut.), Topf. C. scandens L., Schiedeana Schldl., aurantiaca Deesn., cochinchin. Poir. (Achimenes coch. Spr.), erecta Lam. (Trevirania er.), trifoliata Lk. (violacea Jacq. f.), s. Stemodia suffruticosa, etc.
- Columniferae** Bartl. Ord., Endl. Kl. d. Säulchenfrucht gew. od. „Säulchen-träger“ (columna Säule, fero trage).
- Columna** (sc. Corylus) L. (Cupuliferen, XXI. 5) Byzantiner Haselnuss (columnus aus Haselholz).
- Colutëa** L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Blasenstrauch, fr. bague-naude (-dier), faux séné (séné bâtard), e. bladder-Senna (gr. *κολοι-τέα* (-*λυτέα* od. -*ία*) Schotenbaum wie Johannisbroth., F. W. Riemer, Wtst.: v. *κολοίω* verstümmle — als Gestr. leicht zu zerstören!), Zier. C. arborescens L. m. v. v.), C. cruenta Ait. s. orientalis Lam. (humilis Scop.), C. caspica M. B. (Sphaerophysa DC. „Kugelblase“), C. annua Murr. (Lessertia ann. DC.), C. frutescens L. m. v. grandiflora Hort., fr. bag. d'Éthiopie, s. Sutherlandia frut. R. Br.
- Comacelinium** Scheidw., Planch. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Schopflager“ (*ζόμυ* lat. coma Haarschopf, *ζλίω* Bett, Lager — Blumenboden!), Zier. C. aurantiacum Van Houtt., s. Tithonia splendens Hortul.
- Comarum** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 3) Blutauge Grck., Fünfblatt-Gänsekraut, fr. comaret (gr. *ζουαρον* Frucht d. Erdbeerbaums, F. W. Riemer — ähnl. Frucht! Wtst.), C. palustre s. Potentilla pal. Scop.
- Combretaceae** R. Br., -tëae DC. (zu Ord. Calycanthinae Bartl.) Langfadenartige, s. sogl.
- Combrëtum** Löffl. (Onagreen Myrobalaneen od. Combretac., VIII. 1) Langfaden Leun. (bei Plinius nicht näher erkl. Schlingpfl.), Warmh. C. obtusifolium Löffl. Leimbaum (Bras.), C. purpureum Lam., s. Poivreä coccinea DC., C. macrophyllum etc.
- Commelina** Dill., L. (-lÿna Hoffmg.) (Commelinaceen, III. 1) Scheiden- od. Schilflilie, Tagblume, fr. commeline, e. day-flower (n. Casp. Commelyn, Prof. z. Amsterdam, † 1731, s. d. Aut.), Garten C. coelestis W. (tuberosa L.) m. v. v., e. blue day-flower. — Commelinaceae R. Br. (zu Juncinae Bartl.) Gras- od. Schilflilien.
- 1) **Commersonia** Forst. (Büttneraceen, V. 5) „Commersonie“ (n. d. franz. Bot. u. Reis. Commerson, s. d. Aut.) C. diphylla Andr. (Büttneria dasypylla Gay (Str. Neuholl.), echinata L. (Resteria alba Rumph.) (B. Austral.). 2) **Comm.** Sonner. (Melaleuceaceen, XVI. 8), C. speciosa Sonn., s. Barringtonia spec. L. (B. Australocean).
- Comocladia** P. Br., L. (-dium Sm.) (Terebinthac. Cassuviëen od. Anacardieen, III. 1) „Schopfzweigbaum“, Kotbaum (— weg. d. Geruchs), unechtes Brasilienholz, fr. comoclade (*ζόμυ* u. *ζλάδος* Zweig — Blattbüschel an d. Zweigspitzen, Wtst.), C. angulosa W. (Dodonea Plum.) (Str. Amer.), dentata L. (B. Südamer.), etc.
- Compositae** Adans. Bartl., Endl., Ord. d. Zusammengesetzten (Korb- od. Vereinsblütler) (zu Kl. Aggregatae Endl.) (v. compōno Part. Pass. -positus).
- 1) **Comptonia** Banks, Schreb. (Taxaceen od. Myricac., XXI. 3) „Comptonie“, fr. comptonie (n. H. Compton, Bisch. von London, Banks' Freund, in Fulham), Zier. C. asplenifolia Banks, s. Liquidambar aspl. L. u. peregrina L. (Myrica aspl. L.). 2) C. Duham. (Farne, XXIV. 1), C. Ceterach, e. sweet Fern-bush.
- Conanthëra** Rz. Py. (Liliac., VI. 1) „Kegelanthere“ (*ζώνος* lat. conus Kegel, *άνθηρά* Staubbeutel — diese zu einem Kegel zusammen-geneigt! Wtst.), C. Echeandia Pers. (Echeandia terniflora Ort.), C.

Forsteri Spr. (Anthericum Adenanthēra Forst.), *C. bifolia* R. P., s. *Bermudiana bulbosa* Trew (Chili).

**Conferva** Ag., Lk. (Algen od. Confervac., XXIV. 3) Fadenalge, Wasserfaden, fr. lin-marin (v. conferveo gähre, heile zusammen, Plin.; st. conferta v. confercio verdichte, Paxton — ungewiss!), *C. rivularis* L. Bach-W., fr. plante-éponge? — Confervaceae Ag., DC. Ord. d. Fadentange, -véae Kütz. Fam. d. Conferven.

**Coniferae** Juss., Endl., Bartl., Rchb., Ord. d. „Zapfenträger“ (Nadelhölzer) (conus Kegel, Zapfen, fero trage) (Carrière: Cupressineen, Abietineen, Araucarieen, Podocarpeen, Taxineen u. Gnetaceen).

**Coniomorpha** Otth. (Silenac., X. 3) „Kegelfrucht“-Silene (*zoríov* dem. v. *ζῶνος* Kegel, *μορφή* Gestalt), s. *Silēne conoidea* L. kegelkelchiger Taubenkropf Grök.

**Coniomycetes** Fr., Endl. „Staubpilze“ (v. *zoríu* Staub, *μύκος*, -*ητος* Pilz (*μύκος*). -*myci* Nees Ord. d. Staubpilze.

**Conioselinum** Fisch. (Umbelliferen, V. 2) „Schierlingssilje“ (v. *Conium* u. *Selinum*, s. d.), *C. tataricum* Fisch., s. g. Maludenzwur.

**Conium (Conium)** L. (Umbelliferen, V. 2) Schierling, fr. fénouil-sauvage „wild. Fenchel“, e. wild-cicely u. hemlock, auch kecks (*kex*) (gr. *ζῶνειον* od. *ζῶνιον*, nicht n. Linné v. *ζόνις* Staub od. Asche, sond. v. *ζῶνος* Schwindel od. Wtst. v. *ζωρᾶσθαι* schwindelig werden).

**Connaraceae** DC., R. Br., -*rēae* (sc. *Terebinthaceae*) Rchb. Stechdornartige, s. sogl.

1) **Connarus** L. (*Terebinthac.* Connareen, XVI. 5) Stechdorn, Baumbohne Diétr., fr. connare (gr. *ζόνναος* lat. *Connarus* i. q. *Paliurus* Stechdorn), *C. decumbens* L. (*Amphinomia* DC.), *pubescens* DC. (*Robergia* Schreb.), *africanus* Lour. (*Omphalobium* G., DC.). 2) **Connarus** Thb. (*Malvaceen*, XVI. 1), *C. decumbens* Thb., s. *Hermannia triphylla* L.

**Conoclinium** DC. (*Compos.* Inuleen, XIX. 2) „Kegeltett“-Blume (*ζῶνος* lat. *conus*, *ζώνη* Bett-Blumenboden — dies. kegelf.), Zier. *C. janthinum* Moore, s. *Hebeclinium janth.* DC. = *Eupatorium coelestinum* L. himmelbl. Wasserhanf (Bras.).

**Conomorpha** DC. (*Myrsineen*, V. 1) „Kegelgriffel“ (s. v., *μορφή* Gestalt — kurz. Griff. fast kegelf. Wtst.).

**Conophallus** Beccari (*Aroideen*, XX. 9) „Kegelphallus“ (s. v., *γαλλός* Pfahl, männl. Glied, lat. *palus* — nämll. d. Blütenkolbe!), *C. Titanum* E. Becc. *Riesen-Arum* (Sumatra).

1) **Conophora (-ros)** (*Proteaceen*, IV. 1) „Coniferen“-Silberbaum (s. v., *φρος* tragend), *C. capensis* Pet. Gaz., s. *C. pini folio* Petiv. = *Protea nana* Thb. (*Leucadendron* Berg.). 2) **Conophora** DC. (*Compos.* *Eupatorineen*, XIX. 1) Kegel-Pestwurz (— Fruchtbod. m. schmal. unfrucht. Kegel, Wtst.), s. *Cacalia* L.

**Conopsæa** (sc. *Orchis*) L. (*Orchideen* *Ophryd.*, XX. 1) Fliegen-O. (gr. *ζῶνωψ*, -*ωτος* Mücke, *Entomologie*: *Conops* L. Stechfliege), s. *O. conopæa* R. Br. (*Satyrium conopseum* Wahlbg.).

**Conopsidium** Wallr. (*Orchid.* *Ophryd.* XX. 1) „Stechfliegen“- od. Kukuks-O. (s. eb. u. *εἶδομαι* gleiche), *C. platantherum* Wallr., s. *Platanthēra chlorantha* Custer, etc.

**Conostylis** R. Br. (*Liliac.* *Hämodorac.* od. *Amaryllideen*, VI. 1) „Kegelgriffel“-Lilie (s. v., *στυλίς* Griffel — dies. kegelf. verbreit., Wtst.), *C. aculeata* R. Br. etc. (Neuholl.), *C. americana* Pursh, s. *Argolasia auræa* Pursh „Weisszöttige“.

**Conringia** Heist. (fehlerh. *Coringia* autt.!) (*Cruciferen* *Siliquos.*, XV. 2) „Conringie“ (n. H. Conring, Prof. z. Helmstädt, † 1681), z. B. *C. orientalis* Andrez., s. *Erysimum* or. R. Br. (*Brassica* or. L.) morgenländ. Schotendotter.

- Consolida** (sc. Delphinium) L. (Ranunculac., XIII. 3) Feld- od. Acker-  
ritttersporn, fr. riste-perle (v. consolīdo befestige, heile zusammen,  
Chirurgie: Consolidae regalis flores!).
- Contortae** Bartl. Ord., Endl. Kl., Rchb., Fam. d. Drehblütigen od. „Con-  
tortae“ (— Blüten drehen sich auf, contortus zusammengewunden v.  
contorqueo), s. Apocynae Juss., DC.
- Contra** (sc. Artemisia) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Wurmsamen- od.  
Zittwer-Beifuss (contra gegen — näm. d. Samen geg. Würmer!).
- 1) **Contrayerva** (-ba) autt. (sc. Milleria) (Compos. Millerieen, XIX. 4)  
„Gegengift“-M., Giftwurz, e. contrayerva, s. Flaveria Contr. Juss.  
(span. = lat. contra u. herba „Gegenkraut“). 2) **C.** (sc. Dorstenia)  
L. (Urticac. Artocarpeen, IV. 1) wurmtreibende Dorstenie, peruan.  
Giftwurz.
- Convallaria** L. (Sarmentac. od. Smilaceen, VI. 1) Maiblume, Zauke O. W.  
(fehl. Zanke autt.), fr. convallaire, e. may-flower (park-), liriconfancy  
(v. convallis = rings umschloss. Thal), C. majalis L., fr. muguet, lis de  
mai (- des vallées), e. may-lily, convally (lily of t. valley) (flores  
Liliorum Convallium Apoth.), s. Polygonatum majale Allioni.
- Convallium** T. i. q. Convallaria majalis L. (s. eb.).
- Convolvulacae** DC., Rchb., Endl. Ord. (zu Kl. Tubiflorae Bartl.), -vuli  
Juss. Winden, s. sogl.
- Convolvulus** T., L. (Convolvulac., V. 1) „Winde“, fr. liserole (-ron, liset),  
e. winder (wind-rope), rope od. bind-weed (v. convolvō winde zu-  
sammen — Nachts u. bei Regen!), C. arvensis L., fr. fleur des champs,  
Zier. C. tricolor L. m. v. v., z. B. v. azureus Hort.
- Conyza** L. (sc. Inula), DC. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Dürrwurz, Flöh-  
kraut, fr. conize (-se), chasse-puce, e. flea-bane (nach Ambrosinus v.  
κόρυζα syncop. κνίζα Krätze, wogeg. in Anwendung, od. v. κορία  
Asche — als klebr. Pfl. damit behaftet, Wtst. — ungewiss!), C. squar-  
rosa L. (Inula Conyza DC.) sparriger Alant, fr. herbe aux cousins  
u. buccante, C. retusa DC., fr. gallette (saliette „Scharfgesalzene“  
Wolff) etc.
- 1) **Cookia** Retz., Sonner. (**Kookia** Rchb.) (Aurantiaceen, X. 1) Wampee-  
od. Südsee-Orange (n. d. Erdumsegler Jam. Cook, † 1779), z. B. C.  
punctata Sonner., s. Quinaria Lansium Lour. (B. Südchina), C. chloro-  
sperma, etc., s. Glycosmida Spr. (-osmis Corr.). 2) **Cookia** Gmel.  
(Thymeläen, VIII. 1).
- Cooperia** Hook. (Amaryllideen, VI. 1) „Cooper's“-Narzisse (n. d. Gart.-  
Insp. Jos. Cooper zu Wentworthhouse, Earl Fitzwilliam, od. Dan. Cooper,  
schr. Fl. metropolit., Lond. 1833—35, Wtst.).
- Copaifera** L. (Cassieen Ceratonieen, Amyrid. od. Polygalac., X. 1) „Co-  
paivabalsambaum“, fr. copahu od. cupaiba (-ayba) (n. d. brasil. Nam.  
d. B.'s copaiba!), C. officinalis L.
- Copallinum** (sc. Rhus) L. (Terebinthac., V. 3) „Copal“-Sumach, fr. cop-  
pal (-palle, -palline, -palme), e. copal (vaterl. — lief. d. Copalgummi  
od. -harz!).
- Copernicia** Mart. (Palmen, VI. 1) „Copernicus“- od. Wachs-P. (n. d.  
Astronomen Nic. Copernicus, † 1543), C. cerifera Mart., s. Corypha  
cer. autt.
- Coprinus** Pers. (Pilze, XXIV. 4) „Mistpilz“, -schwamm (gr. κόπρινος  
v. κόπρος: Kot od. κοπρία Misthaufen), z. B. atramentarius Pers.  
„Tintenschw.“, fimetarius L. „Dungschw.“
- Coprosma** Forst., L. f. (Rubiaceen od. Apocynen Carisseen, XXIII. 1)  
„Kotduft“ (s. eb., ὄσμη Geruch etc.), z. B. C. foetidissima L. f., hir-  
tella Lab., lucida L. f. (Str. Neuseel.).
- Coptis** Salisb. (Ranunculac., XIII. 7) „Spaltblatt“-Nieswurz (v. κόπτω

spalte etc. — verschnitt. Blätter!), *C. trifolia* Sal. = *Hellebörus trifolius* L.

- 1) **Corallina** T. (Florideen od. Blütentange, XXIV. 1) „Korallentang“, -moos, fr. coralline, e. coral-moss (v. corallino, -na ital. korallenfarbig). — Corallinēae Decsn. Korallentange (zu Ord. Floridicāe Ag. Blüten- od. Rot-Tange). — 2) **Corallina** (sc. *Mespilus*) Risso (Pomaceen, XII. 4) „Korallen“-Mispel.
- 1) **Corallodendron** T. (-drum) (sc. *Erythrina*) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Korallenbaum“, „Korallen“-Scharlachblume (*zoοάλλωv* rote Koralle, *δέρδωv* B.). 2) **C.** Jungh. (Schimmelpilze, XXIV. 4).
- Corallorrhiza** Rupp. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Korallenwurz“ (s. v., *όύζα* Wurzel — diese wie ein Korallenstock geformt!), z. B. *C. innata* R. Br. gem. K., s. *Ophrys* Cor. L.
- Corbularia** Haw. (Amaryllideen, VI. 1) „Korb“-Narzisse (v. *corbula* Körbchen — Form d. Nektariums!), z. B. *C. albicans* Haw. (*Narcissus* a., *Pseudo-Narcissus juncifolius* Clus.).
- Corchörus** L. (Tiliaceen, XIII. 1) Nesselröschenstrauch (gr. *ζοόχορος* schlecht. Gemüse, bei Theophr. = *Anagallis arvensis* L., v. *ζοόσω* reinige — abführend! Wtst.), z. B. *C. olitorius* Trew Muspfl. Diétr., *Moluchiagewürz*, fr. corette, *C. capsularis* L., s. g. Jute (Bast- od. Textilgew.), Zier. *C. japonicus* L. (*Kerria* jap. DC., Rosaceen) japan. Ranunkelstr., s. g. Judenpappel, fr. mauve des juifs, e. jew's-mallow.
- 1) **Cordaea** Nees (Lebermoose, XXIV. 2) „Corda“-Leberm. (n. d. Bot. u. Reis. Corda, s. d. Aut.). 2) **Cordaea** Spr. (Papilionaceen, XVII. 4).
- Cordia** L. (Convolvulac. od. Boragineen, V. 1) Brustbeere (n. *Euricius* Cordus, Arzt in Bremen, † 1535), z. B. *C. Myxa* L. schwarze Br., *Sebstenenbaum*, fr. sebestier, *C. scabra* DC. Rosenholz von Martinique, etc.
- Cordiēra** Rich. (Rubiaceen Guettardeen, XXI. 7) „Cordiere“ (n. Cordier, schr. Guide de l'amateur des champignons, Par. 1826 u. a.), z. B. *C. triflōra* DC., etc.
- Cordyceps** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Keulenkopf“ (v. *ζοοδίλλη* Kolbe etc., -ceps in compos. = caput Kopf), z. B. *C. capitatus* u. *purpureus*, s. *Claviceps* p.
- 1) **Cordylīne** Comm., Pers. (Liliac. Smilac. od. Asphodeleen, VI. 1) „Kolbenlilie“ (s. eb. — bez. d. Wurzeln!), Zier. *C. australis* Lindl., s. *Dracaena* u. *Dianella* austr., Stuben: *C. (Drac.) stricta*, *cannae-folia*, *nutans*, *lentiginosa*, *Haageana* etc. 2) **Cordylīne** *vivipāra* Hort., s. *Chlorophytum Sternbergianum* Steud. (*Anthericum*).
- Cordylocarpus** Desf., Sm. (Crucifer. Lomentaceen, XV. 2) Keulenrettig D., „Keulenfrucht“ (*ζοοδίλλη* Kolbe etc., *ζαοπύος* Frucht), z. B. *C. glaber* Desf., *muricatus* ds. etc., s. *Erucaria aleppica* G.
- Coreopsidēae** Less., DC. Wanzenblumenartige, s. sogl.
- Coreopsis** L. (Coriopsis) (Composit. Heliantheen, XIX. 3) „Wanzenblume“, „Mädchen“- od. „Schönauge“, fr. *coréope* (v. *ζοοίς*, -τος Wanze od. *ζοοή* (*ζωοή* od. *ζοίρη*) Mädchen? *όψις* Aussehen, Auge — Samenform wanzenartig!), Zier. *C. tinctoria* Nutt. (*Calliopsis* t. DC. s. bicolor Hort. m. v. v., z. B. *nana* Hort. u. *nana purpurea* Hort., v. *marmorata* Hort., *C. Drummondii* Torr., Gray, *C. coronata* Hook., *auriculata* L. etc., s. *Calliopsis* Rehb. u. *Bidens* L.
- Corēta** P. Br. (sc. *Corchorus*) L. (Tiliaceen, XIII. 1) „Putz“-*Corchorus* (v. *ζοοσω* reinige, putze etc.), s. *Corchörus siliquosus* L.
- Coriandrum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Koriander“, fr. coriandre, e. coriander (v. *ζοοίον* od. *ζοοάριον* v. *ζοοίς* Wanze — weg. d. Geruchs!), s. *Corion* Hoffm. — *Coriandrēae* Koch.
- 1) **Coriaria** Niss., W. (Rutac. od. Coriariēen, XXII. 9) „Gerber“- od. „Lederstrauch“, fr. *rédoul* od. *rédoix*, herbe faux-tanneurs (lat.

corium, gr. *ζόσιον* Leder), z. B. *C. nepalensis* u. *myrtifolia* L.  
 2) **Coriaria** (sc. *Rhus*) L. (Terebinthineen, V. 3) Gerber-Sumach, fr. coroyère od. roux (rouvre) des corroyeurs, e. hide-tanning-Rhus, elm-leaved Sumach-tree. 3) **Coriaria** Pall. (Plumbagineen, V. 5) „Lederblatt“, s. *Statice latifolia* Sm. s. *cordata* L. — *Coriariaceae* DC. (zu *Rutaceae* *Simarubeae* Rehb. (Ord. *Malpighiinae* Bartl.) Ledersträucher.

**Coricium** Ker (Orchid. *Arethuseen*, XX. 1) „Jünglings“-O.? (v. *ζόσιος*, -*ιζος* Jüngling?), z. B. *bicolor* etc., s. *Corycium* Sw.

**Corindum** T. (Sapindaceen, VIII. 3) „indianisches Herz“, fr. corinde, s. *Cardiospermum Corindum* L. brasil. Herzsamen (cor, -dis Herz, indus indianisch — Same schwarz m. weiss. herzförm. Keimwarze, Wtst.).

**Coringia** Rehb., DC. s. *Conringia*!

**Corion** Hoffing., Lk. (Umbelliferen, V. 2) „Koriander“, s. *Coriandrum*, z. B. *testiculatum* Lk. (*Coriandrum* t. L.), s. *Bifora flosculosa* M. B. (*ζόσιον* vgl. *Coriandrum*).

1) **Coris** T., L. (Primulac. od. Personaten Selagineen, V. 1) Erdkiefer, fr. coris od. cauris (*ζόσιος* Wanze — Ansehen der Blume! coreos herba d. Apoth.), z. B. *C. monspeliensis* L. blaue Erdkiefer, s. *Coris quorundum* Clus. (*Symphytum petraeum* Cam.). 2) **C.** (sc. *Hypericum*) L. (Creta, Zierpfl.).

**Corispermum** L. (Amarantaceen, I. 2) „Wanzensamen“, fr. corisperme (s. v., *στέκουα* Samen), z. B. *intermedium* (Kali folio gramineo Loes.), *squarrosum* L. u. *hyssopifolium* L.

**Cormophyta** Endl. Stöck- od. Achsenpflanzen (*ζοροῦς* Stamm etc., *φυτόν* Pflanze).

**Cornus** Spach (Pomaceen, XII. 3) Spierlingsbaum, Spierling (s. eb.), *C. domestica* Spach = *Sorbus domestica* L., fr. corne (-mier), sorbe (-bier).

**Cornaceae** Grck., -*nēae* DC. Endl. Cornellengew. Grck. (zu *Araliaceae* Rehb.), s. *Cornus*.

**Cornelia** Hardw. (Lythrarieen, IV. 1) „Corneliuskraut“ (n. Herm. *Cornelius*, schr. Catal. horti publ. Amstelodami 1661), z. B. *C. verticillata* Arduin., s. *Ammannia baccifera* L.

**Corniculatae** Endl. Kl. der Horn- od. Gehörtfrüchtigen (*corniculum* Hörnchen) (zu Kl. *Sediflorae Calycanthae* Rehb.).

1) **Cornucopiae** (sc. *Fedia* G., sc. *Valeriana* L.) (Valerianeen, III. 1) „Füllhornkraut“, algerischer Baldrian, fr. Valeriane d'Alger od. corne d'abondance (cornu Horn, copia Fülle). 2) **Cornucopiae** L. (Gräser, III. 2) „Füllhorngras“, z. B. *C. cucullatum* L. halskappiges od. morgenländ., fr. coqueluchiole, s. *Alopecurus*.

**Cornus** T. (Cornaceen, IV. 1) Hartriegel, Hornstrauch, Cornelstr., „Cornelle“ Grck., fr. cornouille (-ler), e. cornel-tree, cornelian-, dog's-berry-tree, dog-wood, gatten-wood, auch privet (v. cornu Horn — weg. d. Härte d. Holzes!), Zier. *C. mas* L. Cornelkirsche, Durlitze, fr. cornouiller mâle, Corneilles, e. cornelian-cherry-tree, s. *C. masculina* P. Hér.; *C. sanguinea* L., fr. sanguinelle od. sangain, gem. Hornstr. *C. florida* L. (*Benthamidia flor.* Spach) Blumen-H., fr. c. fleuri, e. showy *C.* od. flowered-dog-wood; *C. canadensis* L., fr. herbacé.

**Cornutia** Plum., L. (Verbenaceen, XIV. 2) „Cornutie“ (n. Jacques Cornut, lat. *Cornutius*, franz. Nat. u. Reis., schr. *Canadensium plant. hist.* 1635), z. B. *punctata* W. (*Hosta coerulea* Jacq.), *pyramidata* Spr., *staminca* Vahl, etc.

**Corolliflorae** DC. Kl. d. Kronblütigen od. Ganzblumigen (*Monopetalae* Juss.) (corolla Blumenkrone).



- 1) **Coronaria** A. Br. (sc. Agrostemma) L. (Sileneen od. Caryophylleen, X. 4) Garten- od. „Kranzrade“ Grck., s. *Lychnis Coronaria* Lam. u. *Coronaria tomentosa* A. Br. (Zier.). 2) **C.** (sc. *Lychnis*) Moris. i. q. *Lychnis Flos Jovis* Lam. (Agrostemma fl. Jov. L.) schirmtraub. Lichtnelke M. Rehb. 3) **Coronaria Flos cuculi** A. Br. Kukuks-Kranzrade (— Lichtnelke), s. *Lychnis fl. cuc.* L. (v. corona Kranz — näml. kleiner um den Schlund der Blume!).
- Coronariae** Endl., Rchb. Kl. der Kronlilien Endl. (corona Krone — schöne Blumenkr.).
- Coronilla** Neck., L. (Leguminos. Coronilleen, XVII. 4) Kronwicke, „Krönlein“ O. W., fr. coronille, sain foin d'Espagne, e. sickle-wort (dem. corona — Blütenstand!), Zier. *C. glauca* L. (Mirabellenduft!), variegata, Emérus L. s. g. Peltsche, montana Scop., *C. Securidaca* L. „Beilkr.“, wild *C. varia* L. (— bunte Krone!). — *Coronillæe* DC. Peltschenartige.
- 1) **Coronopus** Hall. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Krähenfuss“, Feldkresse, Zwang O. W., fr. coronope (*κορώνη* Krähe, *ποδὶς* Fuss, *Cor. Ruellii* All.), s. *Cochlearia Coronopus* L. (Senebiera-*Cor.* Poir.). 2) **Coronopus** (sc. *Plantago*) L. (Plantagineen, IV. 1) Krähenfuss-Wegerich (Plant. coronopifolia Roth).
- Corothamnus** Presl. (Papilionac. Genisteen, XVII. 4) Zwergginster, „Besenstrauch“ (*χορὸς* Besen, *θάμνος* Strauch), z. B. *C. decumbens* Dur. (Genista prostrata Lam.).
- Corrëa** Sm., Andrews (-raea Hort. Kew., -reia Vand.) (Rutac. Diosmeen, VIII. 1) neuseeländ. Thee (u. d. Bot. *Correa da Serra* in Portugal, † 1823, s. d. Aut.), Treibh. *C. ampullacëa*, bicolor, formosa, speciosa etc., s. *Gomphia* DC.
- Corrigiöla** L. (Paronychieen od. Portulacac., V. 3) Hirschsprung, Strandling, Linge O. W., fr. corrigiöle (dem. v. corrigia Schuhriemen), *C. littoralis* L. — *Corrigiolacëe* (sc. *Portulacëe*) Rchb.
- Cortinaria (-us)** Fr. (Blätterpilze, XXIV. 4) Fasersaum-Pilz, „Spinnwebschleier“ Kumm. (v. cortina Bettvorhang, fr. courtine, Schwammhäutchen d. Pilze!), *C. castaneus* Fr. etc.
- 1) **Cortüsa** L. (Primulaceen, V. 1) Alpenprimel, Heilglöcklein, Bärsanikel Rmpl., fr. cortuse, e. mourtain-Sanicle (n. d. Prof. J. A. Cortusi, latin. Cortusus, zu Padua, † 1596, s. d. Aut.), *C. Matthiöli* L. 2) **Cortüsa arundinacëa** Plum. (Cannaceen, I. 1), s. *Thalia geniculata* Rottb. 3) **Cortüsa americana** Herm. (Saxifragac., X. 2), s. *Tiarella cordifolia* L.
- Coryanthes** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Helm“- od. „Schopf“-O. (*κόρυς* Helm, Schopf, *ἀνθή* Blüte — Oberlippe helmförmig! Wst.), z. B. Bruchmülleri Rchb. f., speciosa Hook., macrantha ds. (Gongöra m. Hook.), etc. (Südamer.).
- Corycium** Sw. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Helm“-O., „Helm-ling“ D. (gr. *κορύριον* dem. v. *κόρυχος* Köcher, Sack etc. — oberst. Blütenblatt ähnl. geformt!) (vgl. *Coricium* Ker), z. B. *C. bicolorum* Sw., crispum Sw. (Arethusa cr. Thb.), etc.
- Corydälis** DC. (Fumariaceen, XVII. 2) Hohlwurz, Lerchensporn, Kappenmohn D., fr. coridale (-rydale), fume-terre „Erdrauch“, e. holl-root, birth-wort (*κορυδάλις* Schopflerche — lerchenspornartige Nektarien!), s. *Fumaria* L., Zier. *C. lutëa* DC. (*Capnoides* l. DC.), *C. nobilis* Pers. u. ochroleuca K., wild: *C. cava* Wahlbg. „Hohlwurz“, *C. solida* Sm. (*bulbosa* DC.) „Derbwurz“, etc.
- Corylopsis** Sieb. u. Zucc. (Betulac. od. Hamamelideen, XXI. 8) „Scheinhasel“ (Corÿlus u. *ὄψις* Aussehn), Zier. *C. spicata* S. Z.
- Corÿlus** T., L. (Betulac. od. Cupuliferen, XXI. 8) Haselstrauch, fr. coudrier od. noisetier, e. hazle-tree (-nut), auch blea od. bleak (v.

*ζόφους* Helm — Form d. Kätzchenschuppe, Wtst.), *C. Avellana* L. gem. H., fr. noisetier commun, m. v. v., *C. tubulosa* W., fr. avéline (-nier), e. phillbert, Zeller- od. Lambertsnuß, m. v. rubra Borkh. „Blutnuß“, *C. Colurna* L. Byzantiner Nuß (byzantina Desf.), fr. noix de Byzance, e. Constantinopel-hazel.

- 1) **Corymbiferae** Vaill., Juss., DC. (zu Synantherae Rich., Ord. Compositae Bartl.) „Ebensträussige“ (v. corymbus, gr. *ζόφουβος* i. q. vertex Scheitel, Bot. Ebenstrauß od. Doldentraube). 2) **Corymbiferae** (sect. v. Rosa Lauch.) „Büschelrosen“.
- Corymbium** L. (Compos. Rolandreen, XIX. 6 od. V. 1) „Ebenstraußblume“, Wollkorn D., fr. corymbiole (s. eb.), z. B. *glabrum* u. *scabrum* L., s. *Bupleurifolia umbellata* Pluk.
- Corynandra** Schrad. (Capparid. Cleomeen, XV. 2) „Kolbenanthere“ (*ζοούνη* Kolbe, *ἀνήθο*, -*ρδοός* Mann, Staubbeutel — diese oben kolbig!), z. B. *pulchella* Schrad. (Nepal).
- Corynephorus** P. B. (Gräser, III. 2) „Kolben“- od. „Keulengranne“, Silbergras od. Bunke (s. eb., *φοοός* tragend), z. B. *C. canescens* P. B., s. *Aira can. L.* (*Avena c. W.*, Weingärtneria c. Bernh.).
- Corynocarpus** Forst. (Myrsineen od. Hesperideen, V. 1) „Keulennuß“ D., Kuhbaum von Neuseeland (s. v., *ζαφλός* Frucht), *C. laevigatus* Forst. (Str. Neuseeland).
- Corypha** L., Lam., Roxb. (Palmen, VI. 1) „Schopf“- od. Schirm-P., fr. coryphe (*ζοουφή* i. q. *ζόφους* Schopf etc.), Stuben: *C. s. Livistonia australis*, *rotundifolia*, *Jenkinsii*, *filifera* etc. — *Coryphæa* DC.
- Corysanthes** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 4) Grosshelm (*ζόφους*, -*υθος* u. *ἀνθος* — d. obere Blütenbl. ein. gross. Helm bildend!), z. B. *bicalcarata*, *fimbriata* etc.
- Coscinium** Colebr. (Menispermaceen, XXII. 6) „Siebsamen“ (*ζόσκινον* Sieb dem. *ζόσκινιον*).
- Cosmanthus** Nolt., A. DC. (Hydrophylléen, V. 1) „Schmuckblume“, fr. *cosmanthe* (v. *ζόσμος* Schmuck etc., *ἀνθος* Bl.), Zier. *C. fimbriatus* Nolt. (*Eutoca* f. Hort.), fr. *c. frangé*.
- Cosmæa** Cav. W. (-*mia* Domb.) (Compos. Senecionid., XIX. 2) „Schmuck“-Dahlie (s. eb.), Zier. *bipinnata* W., *parviflora* W. (*Coreopsis* p. Jacq.), *sulphurea* W. (*Coreops. artemisiaefolia* Jacq.), s. *Cosmos* Cav. (-*mus* Pers.).
- Cosmibuena** Rz. Pv. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Weltgut“, Fieberrinde (Cosmo- in compos. Welt, bueno, -na span. gut), z. B. *obtusifolia* R. P., s. *Cinchona macrocarpa* Vahl s. *grandiflora* R. P.), *acuminata* R. P. (kl. B., Anden) etc.
- Cosmidium** Gray, Nutt. (Compos. Senecionid., XIX. 2) (zu *Coreopsis* L.) „Schmuckdahliengleiche“ (v. *Cosmus* od. *Cosmæa*, s. d. u. *εἶδομαι* gleiche), Garten: *C. Burridgianum* Hook. m. v. *atro-purpureum*, Engelmanni u. *filiforme*.
- Cosmophyllum** C. Koch (Composit. Verbesineen, XIX. 2) „Schmuckblatt“ (s. v. u. *γύλλον* Laub), Zier. *C. calaliaefolium* s. *calalioides* Koch, s. *Ferdinandea eminens* Lag. (grossblättr. Blattpfl.).
- Cosmos** Cav. (-*mus* Pers.) (Compos. Senecionid. od. Heliantheen, XIX. 3) „Schmuck“-Dahlie (vgl. *Cosmæa* W., -*mia* Domb.), Zier. *bipinnatus* Jacq., Cav. m. v. *purpureus* Hort. Rabattenschmuck Vilma., s. *Coreopsis coronata* L.; *C. diversifolius* Otto m. v. *atro-sanguineus* Bot. Mag., s. *Dahlia Zimapani* Roehl.
- Cossignia** Comm. (*Cossinia* Pers., DC.) (Sapindaceen, VI. 1) „Cossignie“ (n. d. franz. Nat. Cossigny, der dem Namengeber Commerson ein Herbar. der Coromandelküste verehrte), z. B. *C. pinnata* Lam., *triphylia* Lam. s. *borbonica* Comm. s. g. weiss. Eisenholz (Insel Bourbon), s. *Pimela nigra* Lour.

- Costa** Fl. Flum. (Diosmeen, V. 1) „Costa“-Duftraute (n. Christoph a Costa, portug. Chirurg d. 16. Jahrh.'s).
- Costus** L. (Scitamineen, I. 1) „Costwurz“, wilder Ingwer, fr. cost (costh) (gr. *κόστος*, arab. koost od. gath „Zierpf.“), Topf. C. zebrinus u. speciosus Sm. (Banksia sp. Kön.), arabicus L. s. glabratus Sw. (Anonýma Merian).
- Cota** (sc. Anthëmis) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) stechende Kamille M.-Rehb. (cota d. alte Name für eine Kamillenart, von d. gr. *κοτίς*; od. *κόττια* Kopf).
- Cotinus** T. (sc. Rhus) L. (Terebinthaceen, V. 3) Perückenbaum, -sumach, Gelbholz, eig. „Ölbaum“ (gr. *κότινος* Theophr. der wilde Ölbaum — zu Kränzen u. dgl. F. W. Riemer), s. Cotinus Coccygia Scop. (*κοκκόγιμος*, cotinus Sumach).
- Cotoneaster** Med. (zu Mespilus), Rehb. (Pomaceen, XII. 4) Quitten- od. Zwergmispel, -quitte, fr. néffier cotonneux, cognassier (deter. v. cotonëum Quitte), C. vulgaris Lindl. s. integerrima Med. (Mespilus Cotoneaster L.) Kutte O. W., fr. cotonéastre commun, C. tomentosa Ldl. s. coccinea Steud. (Mesp. tom. W. s. eriocarpa DC.), fr. néffier tomenteux, e. woolly Cot., C. acuminata (Mesp. ac. Lodd., Crataegus ac. Desf.), C. frigida Wall. (Pirus Nussia Hamilt.) Berg-Zwergmispel, C. Pyracantha Spach „Feuerdorn“, s. Pyracantha Spach.
- 1) **Cotula** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Laugenblume, Kuhdille Leun., fr. cotule (dem. Cota, alt. Name für eine Kamillenart, s. Cota), Zier. C. stricta L. (Lidbeckia pectinata Berg.) (Str. Cap), alba u. herbacea, s. Eclipta erecta L. 2) **Cotula** (sc. Anthëmis) L. (Comp. Anthem.) Stink-Kamille, fr. oeil de vache, e. may-weed (Wtst. von *κοτὴλη* Becher, hohle Hand etc.!).
- 1) **Cotylëdon** L. (Sedeen, X. 5) Nabelkraut, fr. cotylet (-lëdon), e. hipwort (gr. *κοτυλληδών* Höhlung, Gelenkpfanne, d. Pfl. „Venus-Nabel“, umbilicus Venëris), C. umbilicus L. s. orbiculata, coruscans etc. (jetzt Gartenpfl.!). 2) **Cotylëdon** (sc. Saxifraga) L. (Saxifrageen, X. 2) Nabelkraut-Steinbrech, s. g. Venusnabel (umbilicus Venëris). 3) **Cotyledon** pinnata Hort. Kew. (Crassulaceen, V. 5), s. Verëa pinnata Dietr. (Bryophyllum Salisb.), Crassula Cotylëdon Jacq., s. Cot. arborescens Pers.
- Couepia** Aubl. (Amygdalac. od. Myrobalaneen, XVI. 7) Guianapflaume (vaterl. Name!), C. guianensis Aubl. = *Acia amara* W.
- Coumarouna** (Cumaruna) Aubl. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) Tongabohne od. wohlriechende Coumarou (guian. Name cumaron), C. odorata Aubl. (Taralëa), fr. coumarou od. coumier, s. Diptëryx W., Schreb.
- Courataria** Aubl. (Lecythideen, XIII. 1) „Couratari“-Topfbaum, fr. couratari (vaterl.), C. estrellensis Raddi, s. Lecythis Couratari autt.
- Courbaril** Plum. (sc. Hymenaea) L. (Cassieen, X. 1) Heuschreckenbaum (südamer. Name!)
- Couroupita** Poir., Aubl. (Lecythideen od. Melaleucac., XVI. 8) „Couroupita“-Topfbaum, fr. couroupite, C. guianensis Aubl., s. Lecythis bracteata autt. (curupitu tumu in Guiana, Wtst.).
- 1) **Courtoisia** Rehb. (Polemoniaceen od. Convolvulac., V. 1) „Courtoisblume“ (n. d. Prof. Courtois in Lüttich), C. daucifolia Rehb. 2) **Courtoisëa** Nees, Kth. (Cyperaceen, III. 1).
- Coussapöa** Aubl., Juss. (Urticac. Artocarpeen, XXII. 2) „Coussabibaum“ (vaterl. cussabi), s. Cecropia Gaud.
- Coussarëa** Aubl., Juss. (Rubiaceen, V. 1) „Coussaree“, z. B. C. violacëa Aubl. (in Guiana coussare).
- Coutarëa** Aubl. (Rubiaceen, VI. 1) „Coutaree“, Gewächsh. C. speciosa Aubl. (Str. Guiana, Nam. coutare), s. Portlandia hexandra L.

- Coutoubëa** Aubl. (Gentianeen, V. 1) (vaterl. Name coutoube).
- Cracca** Riv., T. (sc. Vicia) L. (Leguminos. Vicien, XVII. 4) Vogelwicke, fr. vesseron od. arousses, e. bird's-tares od. ax-vetch, auch heath's-pease „Heiden-Erbse“ (v. *ζοάζω* krächze — von d. schreienden Vögeln gesucht, Wtst., od. fr. craquer krachen u. aufschneiden, d. i. lügen? — ungewiss!).
- Crambe** T. (Cruciferen Lomentac., XV. 2) Meerkohl (v. *ζοαμβός*; trocken), *C. maritima* L. gem. M., fr. chou-marin (crambe-), e. sea-kale, Zier. *C. cordifolia* Stevens, fr. cr. à feuilles en coeur, tatarica Jacq. (*Tatarica ungarica* Clus.).
- Cranichis** Sw. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Schädel“-O., Helmlippe D. (v. *ζοαρίον* Schädel, *ἔζω* habe — d. aufr. Labell. gewölbt, concav, Wtst.), z. B. luteola, aphylla, diphylla etc., s. Polystachya Hook. (*Dendrobium polystachyum* Sw.).
- Craniflaria** L. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Schädelkapsel“, fr. craniolaire od. cornaret (v. *ζοαρίον* Schädel — Frucht wie ein geteilt. Vogelkopf, Wtst.), *C. fruticosa* L. (Gesneria fr.), annua L. (*Martynia* L.).
- Craspedia** Forst., Schreb. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Fransenblume“ (*ζοάσπεδος* Saum, Franse — frans. Saum d. Blütenchen), z. B. *C. uniflora* Forst. (Neuholl.), pilosa Spr. (*Podosperma pedunculare* Rehb.) (Neuholl.).
- Crassula** L. (Crassulac., V. 5) „Dickblatt“ (v. *crassus* dick), Zier. *Cr. coccinea* L. (*Calosanthus c.* Van Houtt.), *umbellata* Jacq. (*Septas capensis* L.), *falcata* (Rochëa f. DC.), *capitata* (Jonquillenduft!), *Ampelpfl.* *spathulata*, *centauroides* L. (*Sedoides afric. annua* Herm.) etc. — **Crassulacëae** DC. (zu Ord. Succulentae Bartl.) „Dickblättr“, Saft- od. Fettpfl.
- Crataegus** L. (Pomaceen, XII. 2) Weissdorn, fr. aubépine, e. white-thorn (haw-) u. beam-tree (gr. *ζοάταιγος*, ob v. *ζοάτρος* Kraft u. *ἄγω* führe? od. *ζοατέω* beherrsche? crates, -is Geflecht? — unsicher!), Cr. *Oxyacantha* L. m. v. v., Zier. fl. puniceo, fl. albo pleno u. rubro pleno Hort., *C. purpurea* Bosc. s. *sanguinea* Hort., fr. aub. pourpre, *C. grandiflora* C. Koch (*Mespilus* gr. Sm. s. *Smithii* DC.), fr. néflier à grandes fleurs, e. Smith's-medlar, *C. punctata* Ait. (*Azaroëlus* Hort., *Mespilus cuneifolius* Ehrh. s. punct. L.), fr. aub. à fruit ponctué, *C. coccinea* L. (*Mesp. cocc.* Mill.) Scharlach- od. Korallendorn, Mehlapfelbaum, fr. aub. écarlate, *C. monogyna* Jacq. spitzblättr. Weissd. M.-Rhb., etc.
- Crataeva** L. (Capparideen, XI. 1) „Cratevas“-Kapper (n. d. Wurzelgräber *Krateuas* od. *Cratevas*, s. d. Aut.), z. B. *C. gynandra* L. Stinkapfel od. Guakobaum, fr. poire à trois feuilles „Schleimappelbaum“ Wolff, *C. Marmelos* L., *C. Tapia* L. Steinapfelb., Knoblauchbirne D.
- Craterellus** Nees (Pilze, XXIV. 4) „Mischkrüglein“, Füllhornpilz Kumm. (dem. v. crater, -ëris Mischgefäß), *C. cornucopioides*.
- Crenea** Aubl., Schreb. (Salicariëen, XI. 1) „Quellenweiderich“, Kerbling D., fr. crénée (v. *ζοήρη* Quelle, nicht v. creneau Zinne od. crénelé gekerbt; Wtst. guian. Name!), Treibh. *C. maritima* Aubl. (Guiana).
- Crepidëae** Cass. Pippauartige s. *Crepis*.
- Crepidotus** Nees (Pilze, XXIV. 4) „Beschuhter“, Halbstiefelchen Kumm. (*ζοηπιδοτός* v. *ζοηπιδός*), z. B. *alveolus* muldenf.
- Crëpis** L. (Compos. Cichoriac. XIX. 1) Grundfeste, Feste O. W., Pippau, fr. crépide, e. bastard-hawk-weed „Bastard-Habichtskraut“ — Schuhform od. Festauffliegen d. Blätt. ? (*ζοηπιδός* Schuh, fester Stand!), z. B. Wiesen: *C. biennis* L., Anger: *C. polymorpha* s. *virens* L.,

Raine etc. *C. tectorum* L., Zier. barbata L. (*Hieracium baeticum* majus Herm.), s. g. Christusauge, rubra L.

**Crescentia** Jacq., L. (Personat. Büchnereen, XIV. 2) „Crescentie“ (n. Pet. Crescenzi, Petrus de Crescentiis, in Bologna, † 1320), z. B. *C. Cucjete* u. *cucurbitina* L. Kalabassenbaum, fr. calebassier. — *Crescentiaccæ* R. Br.

**Cressa** L. (Convolvulaceen, V. 1) „Creta“-Winde, Harzkraut D., fr. cresse, Cr. cretica L. f. (*Cressa* = Bewohnerin v. Creta).

**Crinum** L. (Amaryllideen, VI. 1) Hakenlilie, fr. crinole u. lis, e. crinum-lily (gr. *κρίνον* Lilie), Zier. *C. gigantæum* Hort., longiflorum Herb., scabrum Sims, americanum L., fr. lis-asphodèle Halmilie, *C. africanum* L. (*Mauhlia capensis* Thb. u. *Agapanthus umbellatus* l'Hér.).

1) **Crista galli** (sc. *Rhinanthus*) L. (Scrophularineen od. *Rhinanthac.* XIV. 2) „Hahnenkamm“, s. *Alectorolophus* Hall. (crista Kamm, e. crest, gallus Hahn). 2) **Cr. g.** (sc. *Erythrina*) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4). 3) **Cr. g.** (sc. *Hedysarum* L., sc. *Onobrychis* G.) (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) kleiner Hahnenkamm (*Caput galli minus* Triumfetti).

**Crithæmus** (nicht *Crithæmus*!) Bess. (Umbelliferen, V. 2) Sichelholde (v. *κρίθη* Gerste — Standort? weg. d. Ähnlichk. d. Samens mit Gerste, Wtst.), *C. Falcaria* Rehb. s. *agrestis* Bess., s. *Drepanophyllum sioides* Wib. u. *Falcaria Rivini* Host.

**Crithmum** T. (Umbelliferen, V. 2) Meerfenchel, Bacille, fr. bacile (v. *κρίθη* Gerste — Samenähnlichk.!), *C. maritimum* L. (*Cachrys mar. Spr.*), fr. criste-marine od. passe-pierre (perce-) u. pourprier aquatique, e. sea-fennel u. samphire (-pire), auch batis.

**Crocodylion** Vaill., L. (zu *Centauræa*) Rehb. (Compos. Centaureen, XIX. 3) Grossdorn- od. Dürrkelch-Flockenblume, „Krokodil“-Fl. (gr. *κροκοδείλιον* eine Pfl., v. *κροκόδειλος* Krokodil — weg. d. stachelschupp. Kelchs!), s. *Centauræa Verutum* L.

**Crocoshia** Planch. (Irideen, III. 1) „Safranschwertel“ (*κρόκος* lat. *Crocus* Safran, *δσμη* Duft), *C. auræa* Planch., s. *Tritonia auræa* Pappe.

**Crocodylon** Eckl., R. Br. (Celastrineen, V. 1) Safranholz (*Crocus* Safran, *ξύλον* Holz — Farbe dess.), *C. crocæum* R. Br., s. *Elaeodendron* (-um) *crocæum* DC., „safrangelb. Ölbaum“.

**Crocus** T., L. (Irideen, III. 1) Safran, fr. safran, e. saffron (*κρόκος* Theophr. urspr. ein chaldäisch. Wort, Wtst. v. *κρόκη* Faden — d. Staubfäd. z. Färben!), Zier. *C. vernus* All. (*vernalis* Jacq.) m. v. v. (*lutæus* u. *auræus* Lam., *sulphuræus* u. *versicolor* Ker etc.), *C. sativus* L. Gewürz-S., *nudiflorus* Sm., etc.

**Crossandra** Salisb. (Acanthaceen, XIV. 2) „Fransenanthere“ (*κρόσσοσ* Franse, *άνθος*, *-νδρος* Mann, Anthere od. Staubbeutel — diese bebartet, Wtst.), *C. undulaefolia* Sm., s. *Harrachia speciosa* Jacq. u. *Ruellia infundibuliformis* Andr.

**Crossopetalum** P. Br. (Sapotaceen od. Celastrac., IV. 4) „Fransenkronblatt“ (s. eb. u. *πέταλον* lat. petalum Kronblatt), z. B. *fruticosum* P. Br. (Str. Westind.), s. *Rhacoma* *Crossopet.* u. *Myginda* *Rhac.* Jacq., L.

**Crossostylis** Forst., Schreb. (Sterculiac. od. Myrtaceen, XVI. 8) „Fransengriffel“, „Kranzsäule“ D. (s. eb. u. *στυλῖς*, *-ίδος* Griffel), z. B. *biflora* Forst.

**Crotalaria** L. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Rasselhülse“, „Klapperschote“ D., fr. crotolaire, e. rattling-cod (v. *κρόταλον* Klapper), Treibh. *C. purpuræa*, *juncæa* L. s. g. Sunn od. bengalischer Hanf, s. *Hallia* Thb., *Rafnia* Thb. u. *Podalyria* Lam.

**Croton** L. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Purgierstrauch, „Zeckensame“, Krebsblume D., fr. croton (v. *κρότων* Zecke od. Waldbock, Hundegläser, Botan. Taschenwörterbuch. 10

- laus), Zierblattpfl. C. Benzöe L. Gummilackbaum, pictum u. maximum, trilobatum W., sebiferum W., etc., s. Codiaeum, Clutia, Schradera etc.
- Crowea** Sm. (Rutaceen Diosmeen, X. 1) Purgierraute (n. Dr. J. Crowe in Norwich, Bot. u. Samml. v. Weiden), Treibh. latifolia Paxt. (Eriostemon l.), major, etc., Sommer-Zier. saligna Andr. (Str. Neuholl.).
- Crozophora** Neck. (Euphorbiac., XXI. 9) Lackmuspflanze M.-Rchb., e. litmoss-plant, Färber-Croton W. (ζοοτων Zecke, ποροδ; tragend — hökr. Frucht! od. v. ζωώζω färbe? Wtst.), s. Croton tinctorium L.
- Crucianella** L. (Rubiaceen, IV. 1) „Kreuzblatt“, fr. crucianelle, croisette, e. cross-wort (dem. v. crux, -cis Kreuz — Blattstellung!), Ampel C. stylosa Trin., e. petty Madder m. v. purp. Hort., angustifolia L., etc., s. Rubia u. Rubiöla.
- 1) **Cruciata** Scop., T. (zu Galium L.) (Rubiac., XXIII. 1) „Kreuz“-Labkraut (cruciatum gekreuzigt — Blattstellung!), z. B. muralis Moris., s. Valantia Cruciatia L. s. muralis L. (Galium cr. Sowerb.), fr. torture d'Espagne. 2) **Cr.** (sc. Gentiana) L. (Gentianeen, V. 1) Kreuzenzian, s. g. Sibyllenwurz, fr. gentiane croisette, e. cross-wort Gentian. 3) **Cruciata** montana minor Burr., s. Anagallis Monelli L.
- Cruciferae** Juss., DC., Rchb. „Kreuzträger“ od. Kreuzblumige (zu Rhoeodaeae Bartl.) (crux, -cis Kreuz u. fero trage).
- Cruciflorae** (sc. Thalamanthae) Rchb. „Kreuzblütler“ Rchb. (s. eb. u. flos, -öris Blume).
- Cryphospermum** P.-B. (Compos. Cäsulieen, XIX. 5) „Verstecksamen“ ζουφις versteckt, στέμμα Samen — d. Achänen in d. Spreublättern, Wtst.).
- Crypsis** Ait. (Gräser, II. 2) „Dornengras“, C. aculeata Ait., s. Anthoxanthum ac. L., C. alopecuroides Schrad. (Heleochlöa al. Host) (ζρόψις d. Verbergen — Blütenähre an d. Basis von einem Scheideblatt, Wtst.).
- Cryptanthus** Klotzsch, DC. (Bromeliac., VI. 1) „Versteckblüte“ (ζουπιτός versteckt, άνθος Bl. — d. Blüt. stecken in d. Blattscheiden), z. B. bivittatus DC.
- Cryptocarya** R. Br. (Laurineen, IX. 1) Nusslorbeer, javan. Eisenholz Leun. (s. eb., ζάουορ Nuss — d. Frucht steckt in d. beerenart. geschloss. Röhre d. Blütendecke, Wtst.), C. glaucescens R. Br. (Neuholl.), mucronata Spr. (Cayenne), s. Laurus mucr. Poir.
- Cryptococcus** Kütz. (Pilze, XXIV. 4) Hefenpilz, Cr. fermentum Ktz. (s. eb., ζύζζοζ Korn).
- Cryptogamae** L. Verborgen- od. Undeutlichblühende, „Kryptogamen“ (s. v., γάμοζ Ehe, Blüte), -gamia L. XXIV. Kl. d. Kryptogamen (γάμοζ hochzeitlich etc.).
- Cryptomeria** D. Don (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) Cypressen-Wachholder, Wachh.-Cypr. (s. v. u. μρολόρ Hüfte etc. — Stielästchen versteckt!), Zier. C. japonica Don (Cupressus jap. L.) s. elegans Don, s. Taxodium jap. Brong., araucarioides u. elegans Veitch.
- Cubeba** (sc. Piper) L. (Piperaceen, II. 2) „Cubeben“-Pfeffer, „Kubebe“, fr. crèbèbe od. cubèbe, poivron à queue od. musqué (- de Mascaren), e. cubeb (vaterl. kuppali d. i. schlechter Pfeffer!).
- 1) **Cucubäus** G. (Sileneen, X. 3) Taubenkropf, Hühnerbiss, fr. cucubale (v. cucubo schreie wie ein Kukuk — also „Kukuksblume“ — ungew., Linné: st. cacobölus v. ζαζός schlecht, βόλοζ v. βάλλω Wurf!). 2) **Cucubäus** Behen L. (Sileneen, X. 3), s. Silene inflata Sm. (vulgaris Grck.) aufgeblas. Taubenkr. Grck., s. g. Widerstoss, auch Wandelblume, fr. carnillet (-niolet), e. calves-foot „Kalbsfuss“!
- 1) **Cucullaria** Raf. (sc. Fumaria) L. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) Kukuks- od. „Kapuzen“-Erdrauch, Mönchskappe, fr. cucullaire (nicht

- cuculus Kukuk, sond. cucullus Kappe, Kapuze). 2) **Cuc.** Buxb. (sc. Valantia) L. (Rubiace., XXIII. 1) Kappenfrucht-Labkr. (— d. Fr. von d. häut. Braktee kapp. umschloss., Wtst.). 3) **Cuc.** Schreb. (Vochysiac. od. Myrobalaneen, I. 1) „Kappenkelch“, z. B. emarginata Vahl, s. Vochya brasiliensis. Vand. (— einer der 5 Kelchklappen gross kappenf., Wtst.). 4) **Cuc.** Pers. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) Kapuzen-P. od. -Morchel (— Hut am Rand unterseits angewachsen).
- Cucumis** L. (Cucurbitac., XXI. 1c) Gurke od. „Cucumer“, fr. concombres, lat. cucumis, -eris Gurke od. Hohlgefäß (v. d. celt. cucc hohl od. bauchig), z. B. C. Conomon Thb. japan. G., C. Dudaim L. pers. od. wohlriech. G. (Apfelmelone), C. sativus L. Salat-G., Zier. C. metuliferus E. Mey. zackenfrücht. G., fr. c. porte-bornes, e. pronged c., C. Anguria L. Arada-G. (C. echinatus Mnch.), fr. angurie, c. arada od. marron, cornichon des Antilles, e. arada c., C. flexuosus L. Schlangen-G. (Cuc. Melo var. flex. Naud.), fr. melon-serpent, e. snake-c.
- Cucurbita** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Kürbis, fr. citrouille od. cource, e. gourd od. bumpkin (pumpion) (v. curvus krumm, Paxton (?), aus cucumis u. orbis Kreis — runde Gurke! Wtst.), Zier. C. Pepo DC. (vgl. Pepo), C. perennis Asa Gray, fr. cource od. cocombre vivace, e. perennial-gourd, dipsacëus Ehrenb. (Bardana Fenzl, Momordica dasycarpa Hochst.) „Karden“-K., C. lagenaria L. „Flaschen“-K., fr. calebasse, e. bottle-gourd, C. melanosperma Naud. Malabar-K., fr. cource-boule de Siam, e. Malabar-melon, fälschl. Angurien-K. (Kletterzierpfl.). — Cucurbitacëae Juss., DC., Rchb.
- Culilaban** autt. (sc. Laurus) L. (Laurineen, IX. 1) „Culilaban“-Lorbeer (Ostind.) (vaterl. culitlawan — Rinde mit Nelkengeruch).
- Cullumia** R. Br. (Compos. Gorterieen od. Arctoideen, XIX. 3) „Cullumie“ (n. Sir Thom. Cullum, schr. 1774 üb. engl. Pfl.), z. B. C. ciliaris Hort. Kew., s. Berkheya W. u. Gorteria L.
- Cuminëae** Koch Pfefferkümmelartige, s. Cuminum!
- Cuminia** Colla (Labiaten, XIV. 1) „Cuminie“ (n. Hugo Cumini, Samml. v. Pilzen 1805 im Thal v. Pisa).
- Cumingia** Lindl. (Liliaceen, VI. 1) „Cuming“-Lilie (n. d. engl. Reis. auf d. Philippinen 1836/39 Cuming), z. B. C. trimaculata Lindl., s. Cumingia D. Don (n. Lady Gordon Cuming in Schottl.).
- Cuminum** Bauh., L. (Umbelliferen, V. 2) Kreuzkümmel, plattd. Köhne Mej., Pfeffer- od. Mutterkümmel, C. Cuminum L. Moris: echter, röm. od. ägypt. Kümmel Leun., fr. cumin (n. d. arab. kammon, gr. *κρίνον* lat. cuminum Kümmel).
- Cunila** L. (Labiaten od. Boragineen, II. 1) Castrierfaden, fr. cunile (filamenta castrata duo L.) (v. cuneo spitze keilförmig zu — Staubfäden, Paxton? od. conus Kegel, Wtst.? — zweifelhaft!), z. B. fruticosa W. (zu Thymus L.), s. Westringia rosmarinifolia Sm.
- 1) **Cunninghamia** Rich. (Coniferen Araucarieen, XXI. 9) „Cunninghams“-Tanne (n. d. Bot. u. Reis. Cunningham, s. d. Aut.), z. B. C. sinensis R. Br., s. Pinus u. Belis Salisb. 2) **C.** Schreb. (Rubiace. Coffeaceen, IV. 1), z. B. verticillata W. (Antirrhoea borbonica Gmel., Str., Ins. Borbon), s. Malanea Lam.
- 1) **Cunonia** Büttn. (sc. Antholyza) L. (Irideen, III. 1) „Cuno's“-Schwertel, Scharlach-Schmetterling (flos papilionaceus coccineus L.) (n. J. Chr. Cuno, Kunstgärten u. Gartendicht. z. Amsterdam, schr. 1749 Catal. sein. Gartens). 2) **Cunonia** capensis R. Br. (Cunoniaceen od. Corniculaten, X. 2) Cap-Cunonie, s. Osterdikia Burm. — Cunoniaceae R. Br. (zu Corniculatae Rchb.).
- Cupania** Plum., L. (Sapindaceen od. Myristicaceen, VIII. 1) „Cupanie“ (n. d. ital. Mönch u. Bot. Cupani, s. d. Aut.), C. americana L. Eisen-

- holz v. Bourbon, *C. tomentosa* L. (Str. Domingo) (Trigōnis tom. Jacq.), s. *Molinaea* Juss. u. *Quiva* Cav.
- Cuphaea** (-ēa) Jacq., P. Br. (Lythraceen, XI. 1) „Kelchhöcker“-Weiderich (*λίθος* Höcker — höck. Kelchgrund!), s. *Lythrum* *Cuphea* L. f., *Zier. C. lanceolata* Ait. m. v. v. *purpurea* u. *nana* Hort., *viscosissima* Jacq., *miniata*, *acinifolia* St. Hil., *silenoides* Nees, *strigulosa* Bot. Reg., *platycentra* Benth. etc. (bel. Zierbl. d. Gärt.).
- Cupressinae** Rich., DC. Cypressen (zu Ord. od. Kl. Coniferae Bartl.), s. *Cupressus*.
- Cupressus** T. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Cypresse“, fr. *cyprès*, (gr. *κυπάρισσος* v. *κύω* erzeuge u. *πάριος* regelmässig, nicht v. Cypern!), z. B. *C. sempervirens* L. Pyramiden-C. m. v. *funebri* Häng-C., *C. Lawsoniana* Murr. (*Chamaecyparis* Laws-Parl.), *C. nutkaensis* Lamb. (*Thujopsis borealis* Fisch.). — *Cupressinae* Carrière: *Juniperus*, *Widdringtonia*, *Frenela*, *Actinostrobus*, *Callitris*, *Libocedrus*, *Biota*, *Thuja*, *Fitz-Roya*, *Thujopsis*, *Chamaecyparis*, *Retinospora*, *Cupressus*, *Taxodium*, *Glyptostrobus*, *Cryptomeria*, *Arthrotaxis*, *Sequoia*, *Wellingtonia*, *Cunninghamia* u. *Sciadopitys*.
- Cupuliferae** Rich., Rchb. (zu Amentaceae Bartl., Kl. Juliflorae Endl.) „Becherfrüchtige“ (v. *cupula* dem. v. *cupa* Napf, u. *fero* trage).
- Curatella** L. (Dilleniaceen, XIII. 2) „Schab“- od. „Barbierstrauch“ (v. *κουρεύω* schabe — d. Blätt. dienen in Guiana zum Glätten etc., Wst. v. *curatus* bearbeitet, v. *curo* etc.). *C. americana* L. (Bstr.), *Campaiba* St. Hil. (Bras.), *imperialis* autt., s. *Theophrasta* imp. Juss.
- Curculigo** G. (Amaryllideen od. Liliaceen, VI. 1) „Kornwurmsame“, Rüssel-Lilie D. (v. *curculio* Rüsselkäfer od. Kornwurm — Samen aussehen!), *Stuben C. recurvata* Dryand. m. v. *fol. variegatis*, *C. orchioides* Roxb. etc.
- Curcuma** L. (Scitamineen, I. 1) Gelb- od. Gilbwurz, fr. *curcuma* u. *terre-mérite*, *souchet*, *safran des Indes*, e. *indian saffron* (v. d. arab. u. ind. *kurkum*), s. *Amomum Curcuma* L. (*C. rotunda* u. *longa* L.).
- Curmeria** Andr., Mast. (Araceen, XX. 9) „Curmerie“ (caraïb. Name *courimari*), z. B. *Wallisii* Mast. u. *picturata* André (Neugran.).
- Cuscüta** T., L. (Convolvulaceen, V. 2) Seide, Flachsseide, fr. *cuscute*, *barbe de moine*, *lin de lierre* (- *maudit*) u. *cremaillère*, auch *teigne*, e. *dotter* (v. d. ital. *cassuto*, arab. *kechout* Paxton, gr. *κασινώ* flicke zusammen, verstricke — schlingend. Wachstum!), *C. carinata* R. Br., s. *Grammica aphylla* Lour. — *Cuscutaceae* DC., Endl., -tēae Presl., Lk. (zu Ord. Tubiflorae Bartl., Fam. Convolvulaceae Juss.).
- Cuscütina** Pfeiff. (Cuscutaceen, V. 2) wohlriech. Flachsseide, *C. suaveolens* Pfeiff. (*Engelmannia* Pfeiff.), s. *Cuscüta* *suav.* L.
- Cyanaea** DC. (Nymphäaceen, XIII. 1) „Blaunymphäe (*κυανός* blau), s. *Nymphaea*.
- Cyananthus** Wall. (Campanulaceen, V. 1) „Blaublume“ (s. eb. u. *ἄνθος*), z. B. *lobatus* Wall. (Nepaul).
- Cyanastrum** Cass. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Blausternblume“, *Moschus-Flockenbl.* (s. eb. u. *ἄστρον* Sternblume), s. *Amberbōa* (*Centaurea moschata* L.).
- 1) **Cyanēa** DC. (Compos. Centaureen, XIX. 3) (*Centaurea* sect. *Cyānus*).  
2) **Cyanēa** Renealm. (Gentianeen, V. 1). 3) **C.** *Gaudich* (*Lobelia*-ceen V. 1 od. XIX. 6) „Blaulobelie“ (*κυανός* blau).
- Cyanella** L. (Liliaceen, VI. 1) Cap- od. „Cyanen“-Lilie (dem. v. *Cyānus* *Cyane*), *C. capensis* Jacq., *C. alba* u. *lutēa* L. etc. (— mehrere blau-bühende Arten! Wst.).
- Cyanophyllum** Lindl. (Melastomaceen, X. 1) „Blaublatt“ (*κυανός* blau,



- φύλλον* Laub — prächt. bläul. Blattpfl.!), Warmh. *C. magnificentum* Lindl.
- Cyānus** Desp., Pers. (sc. *Centaurea* L., zu *Centaurea* sect. *Rchb.*) (Compos. *Centaureen*, XIX. 3) Blaue Kornblume, s. g. „Cyane“ (gr. *κυανή*), fr. aubifoin (*aubiton*), pérole, barbeau u. fleur d'azur (- des champs, - de Zacharie), e. bachelor's-button, blue-bottle, *C. Cyānus* L. (Saaten), *C. montāna* L., *C. rosča* Bang, *C. trinervia* W., repens Dalech., s. *Stachelina dubia* L.
- Cyathēa** Sm. (Baumfarne, XXIV. 1) „Becher“- od. „Tutenfarn“ (v. *κύθηον* Becherchen — d. Sporenbehälter! od. *κύθος* Becher — ganzer Farnhabitus!), Zier. *C. dealbata* Hook. (Neuseel.) u. *ferox* (Stubenf.), *C. speciosa* H. B. K. s. *Hemitelia spec.* Kaulf.
- Cyāthus** Hall. (Lycoperdiaz. Pilze, XXIV. 4) „Becherpilz“ (s. eb.), z. B. *scutellaris* u. *Crucibulum* „Schmelztiegel“.
- Cycadēae** Rich., Endl. Ord. der Palmfarne od. Zapfenpalmen (zu Kl. *Coniferae* Endl.), s. *Cycas*.
- Cycas** L. (Cycadeen, XXIV. 1) Sagobaum, -palme (gr. *κύκας* Theophr. ägypt. Palme), Treibh. *C. circinalis* L. (Indien, *Olus calappoides* Rumph., *Arbor zagoë Amboinense* Seb., *Sagobaum v. Amboina*), *C. revoluta* Thb. (Jap.), Warmh. *Riuminiana* Reg., *Rumphii* u. *glauca* Miq.
- Cyclāmen** L. (Primulaceen, V. 1) Erdscheibe, Saubrot, Alpenveilchen, fr. pain de pourceau, marron de cochon, e. hog's- od. sow-bread (gr. *κυκλαμίνης* u. *-μύρον* v. *κύκλος* Kreis, Scheibe — scheibenförm. Wurzelstock!), Zier. *C. europaeum* L., *persicum* Mill., *vernum* J. Gray (*repandum* Sm.), *neapolitanum* Tenore s. *hederaefolium* Koch.
- Cyclanthēra** Schrad. (Cucurbitac., XXI. 10) „Ringbeutel“-Gurke, fr. cyclanthère od. concombre grimpante (*κύκλος* Ring, *ἀνθήρα* Staubbeutel — Antheren als pollenführender Ring), Zier. *C. pedata* Schrad. „gefingerte“, fr. c. à feuilles digitées.
- Cyclobothra** Sweet, Benth. (Liliac., VI. 1) „Zirkelgrube“, Bartkaiserkrone (s. v. u. *βύθρος* Grube — Nektargrube der Blumenblätter!), Stuben *C. barbata* Benth. (*Fritillaria b. L.*), *alba* Benth. (Californ.) (— kugl. inwend. barthaar. Blumen!).
- Cynōches** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schwanenhals“ (*κύκνος* lat. *cygnus* (*cygnus*) Schwan, *ἀκίνη* Nacken — lange, gekrümmte Columna), *C. Loddigesii* Ldl. (Surin.).
- Cydonia** T. (zu *Pyrus* Rchb.) (Rosaceen Pomaceen, XII. 4) Quitte, fr. coin (*coing*, *cognassier*), e. quince u. malocotoon (*melicotony*), quince-tree (gr. *Κύδωνία* od. *-ρία* v. *Κύδων*. Stadt auf Creta, jetzt Canea), Garten *C. vulgaris* Pers., *C. rosča* Pers., Zier. *C. japonica* Pers. m. v. v., *C. sinensis* Thouin (*Pirus sin.* Poir.).
- Cylindrocarpa** Reg. (Campanulac., V. 1) „Cylinderfrucht“, Walzen- (analog *Prismatocarpus* l'Hér. v. *κύλινδρος* u. *σαρκώδης*), z. B. *Sewerzowi* Reg.
- Cylista** Ait. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Grosskelch“ (v. *κύλις* lat. *calyx* Kelch — dies. sehr gross!), z. B. *C. scariosa* Roxb., *villosa* Ait. (*Dolichos hirsutus* Andr.).
- Cymbalaria** Dill., Mill. (zu *Linaria* Rchb.) (Scrophularineen, XIV. 2) „Cymbelkraut“, fr. cymbalaire (*cimb.*-), Zier. u. wild *C. muralis* Fl. Wett., s. *Linaria Cymb.* T. (*Antirrhinum Linaria* L.) (*cymbalum* „Cymbel“ od. Hohlbecken — Blatt mitten vertieft).
- Cymbaria** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Nachenkraut“ D., *Nachen-* od. *Bootfrucht*, fr. *cymbaire* (v. *κύμα* Nachen etc. — Krone oben nachenf. aufgeblasen), z. B. *daurica* L., *borysthēica* Pall.
- Cymbidium** Sw. (-*dia* R. Br.) (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Nachen-

lippe“ (s. eb., εἶδομαι gleiche — Labell concav), z. B. alōefolium Sw., ensifol. Sw., etc.

**Cyminosma** G. (Rutac. Xanthophylleen, X. 1), „Kümmelraute“ (v. *ζίμινον* Kümmel, *ῥομὴ* Duft — d. Blätt. riechen wie Rosskümmel! Wtst.), s. *Jambolifera pedunculata* L. (*Jambolana* Rumph., *Caryophyllus Tangu aromaticus malabaricus* Pluk.).

**Cyminum** s. *Cuminum* römischer od. Mutterkümmel.

**Cynanchum** L., R. Br. (Asclepiadeen od. Apocynen, V. 2) „Hundswürger“, Würger Schill., fr. *cynanque* od. *étrangle-chien*, auch *scammonée de Montpellier*, e. *dog's-bane* (v. *ζύων*, -*νός* Hund, *ἄγγω* würgen etc. — viell. auch geg. d. *angina* der Hunde! Wtst.), z. B. *C. viminale* L. (Telfel Tavil Alp.).

**Cynapium** (sc. *Aethusa*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Hundspetersilje“, Gleisse, Gartenschierling, fr. *persil de chien* (- *de crapaud*, - *des foux*), e. *dog's-persil* (s. eb. u. *Apium* Silje, Sellerie).

**Cynara** Vaill. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Artischoke, fr. *artichaut*, e. *artichoke* u. *cardoon* (gr. *κινάρα* v. *ζύων* Hund — Schuppen wie Hundszähne), *Cultur C. Scolymus* L. gem. Artischoke, *C. Cardunculus* L. *Cardone* od. *Cardun-Artisch.* — *Cynaræe* Less. *Artischokendistel*.

**Cynarocephalæe** Juss. (sc. *Synantheræe* Rich.) zu Ord. *Compositæ* Bartl. „Distelköpfige“ (*Cynara* s. eb. u. *κεφαλή* Kopf).

**Cynocrambe** (sc. *Mercurialis*) Scop. (*Acalypheen*, XXII. 8) „Hundskohl“, fr. *chou-de-chien* (*ζύων*, -*νός* Hund u. *καύμψη* Kohl).

**Cynodon** Rich. (Gräser, III. 2) „Hundszahn“ (s. eb. u. *ὀδών* Zahn — spitzgezähnte Spelzen), z. B. *C. Dactylon* Pers., fr. *tremme*, e. *dog's-tooth*, kriech. *Hundsgras* Wolff., s. *Digitaria* u. *Agrostis*; *C. virgatus*, s. *Poa chinensis* Burm.

**Cynoglossum** L. (Boragineen, V. 1) „Hundszunge“, fr. *cynoglosse* u. *langue de chien*, e. *dog's-tongue* (*hound's-*) (s. v. u. *γλῶσσα* Zunge — Form u. Weichh. d. Blätter!), *Zier. C. coelestinum* Hort. (*C. Omphalodes* L.), *blaues u. C. limifolium* L. weiss. *Garten-Vergissmeinnicht*, s. *Omphalodes verna* Mch., fr. *cynogl. printanière*, e. *garden-forget-me-not* u. *O. linif.*, fr. *argentine* od. *corbeille d'argent*, e. *flax-leaved-hound's-tongue*, wild *C. officinale* L.

**Cynomëtra** L. (Cassieen *Cäsalpinieen*, X. 1) „Hundsmatrise“, -*rute* D. (s. v. u. *μήτρα* lat. *matrix* Gebärmutter, „Matrise“ — handgrosse fleisch. Fruchthülsen), z. B. *cauliflora* L. (*Cynomorium* Rumph.), *ramiflora* L., *C. Agallocha* Spr. (*Aloëxylon* *Agallochum* Lour.) (*Str. Cochinch.*).

1) **Cynomorium** L. (Balanophoreen, XXI. 1) „Hundsrute“ (s. v. u. *μορίον* männl. Glied — weg. d. ähnl. Gestalt d. blattlosen *Schmarotzers*), *C. coccinëum* L. *roter Hundskolben*, s. *Fungus typhoides cocc. Bocc.* s. g. *Maltheserschwamm* (*Balanophora fungosa* Forst.), *C. cajanense* Sw. (*Cayenne*), *jamaïcense* Sw., *C. Balanophora* W. 2) **Cynomorium** Rumph. (Cassieen, X. 1), z. B. *sylvestre* Rumph., s. *Cynomëtra ramiflora* L.

**Cynosurus** P.-B., L. (Gräser, III. 2) „Hundsschwanz“, *Kammgras*, fr. *crételle*, e. *comb-grass* (s. v., *οἶσα* Schwanz — ährenf. *Rispe!*), z. B. *coracanus* L. *krummähr.* u. *C. Lima* L. *feilenförm.* (*Wangenheimia disticha* Mch.), s. *Eleusine coracana* G.

**Cyparissias** (sc. *Euphorbia*) L. (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) *Cypressen-Wolfsmilch* (*κνλαρισσας* v. *κνλαρισσος* lat. *Cupressus* *Cypresse* — weg. d. Blätter!).

**Cyperacæe** DC., Grck., Seub. „Cypergräser“, *Seggen*, *Riedgräser* Seub. (zu Ord. *Glumacæe* Bartl.).

**Cyperoidæe** Juss., Rchb. i. q. *Cyperacæe* (*Cyperus* u. *εἶδομαι* gleiche).

- Cypërus** L. (Cyperaceen, III. 1) Cypergras, fr. souchet, sultan, e. cypërous (v. *Κύπρις* cypriische Venus od. *κύπερος* lat. cypërus gewürzh. Pfl. d. Wassers), Zier. C. alternifolius fol. variegatis u. C. Papÿrus L. „Papierstaude“.
- Cypbella** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Zitterbecher Kumm. (*ζύγγελλον* Höhlung — concave Hutform!), z. B. musciöla Fr. etc.
- Cypripedium** L. (Orchid. Cypripedieen, XX. 1) Frauenschuh, fr. cypripède, chaussure de Venus, soulier de Notre-Dame, e. lady's-slipper, woman's-shoe (v. *Κύπρις* cypriische Venus, *πέδιον* dem. *πέδη* Fussbekleidung), Zier. C. Calceölus L., fr. marjolaine bâtarde u. sabot de la Vierge, e. common lady's-slipper, Dayanum Rchb., insigne Wall., Mauhleie, Hookerae Rchb. f., etc., s. Calceölus Gmel., Amm.
- 1) **Cyrilla** L. Gard. (Cunoniace. od. Saxifrageen, V. 1) „Cyrillo“-Cunonie (n. d. Prof. Dom. Cyrillo in Neapel, schr. pl. rar. regni Neapol., Fasc. I, Napoli 1788), z. B. antillana Mchx. (Itea Cyrilla Sw. 2) **Cyrilla** l'Hér. (Bignoniaceen, XIV. 2), pulchella l'Hér., s. Trevirania coccinea W.
- Cyrtandra** Forst. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Krummfaden“ (*κυρτός* krumm, *άνθη*, *-νόθος* Mann, Staubfaden!), z. B. staminëa Forst., etc., s. Besleria L.
- Cyrtanthëra** Van Houtt. (Acanthaceen, XIV. 2) „Krummanthere“ (s. eb., *άνθηρά* Staubbeutel), z. B. C. Ghiesbreghtii u. Ghiesbreghtiana Decsn., magnifica, etc.
- 1) **Cyrtanthus** Ait., Herb. (Amaryllideen, VI. 1) Bogenlilie, „Krummblume“ (s. v., *άνθος* Bl. — Tubus d. Krone lang u. gebogen, Wtst.), Zier. C. angustifolius Ait. (Amaryllis cylindracëa l'Hér.). C. M., Kennëi, obliquus Ait., etc. 2) **C.** Schreb. (Rubiaceen, V. 1), z. B. longiflorus Gm., s. Solena l. W. (Posoqueria l. Aubl.).
- Cyrtocarpa** H. B. K. (Terebinthaceen, X. 1) „Höckerfrucht“ (*κυρτός* höckerig, *καρπός* Fr. — diese oberh. d. Mitte m. 5 Hökern, Wtst.), z. B. procëra H. B. K. (B. Mexiko).
- Cyrtochilum** H. B. K. (Orchiideen Vandeen, XX. 1) „Höckerlippe“ (s. v., *χειλος* Lippe — Labell m. höckerig. Nagel, Wtst.), z. B. undulatum Kth. u. flexuosum Hb. Bpl.
- Cyrtodeira** Van Houtt. (Gesnerac., XIV. 2) „Krumm“- od. „Höckerhals“ (s. v., *δειρή* Hals), z. B. C. cupreata Van H., s. Achimënes R. Br.
- Cyrtomium** Presl (Farne, XXIV. 1) „Krummschildfarn“ (*κύρτωμα* Krümmung), z. B. falcatum Presl, s. Aspidium f. Fisch., Langsd.
- Cyrtostylis** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Krummgriffel“ (s. v., *στυλίσ* Griffel — Columna halbstielrund u. an d. Spitze breit ohrenf.), z. B. reniformis R. Br. (Neuholl.), reflexa Spr., s. Epipactis r. Lab., etc.
- Cysticapnos** Boerh., G. (Papaverac. Fumariac., XVII. 2) Blasen-Erdrauch“ (*κύστις* Blase, *καπνός* Rauch — Kaps. blasig aufgetrieben, Wtst.), z. B. C. africana G., s. Fumaria vesicaria L.
- Cystidanthus** Hassk. (Asclepiad., V. 2) „Blasennelke“ (s. eb., Dianthus Nelke), z. B. C. campanulatus.
- Cystopteris** Bernh. (Polypodiaceen-Farne, XXIV. 1) „Blasenfarn“ (s. v., *πτερίς* Farn — Indusium ein eiförm. Bläschen, Wtst.), Zier. C. fragilis Bernh., e. brittle C. „brüchiger“, C. regia Presl, etc., s. Aspidium.
- Cyteophÿtum** Neck. (Papilionaceen, XVII. 4) „Nachenpflanze“ (*κύτος*, *-εος* Höhlung, Schiff etc., *φυτόν* Pfl.). Cyteophÿta Neck. Fam. d. Nachenpfl. d. i. Papilionaceen (mit carina!) i. q. Cyteophörae (Cytinëae) Neck.
- Cytheraea** DC. (Terebinthac. Spondiaceen, X. 4) Balsampflaume, fr. cythérée (*Κυθήρεια* Beiname d. Venus nach d. Ins. Cythera bei

Lakonien — schön rot u. w. Blüte u. sehr süsse Frucht), s. Spondias L.

- 1) **Cytiněae** DC., Rchb. (zu Aristolochiěae Bartl.) Wurzelschmarotzer m. verkümm. Blätt. (XX. 8). 2) **Cytiněae** s. Cyteophōrae Neck. Fam. d. Nachenblütler od. Papilionaceen (v. *κύτος*, -*εος*; Höhlung, Schiff, carina d. Bot.).
- Cytinus** L. (**Citinus** Sm.) (Cytineen, XX. 8) Cistwurz-Schmarotzer (*κύτινος* eig. Ansatz der Granatapfelblüte — Ähnl. d. Kelchs damit!), z. B. C. Hypocistis L. (*ὑποκιστίς*; Schmarotz. an d. Wurzel des Cistus), s. Thyrsine Gled. u. Asarum Hypocistis L. f.
- Cytipogon** Raf. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Cistwurzbart“ (Cytinus s. eb., *πώγων* Bart), z. B. capitatum u. virgatum Raf.
- Cytisus** L., DC. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Geisklee, Baumbohne od. Bohnenbaum, fr. cytise (citise) (gr. *κύτισος* Kleestr. = Medicago arborēa, n. *Κύθνος*, einer d. Cykladen, ben.), Zier. C. alpinus L. s. angustifolius Mch. (Laburnum alp. Mill.), fr. cyt. des Alpes, C. Laburnum L. m. v. v., gem. Bohnenb. od. s. g. Goldregen, fr. ébenier des Alpes, faux ébenier, Arc-bois, e. Peascod-tree „Erbsschoten“-B., bean-trefoil-tree „Bohnen-Kleebaum“, C. purpureus Scop., C. canariensis L., Rhodus- od. Rosenholz, fr. bois de Cypre, - de Rhode, Treibh. C. elongatus Waldst. u. Kit. rutenförm. u. sessilifolius L.
- Czaackia** Bess. Andrews (zu Anthericum Rchb.) (Liliac., VI. 1) „Czackie“, unechte Zaulilie (n. d. poln. Bot. u. Patriot. Thadd. Czacki, † 1813 zu Dubno), C. Liliastrum Andr., s. Anthericum s. Phalangium Liliastrum Pers. (Hemerocallis Lil. L.).
- Czernya** Presl (Gräser, III. 2) Teichrohr, Cz. arundinacēa Presl = Arundo Phragmites L. (n. Joh. Czerny, schr. 1517 Ortus sanitatis).
- Daboecia** D. Don (sc. Andromeda L., sc. Menziěsia Sm.) (Ericaceen, X. 1) „Daboek's“-Heidestrauch (n. d. Nam. eines irländ. Heiligen Daboek), s. Erica Daboecii u. Vaccinium cantabricum Juss. „Heidelbeere v. Cambridge“, D. polifolia Don, s. Menziesia pol. Juss.
- Dacrydium** Sol., Banks (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) „Thränen“- od. Gummitanne (gr. *δακρυόδιον* dem. *δάκρυον* Thräne — d. i. Harz od. Gummi!), D. cupressinum Sol. neuseeländ. Pium.
- Dactylicapnos** Wall. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) „Finger-Erdrauch“ (*δάκτυλος* Finger, *καπνός* Rauch — zusammenges. Blätt.), s. Dielytra Borkh. u. Adlumia Raf.
- Dactylis** L. (Gräser, III. 2) Knaulgras, Hundsgas, fr. dactyle od. chien-dent à bossettes, e. buck's-horn u. dog's-grass (v. *δάκτυλος* Finger — gefingerte Blüten-Knäuel!), Zier. D. glomerata L. fol. varieg. „buntes Kn.“
- Dactylites** Tausch., DC. (Saxifragac., X. 2) „Finger“-Steinbrech (s. eb.), s. Saxifraga tridactylites L.
- Dactylon** Rich., Vill. (sc. Cynodon) Pers. (Gräser, III. 2) Fingergras (s. v. — Stellung d. Ährchen!), s. Digitalia Dactylon Scop. s. stolonifera Schrad. gefing. Hundszahn Grck., fr. tremme kriech. Hundsgas Wolf.
- 1) **Dactylophyllum** Benth. (Polemoniaceen, V. 1) „Fingerblatt“ (s. v., *φύλλον* Laub — handf. gespalt. Blätt.), s. Gilia Parryae Gray.
- 2) **Dactyloph.** Spenn. (Rosac. Potentilleen, V. 5 od. XII. 5) s. Sibaldia L.
- Daedalēa** Pers. (Hautpilze, XXIV. 4) Wirrschwamm Kumm. (*δαίδαλος* künstlich, verworren — Gestalt d. Huts, Wtst.), z. B. D. quercina, abietina etc.

- 1) **Dahlia** Cav., Cass. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Dahlie“ od. Georgine, fr. Géorgine, e. common Dahlia (n. d. Prof. Dahl zu Åbo in Finnland, † 1787, s. d. Aut.), Zier. D. variabilis Desf., D. coccinea W., rosea W., purpurea W.-m. v. v., D. Zimapani Roetzl. (Bidens atro-sanguinea Hort.) etc., s. Georgina W. — 2) **Dahlia** crinita Thb. (Hamamelideen, XXII. 1) Stellmacherholzbaum, s. Trichoclādus crinitus Pers.
- Daſ** L. (Thymeliaceen, X. 1) „Fackel“-Seidel ( $\delta\alpha\acute{\iota}$ ; Brandfackel — Form d. Blütenstands!), z. B. laurifolia Jacq. s. octandra L. (Str.).
- 1) **Dalbergia** Roxb. L. (Leguminos. Hedysareen od. Dalbergieen, XVII. 3) Rosenholz, Ficitin- od. Sissuholz, D. latifolia L. (n. d. schwed. Obersten C. Dalberg, der lang in Surinam lebte). Dalbergiæe (sc. Papilionacæe Hedysaræe) Rchb. 2) **Dalbergia** phoenicea Tussac (Personaten od. Gesnerac. XIV. 2), s. Besleria sanguinea Pers.
- 1) **Dalëa** L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Schorf- od. Grindbohne (n. d. engl. Bot. Thom. Dale zu Ende d. vor. Jahrh.), s. Psoralea Dalea L. 2) **Dalëa** G., P. Br. (sc. Eupatorium) L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1).
- Dalechampia** Plum., L. (Euphorbiac. Hippomaneen, II. 1) „Dalechampie“, fr. dalechampe (n. d. franz. Botaniker Jacques Dalechamps, † 1588, s. d. Aut.), Gewächsh. D. scandens L. u. Roezliana Müll. s. rosea (schön ros. Brakteen!).
- Dalibardia (-da)** Mchx. (sc. Rubus) L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 5) „Dalibard's“-Brombeere (n. d. franz. Bot. Th. F. Dalibard, schr. Florae Paris. Prodr. 1749).
- Dalrymplea** Spr. (-pëlea Roxb.) (Rhamnac. od. Sapindaceen, XXIII. 2) „Dalrymple'sbaum“ (n. Alex. Dalrymple, schott. Geogr., † 1808, schr. Traité s. l. découvertes etc. 1767), z. B. domingensis Spr., pomifera Roxb. etc., s. Turpinia Vent.
- Damätiris** Cass. (Compos. Arctoideen, XIX. 1) „Demeterblume“, Ceresbl. ( $\Delta\alpha\mu\acute{\alpha}\tau\epsilon\rho\varsigma$  dor. st.  $\Delta\eta\mu\eta\tau\epsilon\rho\varsigma$  Göttin Demeter od. Ceres, Wtst. v.  $\delta\alpha\mu\acute{\alpha}\tau\epsilon\iota\omicron\alpha$  Bezwingerin — d. Spreublätth. d. Fruchtbodens umfassen d. weibl. Blüten!), z. B. D. pudica Cass.
- 1) **Dammära** Rumph., Mirb. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Dammarrharzbaum“, Dammar- od. Kaurifichte, fr. dammara (Nam. auf Amboina!), z. B. orientalis s. alba, australis Lamb. etc. 2) **Dammära** selanica Rumph. (Anonaceen, XIII. 6) Bitterholz, s. Xylopiä or. Spr.
- Dampiera** R. Br. (Scaevolaceen od. Campanulac. Goodeniaceen, V. 1) „Dampiere“ (n. d. Weltumsegler Capt. Will. Dampier, s. d. Aut.).
- 1) **Danäa** All. (Umbelliferen, V. 2) „Danadolde“ (n. d. Bot. P. M. Dana zu Turin, Ende d. vor. Jahrh., Herausg. d. Pfl. v. Piemont), D. aquilegifolia All., s. Ligusticum aq. W. 2) **Danäa** Colla (Composit.).
- Danaë** Med. (Smilaceneen, XXII. 13) Traubendorn Lauch. (Danaë, Mutt. d. Perseus, Myth. — Zeus kam in Gestalt goldnen Regens zu ihr, was d. schön. Ächseltrauben andeuten, Wtst.), D. racemosa Med., s. Ruscus r. L.
- Danaea** Sm. (Farne, XXIV. 1) „Dana“-Farn (s. vorh. Danaa!), z. B. alata Sm. (Caraiben-Ins.).
- Dandelion** Beckm. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) (zu Tragopōgon) „Löwenzahn“, fr. dent-de-lion, s. Leontodon u. Tragopōgon.
- Daniellia** DC. (Crassulaceen, V. 5) „Daniellie“ (n. Stefano Danielli, schr. Raccolta di questioni intorno etc. Bologna 1723).
- Danthonia** DC. (Gräser, III. 2) „Danthoine's“ Gras (n. d. franz. Bot. Danthoine), D. pallida R. Br., s. Avena Brownii Spr., D. decumbens DC., s. Triodia dec. P.-B. (Sieglingia dec. Bernh.).

- Dantia** P.-Th., DC. (Onagreen Jussieuen, X. 1) „Dantie“ od. Isnardie (n. Ant. Danty d'Isnard, Prof. z. Paris, s. d. Aut. Isnard), *D. palustris* Klotzsch, s. *Isnardia* p. L.
- Daphnanthes** C. A. Mey (subgen. v. *Daphne*) (Thymeläeen, VIII. 1) (*Daphne* u. *ἀνθή* Blüte), z. B. *D. Cneōrum* L., s. *Cneōrum*!
- Daphne** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) Seidelbast, Kellerhals, wild. Pfefferstr., Zeland O. W., fr. thymelée, daphné, garou u. cancetille, e. spurge-olive (-laurel, -flax) (gr. *δάφνη* Lorbeer, Paxton: v. *δαίω* brenne u. *φωνή* Stimme — prasselt b. Brennen!?), *D. Mezerium* L. gem. S., Stuben (Winterbl.): *D. odōra* Thb. u. *indica* L., Alpen *D. Cneōrum* L. rosmarinblättr. Zeland.
- 1) **Darlingtonia** DC. (Leguminos. Mimoseen, XXIII. 1) „Darlington's“-Mimose (n. d. amerik. Bot. D. W. Darlington, beschr. in *Fl. cestrice* (v. Chester) 1837 d. Pfl. um Chester, Philad. 1837), z. B. *brachylōba* u. *glandulosa* DC. 2) **D.** Torr. (Sarraceniaceen, XIII. 1) *D.*'s Schlauchtute, Fliegenfallen-Schlauch, *D. californica* Torr.
- 1) **Darwinia** Rudge (Myrtaceen, XII. 1) „Darwinie“ (n. Erasm. Darwin, Arzt z. Derby, schr. *Phytonomia* etc.). 2) **D.** Dennst. (Thymeläac.).
- Dasyliro**n R. Br. (-ium Zucc.) (Amaryllid. od. Bromeliaceen, VI. 1) „Zottenlilie“ (*δαυλίς* rauh, zottig, *λείλιον* Lilie — haar. Blütendecken, Wtst.), Warmh. *angustifolium* u. *juncēum*, Stuben (Winterbl.) *glaucum*, *acrotrichum* s. *gracile*, *longifolium* etc.
- Dasynēma** Schott (Dilleniaceen, XIII. 7) „Rauhfa-den“ (s. v., *νήμα* Gespinnst, Faden — Blätt. unten wollhaar.), z. B. *hirsuta* u. *pubescens* Schott.
- DasypHYllum** H. B. K. (Compos. Cynareen, XIX. 1) „Rauhblatt“ (s. v., *φύλλον* Laub — Blätter beiderseits seidenhaar. u. stachlig! Wtst.), z. B. *argentēum* Kth., etc.
- Dasypōgon** R. Br. (Juncaceen od. Bromeliac., VI. 1) „Rauhbart“ (s. v., *πάγων* Bart — d. 3 äuss. Perigonblätter bebartet, Wtst.), z. B. *bromelifolium* R. Br. (Neuholl.).
- Dasyspermum** Neck (Umbelliferen, V. 2) „Rauhsamen“ (s. v., *σπέρμα* Samen), s. *Scandix*.
- 1) **Datisca** W. (Halorageen, XXII. 10) Streichkraut, gelber Hanf Leun., fr. *cannabine*, *D. cannabina* W. (v. *δατέουαι* verteile u. *ἴσχω* meine — man glaubt, dass d. Pflanze gegen *Scrophulose* verteilend wirke). 2) **Datisca** Ham., Don (Resedaceen, XI. 3), z. B. *nepalensis* Don. — *Datiscaea* Presl (zu *Resedaceae* DC.).
- Datura** L. (Solanaceen, V. 1) Stechapfel, fr. *datore*, *pomme épineuse*, herbe au diable, e. apple-thorn, mad-apple (wahrsch. v. d. arab. *tātōrah* od. *datora* Wtst., lat. *tatula*, od. pers. *tat* stechen, schwerl. *δατέουαι* verteile), Zier. *D. humilis* Desf. (*fastuosa* var. *flava* fl. pleno), *fastuosa* L. m. v. *duplex* alba u. v. *dupl. violacea* Hort., fr. *manteau bleu*, *Huberiana* fl. pl., ägypt. St., *D. Tatula* L., *D. Metel* L., *D. meteloides* DC. wilde Giftpfl., *D. Stramonium* L. — *Daturēae* (sc. *Solanaceae*) Rehb.
- Daubentonia** DC. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Daubentonie“ (n. d. Nat. L. Joh. Maria Daubenton, s. d. Aut.), Warmh. *D. Tripetiana* Poir., *punicea* DC., s. *Piscidia pun.* Cav., s. *Aeschynomēne* u. *Daubentonia* DC.
- Daubenya** Lindl. (Liliaceen, VI. 1) „Daubeny's“-Lilie (n. d. Prof. Dr. Daubeny in Oxford, schr. on t. degree of select. by t. plants w. regard to t. earthy constituents etc. 1833).
- Daucinēae** Koch „Möhrendoldige“, s. *Daucus*.
- Daucus** T. (Umbellifer., V. 2) Mohrrübe od. Möhre (gr. *δαῦχος* v. *δαίω* brenne — erhitzt. Pfl., Wtst. — unsicher!), *D. Carōta* L. „Carote“ od. Gelbrübe d. Küchengartens, fr. *carote* (-otte).

- Davallia** Sm. (Farne, XXIV. 1) Büchsenfarn (n. d. Schweizer Bot. Edm. Davall, † 1799), s. Trichomanes. — Davalliaceae Mett.
- Daviësia** Sm. (Cäsalpinieen od. Sophoreen, X. 1) „Daviesie“ (n. d. Bot. Hugh Davies aus Wales, Mitgl. d. Linn. Gesellsch. in London, schr. 1813 üb. grossbrit. Pfl.), Gewächsh. D. corymbosa, latifolia R. Br., mimosoides ds. etc. (Neuholl.), s. Viminaria Lk.
- 1) **Davya** DC., Rchb. (Melastomac. Merianeen, X. 1) „Dayve“ (n. d. engl. Nat. Humphrey Davy, † 1829), z. B. glabra u. guianensis DC., s. Lavoisiera DC. u. Platycentrum DC. 2) **Davya** Moç., Sess. (zu Sau-rauja W.) (Ternstroemiaceae, XIII. 1).
- Dayenia** Hill. (Sterculiaceen, V. 1 od. XVI. 8) Dayenie (n. d. Duc d'Ayen de Noailles ben.), D. inermis Mill., s. Ayenia pusilla.
- 1) **Decaisnea** Hook. f. (Menispermeen od. Lardizabaleen, XXII. 10) „Decaisnee“ (n. d. franz. Bot. Decaisne, s. d. Aut.), Gewächsh. insignis, s. Stackia ins. 2) **D.** Lindl., Brongn. (Orchideen).
- Decamerion** Nutt. (Vaccinieen, XVIII. 1) Buckelbeere Lauch. (δέξα zehn, μυρίοι Hüfte etc.), z. B. D. frondosum Nutt., s. Gay-Lussacia frond. Torr. Gr. (Vaccinium glaucum Mich. s. frondosum L.).
- 1) **Deckenia** Wendl. (Palmen) „Decken's“-P. (n. d. Nam. Decken geb.), D. nobilis Wendl. 2) **Deckenia** Göpp. (foss. Palmen), s. Lepidodendron (st. Dechenia? n. d. Oberberghauptm. Dr. H. v. Dechen in Bonn?).
- Decumaria** L. (Myrtac. od. Guttiferen Clusieen, XXIII. 1) „Dekumarie“ Lauch., „Zehnerblütenstr.“ (v. decumus = decimus d. Zehnte — Blume etc. zehnteilig!), D. barbära L. echte D. (radicans Mneh.).
- 1) **Deeringia** R. Br. (Amarantac. od. Chenopodiaceen, V. 1 od. XXI. 5) „Deeringie“ (n. d. Bot. Schriftst. Dr. Charl. Deering, schr. Catal. Stirpium etc. about Nottingham 1738), D. celosoides R. Br., indica Spr. (Celosia baccata autt.). 2) **Deeringa** (-ia) Adans. (Umbelliferen, V. 2).
- Deforgia (Desforgia)** Lam. (Campanulac., V. 1) „Desforgie“ (n. d. Gouvern. d. Ins. Bourbon Desforges ben.), z. B. borbonica Lam., s. Forgesia Juss.
- Deidamia** P.-Th. (Passifloreen, XVI. 2) (Deidamia, Tocht. d. Lykomedes, bei welcher Achilles in Frauenkleidern weilte!).
- Dejeuxia** Kth. (Gräser, III. 2) „Dejeux“- Schilfgras (n. d. Nam. Dejeux od. Deyeux geb.), D. silvatica Kth., s. Calamagrostis arundinacea Roth (Arundo silvatica Schrad.).
- Dellosma** Andrzej. (zu Hesperis Rchb.) (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Abendduft“, Nachtviole (δέληη Abend, ὄσμη) Duft, Geruch), z. B. matronalis, L., inodora L. (sylvestris Crantz).
- 1) **Delairëa** Lem. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Sommer- od. Schnell-Epheu (n. d. Bot. Delaire ben.) Stuben D. scandens Lem. (Mikania sc. s. Senecio mikanoides Otto). 2) **Delairea** Desv. (Sophoreen, X. 1).
- 1) **Delima** L. (Dilleniaceen, XIII. 1) „Polierblatt“, Feil- od. Raspelstr., fr. délime (v. delimo feile ab — d. Blätt. dienen z. Polieren), D. sarmentosa L. (Tetracera s. Dryand.). — Delimëae (sc. Dilleniaceae) Rchb. 2) **Delima** guianensis Rich., s. Begonia castaneifolia Schott (Polygonaceen, XXI. 9).
- Delphinium** L. (Ranunculac., XIII. 3) Rittersporn, fr. dauphin (-nelle), pied d'alouette, éperon de chevalier, e. lark-spur (gr. δελφίνιον dem. v. δελφίν od. -γιζ Delphin — Gestalt d. geschloss. Blüte, Wtst.), Zier. D. Ajacis L. m. v. v., z. B. v. formosum Hort., fr. pied d'al. brillant (azurbl. mit Zeich. AJAC), nudicaule Torr. u. Gr. (scharlach), elatum L., grandiflorum L. s. sinense Fisch., hybridum Hort. mit v. coelestinum Hort. u. fl. pl. Hort., triste Fisch. (rotbr.) etc. Saat: D. Consolida (auch Garten: s. g. Levkojen-R. m. v. candeläbrum).

- 1) **Demidovia** Pall. (Rosac. Tetragoniaceen od. Portulacac., XII. 4) Neuseeländ. Spinat = *Tetragonia expansa* L. (Culturpfl.) n. d. russ. Grafen Demidoff, Schüler Linné's, † 1828 in Moskau). 2) **Demidovia** Hort. Mosq. (Melanthaceen, VIII. 4), s. Paris L. 3) **Demidoffia** Dennst. (Myrtac.). 4) **D.** Gmel. (Convulvac.).
- Dendrobium** Sw. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baumwucherer“ D., — Schmarotzer-O. (*δένδροον* B. *βίωζ* Leben od. *βιώω* lebe — als Schmarotz. auf Bäumen), z. B. Warmh. *densiflorum* Wall., *speciosum* Sw., *formosum* Rxb., *albo-sanguineum* Wall. etc. (Indien).
- Dendrochilum** Blum., Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baum-Lippen-orche“ (s. eb. u. *ζείλος*; Lippe — starklipp. B.-Schmar.!), Warmh. *nodatum* Ldl.
- Dendrolinum** Blum. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baum-Lein“ (s. v. u. Linum Flachs od. Lein), s. Eria Lindl.
- Dendrolirium** Blum. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baum-Lilie“ (*λείριον* Lilie — schöne Blumen geschlossen v. Liliengestalt, Wtst.).
- Dendromëcon** Benth. (Papaveraceen, XIII. 1) „Baum-Mohn“ (s. v., *μύζων* Mohn — mohnart. Str., Wtst.), Gewächsh. *rigidum* Planch.
- Dendropëmon** Blum. (Loranthaceen, VI. 1) „Baum-Schmarotzer“ (s. v., *πύμων* schädlich — Schmar.!).
- Dendrophthoë** Blum., Mart. (Loranthac., VI. 1) „Baum-Schwindsucht“ (s. v., *φθόνη* Auszehrung etc.), s. *Cichlanthus* Blum.
- Dens Leonis** T. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Löwenzahn“ = *Leontodon Taraxacum* L. (— weg. d. scharfzahn. Blätter!).
- Dentaria** T. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Zahnwurz“, fr. *dentaire* (v. *dens*, -tis Zahn — Wurzel m. Schuppenzähnen!), D. *pentaphyllos* L. (*Saxifraga montana* Gesner), Wald: D. *bulbifera* L.
- Dentella** Forst. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Zähnenkronen“, Zahnblume D. (dem. v. *dens*, -tis Zahn — bez. d. zahn. Kronzipfel), D. *repens* L., s. *Oldenlandia rep.* Burm.
- 1) **Dentellaria** Raj. (Rubiace. Cinchonac., IV. 1), D. *zeylanica* „Zähnenkronen“ v. Ceylon = *Knoxia* z. L., fr. *dentelaire*, herbe aux cancers „Krebsgeschwürkr.“ (d. vor. identisch?). 2) **Dentellaria** Sloan. (Plumbagineen, V. 1), s. *Plumbago scandens* L.
- Deodara** Roxb. (sc. *Cedrus*) L. (Coniferen, XXI. 9) „Deodara“—Ceder (v. d. indisch. *Deva Dara* = Gottesbaum) m. v. *argentea* u. *viridis* Hort. (Himalaya), s. *Pinus*, *Abies* u. *Larix Deod.* Lamb., Lindl., Koch.
- Deparia** Hook., Grev. (Baum-Farne, XXIV. 1) „Becherfarn“ (v. *δέπιαζ*, -ας; Becher, wie analog *Cyathea* v. *ζύαθος*; Becher), z. B. *Moorii*, s. *Cibotium* Kaulf. u. *Dicksonia* P'Hér.
- Dermatogastères** Cord. u. -*mycetes* Rehb., „Fellbauch“— od. Hüllpilze (*δέρμα*, -ατος; Haut etc., *γαστήρ*, -ερος; Bauch, *μύζης*, -ητος; Pilz).
- Deschampsia** P.-B. (Gräser, III. 2) „Deschamps“—Gras (n. d. franz. Bot. Loiseleur Des-Longchamps, † 1849), D. *caespitosa* P.-B., s. *Aira caesp.* L.
- Desliexa** (-cliaea Μοç. Sess.) (Rubiace. Coffeac., V. 1) Perlkaffee (v. d. Nam. Deschieux geb.), D. *leucocarpa* M. S., s. *Margaris* DC.
- 1) **Desfontainea** (-ia) Rz. Pv. (-nesia autt.) (Solnac. od. Gentianeen, V. 1) „Desfontaine“ (n. d. ber. Bot. Desfontaines, s. d. Aut.), D. *Hookeri* Dun., *spinosa* R. P., *splendens* Hb. Bpl., s. *Linkia peruviana* Pers. u. *splendens* Poir. 2) **Desfontainea** Arrab. (Euphorbiac.). 3) **Desfontainesia** Hoffm. (Sapindac. Fraxineen).
- 1) **Desmanthus** W. (Legumin. Mimoseen, XXIII. 1) „Büschelblütenstr.“, Büschelschopf D. (*δέσμη* od. -μύς Bündel, *άρθος* — weg. d. Blütenstands!), D. *destillatorius* „abträufelnder“, *natans*, s. *Neptunea oleracea* Lour. 2) **Desmanthus** Benth. (Asclepiadeen od. Gymnanthereen,



V. 2) „Büschelbl.“ 3) *Desmantha* DC. (zu *Desmanthus* W.) (Mimoseen).

**Desmidiaceae** Endl. Büschel- od. Bündelalgen (s. sogl.).

**Desmidium** Ag. (Algen, XXIV. 3) Kettenstäbchen, „Bündelgleiche“ (s. v. u. *εἶδομαι* gleiche od. *εἶδος* Bild).

**Desmodium** Desv. (zu *Hedysarum* Rchb.) (Leguminos. Onobrycheen, XVII. 4) „Bündelhülse“, Wandelklee, bewegl. Süssklee (*δέσμων*) bündelförmig — weg. d. Blütentrauben!), Warmh. D. (*Hedysarum*) gyrans DC. „Drehblatt“-W., penduliflorum Oud., Garten D. canadense DC.

**Desmoncus** Mart. (Palmen) „Fesselhaken“ (s. v. u. *ὄγκος*, lat. uncus Haken — Schaft u. Blattscheiden m. zahlr. Widerhaken, Wtst.).

**Desmotrichum** Blum., R. Br. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Fesselhaar“ (*δέσμος* Fessel, *τήξ*, *τήξος* Haar — Anthere an ein. Rücken Zahn befestigt), D. angulatum s. *Dendrobium* a. Lindl.

**Detariaceae** (sc. Mimosaceae) Rchb. „Bündel-Mimosen“, s. sogl.

**Detarium** Juss. (Legumin. Mimoseen, XXIII. 1) „Bündel“-M., „Detar“-M. (v. *δειν*) Bündel — Stand d. Blüten, Wtst.: detar Name am Senegal, essb. Frucht: datach), D. senegalense Juss.

**Detris** Ad. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Gering“-Aster, „Schlecht“-A. (zu *Agathe* Cass. — Gegensatz!) (v. *deter*, Fem. -tris, ungebr. Positiv v. *deterior*, gering, schlecht, Wtst.: *detris* d. corrumpierte aster!).

1) **Deutzia** Thb., Sieb., Zucc. (Philadelphaceen, XII. 1) „Deutzie“ (n. d. Ratsherrn Joh. Deutz z. Amsterdam), Gart.: D. *glabra* Sieb., Zucc. (Japan), *crenata* S., Z. s. *scabra* Hort. m. v. v., z. B. fl. plen., *staminea* R. Br. s. *canescens* Hort. (Philadelphus stam. Wall.), Stuben: D. *gracilis* S., Z. (*gracilis* vera Hort.), s. g. Maiblumenstrauch m. v. v.

**Deyeuxia** P.-B. s. *Dejeuxia*! (zu *Calamagrostis* Roth), z. B. *neglecta* Fr. s. *stricta* Nutt., arundinacea Roth = *Arundo* silvatica Schrad.

1) **Diacantha** Lag. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Zweidorndistel“, „Paarstachel“-D. (*δι-* zwei, *ἀκανθα* Dorn od. Stachel — an d. Basis d. Aste!), D. *arboræa* Less. (*Barnadesia* arb. L. f.). 2) **Diacantha** (sc. Grossularia) L. (Ribesiaceen, V. 1) paarstachelige Stachelbeere M.-Rchb.

**Diadelphia** L., Kl. d. „Zweibrüderigen“ (XVII. Kl.) (*δι-* u. *ἀδελφός* Brüder — Staubf. in zwei Partien!).

**Dialypetalae** DC., Endl. i. q. Polypetalae Juss. „Getrenntkronblättrige“ v. *διαλίω* trenne, *πέταλον*, lat. *petalum* Kron- od. Blumenblatt).

**Diandria** L., Kl. der „Zweimännigen“ (II. Kl.) (*δι-* u. *ἀνδρ*, -*ῥός* Mann, Bot. Staubgefäß!).

**Diana** Comm. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) „Diana“-L. (— wie *Diana* in d. Wäldern).

**Dianella** Lam. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Dianelle“, fr. *dianelle* (dim. *Diana*, s. eb.), Stuben: D. *australis* Lam. (*Dracaena* *indivisa* Hortul.), D. *coerulea* Sims, *longifolia* u. *revoluta* R. Br., s. *Dracaena* u. *Cordylina*.

**Dianthera** Sol., Jacq. (Acanthaceen, XIV. 2) „Zweianthere“, fr. *dianthère* (*δι-* u. *ἀνθηρά* Staubbeutel — jeder Staubf. scheint 2 Antheren zu tragen, Wtst.), D. *americana* Forsk. s. *Barleria* (*Justicia*) *flava* Jacq.

**Dianthus** L. (Caryophyllen od. Silenaceen, X. 2) Nelke, Grasblume, fr. oeillet, e. pink od. gilliflower (v. *Ζεύς*, *Ζεύς* u. *ἀνθος* „Zeusblume“, Wtst. *θεός* göttlich, schön!), Garten: D. *plumarius* L. Federnelke od. s. g. Federröschen, e. pheasant-eye, sweet-William, Gart.- u. Topfbl.: D. *Caryophyllus* L. Garten-N. od. Grasrose

- (-blume) m. zahlr. v. v. (vgl. Caryophyllus!), e. clove-gilly-flower, Gartenzier. *D. barbatus* L. „Bartnelke“, s. g. Tausendschön m. v. v., z. *B. nanus* Hort., fr. fleur d'Arménie u. mignonette, e. sweet John, *D. chinensis* L. m. v. v., z. *B. Heddewigii* Hort. u. Heddew. diadematus, v. laciniatus „Schlitz-N.“ u. a., *D. caesius* Sm. m. v. fl. pl. Pfingst-N., wild *D. superbus* L., *D. carthusianorum* L. „Karthäuser“-N. s. g. Marien- od. Blutströpfchen, etc.; ferner Zier. *D. dentosus* Fisch., *dentosus hybridus* Hort.
- 1) **Diapensia** L. (-zia Uhlenb.) (Ericaceen od. Primulac., V. 1) „Schmerzheilblume“, Trauerbl. *D.* (v. *διαπένθη* = *Sanicula*, Wtst. v. *δια* wegen u. *πένθος* Schmerz — Pflanze geg. Wunden!), *D. lapponica* L., s. *Pyxidanthera* Mchx. 2) **Diapensia** (sc. *Astrantia*) Scop. (Umbelliferen, V. 2) = *Sanicula europaea* G. Frank.
- Diaphyllum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Durchblatt“, Durchwachs (*δια* hindurch, *φύλλον* Laub — durchwachsene Blätt!), *D. triadiatum* Hoffm., „dreistrahliges“, s. *Bupleurum perfoliatum* Lk.
- Diastēma** Benth. (Gesneraceen, XIV. 2) „Zwischenstellung“ (*διάστημα* Abstand — näml. zwischen *Achimenes* u. *Gesnera*, Paxton), *D. quinque-vulnerum* Van Houtt. „fünfnarbige“.
- Diatōma** DC. (Algen, XXIV. 3) „Schnitt“- od. Stückelalgen (*διατομή*) Spaltung — wegen d. Aussehens!). — *Diatomacēae* Harv., -mēae Ag. Diatomeen od. Bacillarien, d. i. „Stäbchenalgen“.
- Dicentra** Borkh. (Papaverac. Fumariaceen, XVII. 2) „Doppel“- od. „Zweisporn“, -flügel, s. g. Herzblume, Jungfern- od. thranendes Herz (*δι-* u. *ζέντροον* Stachel, Honigsporn — Antherenklappen lang hornförm. Wtst.), s. *Dielytra* s. *Fumaria spectabilis*.
- Dicēra** Forst. (Tiliaceen Elaeocarpeen, XIII. 1) „Doppelhörchen“ (*δι-* u. *ζέρας* od. *ζερός* Horn), s. *Elaeocarpus Dicera* L. u. *Eriostemon* Collad.
- Dicerma** DC. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) „Zweimünzkle“ (*δι-* u. *ζέμα* Geldstück — Hülse m. 2 kreisr. münzenförm. Gliedern, Wtst.), s. *Hedysarum* u. *Zornia* Gmel.
- Dichaea** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Doppelorche“ (*δίχα* in zwei Teile geteilt — d. Blätt. stehen zweireihig, Wtst.), z. B. *diandra* Rchb. f., s. *Fernandezia* Rz. Pp.
- Dichilus** DC. (-cheilus Rchb.) (zu *Cytisus* Rchb.) (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Zweilippkelch“ (*δι-*, *χειλος* Lippe — näml. d. Kelch!), z. B. *argentus* L. silberblättr. Bohnenbaum = *Lotus* arg. Brot.
- Dichōdon** Bartl. (zu *Stellaria* Rchb.) (Alsinaeen, X. 3) „Doppelzahn“ (*δίχα* s. v. u. *ὀδών* Zahn — Kronblätter gespalten!), z. B. *cerastoides* L. u. *anomala* Rchb. (*Cerastium anomalum* W. K.).
- Dichoglottis** Fisch., Mey. (Caryophylleen, X. 3) „Doppelzunge“ (s. v. u. *γλωττα* Zunge — Kronblattspreite meist zweiteilig, Wtst.).
- Dichondra** Forst. (Ehretiac. od. Convolvulac., V. 1) „Doppel“- oder „Zweikorn“, fr. *dichondre* (*δι-*, *χόνδρος* Knorpel u. Korn — aus jed. Blüte zwei Körner! Wtst.), z. B. Hängvasen *D. repens* Forst. u. *sericēa* ds., s. *Sibthorpia convolvulacea* L. (Neuseel.).
- Dichorisandra** Mik. (Commelyneen, VI. 1) „Zweispalt-Anthere“ (*δι-χωρίζω* spalte, *άνθη*, -*ιδούς* Mann, Staubbeutel — Staubgef. in zwei Gruppen getrennt), Warmh. *D. ovalifolia*, *discolor*, *nana* (*violacēa* u. *alba*), *musaica* Lind. (Columb.), *vittata* Lind. etc.
- Dichostylis** P.-B. (Cyperaceen, III. 1) „Doppelgriffel“, Wasserriet (*δίχα* in compos. *διχο-*, *στυλις* Griffel), *D. fluitans* P. B. (*Scirpus* fl. L.) etc., s. *Echinolytrum* Desv. u. *Eleogiton* Lk.
- Dichophyllum** Dill. (Urticac. Ceratophylleen, XXI. 8) „Zerschneidblatt“, Igellock, s. *Dichotophyllum* st. *Dichotomophyllum* (*διχοτομέω* zer-

schneide od. *δίγα* entzwei u. *φύλλον* — zerfetztes Laub d. Igellocks!), s. *Ceratophyllum*.

**Dicksonia** l'Hér. (Baumfarne, XXIV. 1) „Dicksonie“ (n. d. engl. Bot. Jan. Dickson, † 1822, s. d. Aut.), Zier. D. *cicutaria* Sw., *dissecta* Sw., *punctiloba* Kze.

**Diclinia** Juss. „Zweilagerige“, Getrenntblütige — Gegensatz zu Zwitterblüten! (*δί-* u. *κλίνη* Bett etc.).

**Diclytra** DC. fehlerh. st. *Dielÿtra* Bork. (s. d.) — oft angewandtes Fehlerwort!

**Dicoma** Cass., Less. (Compos. Carlineen, XIX. 1) „Zweischopf“-Anthere *δι-*, *κόμη* lat. *coma* Haarschopf — Antherenschwänze geschlitzt, Wst.), z. B. *lanuginosa* DC.

**Dierānum** Hedw. (Laubmoose, XXIV. 2) „Gabelzahn“-M., fr. bifurque (*διχοῦρος* od. *-ης* zweiköpfig — Zähne d. Peristoms zwei- bis dreiteilig, Wst.), D. *scoparium* Hedw.

1) **Dictamnus** L. (Rutaceen, X. 1) „Diptam“, fr. dictame, e. dictany (dittany) (*δίπτυμονος* v. *λίπτη* Berg auf Creta u. *θάμνος* Strauch, bei d. Alten *Origanum Dictamnus* L., Wst.), wild u. Zier. D. *Fraxinella* Pers. s. *albus* L. 2) **Dict.** (sc. *Origanum*) L. (Labiaten, XIV. 1) candischer Diptam (s. eb.).

**Dictyanthus** Deesn. (-tha Raf.) (Stapeliaceen od. Aristolochieen, V. 2) „Netzblume“ (*δίπτυς* od. *δίπτυνον* Netz, *ἄρθος*), z. B. *Pavoni* Van Houtt. „Pavon's-N.“, s. *Stapelia campanulata* Pav.

**Dietyosperma** Wendl. (Palmen) „Netznuss“-P. (s. eb., *στέγμα* Samen od. Frucht), D. *alba* Wendl.

**Didelta** l'Hér., Ait. (Compos. Millerieen od. Arctoideen, XIX. 4) „Doppeldelta“ (*δι* u. *δέλτα* Buchst. Δ — Form d. dopp. Fruchtknotens!), s. *Polymnia* L. u. *Favonium* G.

**Didesmus** Desv. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Zwei-“ od. „Doppelfessel“ *δι-* u. *δεσμός* Fessel — Schötchen wie 2 Kettenglieder, Wst.), D. *perennis* Desv., s. *Myagrūm perenne* L.

**Didiscus** DC., Hook. (Umbelliferen, V. 2) „Doppelscheibe“ (*δι-* u. *δίσκοςος* lat. *discus* Scheibe — Früchte zusammengedr., fast zweifach, Wst.), Zier. D. *coerulēus* Hook., s. *Trachymēne coer.* Rudg. u. *Huegelia* R. Br.

**Dieffenbachia** Schott, Endl. (Aroideen, XX. 9) „Dieffenbach's“-Aron (n. d. deutsch. Reis. Prof. E. Dieffenbach in Giessen, Wst. n. d. ber. Operateur Dieffenbach z. Berlin, † 1847), Warmh. D. *costata* Schott (*Caladium cost.*), *Baraquiniana* Verschaff., D. s. *Seguine picta* u. *eburnea* elfenbeinw. gestielte.

**Dielÿtra** Borkh. (nicht *Diel.*!) DC. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) „Doppelfutteral“, -herzöhr, Leierblume, Herzblatt s. g. thränend. Herz (*δι-*, *ἐλυτρον* Futteral, Scheide — zwei umgebog. Ohrzipfel!), Zier. D. *spectabilis* DC., fr. *coeur de Marie*, *Dielÿtra* de Chine, e. *showy* Diel., s. *Dicentra spect.* (*Fumaria* sp. L.), D. *formosa* DC., fr. D. d'Amérique, D. *eximia* DC., fr. D. *distinguée*, D. *chrysantha* DC., etc.

**Diēnia** Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Doppelzügel“ (*δι-* u. *ῥίνα* Zügel — d. Pollenmassen zu je 2 zusammenh., Wst.), D. *fusca*, *cylindrica*, *Myurus* Ldl. (*Pedilēa* Ldl.).

**Dierāma** Bak. (Irideen, III. 1) „Trichter“-Schwertel (*δίεραμα* Trichter, Durchschlag), D. *pendula* Bak.

**Diervilla** T. (-ea) L. (Lonicereen, V. 1) „Dierville's“-Geisblatt, fr. *dierville* (n. d. franz. Chirurg. Dierville, Tournefort's Freund), Zier. D. *versicolor* Sieb., Zucc. (Weigela japonica Thb. s. *arborēa* Hort.), D. *canadensis* W. s. *trifida* Mnch. (*Lonicera Diervilla* L.), D. *rosēa* Hort. (Weigela ros. L., *Calysphÿrum ros.* Mey.).

- Diētes** Salisb. (Irideen, III. 1) „Doppelverwandte“, „Zweijährige“ Wtst. (*δι-* u. *ετις*; Freund, Verwandter — nämll. Iris u. Moraea! Wtst. *δι-ετις* zweijährig!), Stuben: D. bicolor Sal.
- 1) **Dietrichia** Tratt. (Crassulaceen, V. 5) „Dietrich's“-Dickblatt (n. Fr. Gottl. Dietrich, Übers. v. Loudon's Encyklopädie d. Gartenk., Jena 1836—49, s. d. Aut.), Zier. D. coccinea Tratt. = Crassula s. Larochea (Rochea) coccinea Pers., D. odorata Tratt. (Crassula odoratissima Andr.). 2) **Dietrichia** Gies. (Scitamineen, I. 1).
- Digitalis** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Fingerhut“, fr. doigtier, digitale, gantelet, gant-de-Nôtre-Dame, herbe au pauvre-homme, e. fox-gloves „Fuchshandschuhe“ (digitus Finger), z. B. wild u. Zier. D. purpurea L. m. v. gloxiniaeflora Hort., D. grandiflora Ait. (blassgelb), ferruginæa L. (rotgelb), lanata Ehrh. etc.
- Digitaria** Schrad. (Gräser, III. 2) „Fingergras“, -hirse, -fennich Seub., fr. pied de poule „Hühnerfuss“ (s. eb.), D. sanguinalis Scop. (Panicum s. L.), filiformis Kôl. (humifusa Rich.), s. Panicum filif. Grck., etc.
- Digrāphis** Trin. (Gräser, III. 2) „Doppelschrift“- od. Bandgras (*δι-* u. *γράφεις* Griffel — d. beid. Griffel m. pinselförm. od. federf. Narben, Wtst.), Zier. D. arundinacea Trin., s. Arundinaria americana Mchx.
- Dilātris** L. (Liliac. Hämodoraceen, III. 1) „Doppeldienerin“, fr. dilatris (*δι-*, *λάττεις* Dienerin, Wtst. Blüten aussen, wie d. Kapsel struppig — doppelt bedient!), D. corymbosa L., s. Ixia hirsuta u. Wachen-dorfia umbellata.
- Dilepŕyrum** Mchx. (Gräser, III. 2) „Zweihüllgras“ (*δι-*, *λέπυρον* Schale etc. — jed. Blüthch. hat 2 Kelch- u. Kronspelzen, Wtst.), D. minuti-florum Mchx., s. Mühlenbergia diffusa Schreb.
- Dillenia** Thunb. (Ranunculac. Dillenieen, XIII. 6) „Dillenie“, Rosen-apfelbaum (n. d. Darmstädter Bot. Dillenius, Prof. in Oxford, † 1747, s. d. Aut.), Zier. D. speciosa s. indica Thb.
- Dillwynia** (-nēa, -winia) Sm. (Legumin. Cäsalpinieen, X. 1) „Dillwyn's“-Cäsalpinie (n. d. engl. Bot. Lewis Weston Dillwyn, s. d. Aut.), Gewächsh. cinerascens Bot. Cab., floribunda Sm., parvifolia R. Br., speciosa, coronata etc.
- Dimia** Spr., R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Doppelnebenkrone“ (v. *διμὸς* st. *διδυμὸς* doppelt — d. corona staminea dopp. vorhand., Wtst.) od. „Schreckpflanze“ (v. *δειμα* od. -*μος* Schrecken — weg. d. Ansehens!).
- 1) **Dimocarpus** W. (Sapindac. od. Amyrideen, VIII. 1) „Doppelfrucht“, Zwillingspflaume, st. Didymocarpus (*διδυμὸς* zwiefach, Zwilling, *ζωπὸς* Fr.), D. Litschi W., s. Sapindus edulis Ait. 2) **D.** Lour. (Euphorbiaceen, XXI. 1).
- Dimorpha** Sm., W. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Zweiform“ D. (*δίμορ-φος* von dopp. Gestalt, Wtst. *διὰ* durch od. ähnlich u. Amorpha — ein Kronbl. an Stelle d. Carina!), D. grandiflora W. (Parivōa gr. Aubl.), tomentosa W. (Parivōa tom.) Filz-Lederhülle, s. Palovea Aubl.
- Dimorphanthus** Miq. (Araliaceen, V. 5) „Doppelformblüte“ (s. eb., *διρθος* — frucht. u. unfrucht. Blüten verschieden, Wtst.), D. mandschuricus Maxim., s. Aralia edulis autt.
- Dimorphopetalum** Bert. (Crassulac., V. 5) „Doppelform-Kronblatt“ (s. eb., *πέταλον* — vier ungleichgrosse Kronblätt., zwei fast verkümmert).
- Dimorphothēa** Mnch., DC. (Comp. Calendulac., XIX. 4) „Doppelformfrucht“ (s. v., *διήκη* Behälter — zweierlei Achänen, Wtst.), D. pluvialis Mnch. s. Calendula pluv. L. „Regenrose“.
- Dinēma** Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Zweifaden“-O. (*δι-* u. *νήμα* Gespinnst od. Faden — je 2 Pollenmassen an 1 Faden! Wtst.), D. polybulbon Ldl. „vielknoll.“ (Epidendron p. Sw.), s. Bolbophyllum orientale Spr.

- Dinētus** Sweet (Convolvulaceen, V. 1) „Drehwinde“ (*δινητός* herumgedreht — Wst. *δις* doppelt u. *νητός* gedreht etc. — d. zwei äuss. Kelchblätt. gleich, die drei innern vergröss. sich nach d. Verblühen!), s. Porāna Burn. „Wanderwinde“.
- Diocleā** Kth. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Diokles“-Bohne (n. d. altgriech. Bot. Diokles von Caristos, schr. ein *διζοτουζόν*), Gewächsh. D. glycinoides (Kennedy splendens Vent.) etc.; s. Dolichos u. Hymenospōron Spr.
- Dionaea** L. (Cistineen Droseraceen, X. 1) Venus-Fliegenfalle, fr. dionée u. attrape-mouches, e. catchfly (n. Dione, Mutter d. Venus, Zuname), D. Muscipula L., fr. miracle de nature.
- Dioon** Lindl. (**Diōn** Bot. Mag.) (Cycadeen, XXII. 11) „Zweieipalme“ *δι-* u. *ῥορ* lat. ovum Ei — jede Schuppe mit 2 solchen!), D. edüle Lindl.
- Dioscorēa** Plum., L. (Sarmentac. od. Dioscoreen, XXII. 6) Yamswurzel (Cassavebrot, Mandioccamehl), fr. dioscorée, igname od. yam, e. yams (n. Dioscorides aus Cilicien, ber. Arzt zu Nero's Zeit, schr. üb. Arzneimittel etc.), Gart. u. Culturpfl. D. Batatas Decsn. „Bataten“, fr. ign. batate od. de Chine, e. indian yams, Warmh. D. bulbifera u. discolor variegata, multicolor Baraquin m. v. v. chrysophylla Lindl., metallica Lindl. etc., D. Eldorado u. prismatica Lindl. (— alle buntblättr.). — Dioscorēae DC., -reacēae R. Br. (zu Ord. Liliacēae DC.) Schmeerwurzwurzwächse Grck.
- Diosma** L. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Götterduft“, fr. diosme (v. *διος* göttlich, Wst. od. *Διος* Gen. v. *Ζεύς* u. *δομή* Geruch etc. od. auch *διοςμος* durchdring. Geruch!), Gewächsh. D. fragrans s. speciosa Hort., uniflora L. (Adenandra W.), ovata Thb., capitata L. etc. — Diosmēae Rchb. (zu Rutaceae Rutariae Rchb.) Buccogewächse.
- 1) **Diospȳros** L. (Sapotac. Mimosoepen, XXIII. 2) Dattel- od. Lotus-pflaume, fr. plaqueminier (s. eb. u. *πυρός* Weizen, überh. Frucht! od. lat. *pȳrus* Birne, Paxton — Früchte meist v. ungenießb. Geschmack, Wst.), D. Lotus L. Lotusbirne, D. Ebenum L. Kōn. Ebenholz (lignum Ebenum), s. Melanoxylon Schott. 2) **Diospȳros** (sc. Tetranthēra) Spr. (Laurineen, IX. 1), s. Laurus Diospȳros Pers.
- Diostomaea** Spenn. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Göttermäulchen“, Zweiblatt (s. v. u. *στόμα* Mund — schöne Blütenform, Wst.), D. ovata u. cordata Spenn., s. Listera ov. u. cord. R. Br.
- Diothonaea** Lindl., Rchb. f. (Orchideen, XX. 1) „Doppelschleier“-O. (*δι-*, *ὑθόνη* Leinwand, Schleier — d. Columna ausgebreitet. etc., Wst.), D. cotoniaeflora Rchb. f. „quittenblüt.“
- 1) **Diōtis** Schreb. (Amarantac. od. Chenopodiaceen, XXI. 4) „Zweiohr“-Melde (*δι-*, *οὖς*, *ῥίτος* Ohr — d. weibl. Perigon zuletzt zweiflügl.), D. atriplicina Spr., s. Obione pedunculata Moq.-Tand. (Atriplex ped. L.), s. Halimus ped. Wallr., D. ceratoides W., s. Ceratospermum papposum Pers. (Achyranthes papp. Forsk.). 2) **Diōtis** Cass. (Compos. Anthemid., XIX. 2) (zu Santolina L.) (— Kronröhre zweiflügl.).
- Dipelta** Maxim. (Lonicereen, V. 1) „Doppelschild“ (*δι-*, *πέλιτη* klein. Rundschild — bez. d. Frucht), D. floribunda Maxim.
- Diphāca** Lour. (Leguminos. Onobrycheen, XVII. 4) „Zweikernstrauch“, „Doppellinse“ (*δι-*, *φακῆ* Linsenfrucht — jede Hülse trägt 2 Linsen), s. Dalbergia Roxb.
- Diphylleia** Rich. (-ēja Mchx.) (Berberaceen, VI. 1) „Zweiblattstrauch“ *δι-* u. *φυλλειον* Laub — nicht mehr als 2 Blätt.), D. cymosa Mchx. (Carolina).
- Diphysa** Jacq. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Zweiblasen“-Strauch *δι-*, *φύσα* Blase etc. — Hülse an beid. Enden blasig), D. carthagenensis Schiede, etc.

- Diplachne** P.-B., Lk. (zu *Festuca*) Rehb. (Gräser, III. 2) „Doppelspelze“ (*διπλός* dopp., *ἀγνή* Spreu etc. — jed. Blüthch. hat 2 Spelzen, Schüppch. u. Kronspelz), *D. serotina* Lk., s. *Molinia* ser. M. K.
- Diplacrum** Kth., Endl. (Cyperaceen, XXI. 11) „Doppelspitze“ (s. eb., *ἄζοον* Spitze — festschliess. zweispitz. Schlauch um d. Frucht), *D. caricinum* Kth. etc.
- Dipläcus** Nutt. (Scrophularineen, XIV. 2) „Zweiplattennarbe“ (*δι-πλαζοῦς* Kuchen od. *πλάξ*, -zó; Platte — Narbe m. zwei Lamellen), *D. glutinosus* u. *grandiflorus* Van Houtt.
- Dipladenia** DC. (Apocynen, V. 1) „Doppeldrüsen“-Würger (s. v., *ἄδην. ενος* Drüse — 2 Drüs. od. Höker an d. Basis des Ovariums), Stub. Gewächsh. *D. splendens* Hort., *atro-purpurea*, *Harrisii* Purdil etc., s. *Echites* P. Br.
- Diplarrhēna** Dietr. (Irideen, III. 1) „Zweimann“-Schwertel (s. v., *ἄδδην. -ερος* Mann — nur 2 vollst. Staubgefässe), s. *Moraea diandra* Vahl.
- Diplasium** (-zium) Sw. (Farne, XXIV. 1) „Doppelschleier“-F. (v. *διπλάζω* verdoppeln od. *διπλάσιος* doppelt — zu zweien vereinte Fruchthaufen), Zier. *D. gigantēum*.
- Diplecolobēae** (sc. Cruciferae) DC. (richt. **Diplacol.**) „Zweikuchennlippige“ (*δι-πλαζοῦς* Kuchen, *λοβός* Lappen — bez. des Samens b. Aufgehen!).
- Diplectrum** Pers. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Doppelsporn“ (*δι-πλήκτρον* Sporn, lat. *plectrum* etc.), s. *Satyrium* Sw. L.
- Diplocentrum** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Doppelstachel“ (*διπλόος* u. *ζέντροον* Stachel, Sporn — Label m. 2 Stacheln), *D. recurvum* Ldl.
- Diplochilus** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Doppellippe“ (s. v., *χεῖλος* Lippe — scheinb. dopp. Label).
- Diplochiton** (-ta) DC. (Melastomac., VIII. 1) „Doppelhemd“ (s. v., *χιτων* Unterkleid etc. — Blüte noch in 2 Brakteolen gehüllt), *D. aurea*, *bracteata* DC. etc.
- Diplochlaena** R. Br. (Rutac. Diosmeen, XIII. 2) „Doppelkleid“ (s. v., *χλαίνα* Kleid — bez. d. Blütenform!), s. *Diplolaena* Desf.
- Diplocōma** Don (Compositen Eupatorin., XIX. 1) „Doppelschopf“ (s. v., *κόμη* lat. *cōma* Haarschopf — dopp. vorhand. Pappus d. Scheibe), *D. villosa* Don, etc.
- Diploconchium** Schauer (Orchideen, XX. 1) „Doppelmuschel“ (s. v., *κόγχη* lat. *concha* Muschel etc. — das *Hypochilum* nachenf., gehört, d. *Epichilum* konkav), *D. gymnocephalum* Schauer.
- Diplolaena** Desf., Damp. (Rutaceen, XIII. 2) „Doppelmantel“ (s. v., *χλαίνα* i. q. *χλαίνα* Mantel, Kleid), s. *Diplochlaena* R. Br.
- Diplolepīs** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Doppelschuppe“ (s. v., *λεπίς* Schuppe — jed. Blättch. d. *corona staminea* scheint doppelt).
- Diplomeris** D. Don (Orchideen, XX. 1) „Doppelstück“, -lippe (s. v., *μερίς* od. *μέρος* Stück, Teil — d. Antherenschnäbelchen m. 2 fleisch. Fortsätzen), s. *Diplochilus* Lindl.
- Diplomitrium** (-on) Corda (Lebermoose, XXIV. 2) „Doppelmützchen“ (s. v., *μυτρίον* dem. v. *μίτρα* Mütze, Haube etc. — scheint dopp. vorhand.).
- Diplopappus** DC. (Compos. Solidagineen, XIX. 2) „Doppelpappus“- od. Mantelaster, Feinstrahl (s. v., *pappus* Samenkronen — diese einbis mehrreihig), *D. annuus* DC., s. *Stenactis* ann. Nees (Bellis ann. L.).
- Diplopetis** Endl. (Sapindaceen, XXIII. 1) „Doppelschild“ (s. v., *πέλις* klein. Rundschild — Blütenscheibe in eine Schuppe ausgehend).
- Diploprion** Viv. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) „Doppelsäge“ (s. v., *ποίον* Säge — beide Hülsenränder runz. od. stachlig), *D. medicagionoides* Viv., s. *Medicago* *Ibyca* Spr.

- Diplostephium** DC. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Doppelkranz“-Aster (s. v., στεφλίον dem. v. στέφος i. q. στέφανος; Kranz — Pappus inn. u. aussen borstig), Zier. D. amygdalinum Cass. (Canada) etc., s. Aster L.
- Diplotaxis** DC. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Doppelreihe“, -samen, s. g. Rampe (Rempe) (s. v., τάξις Reihe — dopp. Reihe Samen in jeder Schote!), D. tenuifolia DC. (Wegunkr.), muralis DC., etc.
- Diplothemium** Mart. (Palmen, XXI. 6) „Doppelscheide“ (s. v., θημῶν Haufen etc. — d. Brakteen schliessen je 2 männl. Blüten ein, einhäus. Blüten an dems. Kolben, aber mit dopp. Scheide), D. maritimum Mart., s. Cocos arenaria Gomez „Sand-Kokospalme“.
- Diplusödon** DC. (Lythrarieen, XI. 1) „Doppelzahn“-Weiderich (s. v., ὀδῶν Zahn — 6 äuss. u. 6 inn. Kelchzähne), D. buxifolium DC.
- Dipösis** DC. (Umbelliferen, V. 2) „Doppelgeliebter“ (δι- u. πόσις. -εος; Geliebter — Pfeiffer: d. Seitenblüt. männl., d. inner. weibl.!), D. Bulbocastanum DC. „Erdkastanie“, etc., s. Hydrocotyle saniculifol. Lam.
- Dipsacæe** Juss., DC., -acæe Græk., fr. dipsacées Karden (Caprifoliacæe Dipsacæe Rchb.).
- Dipsacus** T. (Dipsaceen od. Aggregaten, IV. 1) Kardendistel, Karde, fr. chardon od. cardère, e. fuller's-weed, tazel (-sel) (gr. δίψακος v. δίψωω dürste — sammelt in d. Blattachseln Wasser, daher auch fr. bain de Venus „Venusbad“), Cultur: D. fullönun L. Weberkarde, fr. chardon à bonnetier (- à foulon), cardère des foulons, e. fuller's-thistle (-weed), wild D. sylvestris L. (-ster Huds.) gem. Karde, fr. cardère des bois, e. shepherd's-rod „Schäfer's-Rute“, tazel (-sel) (D. Fullonum var. a L.).
- Diptera** Borkh. (Saxifragac., X. 2) „Zweiflüglerin“ (δι- u. πτέρων Flügel, δίπτερος zweiflüglig — weg. d. 2 Kronblätter!), Ampelpfl. D. sarmentosa Borkh. (Saxifraga s. L.) s. g. Judenbart.
- Dipterix** s. Dipteryx.
- Dipterocarpeæ** Blum., DC. (Tiliacæe Dipteroc. Rchb. u. Ochnacæe DC.) (zu Ord. Columniferae Bartl.) „Zweiflügelnuss“-Gew., s. sogl.
- Dipterocarpus** Roxb. (Tiliac. Dipterocarpeen od. Ochnaceen, XIII. 1) „Zweiflügelnuss“ (δίπτερος zweiflüglig, καρπός Frucht — diese von 2 Flügeln gekrönt).
- 1) **Dipterygia** Presl (Umbellifer., V. 2) „Doppelflügelfrucht“-Dolde (δι- u. πτέρωξ. -γος Flügel). 2) **Dipterygium** Decsn. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Zweiflügelschötchen“ (δι-, πτερόγυιον dem. v. πτέρωξ, Flügelchen), z. B. isaticarpum Decsn. „waidfrüchtiges“.
- Dipteryx** (-ix) Schreb. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) „Doppelschwinge“, Tongabohnenbaum, D. Tonga Schreb. (δι- πτέρωξ Flügel — nämll. d. beid. ober. Kelchzipfel, wie Flügel!), s. Barosma Tonga W., Pers.
- Ditychocarpus** Reg. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Zweifaltenfrucht“ (δι-, πτύχη Falte, καρπός), D. hispīdus Reg., s. Chorispōra DC. u. Raphānus L.
- Dirca** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Quellenseidel“, Leder-, Blei-, Ceder- od. Sumpfhholz (n. der Dirce od. Dirca, Gemahlin d. Königs Lycus v. Theben u. Quelle bei Theben, Myth. — Pfl. im Wasser wachs.), D. palustris L., fr. Dirca des marais, bois de plomb (- de cuir, - des Canadiens).
- Dircaea** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Quellenblume“ (s. eb.), Stuben D. Cooceri Decsn., bulbosa m. v. lateritia, u. D. refulgens Van Houtt., s. Gesneria bulbosa autt.
- Disa** Berg., L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Grossblume, Nass-O. (v. δῆισα Nässe? Wtst. Name d. Pfl. am Cap!), D. grandī- s. uniflōra

- Berg. (*Satyrium grandifl.* Thb.), *barbata* Sw. (*Satyr. barbata* Thb.), *longicornis* Thb., etc., s. *Schizodium* Lindl., *Orchis* L., etc.
- Disaccium** DC. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Zweisack“-Senf (*δί- σακ-ζίον* Säckchen — 2 Kelchblätt. an d. Basis sackförmig), s. *Sināpis* T., L.
- Disandra** L. (Scrophularineen, VII. 1) „Einmannblume“, „Wechselmannbl.“ (v. *δείς* einer, während *οὐδείς* keiner, *ἀνῆρ*, -*ῥδοος* Mann, Staubgef., Paxton u. Wtst. Wechsel in d. Zahl, schlimm zu zählen, (wechs. v. 5—8), also *δὺς* miss-, schlimm — daher richtiger *Dysandra*!), Ampelpfl. *D. prostrata* L., s. *Sibthorpia peregrina* Bot. Mag.
- Discanthae** Endl., Kl. d. „Scheibenblütigen“ (*δίσκος* lat. *discus* u. *ἀνθή* od. -*ος* Blüte): *Aralien*, *Umbelliferen*, *Ampelideen*, *Cornellen* u. *Loranthaceen*.
- Dischidia** R. Br. (Asclepiad. *Ceropegieen*, V. 2) „Spalt“-Wachspfl. (*δισχιδής* gespalten — d. *corona staminea* zweiteilig), *Warmh.* *D. Raflesiana* Wall. (B.-Schmarotzer m. merkw. Anhängseln!), s. *Colyris* Vahl u. *Leptostemma* Blum.
- Discoactus** Miq. (Cacteen, XII. 1) „Scheibencactus“ (*δίσκος* lat. *discus* Scheibe), s. *Echinocactus* Salm-Dyck.
- Discomycetes** Fr. „Scheibenpilze“ (s. eb. u. *μύκης*, -*ητος* Pilz).
- Disparāgo** G., DC. (Compos. *Seriphieen*, XIX. 6) *Sommerflockenblume* (v. *dispar* ungleich — Wtst.: *Anthodium* mit nur 2 Blüten, eine zungenförmige u. eine röhrlige!), s. *Seriphium* s. *Centaurea solstitialis* L.
- Dispēris** Sw. (Orchideen *Arethuseen*, XX. 1) „Doppelsack“-O. (*δεις* zweimal, doppelt, *πίρα* Sack, Tasche etc. — d. beid. Pollenmass. m. entfernten Beutelchen), *D. purpurata* Rchb. f., *alata* Lab. etc., s. *Arethusa* Sw.
- Dispōrum** Salisb. (Melanthaceen, VI. 3) „Zweisamen“ (*δί-*, *σπορά* od. -*ος* Same — jedes der 3 Fächer hat 2 Samen).
- Dissōlēna** Lour. (Apocynen, V. 1) „Doppelscheide“ (*δεις*, *σωλήν* Scheide — Krone doppelröhrenf.), *D. verticillata* Lour., s. *Cerbera chinensis* Spr.
- Disteganthus** Lemaire (Bromeliac., VI. 1) „Doppeldeckblume“ (*δί-*, *στέγη* Decke etc. *ἀνθος* Bl.), *D. basilateralis* Lem.
- Distemma** Lab. (Passifloreen, XX. 4) „Doppelkranz“ (*δί* u. *στέμμα* Kranz — Zusammensetz. d. Blume!), s. *Passiflora* L. u. *Muricuja* T., z. B. *D. coccinea* DC. (Neuholl.), *Hahnii* Fourn. (Mexiko) etc.
- Distylis** Gaud. (Campanulac. *Goodenoviaceen*, V. 1) „Doppelgriffel“ (*δί-*, *στυλις* Griffel — zwei unten verwachs. convergente Griffel), z. B. *Berardiana* Gaud.
- Distylium** Sieb. u. Zucc. (Hamamelideen, IV. 2) *Zwei-* od. *Doppelgriffel* (s. eb.), *D. racemosum*, s. *Hamamelis* rac. S. Z. (Japan).
- Ditmaria** Spr. (Myrobaleen od. *Vochysiaceen*, I. 1) „Ditmarie“ (n. d. Senator *Ditmar* in Rostock, s. d. Aut.), *D. floribunda* Spr. etc., s. *Erisma* Rudg. u. *Debraea* R. u. Sch.
- Diūris** Sm., R. Br. (Orchideen, XX. 1) „Doppelschwanz“ (*δί-*, *οὐρά* Schwanz — *Columna* m. 2 schwanzart. Seitenlappen).
- Dodartia** L., Mill. (Scrophularineen, XIV. 2) „Dodartie“ (n. d. alt. Bot. F. *Dodart*, schr. *Mémoires pour servir à l'hist. d. pl.*, 1676), s. *Anarrhinum bellidifolium* W. (*Linaria odorata* *Dodart*, *Timbuleta* Forsk.).
- Dodecadenia** Nees (Laurineen *Tetranthereen*, IX. 1) „Zwölfdrüsen“-*Topflorbeer* (*δώδεκα* zwölf, *ἀθήν.* -*ενοος* Drüse — Krone u. Kelch zwölfteilig), *D. grandiflora* Nees.
- Dodecandria** L., Kl. der „Zwölfmännigen“ (XI. Kl.) (s. eb., *ἀνῆρ*, -*ῥδοος* Mann, Staubgefäss).
- Dodëcas** L. (Myrtaceen, XI. 1) „Zwölfaden“ (*δωδεκάς* Zahl Zwölf — so viel Staubfäden!), *D. surinamensis* L. (Str.).



- Dodecathëon** L. (Primulaceen, V. 1) „Zwölfgötterblume“, Göttergabe M.-Rchb., fr. giro selle (gyr.-), douze-dieux, e. cow's-lip „Kuhlippe“ (eig. δωδεκάθεος von den 12 Göttern einer), Zier. D. Meadia L. virgin. G. (für mea dea meine Göttin), fr. gir. de Virginie, e. virginian cow's-lip, m. v. v., integrifolium Mchx., etc.
- 1) **Dodonaea** L. (Sapindaceen, VIII. 1) „Dodoensbaum“ (n. Dodoens, lat. Dodonaeus, aus Mecheln, Leibarzt Kaiser Maximilian's I., † 1585), D. viscosa L. (Ptelea visc. L.), s. Staphylo dendron Pluk. u. Thlaspidioides arborecens Barrere. — Dodonaeaceae H. B. K. (sc. Sapindaceae Juss., Ord. Malpighiinae Bartl. 2) **Dodonaea** Plum. (Anacardiaceen, III. 1) (s. Ilex Dodonaea L. f.), z. B. angulosa W. u. ilicifolia L., s. Comocladia L.
- Doellingeria** Nees (Compositen) „Döllingerie“, z. B. scabra Nees (n. d. Landshut-Münchener Anatomen J. Döllinger, Wtst.: Th. Döllinger, Reis. am Senegal u. 1836 mit A. v. Nordmann am Kaukasus, † in Moskau).
- Dolichonema** Nees (Sapotaceen od. Cassieen, X. 1) „Langfaden“ (δολιχός lang, νήμα Faden etc. — einer d. Staubfäd. sehr lang u. unfruchtbar.), D. speciosa Nees, s. Moldenhawera floribunda Schrad. u. Bowdichia speciosa Spr.
- Dolichos** G., L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) Fasel-, Soja-, Gewürzbohne, fr. dolique, e. bonavist (s. eb.), Gärt. D. Lablab L., fr. dolic od. haricot d'Égypte, D. urens L. Teufelsbohne, fr. œil-od. yeux-de-bourrique, D. pruriens L. (Phaseolus americanus Pluk.), fr. pois à gratter od. pouilleux „Kuhkrätze“ Wolff, s. Strizolobium P. Br.
- Doliocarpus** Rol. (Ranunculac. Delimeen, XXII. 12) „Fassfrucht“ (lat. dolium Fass, κασιός Fr. — diese eine einf. ein- bis zweisamige Beere), D. Rolandi, s. Tetracera Doliocarpus W.
- Dolomiaea** DC. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Dolomieu“-Distel (n. d. Geologen Dolomieu, † 1801 in Paris), D. macrocephala DC.
- Dolophyllum** Salisb. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Trugblatt“ (δόλος lat. dolus Trug etc., φύλλον Blatt), s. Thuja.
- Dolophragma** Fenzl. (Caryophylleen, X. 2) „Trugwandkapsel (s. eb., φράγμα Wand, Scheidewand — die Klappen d. Kapsel tragen mitten nur halb d. Wände).
- 1) **Dombeya** Cav., Boj. (Geraniac. Dombeyaceen, XVI. 5) „Dombeye“ (n. Jos. Dombey aus Macon, † 1795 in engl. Gefang.), D. umbellata u. viburnifolia Boj. — Dombeyaceae Kth. 2) **D.** lappacea l'Hér. (Bignoniaceen, XIV. 2), s. Tourretia lapp. 3) **D.** chilensis Lamb. (Coniferen, XXI. 9), s. Araucaria imbricata Pav.
- Donatia** Forst. (Saxifragac. od. Paronychieen, III. 3) „Donatie“ (n. d. venetian. Bot. Donati), D. fascicularis L. (Str.), s. Polycarpon magellanicum L.
- Donax** P.-B., L. (Gramineen, III. 2) Pfahl- od. Pfeilrohr, Klarinetten-R. Lauche (gr. δόναξ od. δῶναξ v. δονέω od. -νάω schwanke umher, Wtst.), D. arundinaceus P.-B., s. sativus Lam., s. Arundo Donax L. (D. Dioscoridis Bauh. u. β indica, D. laconica versicolor Moris.).
- Dondia** Spr. (Araliaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Dondie“, Sterndolde (n. d. franz. Bot. Dondie Duprée, Wtst. n. Jacopo di Dondie, † 1385, schr. promptuarium medicinae etc.), D. Epipactis Spr., s. Hacquetia Neck. od. Dondisia M.-Rchb. (Astrantia L.) Epipactis.
- Dondisia** M.-Rchb., s. Dondia.
- 1) **Donia** autt. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Donblume“, deutsche Flagge (n. d. Bot. Gebr. Don, s. d. Aut.), s. Clanthus Sol. 2) **Donia** Hook., Nutt., Less. (Compos. Astereen, XIX. 2) Don's-Aster, D. ciliata Hook. (Grindelia cil. W.), D. glutinosa R. Br. (Grind. gl. W.).

- 3) **Donia** R. Br. (Polygoneen Oxyrideen, VI. 2), *D. sapida* R. Br., s. *Oxyria digyna* Cambd. (Rumex d. L.).
- 1) **Doodia** R. Br. (Farne, XXIV. 1) „Doody's“-F. (n. d. Lond. Apoth. Sam. Doody), *D. caudata* R. Br., s. *Woodwardia c.* Sm. 2) **Doodia** Roxb. (Portulacac., X. 1).
- Doratolēpis** Benth. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Speerschuppe“, s. *Podolēpis* Lab. „Stielschuppe“ (v. *δόρου*, -ατος Speer, *λεπίς* Schuppe — Schuppenform d. Anthodiums!).
- Dorēma** D. Don (Umbelliferen, V. 2) Ammoniakpfl. Leun., Gummidolde (gr. *δώρημα* Geschenk? wahrsch. *δόρου* Schaft — lange, schlanke Stengel), *D. ammoniacum* Don, e. gum-ammoniac.
- 1) **Doria** Ad. (sc. Senecio) L. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Doria“-Baldgreis (n. d. alten Dogen v. Genua, Andr. Doria — weg. d. w. Pappus!), s. *Jacobaea Doria* Fl. Wett. hohes Kreuzkraut (Greiskr.). 2) **Doria** Thb., Less. (Compos. Senecionid., XIX. 2), s. *Cineraria alata* u. *bipinnata* W. (Wtst.: v. d. franz. doré goldfarb. — Blütenfarbe?).
- Doritis** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Spiess“- od. „Lanzen“-O. (nicht v. *δοῦντις*; Preis b. Wettspiel, sond. v. *δόρου* Lanze — Labell spiessförmig dreilappig), *D. pulcherrima* Ldl. (Cochinch.).
- 1) **Doronicum** T., L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Gemswurz, fr. doronic, tabac des Vosges (n. Linné v. *δόρον* Gabe u. *ρίζη* Sieg od. n. Vaillant v. d. arabischen *doronigi* — z. Tödtung wilder Tiere!? Wtst.), Garten: *D. caucasicum* M. B., fr. d. du Caucase, e. caucasian leopard's-bane u. *Pardalianches* W. (s. d.). 2) **Doron.** (sc. Senecio) L. Gebirgs-Kreuzwurz M.-Rchb.
- Dorstenia** Plum., L. (Urticaceen Artocarpeen, IV. 1) „Dorstenie“, fr. dorstène (n. Theod. Dorsten, Prof. zu Marburg, † 1539), *D. Contrayerva* L. peruan. Giftwurz, Bezoar- od. Schlangenzwurz, fr. u. e. *contrayerva*, s. *Drakena radix* Clus., *D. caulescens* L. (*Parietaria racemosa* Plum.), *D. radiata* Lam. (Kosaria Forsk.).
- Dortmannia** Don (sc. Lobelia) L. (Lobeliaceen, V. 1 od. XIX. 6) Wasser-Lobelia M.-Rchb. (n. d. Gröninger Apoth. Dortmann ben.).
- Doryanthes** Corr. (Amaryllideen Agaveen, VI. 1) „Speerblume“ (*δόρου* Speer, *άνθη* Bl. — langer lanzenf. Schaft!), *D. excelsa* R. Br., *D. Palmeri* W. Bull etc.
- Doryenium** T., Mch. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) Backenklee Leun., „Spiess“- od. „Speerklee“ (gr. *δορύχνιον* Diosc. v. *δόρου* Speer — z. Vergift. d. Speere diente *Convolvulus Doryenium* L.); *D. suffruticosum* u. *herbacum* Vill.
- Doryopteris** Sm. (Farne, XXIV. 1) „Speerfarn“ (v. *δόρου*, -ατος u. -ατος Speer, *πτερίς* Farn — spiessf. Wedel!), Zier. *D. collina* Raddi (Bras.), *sagittifolia* Sm., *palmata* Sm. etc. (das.).
- 1) **Doryphora** Rchb. f. (zu *Cephalanthera* Rchb.) (Orchideen, XX. 1) „Speerträgerin“ (s. v., *φορέω* tragend). 2) **Doryphora** Endl. (Laurineen Monimieen, XXI. 3) (— langlanzettl. Perigonlappen), z. B. *D. sassafras* Endl. (Neuholl.).
- Dothidēa** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Geschwür“- od. Dürripilz (v. *δοθύν* od. *-θύνων* Geschwür u. *εἶδομαι* gleiche — braune Farbe u. Gestalt wie ein solches), s. *Asterōma* DC. — *Dothideaceae* DC.
- 1) **Douglasia** Lindl. (Primulaceen, V. 1) „Douglas“-Primel (n. d. schott. Bot. u. Reis. in Californien 1834, David Douglas). 2) **Douglassia** Schreb. (Laurineen, VI. 1), s. *Laurus hexandra* Sw. 3) **Douglassia** Houst. (Viticeen, XIV. 2) = *Clerodendron* s. *Volkameria fragrans*.
- Draba** L., DC. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Hungerblümchen, fr. drave (gr. *δράβη* Diosc. = *Lepidium Draba* L., eine bittere Pfl.), *D. verna*

- L., fr. mignonette, Zier. *D. aizoides* L., *D. repens* M.-B., fr. dr. rampante, e. creeping *Draba* (Sibir.).
- Dracaena** L. (Liliac. Smilaceae od. Asphodeleen, VI. 1) „Drachenbaum“, fr. dracène (gr. *δοράκαινα* weiblicher Drache — d. blutrote Saft = Drachenblut!), *Dr. Draco* L. echter Dr., s. g. Drachenblut, fr. dracène od. dragonnier (bois-de-chandelle), e. dragoon's-blood (*Dr. reflexa* autt.), Zier. *ensifolia* Wall., fr. reine des bois, *D. Aubryana* A. Br. (leichtblüh.), *D. terminalis stricta* Hort. rotstreif., *D. marginata* Lam., *rubra* (rotbeerige), Warmh. *Dr. (Charlwoodia) congesta*, (*Dracaenopsis*) *australis*, (*Dianella*) *indivisa* spitzschilfbl., v. *bruno-lineata* Hort., v. *brun.-lin.-latifolia*, (*Cordylina*) *Haageana* breitblättr., *Moo-reana* br. carmin., etc.
- 1) **Draco** (sc. *Dracaena*) L. (Liliaceen, VI. 1) gem. Drachenbaum (s. eb.).  
 2) **Draco** (sc. *Pterocarpus*) Jacq. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) Drachen-Flügelfruchtbaum (*draco* Drache).
- Dracocephalum** L. (Labiaten, XIV. 1) „Drachenkopf“, fr. dracocéphale, tête-de-dragon, e. dragoon's-head (gr. *δοράζων* u. *ζεγαλή*) Kopf), Garten *D. moldavicum* L., fr. moldavique, *canescens* L., *grandiflorum* L., *argunense* Fisch.
- 1) **Dracontium** L. (Aroideen, XX. 9) „Drachenwurz“, fr. draconte, e. dragon's-wort (v. *δοράζων*, -*οριος* Drache — Stengel fleckig wie Schlangenhaut!), z. B. *pertusum* L. = *Philodendron pertusum* Kth. s. g. Baumwürger. 2) **Dr.** (sc. *Arum*) L. kleiner Aron M.-Rchb.
- Dracopis** DC. (zu *Rudbeckia* Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Drachenaugen“ (s. v., *δράκος* Gen. v. *ὄψ* Auge, Gesicht), Zier. *D. amplexicaulis* Cass., s. *Rudbeckia ampl.* Jacq.
- 1) **Dracunculus** T. (sc. *Arum*) L. (Aroideen, XX. 9) „Drachenwurz“, fr. draconcule od. serpentinaire (dem. v. *draco* Drache). 2) **Drac.** Bess. (sc. *Artemisia*) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Dragun-Beifuss, Esdragon, fr. estragon od. herbe-au-dragon (— Wurzel schlangenartig gewunden).
- Drakaea (-keä)** Lindl. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Drake's“-O. (n. Franz Drake, d. Erdumsegler unter Königin Elisabeth v. England), *D. elastica* Van Houtt., s. *Arethusa* Sw.
- Drepanocarpus** F. W. Mey. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) „Sichelhülse“ Kino od. senegalsches Santelholz (*δορεϊάνη* Sichel, *ζαροπός* Frucht), s. *Pterocarpus* L.
- 1) **Drepanophyllum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Sichelblatt“ (s. eb., *φύλλον* Laubblatt), s. *Sium Falcaria* L. (*Critamus* F. Rchb.) u. *Falcaria Rivini* Host s. *vulgaris* Bernh. — 2) **Drep.** Rich. (Moose, XXIV. 2) „Sichelmoos“, *D. fulvum* Hook., s. *Fissidens falcifolius* Schwägr.
- Drimys** Forst. (falsch *Drymis*!) (Magnoliaceen, XIII. 4) Winterrindenbaum, fr. boique (gr. *δομύς* beissend, scharf — arom. Rinde!), *Gewächsh.* *D. Winteri* Forst. = *Wintera* Pers., *aromatica* Murr. (Chili).
- Drosanthe** Spach (Hypericineen, XVIII. 3) (zu *Hypericum* L.) Mannsblutblume (nicht v. *δοσός* der Tau, sond. *Androsæmum* u. *ἀρωγή* Bl.), *D. helianthemoides* Spach.
- Drosëra** L. (Cistineen Droseraceen, V. 5) „Sonnentau“, fr. rosée du soleil, rorelle od. herbe de la rosée, e. ros-solis u. sun-dew (v. *δοσέρος* betaut — gestielte Drüsen im Sonnenschein wie Tau), *D. rotundifolia* L. — *Droseracæe*, -*ræe* Rchb.
- Drosophyllum** Lk. (Cistineen Droseraceen, V. 5) „Taublatt“ (*δοσός* Tau, *φύλλον* Blatt — im Sinn der vorigen!), *D. lusitanicum* Lk., s. *Spergula droseroides* Brotero.
- Drummondia** DC. (Saxifragaceen, V. 2) „Drummondie“ (n. d. Pflanzensammler Thom. Drummond, † 1835 auf Cuba), *D. pentandra* DC., s. *Mutella* pent.

- Drupacĕae** DC., Seub. „Steinfrüchtler“ Leun. (drupa, gr. *δρούπια* Steinfrucht).
- Drusa** DC. (Araliaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Le Dru's“—Dolde (n. d. Reis. Bot. u. Reis. in China Le Dru, schr. voyage aux îles de Ténériffé etc., Paris 1810), *D. oppositifolia* DC.
- 1) **Dryandra** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Dryander's“—Silberbaum (n. d. schwed. Bot. Jon. Dryander), Gewächsh. *D. formosa*, *falcata* R. Br., *nobilis* Lindl., *speciosa*, *floribunda*, *nivea* etc. R. Br. 2) **Dryandra** L., Thb. (Euphorbiaceen, XVI. 4) „Dryandersbaum“, *D. cordata* L., s. *Vernicia montana* Lour.
- Dryas** L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 5) Achtauge, „Dryade“ od. Waldgöttin Vilm., Silberkraut, Hirsch- od. Silberwurz, fr. *dryade* u. *chênette*, e. mountain-Avens (*Λοιάς*, -*άδος* Baumnymphé od. Dryade, v. *δρῦς* Eiche — Blattähnlichk.), Zier. *D. octopetala* L. (Alp.), fr. *dryade à huit pétales*, e. eight-petaled-m.-Av. — *Dryadæa* Vent.
- Drymaria** W., DC. (Paronychieen, V. 3) „Waldknorpelblume“ (v. *δρῦμός* od. -*ov* Eichwald — sehr verbreitet wachsend, wie ein kleiner Wald, Wtst.), *D. cordata* Kth., s. *Holostëum cord.* L. (*Loeflingia renifolia* Lag.) etc., s. *Illecebrum* T.
- Drymōda** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Waldorche“ (*δρῦμῶδης*; waldig — auf Waldbäumen), s. *Epidendron* L.
- Drymonia** Mart. (Gesneriac. od. Bignoniac., XIV. 2) Wald- od. Zartgesnere (*δρῦμόνιος* adj. v. *δρῦμός* od. -*ov* Eichwald, Wtst. v. *δρῦμός* (?) zart, fein — zarter Klímmstrauch!).
- Drymophila** R. Br. (Sarmentaceen, VI. 1) „Waldlieb“ (s. eb., *φιλος*, -*η* Liebhaber, -berin), *D. cyanocarpa* R. Br. (Neuholl.).
- Drynaria** (bess. **Dryaria**) Bory St. Vinc. (Farne, XXIV. 1) „Baumfarn“ (v. *δρῦς*, -*ίος* (nicht *δρῦρός*), Baum; ähnl. Fehler in d. Entomologie *Drynobia* st. *Dryobia*, „Wald-Eichenglucke“), *D. coronans* Bory, *morbillosum* etc., s. *Psygium* Presl s. *Polypodium* L.
- Dryobalanops** G. f. (Tiliac. od. Laurineen, Dipterocarpeen, XIII. 1) Flügeleiche od. Kampherölbaum (*δρῦς*, -*ύος* Eiche, *βάλανος* Eichel, *ὄψ* Gesicht — Frucht wie eine Eichel in einem Becherkelch), *D. aromatica* G. f., s. *Dryobalanus* auct.
- Dryopelia** (-*ėja*) A. P.-Thouars (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Baum“-O. (s. v., *ὄπλω* schaue — Baumschmarotzer!), *D. discolor* u. *oppositifolia* P.-Th.
- Dryopteris** Sm. (Farne XXIV. 1) „Eichenfarn“ (s. v., *περίς*; Farn), s. *Polypodium Dryopteris* L. Eichen-Tüpfelfarn Leun.
- 1) **Duchesnea** Sm. (-*nia*) G. Don (Rosaceen Sanguisorbeen, XXI. 8) „Duchesne's“—Erdbeere (n. d. Bot. Duchesne, schr. Hist. des Fraisières, Par. 1766), *D. fragiformis* Sm., s. *Fragaria india* Hort. 2) **Duchesnia** Cass. (Compos. Inuleen, XIX. 2), s. *Francoeuria* DC.
- 1) **Dudaïm** (sc. Cucūmis) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Apfel-Melone, „Dudaïm-Gurke“ (*Dudamia* Beckm.), s. *Cucūmis Melo* var. *Dudaïm* Naud. (*Cucumis odoratissimus* Mnch. s. *pictus* Jacq.) (hebräisch. Bibelwort nicht bekannter Bedeutung). 2) **Dudaïm** ♂. Frank (Solaneen, V. 1) Alraun = *Mandragōra officinalis* Mill.
- Dugaldea** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Dugald's“—Blume (n. Dugald Stewart, schott. Philos., † 1828).
- Duhaldĕa** DC. (Compositen) „Duhald's“—Blume, *D. chinensis* DC. (n. d. Reis. J. B. Duhalde, Beschr. v. China, Mitte des 17. Jahrh.'s.).
- 1) **Duhamelia** Pers., Domb. (Contorten od. Sapotac. Lucumeeen, V. 1) „Duhamelië“ (n. d. franz. Bot. Duhamel du Monceau, † 1782), *D. ventricosa* P., *D. Manglilla* Domb., s. *Bumelia Manglilla* W. u. *Hamelia* Jacq. 2) **D.** Pers. (Rubiaceen, IV. 1).

- Dulacia** Neck. (Myrobalaneen, XII. 1) „Dulac's“ od. Moquillo-Mandel, s. Moquilea Mart., Zucc. od. Acia Schreb. (Acioa Aubl.) (n. Franz Alleon Dulac).
- Dulemāra** Mnch. (sc. Solanum) L. (Solaneen, V. 1) „Bittersüss“, Alp- od. Wasserranke, Saurebe, Stickwurz, Seidelbeere, fr. douce-amère, morelle, loque, vierge, vigne de Judée, e. bitter-sweet, woody-night-shade „holziger Nachtschatten“ (dulcis süß, amārus bitter).
- Dulichium** Pers. (**Dulcichium**) Rich. (Cyperaceen, III. 1) „Doulichion“ Riet (n. d. echnadischen od. jonischen Insel *Δουλίχιον* Homer, od. dulcis süß — so schmeck. Wurzel), D. canadense Mchx., spathacēum Pers. (Cypērus spath. W.).
- 1) **Dunalia** Hb., Bpl., Kth. (Solaneen, V. 1) „Dunal's“-Strauch (n. d. franz. Bot. Dunal), D. solanacēa Hb., Bpl. (südam. Str.). 2) **D. Spr.** (Lythraieen, VI. 1), tuberosa Spr., s. Peplis tetrandra L. 3) **D. R. Br.** (Labiaten).
- Duperreya** Gaud. (Solaneen od. Convolvulaceen, V. 1) „Duperrey's“-Strauchwinde (n. d. Bot. u. Reis. Duperrey, s. d. Aut.), D. sericēa Gaud. (Hstr.).
- Duranta** L. (Viticeen, XIV. 2) „Durante“-Müllen (n. d. Arzt u. Bot. Castor Durante, † 1590), Warmh. D. Bonardi, Plumieri L. s. spinosa (Castorēa racemosa Plum.) u. Ellisia L. (Str.).
- Durio** Rumph., L. (Sterculiaceen, XVIII. 3) Kürbisfruchtbaum, ind. Zibethbaum Leun., fr. durion, D. zibethinus L. (v. duryon, dem malayischen Nam. d. Frucht).
- Duris** Juss. (Capparideen, XIII. 1) Baumkapper (*δοῦρον* od. -ρα Baum).
- Duroia** L. f. (Rubiaceen Guettardeen, VI. 1) Waldcacao, Marmeladendosen-Baum (u. d. franz. Bot. Duroi), D. Eriopila L. „Wollhaar“-Cacao (Cacao sylvestris Aubl.), s. Genipa Merianae Pers.
- 1) **Duvalia** Haw. (Asclepiadeen, V. 2) „Duval's“-Wachspfl. (n. den Botanikern Duval, s. d. Aut.) D. compacta Haw., s. Stapelia replicata Jacq. 2) **Duvalia** Nees (Lebermoose, XXIV. 2), D. rupestris Nees, s. Marchantia hemisphaerica L.
- Duvaua** Kth. (Terebinthac. Anacardieen, XXII. 9) „Duvau's“-Nierenbaum (n. d. franz. Freunde Kunth's Duvau), s. Amyris polygama Cav. (Schinus dependens Ortega).
- Duvernoya** Desf. (Lythraieen, XI. 1) „Duvernoy's“-Kelchhocker (n. Duvernoy, schr. Fl. v. Tübingen, 1722), s. Cuphea Jacq.
- Dyckia** Mart., Schult. (Bromeliaceen, VI. 1) „Dyck's“-Ananaspfl. (n. d. Fürst. Salm-Dyck, Gönner d. Bot.), D. frigida Hook. f., s. Pourretia frig. Hort. Lind.
- Dypsis** Nor. (Palmen, XXI. 8) „Tauchpalme“ (v. *δύπτω* tauche unter — steht im Wasser, Kolben in nur oben offenen Scheiden), D. pinnatifrons „fiederwedelige“, s. Areca gracilis Thouars.
- 1) **Dysodēa** Pers. (**-dia**) Cav., Lag. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Stinkblume“ (*δυσωδής* übelriechend), D. glandulosa Less., s. Boebēra W. 2) **Dysodēa** Pers. (**-da** Lour.) (Rubiaceen, Cinchonaceen, V. 1), s. Serissa Commel. 3) **Dysodēa** foetida (Disodea f.) autt. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1), s. Crepis foet. L. (Barkhausia f. DC., Hieracium f. Karsch).
- Dysophylla** (nicht **Disoph.**) Blum., Benth. (Labiathen, XIV. 1) „Stinkblatt“ (s. eb. st. Dysodophyllum v. *δυσωδής* u. *φύλλον* Blatt), D. strigosa Benth. (Ostind.), s. Mentha.
- Dysoxylon** Blum. (Hesperid. Meliaceen, X. 1 od. XVI. 5) Riech- od. „Stinkholz“ (v. *δυσούζω* rieche übel, od. *δυσωδής* s. v., *ξύλον* Holz), D. alliaceum Blum., s. Trichilia alliacea Forst.

- Earīna** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Frühlings“-O. (ἐαφ, -φος Frühling — blüht im Sept. u. Okt., d. Frühlg. Neuholl.'s), z. B. E. Deplanchéi Rehb. f.
- Ebelia** Rehb. (Rubiaceen, IV. 1) „Ebelie“ (n. W. Ebel, schr. de Armeriae genere, Königsb. 1840).
- Ebenacēae** Juss., DC. (zu Ord. Styracīnae Bartl.) „Ebenholz bäume“.
- Ebenoxylon** Lour. (Sapotac. od. Lucumeen, XXIII. 2) Ebenholz v. Cochinchina, fr. ébénoxyle, s. Diospýros Ebēnum L.
- Ebēnum** Kön., L. f. (sc. Diospýros) L. (Sapotac. od. Lucumeen, XXIII. 2) Schwarzholz = Lotus, Schwarzholzkern, echtes „Ebenholz“ W. (Ἐβερως Theóphr., hebr. eben, arab. abnous Stein!).
- 1) **Ebēnus** L. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) Ebenholz, Schwarzholz, E. cretica L., fr. ébène (-nier), e. ebony-tree (eben-, ebon-) (gr. Ἐβερως Theóphr., lat. ebēnus, arab. abnous). 2) **Ebēnus** (sc. Maba) Spr. (Ebenaceen, XXII. 8) gem. Ebenholz (Ebēnus vulgaris Roxb.). 3) **Ebēnus** (sc. Aspalathus) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Ebenholz = Dornhülsenbaum, s. g. Rhodiserholz. 4) **Ebēnus** Comm. (Lucumeen od. Mimusopeen, VIII. 1).
- Ebulum** Pont., Grck. (-us) (sc. Sambūcus) L. (Caprifoliaceen, V. 3) Zwerghollunder, Attich od. Eppich, fr. aubier (obier), petit sureau, sureau aquatique, e. danewort, dwarf- od. marsh-elder (lat. ebulum od. -lus Eppich — viell. von εἶδ u. βουλῆ Rat — n. Plinius als Mittel geg. allerlei Übel), E. humile Grck. s. Samb. Ebulus L.
- Ecastophyllum** P. Br. (Hecast.-), H. B. K. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 4) „Einzelblatt“ (ἐκαστος, lat. singulus einzeln, γύλλον Bl.), E. frutescens P. Br., s. Pterocarpus s. Hedysarum Ecastoph. L.
- Ecballion** Koch (-um Rich.) (Cucurbitac., XXI. 10) „Spritz“- , Vexier-, Eselsgurke (v. ἐκβάλλω werfe heraus — näml. bei Berührung die Samen!), E. agreste Rehb. s. Momordica Elaterium L. (Ecballium Elaterium Rich.).
- Eccilia** Fr. (Hutpilze, XXIV. 4) Hohlstiel P. Kumm. (v. ἐκκοιλῆνυ höhle aus), z. B. calophylla, griseo-rubella Fr. etc., s. Agaricus L.
- Eceremocarpus** Rz., Pv. (Bignoniac., XIV. 2) „Hängfrucht“, Schönrebe Rmpl. (v. ἐκκρέμαμαι hänge herab, ζασπός Fr.), E. scaber R. P., rauhrüchtig, fr. Bignone du Chili, e. rough-podded Ecer. (Wand-Decor.), s. Calampēlis scabra Don.
- Echeandia** Orteg. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) „Echeandie“ (n. Greg. Echeandia, Prof. in Saragossa), E. terniflora Ort. s. Conanthera Echeandia Pers.
- Echeveria** DC. (Crassulaceen, X. 5) „Echeveri's“-Dickblatt (n. Echeveri, Wtst.: Echever, Zeichner d. Fl. Mex., in Mexiko), Gärt. secunda Lindl. m. v. glauca, metallica Nutt., coccinea DC., fulgens Lem., Stuben: retusa Lindl., campanulata, etc., s. Cotyledon L.
- Echinacēa** Mch. (zu Rudbeckia Rehb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Stachelkopf“- od. Purpur-Rudbeckie (v. ἐχίνος Igel), Zier. E. purpurea Mch. s. serotina DC., s. Rudb. purp. L. s. hispida Hoffm.
- Echinanthriscus** Lantzius-Beninga (Umbellifer., V. 2) „Stachel-Klettenkerbel“ (s. eb. u. Anthriscus), E. vulgaris Lantz. s. Anthriscus vulg. Pers. (Scandix Anthr. L.).
- Echinaria** Desf. (zu Sesleria Rehb.) (Gräser, XXIII. 1) „Stachel“- od. „Igelgras“ (s. v. — Kronspelz. eingeschnitten, lang, steif u. rauh), E. capitata Desf. s. Sesleria echinaria Schrad. s. Cenchrus capit. L. f.
- Echinocactus** Salm-Dyck, Lk., Otto (zu Cactus Rehb.) (Cacteen, XII. 1) „Stachel“- od. „Igel“-Cactus (s. v.), Topf. E. Ottonis Lehm., Scopa Lk., Otto „Besen“-C., Linkii u. corynodes „kolbiger“, mammillosus Lem., Mirbelii, cylindraceus Engelm., etc.

- Echinocarpus** Blum. (Tiliaceen od. Bixaceen, XIII. 1) „Stachelfrucht“-Linde (s. v., *καρπός* — Kaps. m. auss. stachl. Klappen), E. s. Sloanea *paradisearum* F. Müll.
- Echinochlōa** P.-B. (zu Panicum L.) (Gräser, III. 2) „Stachelgras“ od. -hirse (s. v., *χλόα* od. -*ύη* Gras — Spelz. d. geschlechtslos. Blüth. stark begrannt), E. *crus-galli* „Hahnsporn“ od. Hühner-Fennich M.-Rchb., fr. *pie-de-poule*.
- Echinocystis** Torr. u. Gr., Cognx. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Stachelblase“ (s. v., *κύστις* Blase — d. kugl. aufgeblas. Frucht stachelborstig), E. *australis* Cognx.
- Echinodorus** Rich., Engelm. (Alismaceen, VI. 5) „Igelkopff“-Froschlöffel, „Igelschlauch“ (s. v., *δορός* Schlauch — Carpidieen lederart. einsamig etc.), E. *natans* u. *ranunculoides* Eng., s. *Alisma natans* etc.
- Echinolochin** Lehm. (Boragineen, V. 1) „Igelsame“, s. *Echinosperrum* Sw. (s. v., *γλωχίν* Spitze, Ecke — stachelspitz. Samen!), E. *Lappula* Lehm s. *Lappula Myosotis* Rupp. (*Myosotis Lappula* L.).
- Echinolobium** Desv. (Leguminos. Hedysareen, XVII. 4) „Stachelhülse“, *Espartette* (s. v., *λοβιον* dem. v. *λοβός* Hülse — Glied d. Hülse weichstachl., widerhakig etc.), s. *Hedysarum Onobrýchis* L.
- Echinomelocactus** DC. (Cacteen, XII. 1) „Stachel-Melonendistel“, s. *Melocactus* DC.
- Echinonyctanthus** Lem., Miq. (Cacteen, XII. 1) „Stachel-Nachtblume“ (s. v., *νύξ*, -*νιτος* Nacht, *άνθος* — nächtl. Blüten aus dorn. Höckern), s. *Echinopsis* Zucc.
- Echinopeae** (sc. Compos. Homoianthae Rchb.) „Kugeldistelartige“, s. *Echinops*.
- Echinophora** T., Col., L. (Umbelliferen, V. 2) „Stachelträgerin“, -Hülldolde, Igelklette Dietr., fr. *échinophore* (s. v., *γορός* tragend — d. ganze Pfl. hat Stacheln), E. *spinosa* L. s. *Daucus*, *Crithmum*, *Caucalis* u. *Pastinaca echinophora apula* Column.
- Echinops** L. (Compos. Echinopeen, XIX. 5) Kugeldistel, Igelkopf, Knopfwurz O. W., fr. *échinope*, *boulette*, e. *globe-thistle* (v. *έχινος* Igel u. *όψ* Ansehen), Zier. E. *ruthenicus* Fisch., *sphaerocephalus* L., *Ritro* L. glattblättr., fr. *boulette azurée*. — *Echinopsidæe* Less., DC. (-*opæe* Rchb.).
- Echinopsilon (-um)** Moq.-Tand. (Chenopodiaceen, V. 2) „Stachelhaar“ Grck. (nicht v. *ψιλός* nackt, sond. *ψίλον* dor. st. *πίλον* Feder — strahlig fünfstachel. Perigon), E. *hirsutus* Moq. s. *Salsola hirsuta* L.
- Echinopsis** Zucc. (Cacteen, XII. 1) „Stachelcactus“, „Igelgleicher“ (s. v. u. *όψις* Aussehen), *Gewächsh. E. Eyriesii* Zucc., *multiplex* Zucc., *Decaisneana* Lem. u. *Zuccarinii*, s. *Echinonyctanthus* Lem.
- Echinosperrum** Lehm., Sw. (Boragineen, V. 1) „Igelsamen“, Stachelnüsschen Seub. (s. v., *σπέρμα* Samen — dies. rauh, wie Kletten!), E. *Lappula* u. *deflexum* Lehm., s. *Myosotis* etc. L., *Wahlbg.*
- 1) **Echinus** (sc. Statice) L. (Plumbagineen, V. 5) „Stachelblatt“ (gr. *έχινος* Igel). 2) **Echinus** Lour. (*Euphorbiac.*, XXI. 9), E. *trisulcus* Lour., s. *Mappa cochinchinensis* autt.
- Echites** P. Br., L. (*Apocynen*, V. 1) „Viper“- od. „Otter“-Wachskraut, *Klammerstrauch* D., fr. *échite* (gr. *έχίτης* Otterstein u. -strauch v. *έχίς*, -*ιτος* Otter, Schlange — schlangenart. gewund. Stengel), Zier. E. *Melaleuca* u. *nutans*; E. *caudata* L. s. *Strophanthus dichotomus* DC.
- Echium** L. (Boragineen, V. 1) „Natterkopff“, fr. *vipérine*, *herbe aux vipères*, e. *adder's-tongue* od. *viper's-bugloss* (*έχίον* od. *έχίον* Otternkraut — Stengel fleckig, Wst., Staubfäd. wie Schlangenzungen vorstehend!), wild E. *vulgare* L., Zier. *creticum* L. (non Pall.) *canadischer N.*

**Eclipta** L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Fehlkrone“, Mehlblume D. (v. *ἐκλείπτουμαι* fehle — dem Samen fehlt Krone u. Flügel, Wtst.: *ἐκλείπτω* lasse aus, *ἐκλείψις* Verfinsternung, n. Rumphius Auswurf d. Sonne bei Sonnenfinsternissen nach Ausleg. d. Malayen!), *E. erecta* L. (*Cotula* s. *Verbesina alba*), s. *Micrelimum asteroides* Forst.

1) **Edgeworthia** Falcon. (Myrsineen, V. 1) „Edgeworthie“ (n. d. engl. Novellistin Miss Mary Edgeworth, † 1849), z. B. *chrysantha* Falc. 2) **Edg.** Lindl., Meisn. (Thymeläen, VIII. 1), s. *Daphne Gardneri* Wall.

**Edraianthus** DC. (Campanulaceen, V. 1) Büschelglocke Koch-Hallier (v. *ἐδραῖος* sitzend, *ἄνθος* — sitzende Blüt.), z. B. *pumila* DC. Zwerg-„Sitzblume“, *tenuifolius* u. *Kitaibelii* A. DC. (östr. Alp.).

1) **Edwardia** Salisb. (-*wardia* Raf.) (Cassieen Sophoreen, X. 1) „Edwardsie“ (n. d. Bot. S. Edwards), *E. chilensis* Miers, s. *Sophora sericea* s. *macrocarpa* Sm., *E. microphylla* Sal. (Soph. micr. Ait.) etc. 2) **Edw.** Neck. (Compositen).

**Eglanteria** (sc. *Rosa*) L. (Rosaceen, XII. 5) gelbe Rose, fr. *églantine* (-tier), e. *églantine*, s. *Rosa lutea* J. Bauh. (v. d. franz. *églantier* Hunds- od. Heckenrose).

**Ehrenbergia** Mart., Spr. (Rutac. Zygophyllen, X. 1) „Ehrenberg's“ - od. brasil. Burzeldorn (s. d. Autoren), *E. tribuloides* Mart., s. *Tribulus brasiliensis* Hort.

1) **Ehretia** L. (Boragineen od. Hydrophyllen, V. 1) „Ehret's“-Wasserblatt (n. G. Dion. Ehret, arb. für Jussieu in Paris, † 1770 in Engl.), s. *Hydrophyllum*. — *Ehretiaceae* Mart. (zu *Hydrophyllae* R. Br.).

2) **Ehretia** W. (Ebenaceen, XXII. 6), *E. ferræa* W., s. *Ferreöla* s. *Maba buxifolia* Kön.

1) **Ehrharta** Thb., Sm., Web. (Gräser, III. 2) Reis-Leersie, *E. clandestina* Web., s. *Leersia oryzoides* Sm., *E. capensis* Thb. etc. (n. d. schweiz. Bot. Ehrhart, Linné's Schüler). 2) **Ehrhardia** Scop. (Laurineen) (nach demselben!).

**Eichleria** (g. n.) (Oxalideen, X. 4) „Eichler's“-Sauerklee (n. d. Bot. A. W. Eichler), *E. (Oxalis) Blanchetiana* Moric.

**Elaeagnaceae** R. Br., -*neae* DC., -*ni* Juss. (zu *Proteaceae* Rchb.) Strand-dorngewächse, s. sogl.

**Elaeagnus** L. (Proteac. Elaeagneen, IV. 1) Oleaster od. Ölweide, s. g. wilder Ölbaum, fr. *olivier sauvage*, *olivétier*, auch *chalef*, e. *oleaster* (*olivaster*), wild olive-tree (gr. *ἐλαίαινος* Wtst. *ἐλαία* od. *-λαίη* Ölbaum u. *ἄγρος* (*Vitex Agnus castus*) geb. — Blätt. ähnl. denen des Keuschlamms!), Zier. *E. angustifolia* L. s. *hortensis* M.-B., fr. *daphnot* des Antilles, *E. argentea* Pursh (*macrophylla* Hort.) amerik. Silberbaum, fr. *chalef argenté*, e. *Missouri-silver-tree*.

**Elaeis** Jacq. (*Elaïs* L.) (Palmen, XXII. 6) „Ölpalme“, fr. *avoira*, e. *oily-palm* (*ἐλαίς* v. *ἐλαιον* Öl), *E. guineensis* L. wahre, afrik. u. *E. guyanensis* P. Br. (Stuben).

**Elaeocarpus** L. (Tiliac. Elaeocarpeen, XI. 1) „Oliven“- od. „Ölfruchtbaum“, Ganiterbaum D., fr. *ganitre* (*ἐλαιον* Öl, *καρπός* Fr. — Ähnlichk. mit ein. Olive), *E. sylvestris* Poir., s. *Adenodum sylv.* Lour., *E. Perim-Kara* DC. malabar. Ganiterb. Leun. (El. *copallifer* Vahl s. *Vateria indica* Rheed.), s. *Craspedum* Lour.

**Elaeoselinum** Koch, DC. (Umbelliferen, V. 2) „Ölsilje“ (s. v. u. *Selinum* gr. *σέλινον* Silje).

**Elaphomyces** Nees (Bauchpilze, XXIV. 4) Hirschtrüffel, s. g. Hirschbrunst (*ἐλάφος* Hirsch, *μύκης* Pilz). — *Elaphomyces* Fr.

**Elaphrium** Jacq. (Amyrideen Burseraceen, VIII. 1) Leichtholz Leun. (*ἐλαφρόος* gering — gering. spez. Gewicht), s. *Fagära Elaphrium* (zu *Amyris* Spr.) *Tacamahac*-Harzbaum.



- Eläte** Ait. (Palmen, XXI. 3) „Fichten“- od. „Tannen“-P. D., fr. *élate* (gr. *ἐλάτιη* Fichte), *E. sylvestris* L., s. g. wilder Dattelbaum D., s. Phoenix.
- Elaterium** Mch. (sc. Momordica) L. (sc. Ecballium C. Rich.) (Cucurbitac., XXI. 10) „Schleuder“- od. Spritzgurke, Esels-, Vexier-G., Igel- od. Hundskürbis, fr. momordique élastique, e. wild-squirting-cucumber, s. Ecballium agreste Rehb. s. Elaterium C. Rich. (*ἐλατιήρ* Treiber etc. — schleudert aufspringend d. Samen fort!).
- 1) **Elatine** L. (Lythraieen, VIII. 4) „Tännel“, fr. *élatine* (*ἐλατινός* v. *ἐλάτιη* Fichte etc. — Ähnl. d. Pfl. damit!). — Elatinĕae Rehb., -tinĕae Camb., Grek. (zu Lythraieae Rehb.). — 2) **Elatine** (sc. Antirrhinum) L. (Scrophularineen, XIV. 2) Tännel-Löwenmaul.
- Elemifera** Plum. (sc. Amyris) L. (Terebinthaceen Amyrideen, VIII. 4) „Elemi“-Balsam, fr. *élémier*, e. elemy (elemi vaterl. Name d. Harzes u. fero trage), *E. racemosa* Plum., s. *Cornus racem.* Plum. u. *Isca-riba* Marogr.
- Eleocharis** Lestib. (nicht **Elaeoch.**) (Cyperaceen, III. 1) „Teichriet“, Riet Grck. (v. *ἐλος*, -*εος* Sumpf u. *ζάμις* Freude), s. *Scirpus* L. u. *Heleocharis* R. Br.
- Eleogiton** Lk. (Cyperaceen, III. 1) Flutsimse (s. eb. u. *γείτων* Nachbar etc.), *E. fluitans* Lk., s. *Scirpus* s. *Heleocharis fluit.* Hook.
- Elephantopus** Cass. (Compos. Segregaten, XIX. 5) „Elephantenfuss“, fr. *éléphantope*, pied d'éléphant (*ἐλεφας*, -*αντος*, *ποδς* Fuss — weg. d. Wurzelblätt.), *E. scaber* L.
- Elephantusia** W., Mart. (Pandaneen, XXII. 1) „Elephantenbaum“, fr. *éléphantusie* (s. eb., *ουσία* Wesen), *E. macrocarpa* Mart., s. g. vegetabil. Elfenbein, s. *Phytelephas* Rz. Pv.
- Eléphas** T. (Scrophularineen, XIV. 2) Elefantenrüssel, Rüsselhelm, fr. *éléphas* (s. v. — lange Oberlippe!), *E. italica* T., *orientalis* T., s. *Rhinanthus Elephas* L., *orient. L.*, etc.
- Elettaria** Don, Maton (Amomeen od. Scitamineen I. 1) Cardamom-Ingwer (elettari, Nam. d. Pfl. auf Malabar), *E. Cardamomum* White echte Cardamomen (*Cardamomum minus*), Cardamom-Alpinie, s. *Amomum Cardamomum* L. (*Alpinia* C. autt.).
- Eleusine** Lam. (Gräser, III. 2) Hartgras (n. Eleusina, Stadt in Attika mit Cerestempel, Ceres od. Göttin d. Getreides!), *E. (s. Poa) dura* Scop., s. *Sclerochloa dura* P.-B., Zier. *E. coracana* Lam. ind. Kammergras od. Korakan (*Tocussa*).
- Eleutherococcus** Maxim. (Araliaceen, V. 5) Stachelbaum Lauch., „Freikorn“ (*ἐλευθερος* frei, *κόκκος* Korn etc.), *E. senticosus* Max. (*Hedera* sent. Rupr.).
- Eleutherogynae** A. Rich. (sc. Monocotyledones Juss.) „Freiweibige“ (*γυνή* Weib, Stempel etc. — Fruchtknot. unverwachsen, frei!).
- 1) **Elichrysum** W. (**Heliehr.**- G.) (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Strohblume, eig. „Sonnengold“ (v. *ἥλιος* Sonne, Wtst. v. *ἐλλίξω* od. *ἐλω* winde, rolle?, *χρῶσος* Gold), Zier. *E. proliferum* W., spec. tabile grandiflorum Hort., purpurĕum, besond. aber orientale G. u. bracteatum W. s. g. Immortelle von Malmaison, brachyrrhynchum Sond. (Austral.), wild *E. arenarium* DC. Sand-Immerschön. 2) **Elichr.** aethiopicum Pluk. (Rhamnac., V. 1), s. *Phyllica eriophora* Ait.
- Elisma** Buchenau (Alismaceen, VI. 5) Schwimm-Froschlöffel (v. *ἐλος* Sumpf — analog *Alisma!*), *E. natans* Buch. s. *Alisma nat.* L.
- Elleanthus** Presl (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Wickelblume“ (v. *ἐλλω* wickle ein, *άνθος* — d. Blüt. in Brakteen eingeschloss.), *E. linifolius* Presl, s. *Isochilus* Lindl.
- 1) **Elodĕa** Rich., Mchx. (Elatineen, VIII. 4) Wasserquendel (*ἐλωδής*, -*εος* Sumpf liebend), *E. canadensis* Mchx. s. g. Wasserpest, s. Ana-

- chäris *Alsinastrum* Rich. u. *Tropperaria pestifera* autt. 2) **Elodëa** Ad., Chois. (-des Spach) (Hypericineen, XVIII. 3) Sumpf-Hartheu, *E. petiolata* u. *tubulosa* Pursh, *E. palustris* Spach, s. *Hypericum* *Elödes* L.
- Elödes** Spach (zu *Hypericum* L.) (Hypericineen, XVIII. 3) „Sumpf“-Hartheu, *E. palustris* Spach, s. *Hypericum* *Elödes* L. (vgl. eb.) (*ἑλωδης*, -εος Sumpf liebend).
- 1) **Elsholtzia** W. (*Elssholzia* Grek.) (Labiaten, XIV. 1) Kamm-Ysop (n. Joh. Sig. Elsholtz, schr. Fl. marchica, † 1688), *E. cristata* W. (Hyssöpus cr. W.), *E. ocimoides* W. (*Mentha* oc. Lam.). 2) **Elsholtzia** Rich. (Melaleuceaceen, XVIII. 2).
- Elsneria** Walp. (Umbelliferen, V. 2) „Elsner's“-Dolde (n. Mor. Elsner, s. d. Aut.).
- 1) **Eluteria** (sc. *Clutia*) L. (Euphorbiac., XXII. 14) „Wollhüllen“-Purgierstrauch (v. *ἑλῦω* hülle ein, *ἕλιον* Wolle? — unbestimmt, vielleicht d. veränd. *Alaternus*!), s. *Croton* *Eluteria* Sw. (*Ricinus dulcis* *arborescens* Seb.). 2) **Elutheria** (bess. **Eluteria**) P. Br., *arborica* P. Br., s. *Guarea trichiloides* L. (Meliaceen, VIII. 1) = *Melia* *Guarea* Jacq.
- Elymus** L. (Gräser, III. 2) Haargras, fr. *elyme* (gr. *ἑλυμος* Fennich v. *ἑλῦω* hülle ein — Blätt. zu grob. Flechtwerk), Zier. *E. arenarius* L., fr. *él. des sables*, e. sand-elymus, *E. Hystrix* L., s. *Asperella* *hystrix* Hb. (*Hystrix* *patula* Much.).
- Embothrium** Forst. (Proteaceen, IV. 1) „Grübchen“-Anthere (v. *ἐν* in, *βοθρόν* dem. v. *βόθρος* Grube — d. Antheren in einer Grube d. Kelchblätt.), Gewächsh. *E. speciosissimum* Sm. (*Telopea* R. Br.) (Prachtstr. D.), *E. coccineum* Forst. (Südspitze Amerika's).
- Emërus** T. (sc. *Coronilla*) L. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) Peltschen, Skorpion-Kronwicke, fr. *émërus*, *coronille-des-jardins*, e. scorpion-Senna-Coronilla (v. *ἡμερος* gezähmt — zahme, angenehme Pfl.), s. *Emërus* Mill.
- Emilia** Cass. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Scharlach-Quastenkopf (n. Rousseau's *Emile* benannt?), Zier. *E. sagittata* DC. m. v. *aurantiaca* Hort. „Orangeköpfchen“, s. *Cacalia* *sonchifolia* Hort.
- Empetracëae** (-trëae) Nutt. (sc. *Rutaceae*) Rehb. (zu *Ord. Tricoccae* Bartl.) Rauschbeerartige, s. sogl.
- Empëtrum** L. (Rutac. *Empetraceen*, XXII. 3) Rausch- od. Krähenbeere, „Felsenstrauch“ D., fr. *camarine* od. *vaccinet*, e. *crack-berry* (gr. *ἐμπετρον* auf Felsboden wachs., *ἐν* u. *πέτρα*), *E. nigrum* L.
- 1) **Empüsa** Lindl. (Orchideen Malaxideen, XX. 1) „Gespenst“-O. (*ἐμψόσα* Gespenst, Popanz), *E. lancifolia* Ldl. (*Malaxis* l. Sw.), *paradoxa* Ldl., s. *Stelis racemosa* Sm. (*Bletia bicallosa* Don). 2) **Empüsa** Cohn (Insektenpilz, XXIV. 4) Fliegenotter, -schimmelpilz.
- Empusaria** Rehb. f. (Orchid. *Malaxid.*, XX. 1) = *Empusa* Lindl. (s. eb.).
- Enaleïda** Cass. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Wehrblume“ (*ἐν* in, *ἀλζή* od. -ζή Wehr, Kraft), *E. pilifera* Cass., *foeniculifolia* Cass. (*Tagëtes* *clandestina* Lag.).
- Enantioblastae** Endl., „Gegensprosser“ (*ἐναντίον* gegenüber, *βλάστος* Keim) i. q. *Juncacëae* Bartl.
- Enantiosparton** C. Koch (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Zwerg-Pfriemen (s. eb. u. *σπάρτος* Genst, lat. *Genista* od. *Spartium*), *E. radiatum* C. Koch (*Genista* rad. Scop., *Telinaria* r. Presl, *Cytisus* rad. Koch) (Südeur.).
- Encalypta** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Haubenmoos“, Glockenhut (*ἐγκαλύπτω* verhülle etc. — grosse Haubenglocke der Kapsel), *E. vulgaris* Schreb., etc., s. *Bryum* u. *Leersia*. — *Encalypta*cëae Schimp.

- Encephalartos** Lehm. (Cycadeen, XXII. 11) Brotpalme Leun., Sago- od. Kafferbrodbaum (*ἐν* in, *κεφαλή*) Kopf, *ἄρτος* Brot — in d. kopf- förm. Zapfen etc.), *E. lanuginosa* Jacq. (*Zamia lan.* Thb.), *E. Hildebrandti* Lehm.
- Endiua** Alfd. (Legumin. Viciaen, XVII. 4) Zitterlinse (v. *ἐνδιάω* wohne unt. freiem Himmel), *E. hirsuta* Alfd., s. *Ervum hirsutum* L. (*Vicia h.* Koch).
- Endivia** (sc. *Cichorium*) L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Endivien“- Salat, Wegwarte, fr. u. e. *endive* (v. *ἐνδοον* lat. in od. auf, via Weg — Wegwarte, Wtst. v. d. arab. *hendibeh*!).
- Endymion** Dumort. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Sternhyacinthe, Hasen- glöckchen Grck. (n. d. schön. Hirten Endymion, Myth.), Zier. *E. non scriptus* Grck. (*Agräphis nutans* Lk., *Hyacinthus n. scr.* L.).
- Ensatae** Endl., Rchb., DC., Bartl. Ord. d. Schwertlilien (Schwertelgew. Rchb.) (v. *ensis* Schwert).
- Ensete** (sc. *Musa*) Bruce (Scitamineen, VI. 1 od. XXIII. 1) äthiopische Banane (vaterl.!).
- Entelea** R. Br. (Tiliaceen, XIII. 1) „Schönlinde“ (v. *ἐντελής*) vollkommen — schönes Aussehen, Wtst.).
- Entoloma** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Krummrand“, Schleierpilz Kumm. (*ἐντὸς* einwärts, *λωμα* Rand — dies. einwärts gekrümmt!), *E. rhodopolium* „Rosenpilz“ (*δόδος* Rose, *πώλεομαι* bewohne).
- Epacridae** R. Br., DC. (zu Plantagineae Rchb.) Bergheiden (zu Ord. Ericineae Bartl.) (s. sogl.).
- Epäeris** Forst., Sm. (Plantagineen od. Epacrideen, V. 1) Fels- od. Berg- heide, Felsbusch Rmpl. (*ἐπί* auf, *ἄκρος* Bergspitze — Standort in Neuseeland), Zier. *E. grandiflora* W., *purpurascens* R. Br., *impressa* Lab., etc., s. *Dracophyllum* Lab.
- Ephedra** L. (Gnetaceen, XXII. 13) Pferdeschwanz, Meerträubel Rmpl., fr. raisin de mer od. uvette, e. mangrove-grape (gr. *ἐφεδρα* (-ος) daraufsetzend — an Felsen klimmend), Zier. *E. vulgaris* Rich., mono- u. distachya L., media C. A. Mey.
- 1) **Ephemërum** Hampe, Schreb. (Moose, XXIV. 2) „Tag“- od. „Eintags“- Moos (*ἐφήμερος*) auf einen Tag, v. *ἐπί* u. *ἡμέρα* — d. Moos dauert nicht lang. 2) **Ephemërum** Rchb. (zu *Lysimachia* L., Murr.) (Primulaceen, V. 1) Wald- od. „Eintags“-*Lysimachie*, *E. (Lys.) nemorum* L. 3) **Ephemërum** T., Moris. (Commelyneen, VI. 1) virginische Tradescantie, *E. phalangoides* Moris. = *Tradescantia virginica* L. (tägl. eine neue Blume!), *E. bengalense* Pluk. bengal. Commelyne, s. *Commelina* L.
- Ephippium** Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schabracken“-O. (*ἐπιπ- πιον* Pferdedecke v. *ἐπί* u. *πιπτος* — Labell wie ein Pferdesattel ge- formt), *E. lepidum* u. *cornutum* Blum.
- Epichäris** Blum. (Hesperid. Meliaceen, X. 1) „Reiz“- , Paradies- od. Pater- nosterbaum (*ἐπιχάρσις* reizend — schön. ansehnl. Baum), *E. sericea* Blum. etc., s. *Guarea* Spr.
- Epidendron (-um)** L. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Baumwurzler“, -orche (*ἐπί* auf, *δένδρον* B. — wurzeln od. schmarotzen auf Bäumen!), *E. aromaticum* s. *Vanilla* autt. (*Vanilla arom.* W.) „Vanille“. — *Epi- dendreae* Juss. Baumorchen, z. B. *Cattleya*, *Laelia*, *Epid.* etc. 2) **Epi- dendrum** (sc. *Lycoperdon*) L. (Bauchpilze, XXIV. 4) Baum-Blutmilch Kumm., s. *Lycogala* *Epid.* Mchx.
- Epigaea** L. (Ericac. Rhodoreen od. Melastomaceen, VIII. 1 od. X. 1) „Erd- primel“, Grundstrauch (*ἐπί* u. *γη* od. *γαία* Erde — kriecht etc.), Zier. *E. repens* L. kriechendes Immergrün, s. *Memecylon* L., *Mitch.*, *E. cordifolia* L., s. *Gaultheria sphagnicola*, etc.

- Epigynia** Juss., „Oberstempelige“ — mit oben, d. h. auf d. Blumenboden stehend. St. (ἐπί u. γυνή).
- Epilinum** Weihe (sc. Cuscūta) L. (Convolvulac. Cuscuteen, V. 2) Flachs-seide Grck. (ἐπί u. Līnum gr. λίνον Lein od. Flachs).
- Epilobium** L. (Onagrarien, VIII. 1) Weidenröschen, Schotenweiderich, Eberich O. W., fr. épilobe, herbe de St. Antoine, e. loose-strife, willow-herb (ἐπί u. λοβίον Hülschen od. Schote — Blüt. auf lang. schotenförm. Fruchtkelch), Zier. E. spicatum Lam. s. angustifolium L. (Chamaenerion speciosum Lodd.), fr. osier-fleuri, e. spiked-willow-herb m. v. fl. albo Hort., E. rosmarinifolium Hänke (angustifol. Lam.), fr. épil. à feuilles de Rosmarin, e. rosemary-leaved w.-h., Ufer: E. hirsutum L., fr. ép. rose, -velue od. -hérissé.
- Epimedium** L. (Papaverac. od. Berberideen, IV. 1) „Nick“- od. Sockenblume Rümpl., Nickvierblatt, fr. épimède, e. barren-wort (v. ἐπι-μύδομαι sinne nach — mit gesenkt. Kopf! Wtst.: ἐπί u. μύδιον in Medien wachsend, n. Dioscor.), Zier. E. macranthum Morr., Descn. u. violacëum Morr., Decsn. (Topf), E. alpinum L., e. alpine barr.-w., E. diphyllum Grah. (Aceranthus d. Morr., Decsn.).
- 1) **Epipactis** Rich., Hall. (Orchid. Neottien, XX. 1) Sumpfwurzel, -orche, Sitter O. W. (gr. ἐπιπαιτίς von ἐπιπαιτώ schliesse zu, Pfl. sonst ἐλλεβορόννη), E. palustris u. Helleborine Crantz. 2) **Epipactis** (sc. Dondia) Spr. (Umbelliferen, V. 2) grüne Dondie Spr., s. Astrantia Epip. L. f. (v. ἐπιπύγνυμι mache gerinnen — nämll. Milch, Wtst. v. ἐπι-σπῆω ziehe heraus — d. Wurzel bei d. Alten als Fontanelle d. Haar-seil, nämll. diej. von d. ähnl. Hellebörus albus (Veratrum album), was Haller mit d. ähnl. Epipactis andeuten wollte).
- Epipetalia** Juss., „Oberkronblättrige“ — mit oberständ. Kron- od. Blumenblättern (ἐπί u. πέταλον).
- Epiphyllum** Herm., Haw. (zu Cactus Rchb.) (Cacteen, XII. 1) „Blattcactus“, Ast- od. Stutzblatt-C. (ἐπί u. φύλλον Laub — Blume auf d. Blatt sitzend), Zier. (Stuben, Topf) E. portulacifolium (stumpfkeilblättr.), truncatum Haw. (gestutzt), violacëum u. violac. superbum, Altensteinii Pfeiff. s. truncat. multiflorum, etc., s. Cactus Phyllanthus L. u. Phyllocactus Lk.
- Epipogium** Gm. (-pōgon R. Br.) (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Bartlippchen, „Aufbart“, Bananen-O. (ἐπί u. πώγων Bart — bez. d. büschelfas. Wurzel), E. aphyllum Gm., s. Satyrium Epipogium L. (Limodōrum Epip. Sw.).
- Epistaminia** Juss. mit oberständigen Staubgefässen (ἐπί u. stamen, -inis Staubgefäss).
- Epithymum** (sc. Cuscūta) L. (Convolvulac. Cuscuteen, IV. 2) „Quendelseide“ (ἐπί u. Thymus Thymian od. Quendel).
- Equisetum** L. (Equisetaceen, XXIV. 1) Schaft- od. Schachtelhalm, Gliederfarn, Kannenkraut, eig. „Pferdeborste“, fr. prèle od. asprèle, e. horse-tail od. shave-grass (v. equus Pferd, sēta Borste). — Equisetacæ DC., Rchb. Kl., Ord. od. Fam. d. Schafthalme.
- Eragrostis** P.-B. (zu Poa L.) Rchb. (Gräser, III. 2) „Liebesgras“, Flittergras O. W. (v. Ἔρωσ od. ἐρὸς Liebe, ἀγρωσις Feldgras, Wtst. ἐρὸς sehr, Partikel der Verstärkung! — vielblüt. Ährchen zu einer gross. Rispe vereinigt), Bouquetgr. E. major Host, minor Host s. poaeformis Lk. (Poa Eragrostis L.).
- Eranthënum** R. Br. (zu Ruellia) Rchb. (Acanthaceen, II. 1) „Erdblume“, Menderle D. (v. ἔρα od. ἦρα Erde, Wtst. ἐρὸς sehr, s. eb., ἀνθραμον i. q. ἀνθος — schöne zahlr. Blüten!), Warmh. E. sanguinolentum Hort. (Hypoestes Hook.) (rotader. Blattpfl. d. Warmh.), ignëum Hort. (Chamaeranthemum Nees), leuconeum Hort., etc.

- Eranthis** Salisb. (zu Hellebörus) Rchb. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Winterblume“ od. Winterling, *E. hiemalis* Sal., fr. *eranthé* u. *helléborine* od. *Anémone Aconite* des Hollandois, e. *common winter-aconite* (v. ἤρι früh od. ἔαρ Frühling, ἄριστος Bl. — blüht frühzeitig!), s. *Hellebörus hiemalis* L. „Wintersturmhut“ Rmpl.
- Eremostachys** L. (Labiaten, XIV. 1) „Einzelähre“ (v. ἔριμος einsam, leer, στάχυς Ähre — hat nur eine od. wenige quirl. Blütenähren), Zier. *E. laciniata* Bunge (Phlomis l. L.), fr. *phlomide laciniée*, *E. iberica* Fisch., Mey. (Phlomis ib. L.), fr. *phlomide du Caucase* od. d'Ibérie.
- Eria** Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Woll“-O. (ἔριον Baumwolle, Wolle — auss. woll. Blüten), *E. rosea* Ldl. (*Octomeria* r. Ldl.) etc.
- Erianthus** Rich., P.-B. (Gräser, III. 2), *E. Ravennae* Rich. „Ravennagrass“, -zuckergr., eig. „Wollblütgras“, fr. *érianthe* od. *canne de Ravenne*, e. *Ravenna-sugar-grass* (*E. saccharoides* Mchx.), s. *Saccharum gigantēum* Pers. u. *Andropogon Ravennae* W. (ἔριον Baumwolle, ἄριστος Blüte — einblüt. Ährchen in Seidenwolle gewickelt), *E. japonicus* P.-B. (*Saccharum* jap. Thb., *Obanna* Kämpf.).
- Erica** (nicht *Erica*) L. (Ericaceen, VIII. 1) Heide, Glocken- od. Schnabelheide Leun., fr. *bruyère*, e. *heath* (gr. ἑρίκη od. ἑρέκη Diosc. — viell. ἑρέκη breche, „Brüchling“? Leun. Wtst.), Töpf: *E. herbacea* L., *Gewächsh.*: *E. cylindrica* Wendl., *propendens* Andr., *ventricosa* Thb. m. v. *elegans*, *coccinea* etc., *speciosa* Andr. etc., *Waldheiden* *E. vulgaris* L., s. *Calluna* Salisb. — *Ericaceae* DC., Rchb., Kltzsch., Endl., -ceae R. Br.
- Ericinæe** DC., Bartl., Leun. Ord. d. Heideartigen Bartl.
- Erigeron** L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Dürrewurz, Flöh- od. Berufskraut (Berufungskr. Vilm.), eig. „Früh“- od. „Baldgreis“, „Altmannskr.“ Dietr., fr. *erigeron*, e. *flea-bane* (v. ἤρι früh u. ἔριον Greis — gleich an d. Blüt. weiss. Pappus!), Zier. *E. alpinus* L. u. *grandiflorum* Hort., *E. speciosum* DC. (*Stenactis spec.* Lindl.), e. *showy fl.-b.*, *E. glabellum* Nutt. (Nordamer.), e. *smootish fl.-b.*, *Feldunkr.* *E. canadense* L., s. g. *Franzosenkraut*.
- 1) **Erinus** L. (Scrophularineen, XIV. 2) *Alpen-Leberbalsam* Rmpl., *E. alpinus* L., fr. *érine des Alpes*, e. *alpine liver-balsam* m. v. *fol. hirsutis* Hort. s. *hispanicus* Boiss. (gr. ἑρινός, ἡ eine Pfl., ὁ lat. *caprificus* wild. Feigenbaum, v. ἔριον Baumwolle? — unbek.). 2) **Erinus** (sc. *Lobelia*) L. (Lobeliaceen, XIX. 6) (langäst. Ampelpflanze). 3) **Erinus** (sc. *Campanula*) L. (Campanulaceen, V. 1) *kleinkronige Glockenbl.*
- Eriobotrya** Lindl. (Pomaceen, XII. 4) „Wolltrauben“-Mispel, japan. *Wollmispel*, *E. japonica* Ldl., s. *Mespilus Cuila* Buchan. u. *japonica* Thb. (ἔριον Wolle, βότρυς Traube).
- Eriocaulon** L. (Commelyneen od. Restiaceen, III. 3) „Wollstengel“, *Eckhalm* D., fr. *joncinnelle* (ἔριον Wolle, *zanlōs* Stengel), *E. decangulare* L., s. *Nasmythia articulata* Huds. (*Randia americana* Petiv.), *quinquangulare* L. (*Scabiosa graminæa* Pluk.), *E. spadicēum* s. *Schoenus spad.*, etc. — *Eriocaulonæe* Endl.
- Eriocnema** Naud. (Melastomaceen, X. 1) „Wollschiene“ (s. v., *σνήμη* Bein, *Schienbein* etc.), *E. aenea marmoræa* Van Houtt., s. *Bertolonia* Raddi.
- Eriodendron** DC. (Malvaceen od. Sterculiaceen, XVI. 8) „Wollenbaum“ (s. v., ἑριόδρον B.), *E. pentandrum* DC., s. *Bombax pentandrum* L.
- Eriophorum** L. (Juncaceen od. Cyperaceen, III. 1) *Woll-* od. *Dungras*, *Binsenseide*, *Wiesenwolle* Leun., fr. *porte-laine*, *laine des près* (- des marais) u. *linaigrette*, e. *eud-wort* (-weed), *cotton-weed* (s. v., *γοφός* tragend).

- Eriopogon** Endl. (Gramineen, III. 2) (zu Saccharum) „Wollbart“ (s. v., *πώγων* Bart — d. Ährch. seidenhaar. mit in eine Röhre verwachs. Schuppen).
- Eriopsis** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Wollorchisähnliche“ (Eria Ldl. u. *ὄψις* Ansehen), E. biloba Ldl. (Columbien).
- 1) **Eriostemon** Pers., Sm. (Rutac. Diosmeen, X. 1) „Wollfaden“-Raute (s. v., *στρίμων*, lat. stamen Staubfaden), Gewächsh. E. buxifolium, cuspidatum, linifolium, pulchellum (Diosma pulchella L., Hartogia p. L.), E. squamæ Lab. (Phebalium squamulosum Vent.) (Neuholl.), E. capense Pers. s. Diosma s. Okea uniflora L. 2) **Eriostemum** Collad. (Tiliaceen, XI. 1), s. Elaeocarpus reticulatus. 3) **Eriostemon** Less. (Compositen) — Antheren mit wollwimper. Schwänzen, Wtst.).
- Erithalis** P. Br. (Cinchonac. Guettardeen, V. 1) Grünchina, Lederkrapp Leun., Balsamstrauch (*ἐριθαλίης* od. *-ίς* v. *ἐρί* sehr, *θάλλω* grüne — tiefgrüne Blätt.), E. odorifera P. Br., s. Amyris balsamifera L., E. polygama Forst, s. Timonius Rumph.
- Erodæa** Sm. (Cinchonac. Coffeaceen, IV. 1) „Vielast“-Chinastr., „Ästling“ D., westind. Citronenholz, s. g. Hisparilla (v. *ἐρωδάης* voller Äste od. Zweige — sehr buschige Pfl.), E. montana Sm. (Putoria Pers. Pavetta foetidissima Cyrill.), auch s. Knoxia litoralis P. Br. u. Thymelæa Sloan.
- Erodium** l'Hér. (Geraniaceen, XVI. 2) „Reiherschnabel“, e. heron's-bill (v. *ἐρωδιός* Reiher — langschnäbl. Kapsel!), Garten E. alpinum l'Hér., petraeum, Manescavi Boubani (Pyren.), e. Manescaut's h.-b. u. moschatum l'Hér. (Geranium m. L.) bisamduftend. R., e. musk-h.-b., Unkraut E. cicutarium l'Hér., s. Geranium sect. Erodium L.-Pers.
- Erophila** DC. (zu Draba) Rchb. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Frühlings-Hungerblümchen (*ἔρος* Liebe, Hunger, *φίλη* Freundin, Wtst. *ἔρος* i. q. *ἔριον* Wolle — Stengel unt. u. Blätt. weiss behaart), E. (Draba) verna L.
- Eruca** T. (sc. Brassica), L. (Crucifer. Lomentaceen, XV. 2) Rauke, Runke M.-Rchb., fr. roquette, e. rocket-gentle, E. sativa Lam. i. q. Brass. Er. L. (eruca Plin. wilder Kohl), E. erecta Lag., s. Brassica Tournefortii DC.
- Eruca** T., Hornem. (sc. Bunias) L. (Crucifer. Lomentac., XV. 2) senfblättr. Zackenschote, E. runcinata Hornem., fr. erucege u. roquette des champs Stachel-Meersenf, Bauernsenf (s. eb.).
- Erucaria** G. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Raukensenf“ (s. v.), s. Sinapis, Cordylocarpus u. Brassica.
- Erucastrum** Presl (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Hundsrauke“, Wegkohl, Remppe M.-Rchb., fr. roquette, e. rocket (deter. v. Eruca, Wtst. Eruca u. astrum Stern od. Bild), E. inodorum J. Bauh. s. Pollichii Spenn. (Sisymbrium gallicum W.), s. Eruca Erucastrum Fl. Wett.
- Ervilia** Lk. (zu Ervum) Rchb. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) Rosswicke, Feldlinse (Ervilia Plin. = Lathyrus Cicera L.), E. sativa Lk., s. Vicia Ervilia L., W. knotenfrüchtige Erve Grck., fr. gousse, e. ers.
- Ervum** L. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) „Erve“ od. Erbse, Linse, fr. ers od. gousse (E. hirsutum L.), e. ers od. strangle-tare (-weed) „Würg-Lolch“ (v. d. celt. erw d. i. gebautes Land, lat. arvum), E. Lenticula Schreb., E. hirsutum L. Zitterlinse, s. Endiusa hirsuta Alfd. (Vicia h. Koch).
- Eryngium** T. (Umbellifer. Saniculeen, V. 2) Mannstreu, Brackdistel, fr. érynge od. panicaut (chardon Roland, - à cent-têtes), e. eringo, sea-holly (-holm), share- od. fever-wood (gr. *ἐρύγγιον* od. *ἐρύγγιον* Distelart, n. Paxt. v. *ἐρύγω* rülpse, breche mich), Zier. E.

alpīnum L., bromeliaefolium L., pandanifolium, amethystinum L. etc., wild E. campestre L. s. g. Brackdistel.

**Erysibe** Rebut. (-īphe Hedw.) (Schimmelpilze, XXIV. 4) Mehltau, fr. érysiphe u. tétoron „Sauger“, e. mil-dew (gr. ἐρυσίβη rotpulv. Mehltau v. ἐρυσθρός rot od. ἐρυσίτελας Hautentzündung), s. Alphitomorpha Wallr.

**Erysimum** G., L. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) Schotendotter Grck., Hederich Seub., Schoterich O. W., fr. érysime, tortelle, vélar u. giroflée, e. hedge-mustard (E. Alliaria L.), Zier. E. Petrowskianum Fisch., Mey., fr. giroflée de Petrowski, Marshallianum Andrcz., Barbarea L. v. fl. pl. Hort. u. fol. varieg. (gr. ἐρύσιμον, lat. irio, Wtst. v. ἐρύω rette — bez. d. Heilkräfte).

**Erythraea** Rich. (Gentianeen, V. 1) Rosen-Enzian, Tausendguldenkraut, fr. fiel-de-terre, e. centaury, E. Centaurium Pers. (Gentiana Cent. L.) (ἐρυθραῖος rötlich).

1) **Erythrina** L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Scharlachblume“, Korallenbaum Rümpl., fr. érythrine (ἐρυθρός rot), Zier. E. crista galli L., fr. crête de coq, E. Coralodendron L. m. v. orientalis Murr. Korallen- od. Kondoriholz, C. herbacea L. (Florida), E. speciosa Andr., etc. 2) **Erythrina** (sc. Piscidia) L. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Fischtöter.

**Erythronium** L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Hundszahn, Zahn- od. Rotlilie, Rotwurz (s. v.), Winter-Zier. E. dens canis L., fr. dent de chien, e. dog's-tooth-Violet.

1) **Erythroxylon** L. (Malpighiac. od. Violac. Sauvageseen, X. 3) „Rothholz“ (s. v., ξύλον Holz), E. Coca Lam., Cocastr., Rmpl. Kaubblattbaum, s. Sethia St. Hil. 2) **Er.** (sc. Rhamnus) Pall. (Rhamnac., V. 1) „Rothholzdorn“, fr. nerprun à bois rouge, e. red-wooded buskthorn.

**Escallonia** Mut., Sm. (Ribesiaceen Escallonieen od. Saxifrageen, V. 1) „Escallonie“ (n. d. Entdecker Escallon in Neugranada), Gewächsh. E. floribunda Hb., macrantha Arn. u. rubra Pers. — Escalloniæe R. Br. (zu Ribesiaceæ Rehb.).

**Eschscholtzia (-zia)** Cham. (Papaverac., XIII. 1) „Eschscholtzie“ (n. d. Nat. J. Fr. Eschscholtz in Dorpat, † 1831), E. californica Cham. (Chryseis cal. Lindl.) m. v. leucantha Hort. (calophylla Hort.), fr. globe du soleil, E. de Californie, tenuifolia Benth., crocea Benth. m. v. v. (rosæa, striata etc.).

1) **Esculus** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) „Speise“-Eiche (v. esca Speise). 2) **Esculus**, s. Aesculus L. Rosskastanie, s. d.

**Esmarchia** Rehb. (Aisnaceen, X. 4) „Esmarch's“-Hornkraut, E. ceras-tioides Rehb., s. Cerastium tetrandrum Curt. (n. d. Bot. Ant. Esmarch, schr. Fl. v. Schleswig u. üb. Gräser, Lpz. 1797).

**Ethulia** L., Cass. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Sittenheil“?, fi. éthulie (v. ἠθούς od. ἔθους Sitte u. οὐλίος heilend, Wtst. ἐσθῆς Kleid, οὐλός weich, kraus od. αἶθω brenne, οὐλόος gefährlich), Zier. E. corymbosa Cass. angustifolia Boj., divaricata L. (Chrysanthemum bengalense Pluk.).

**Euazalæa** Planch. (zu Azalæa L.) (Ericaceen, V. 1) „Schön-Azalee“ (εὖ wohl, schön etc.), z. B. A. pontica, daurica etc.

**Eucalyptus** Lab. l'Hér. (Myrtaceen, XII. 1) „Schönmützenbaum“, „Schönhaube“, neuholl. Gummibaum, fr. eucalypte (-lipte), Zier. E. globulus Lab. s. glauca DC. Fieberbaum, Fieberheil, robusta l'Hér. austral. Eisenholzb. (Eisen-Veilchenbaum, blauer od. roter Gummib.), E. resinifera Lab., Kinobaum (εὖ- u. καλυπτός verhüllt — beim Aufblühen abfall. Haube, wie bei Calypranthes, Wtst.).

- Eucharidium** Fisch., Mey. (Onagrariaceen, IV. 1) „Reiznarzissenähnliche“ (s. sogl. u. *εἰδομαί* gleiche — angen. rosablüh. Pfl. Wst.), Garten *E. concinnum* F. u. M., fr. Euch. élégant, *E. grandiflorum* F. M. m. v. v.
- Euchäris** Planch. (Amaryllideen, VI. 1) „Reiz“- od. Grazien-Narzisse (*εὐχαρίς* angenehm etc.), Zier. *E. amazonica* Lind.
- Euchlaena** Schrad. (Gräser, III. 2) Guatemalagrass, s. g. Teosinte, eig. „Schönmantel“ (*εὐ* u. *γλαίνα* Oberkleid — d. Blüt. betr.), *E. gigantéa* Schrad. (als Futter geb. trop. Gras), s. *Panicum* L. u. *Reana luxurians* Brign.
- Euclidium** R. Br. (Cruciferen Nucamentaceen, XV. 2) „Schönschlösschen“ (v. *εὐκλιδίς* wohlverschlossen — sehr deutl. Schotennähte! — *εὐ* u. *κλειδίον* Schlösschen!), *E. rostratum* R. Br., s. *Myagrum* r. Scop. „Schnabeldotter“, *E. syriacum* R. Br. (*Soria* syr. Desv.), s. *Anastaticum* syr. Jacq. (*Bunias* syr. G.) „syrische Jerichorose“.
- Eucnide** Zucc. (Loasaceen, XIII. 1) „Schönnessel“, Langfaden (*εὐ* u. *κνίδη* Nessel), Stuben *E. bartonioides* Zucc., s. *Microsperma* bart. Walp.
- Eucömis** L., l'Hér. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Schopflilie“, fr. eucomide (*εὐ* u. *κόμη* Schopf etc. — an d. Spitze d. Blütentraube ein Blattbüschel!), Zier. *E. punctata* l'Hér., fr. basilée ponctuée, e. dotted Euc., s. *Basilaea* p. Juss., Topf *E. regia* Ait., *undulata* ds., etc.
- Eudianthe** Rehb. (Sileneen, X. 4) „Schön-Lichtnelke“, s. *Lychnis* L. (*εὐ* u. *Dianthe* i. e. *Διὸς ἄνθη* Zeus-Blume, Wst. *εὐδιδὸς* schön u. *ἄνθη*, zu *Lychnis* — schönrote Bl.!), *E. coeli-rosa* u. *laeta* A. Br. (*Lychn. coel.-ros.* Desr. s. *Agrostemma coeli rosa* L.).
- Eugenia** L. (Myrtaceen, XII. 1) Gewürznäglein, -nelkenbaum, Jambusenbaum u. s. f. (n. d. Prinzen Eugen v. Savoyen, Gönn. d. Bot., † 1736), *E. Jambos* L., *E. sinemariensis*, fr. maripou, Warmh. *E. Ugni* Hb. (*Chili*), *Michellii* Lam., s. g. Cayennekirsche, *brasilienis* L., *E. caryophyllata* Thb., s. *Caryophyllus aromaticus* L.
- Eulalia** Kth. (Gräser, XXIII. 1) „Eulalie“ (N. pr. v. *εὐλαλος* beredt), Zier. *E. japonica* Kth., s. *Andropogon*.
- 1) **Euosma** W. (-*mia* H. B. K.) (Rubiaceen, IV. 1) „Wohlduftstrauch“ (*εὐ* u. *ὄσμη* Duft etc.), s. *Evosmia* s. *O'Higginsia* (*Higginsia*) Rz. Pv. 2) **Euosma** Andr. (Gentianeen, V. 1).
- Eupatoria** (sc. *Agrimonia*) L. (Rosaceen, XI. 2) gem. Odermennig (s. sogl.).
- Eupatorium** T. (Composit. Eupatorineen, XIX. 1) Wasserhanf, -dost, Ottig O. W., Kunigundenkraut etc. (gr. *εὐπατόριον* Pfl. nach Mithridates *Eupator*, d. Kön. v. Pontus, † 64 v. Chr.), *E. cannabinum* L., fr. langue de chat, herb de Ste. Cunegonde, *eupatoire* d'Avicenne u. cornuet, e. water-hemp, *eupatory*, *hemp-agrimony*, *sweet-maudlin* (-mawlin), Zier. (Winter): *E. guatimalense*, *purpureum* L., *aromaticum* L., *ageratoides* L., etc. — *Eupatoriaceae* Rich., -*iacae* DC., -*rinae* Rehb.
- Euphorbia** L. (Rutac. Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) Wolfsmilch, Hundsmilch, fr. euphorbe, lait-de-loup, e. milk-weed, sea-lettice, spurge, wolf's-milk (v. *εὐφόροβιον* milchendes Stachelgew. in Afrika, Plinius: nach *Euphorbus*, Leibarzt d. Königs Juba, ben.), s. *Tithymalus* T., z. B. *E. Esula* L., fr. *ésule* „Eselsmilch“, *laitue* de chèvre „Ziegenmilch“, *Gerardiana* Jacq., *Cyprisias* L. „Cypressen“-W., *palustris* L., Zier. *E. variegata* Sims, Stuben *E. jacquiniaeflora* Hort. (scharl. Winterbl.), *splendens* Boj., *fulgens* Karw., etc. — *Euphorbiaceae* Kltzsch., Grck., -*biaceae* (sc. *Rutaceae*) Rehb. (zu Ord. *Tricoccae* Bartl.).
- Euphrasia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) Augentrost, fr. euphrasie, e. euphrasy (gr. *εὐφρασία* Frohsinn etc. — für ein wirks. Augenmittel



- gehalten! Leun., Wtst.), *E. officinalis* L., fr. langéole od. lumenet, e. euphrasy u. eye-bright.
- Eurya** Thunb. (Theac. Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Weitaststrauch“ D. (v. *εὐρύς* weit, breit — bez. d. Äste!), *E. japonica* s. Macartnei Champ., s. Fisakaki Kämpf.
- Euryale** Salisb. (Nymphaeaceen, XIII. 1) Dorn-Nymphäe (n. Euryale, e. d. Gorgonen, Myth., nicht Wtst. *εὐροιάλος* breit — sehr grossblättr.), *E. ferox* Sal. (— Dornen d. Blattunterseite!), s. *Anneslea spinosa* Andr.
- Eurybia** Cass. (zu Aster Rchb.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Weithinmächtige“, „Allgewaltige“ (*εὐρουβίης* weit u. breit mächtig, *εὐρύς* u. *βία* Gewalt), Zier. *E. corymbosa* Cass., Gewächsh. glandulosa u. lyrata DC., Gart. argophylla Cass. „weissblättr.“
- Eutaxia** R. Br. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Schönreih“-Cäsalpinie (*εὐταξία* schöne Reihe — steife, einfache gegenständ. Blätt.), s. Dillwynia Sm.
- Euterpe** G., Mart. (Palmen, XXI. 8) Kohlpalme, Pallisadenpalme Leun. (Euterpe, eine d. Musen, od. v. *εὐτεροπής* wohlfeil — Wtst. stattlich. Ansehen!), *E. oleracæa* Mart. (*Aræca* ol. L.) u. *edulis* Mart.
- Eutœa** R. Br. (Hydrophylléen, V. 1) „Vielblumenkraut“, fr. Eutoque (*εὐτοξος* fruchtbar im Gebären — jede Placenta m. zahlr. Eiern), *E. multiflora* R. Br., s. *Cosmanthus mult.* Dougl., Gart. *E. Wrangeliana* Fisch., Mey., *Menziesii* R. Br. u. *viscida* Benth. (*Cosmanth. visc.* A. DC.) „Klebglocke“, fr. *Eut. viscida*, etc., s. *Hydrophyllum* u. *Polemonium*.
- Euulmus** C. Koch (zu *Ulmus* L.) (Urticac. Ulmaceen, V. 2) „Schönrüster“ (*εὐ* u. *Ulmus*), z. B. *campestris* L.
- Euvicia** Endl. (zu *Vicia* L.) (Legumin. Vicien, XVII. 4) „Schönwicke“ (*εὐ* u. *Vicia*), z. B. *Cracca* L., *angustifolia* All.
- Euvitis** Endl. (zu *Vitis* L.) (Ampelideen, V. 1) „Schönrebe“ (*εὐ* u. *Vitis*), z. B. *vinifera* L., *Labrusca* L., etc.
- Euxölus** Moq.-Tand. (Amarantaceen, XXI. 5) Spinat-Amarant (*εὐ*, *euxīnus* wirtbar u. ölus, -*ērīs* Küchenkraut!), *E. viridis* M.-T., s. *Albersia* Blitum Kth. (*Amarantus* Bl. L.).
- Evax** G., DC. (Composit. Gnaphalieen, XIX. 2) Schimmel- od. Fadenkraut, s. *Filago* T. (v. *εὐάξος* zerbrechlich? n. Plinius v. *Evax*, arab. König zu Nero's Zeit), *E. pygmaea* Desf. s. *umbellata* G., s. *Micröpus* pygm. Desf.
- Evodia** Forst. (Rutaceen, IV. 1) „Wohlduft“-Raute (*εὐώδης* wohlriechend), z. B. *elaeodendroides* Bak., *hortensis* Forst. (*Fagara Evodia* L.), *E. febrifuga* St. Hil. (*Esenbeckia* f. St. Hil.) brasil. China- od. Fieberrinde.
- Evolvulus** L. (Convolvulaceen, V. 1) „Aufwickelwinde“ (v. *evolvo* wickle auseinander — nied. kriechende Kräuter!).
- Evonymus** T., L. (Celastraceen, V. 1) Spindel- od. Spillbaum, Pfefferriesel, s. g. Pfaffenhütchen, fr. *fusain* od. *garais* (*garas*), *bonnet de prêtre*, e. spindle-tree, *butonic* u. *prick-wood* (gr. *εὐώνυμος* von gutem Namen), *E. europaeus* L. (*vulgaris* Mill.) m. v. v., Zier. *E. japonicus* Thb. m. v. v. (*macrophyllus*, *aureo-maculatus*, *aureo-marginatus* Hort.), etc.
- Evosmia** H. B. K. (-osma W.) (Rubiaceen, IV. 1) „Wohlgeruchstr.“ (*εὐ* u. *ὄσμη*) Duft, z. B. *caripensis* Hb. Bpl., s. *O'Higginsia* Spr. (vgl. *Euosma* W.).
- Ewyckia** Blum. (Lythraceen, XI. 1) „Ewyckie“ (n. Van Ewyck, e. holländ. Gelehrten).
- Exäcum** L. (Gentianeen, IV. 1) Bitterblatt (v. *ex aus*, ago treibe — Mittel geg. Gift!), *E. filiforme* W. (*Cicendia* fil. Delarbre), *E. aphyllum* Jacq. (*Lita* aph. Dietr.), *albens* s. *pedunculatum* L., etc.

- Excoecaria** L. (Rutac. Euphorbiaceen, XXII. 3) „Blind“- od. „Blendebaum“ (v. excoeco mache blind — Wirk. d. Milchsafte in die Augen), E. Agallocha L. (Arbor excoecans Rumph.).
- Exidia** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Lappenpilz, Hollunderschwamm, s. g. Judasohr, E. Auricula Judae (v. ἐξιδίω schwitze aus — weg. d. Sporangien), s. Tremella L.
- Exoascus** Fuckel (Pilze, XXIV. 4) „Aussenschlauch“, Zwetschtaschenpilz (ἐξω hinaus, ἀσχός Schlauch — d. Mycel dringt bis in d. Zweige des Baums).
- Exochorda** Lindl. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) Hartschalf Frucht-Spiräe (ἐξω aussen, χορδή lat. chorda Darmsaite — bez. d. knorpeligen Frucht!), Zier. E. grandiflora Lindl. (Spiraea gr. Hort.).
- Exostemma** Hayne, DC. (richt. -stema Pers., H. B. K.) (Cinchonaceen, V. 1) „Aussenfaden“ (ἐξω s. v. u. στήμιον lat. stamen Staubfaden — diese hängen aus d. Blume heraus), E. caribaea Hayne (Cinchona car. W. s. jamaicensis Wright).
- Faba** T., Mnch. (zu Vicia L.) Rchb. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Sau- od. Buffbohne (Puffb. Rmpl.), Pferdebohne, fr. fève de marais, e. hog's-bean (lat. faba Bohne v. d. celt. faff, Wtst. gr. φάγω esse?), F. vulgaris Mnch. = Vicia Faba L. (Casp. Meer), F. equina Bauh. s. minor L. (Vicia Faba L. β), narbonensis Biv.
- Fabago** T. (sc. Zygophyllum) L. (Rutaceen, X. 1) gem. Jochblatt, s. g. Bohnenkapper D. (v. faba Saubohne — bohnenf. Samen).
- Fabiana** Rz. Pv. (Solanac. od. Convolvulac., V. 1) „Fabianopflanze“, fr. fabiane (n. d. Erzbischof v. Valencia Franc. Fabiano ben.), Glash. F. imbricata Rz. Pv. (Hstr.).
- 1) **Fabricia** G. (Myrtaceen, XII. 1) „Fabricius“-Myrte (n. d. Bot. Ph. K. Fabricius). 2) **Fabricia** plicata Thb. (Amaryllideen, VI. 1) „Fabricius“-Duftlilie, s. Gethyllis plic. Jacq. 3) **F.** Scop. (Papilionaceen). 4) **F.** Adans. (Labiaten).
- 1) **Fagāra** Schreb. (Terebinthaceen, VIII. 1) Sattelbaum D., fr. fagarier (wahrsch. aus d. Arabischen, schon Avicenna brauchte d. Namen, schwerl. v. φάγος; od. φάγος; Wetzstein, der d. Metalle gleichs. anfrisst, φάγος; Fresser), F. inaequalis D. (Amyris inaeq. Spr.), copallifera D. (Amyris s. Elaphrium cop. Sess.). 2) **Fagāra** L. (Sapotac. od. Rutac. Diosmeen, IV. 1), F. Pterota L. Eisenholz v. Jamaika, F. Piperita L. japan. Pfeffer (Piper japonicum Kämpf.).
- Fagonia** T. (Rutac. Zygophylleen, X. 1) „Fagon's“-Jochblatt, fr. fagone (-goue) (n. Guy Crescent. Fagon, Prof. u. Leibarzt Ludw.'s XIV., † 1718), F. persica DC. s. indica L., Bruguieri DC. s. mysorensis Roth.
- Fagopyrinae** Bartl., DC. Ord. d. Buchweizenartigen, s. sogl.
- Fagopyrum** T. (Polygonaceen, VIII. 3) „Buchweizen“, Heidekorn, fr. bucaille od. blé saracin (-noir), e. buck-wheat (book-), bollemong, panicle (pannicle) u. bird's-tongue „Vogelzunge“ (v. φηγός lat. fagus Buche, αῖος; Weizen — Samen wie Bucheckern!), F. esculentum Mnch. = Polygōnum Fagopyrum L., F. tataricum G. s. erectum Gm. (Polyg. tat. L.), s. Fagotriticum sibiricum Act. Stockh. (Fagus u. Triticum Weizen).
- Fagraea** Thunb. (Loganiaceen, V. 1) „Fagraeus“-Fruchtbaum (n. Thunberg's Freunde J. T. Fagraeus), F. imperialis u. tahitensis Thb., s. Willughbeia zeylanica Roxb.).
- Fagus** L. (Cupuliferen od. Corylaceen, XXI. 5) Rot- od. Waldbuche, fr. hêtre, fouteau (fayar, fou), faine „Buchecker“, e. beech-tree (gr. φηγός v. φάγω esse etc.), F. silvatica L. (Castanea Fagus Scop., F.

- sylvestris Mchx.), fr. hêtre commun, e. common b.-tr., m. v. v., z. B. aspleniifolia Lodd. s. heterophylla Loud., v. purpurea Ait. (atro-rubens Dur., atro-purp. Hort., colorata DC.) s. g. Blutbuche.
- Falcaria** Host (zu Critämus Trag.) Rchb. (Umbellifer., V. 2) „Sichel-dolde“, Sichel O. W. (falx, -cis Sichel), s. Sium Falcaria L. (Sesclī Falc. Scop.) u. Drepanophyllum sioides Wib. s. agreste Hoffm.
- Farfara** DC. (s. Tussilago) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Hufattich, Husten-, Acker-, Eselshuf (viell. corripert aus φάρμακον Luftröhre u. φάρμακον Lappen, Wtst. v. far Mehl u. fero trage — Mehl auf d. Blattunterseite), Zier. v. fol. varieg. Hort., fr. pas d'âne à feuilles panachées.
- Farfugium** Lindl. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Fleckenblatt-Hufattich (aus Farfara u. fugio fliehe gebildet!), Topfbl. F. grande Ldl., s. Ligularia Kaempferi var. Sieb. u. Zucc.
- 1) **Farsetia** R. Br., Turr. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Farsetie“, Sandkresse, Weisssteinkraut, fr. cresson des sables, F. incana R. Br. (n. d. venet. Bot. Ph. Farseti ben.), s. Alyssum incanum L. (Berteroa inc. DC. u. Farsetiana DC.). 2) **F.** (sc. Cheiranthus) L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) strauch. Mondviole, s. Lunaria fruticosa s. leucojifolia T.
- Fatsia** Decsn. (Araliaceen, V. 5) „Fatsie“, F. japonica Decsn., s. Aralia jap. s. Sieboldii Hort. (vaterl. Name fatsi).
- Fedia** Mnch. (Valerianeen, III. 1) Schmalzkraut, Feld- od. Lämmersalat, Nisschen, Rapünzchen Grck. etc., fr. mache, blanchette u. laitue de brébis, e. rampion u. corn-sallad (v. fedus altlat. Böcklein, Wtst. d. corrumpierte φού!), F. locusta Rchb. s. olitoria Vahl, s. Valerianella olit. Mnch. = Valeriana Locusta var. *a* olitoria L.; F. olitoria G. = Valerianella Auricula s. dentata DC. (rimosa Bast.).
- Felicia** DC. (zu Aster Rchb.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Felicie“ od. „Felix“-Aster (n. d. Legat.-Rat Felix in Regensburg, † 1846), F. tenella Nees, fr. Felicie delicate, e. slender F., s. Aster tenellus Thb. (Kaulfussia ciliata Nees).
- Feliciana** Camb. (Lythraieen, XI. 1?) „Feliciane“ (n. José Feliciano Fernandez Pinchero, schr. üb. Agricult. in Brasilien).
- 1) **Fenzlia** Benth. (Polemoniaceen, V. 1) „Fenzl's“-Speerkraut (n. d. Prof. Fenzl in Wien), Zier. F. dianthiflora Benth. (Gilia dianthoides Endl.). 2) **Fenzlia** Arn. (Myrtaceen Memecyleen, VIII. 1). 3) **F.** Endl. (Lythraceen, XI. 1?).
- Ferdinanda** (-dea) Lag. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Ferdinand's“-Strauch (n. d. König Ferdinand VII. v. Spanien, † 1833), z. B. F. augusta u. eminus Lag.
- Ferolia** Aubl. (Rosaceen od. Laurineen Cedreleen, X. 1) Atlas- od. Satinetholz, fr. bois-benoit-fin u. férole (bois de -), e. satin-wood, F. guianensis Aubl., s. Chloroxylon Swietenii (Guian. Name ferol).
- Feronia** Corr., DC. (Aurantiaceen, X. 1) Wald-Pomeranze, Elephantenapfel, F. elephantum Corr. (v. Feronia Göttin d. Wälder, Wtst. n. Feroni, florent. Bot., schr. 1804 Verz. sein. Gartengew.).
- Ferraria** L. (Irideen, III. 1 od. XX. 3) Tiger- od. Pfauenlilie, F. tigrida u. pavonia L. (n. d. Jesuiten Ferrari, s. d. Aut.).
- Ferreola** Kön., Roxb. (Ebenaceen, XXII. 6) Maba-Eisenholz, F. buxifolia Kön. (Maba Forst.), s. Ehretia ferrera W. u. Pisonia buxif. Rottb. (v. ferrus eisern — ungemain hart. Holz!).
- Ferula** T. (Umbelliferen, V. 2) „Steckenkraut“, fr. férole, e. gigant's-fennel „Riesen-Fennich“ (ferula Rute v. ferio schlage damit), z. B. F. asa foetida L. Stink-Asand von Persien, s. g. Teufelsdreck, Zier. F. communis L. gew. Rutenkraut, tingitana L. f., fr. fér. de Tanger etc.
- Festuca** L. (Gräser, III. 2) Schwingelgras, eig. Futtergras, fr. fétuque,

e. fescue-grass (Linné: n. d. celt. fest d. i. Futter geb.), z. B. Zier. F. glauca Schrad., Ufer F. fluitans L. (Poa s. Glycesia fluit. Scop., R. Br.), fr. fétuque flottante, brouille, etc.

**Feuillaea** (-llēa. Fevillēa) L., P. (Cucurbitaceen, XXII. 6) „Feuillee“ (n. d. Reis. Feuillée, s. d. Aut.), z. B. cordifolia u. trilobata L., s. Trichosanthes punctata L. f., F. scandens L., fr. liane contre-poison (couleuvre).

**Ficaria** Dill. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Feigen“-Ranunkel, Feigwurz, Feigwarzenkraut, Scharbock Grck., Schmergel, Gessel O. W., fr. ficaire, petite chéloïde u. hémorrhoidale od. aureillette, e. scurvy od. spring-Pile-wort (v. ficus Feige — näml. feigenförm. Wurzelknollen), F. ranunculoides Mch. s. verna Huds. = Ranunculus Ficaria L., Zier. F. calthaeiflora Rehb.

**Ficoideae** Juss., DC. „Feigenartige“ (zu Ord. Urticinae Bartl.).

**Ficus** T. (Urticac. Ficoideen, XXIII. 3) Feigenbaum, fr. figuier, e. fico fig-tree (lat. ficus v. gr. *φῖκος* v. *φῖκου* wachse? Wtst. d. veränd. *σῆζορ* Feige!), Gewächsh. F. elastica Roxb. Gummibaum d. Stuben, F. australis W., F. scandens Lam. s. stipulata Thb., F. indica L. ind. Baniane, fr. figuier d'Inde, F. beniamina L. Baniane, fr. banyans, F. Carica L. essb. Feige, etc.

**Filago** T., W. (Compos. Gnaphaliaceen, XIX. 4) Schimmel- od. „Fadenkraut“, fr. herbe à coton, e. mould-weed (v. filum Faden), s. Evax G. — Filaginaceae Cass. (zu Inulaceae Cass. od. Gnaphaliaceae Less.).

**Filipendula** T. (sc. Spiraea) L. (Rosac. Spiraeaceen, XII. 4) Erdeichel, „Knollfaden“-Spiräe, fr. Spirée filipendule, e. drop-wort u. queen of meadow „Wiesenkönigin“, Zier. v. fl. pleno Hort. (v. filum Faden, pendulus herabhängend — Wurzelfäden m. knolligen Enden!).

**Filices** Juss., DC., Rchb., Kl. d. Laub- od. Wedelfarne, fr. fougères, e. ferns. — Filicinae DC. Ord. d. Laubfarne (v. filix, -icis Farnkraut).

1) **Filix** femina Bernh. (sc. Aspidium Sw., Asplenium L. s. Athyrium Roth) (Polypodiaceen-Farne, XXIV. 1) weiblicher Schild-, Milz- od. Streifenfarn. 2) **Filix** mas (sc. Aspidium Sw., Polypodium L. s. Polystichum Roth) Wurmfarne, fr. silique. 3) **Filix** (sc. Lichen) L. (Flechten, XXIV. 3) „Farn“-Flechte (filix, -icis Farnkraut, Wtst. entw. v. filum Faden, weg. d. Wurzelfäden, od. v. *πιτλον* Flügel — weg. d. Wedel!).

**Fissidens** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Spaltzahn“ (fissus gespalten u. dens Zahn), z. B. adiantoides u. osmundoides Hedw.

**Fistula** DC. (sc. Cassia) L. (Cassieen, X. 1) „röhrenförm.“ Cassie (fistula Fistel, Röhre etc. — Hülsenform!), s. Cathartocarpus Fistula Pers.

**Fistularia** Ach., Grev. (Tange, XXIV. 3) „Pfeifen“- od. „Röhrentang“, fistulaire (s. eb.), z. B. F. tabacaria Grev., fr. pétimbe.

**Fistulina** Nees, Bull. (Pilze, XXIV. 4) „Röhrenpilz“, Leberschwamm Kumm., F. hepatica Bull. s. g. Blutschwamm (essb.) (s. eb.).

**Fittonia** Coëm., Lem. (Acanthaceen, XIV. 2) „Fittonie“ (n. d. Schwestern Elisabeth. u. Sarah Mary Fitton, schr. Convers. on botany, 8. edit. Lond.), z. B. Stubenblattpfl. F. Verschaffelti Coëm. m. v. argyroneura (silberaderig), F. gigantea Lindl. u. Pearcei ds., s. Gymnostachyum Verschaffelti Lem. etc.

**Fitzroya** Hook. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) „Fitzroy“-Cypresse, s. g. Alercebaum, F. patagonica Hook. (n. d. engl. Schiffscap. Fitzroy ben.).

**Flacourtia** l'Hér., Comm. (Capparideen od. Tiliaceen, XIII. 1) „Flacourtie“ (n. d. franz. Statthalter Etienne de Flacourt auf Madagascar, † 1660), z. B. F. cataphracta l'Hér., rhamnoides Burch. u. inermis Roxb. — Flacourtiaceae Rich., DC., -iäe Rchb. (zu Cistiflorae DC.).

- 1) **Flammüla** (sc. *Ranunculus*) L. (*Ranunculac.*, XIII. 7) brennender Hahnenfuss, „Flämmchen“ (dem. *flamma* Flamme). 2) **Flammula** Dill., Rupp. (sc. *Clemätis*) L. (*Ranunculac.*, XIII. 7) scharfe Waldrebe, fr. *flammule* od. *Clématide odorante*, e. sweet-scented Virgin's-bower, m. v. *rubella* DC., s. *Flammula scandens* Dill. (*caespitosa* Scop., „Rasenrebe“ od. *fragrans* Ten.). 3) **Fl.** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Flämmchen“-Schwamm (— weg. d. schnell verschwind. Manschette), z. B. *saniosa*, *limonia* etc., s. *Agaricus*.
- Flindersia** R. Br. (Ampelideen od. *Meliac.* *Cedreleen*, X. 1) molukki-scher Rasselbaum (n. d. Capt. Matth. Flinders, † 1814), *Fl. moluccana* R. Br.
- Floridäe** Ag., Rchb. Ord. d. Rot- od. Blüentange Seub., Hautalgen Rchb. (*flos*, -öris Blume).
- Flumina** Fr. (Gräser, III. 2) Flussschwengel (*flumen*, -inis Fluss), *Fl. arundinacea* Fr., s. *Scolochlōa festucacea* Lk.
- Fluviales** Endl., fr. *fluviales*, Kl. d. Najaden od. „Flusspflanzen“ (s. sogl.).
- Fluvialis** Michel (Najadeen, XXII. 1) „Fluss“-Najade (*fluvius* Fluss), *F. latifolia* Mich., s. *Najas fluviatilis* Lam., *Fl. flexilis* Pers. (XXI. 1), s. *Najas flex.* Rostk. (*Caulinia fl. W.*), *Fl. minor* Mich., s. *Caulinia fragilis* W. (*Najas minor* Schk., *Ittnera* m. Gm.).
- Foeniculum** Ad., T. (Umbellifer., V. 2) „Fenchel (Fönchel)“, fr. *fénouil*, e. fennel (ital. *finocchio*) (*foeniculum* dem. v. *foenum* Heu, deutsch.: Fenchel), Gärten: *F. vulgare* G., s. *Anethum lutēum* s. *Foeniculum* L.
- Foenum graecum** T. (sc. *Trigonella*) L. (*Leguminos.* *Trifolien*, XVII. 4) Bockshornklee, gemeiner Kuhhornklee W., griech. Steinklee, s. g. „griech. Heu“, fr. *fénugrec* od. *senègre*, e. fenugreek (*fenny-*) (*foenum* od. *fenum* Heu — nämll. getrockn. Blätt. in Käse! — lange hornförm. Hülschen).
- Foetidia** A. Cunningh., Comm., Juss. (*Myrtaceen*, XII. 1) „Stinkbaum“ D. (v. *foetidus* übelriechend — nämll. d. Holz!), *F. mauritiana* Lam. (Ins. *Mauritius* od. *Bourbon*).
- Fontanesia** Lab. (*Oleaceen*, II. 1) „Desfontaine's“-Strauch (n. d. Bot. u. Reis. Prof. Desfontaines z. Paris), *Gewächsh. F. phillyreoides* Lab.
- Fontenellēa** St. Hil. (*Spiraeac.*, XII. 4) „Fontenelle“ (n. Julia de Fontenelle, schr. mit H. Tollar Manuel de l'arboriste, Paris 1828).
- Fontinalis** Dill., L. (*Moose*, XXIV. 2) Quell- od. Brunnenmoos (*fons*, -tis Quelle), *F. antipyretica* L. (in Quellengraben — früher um Schornsteine geg. Feuersgefahr!).
- Forestiera** Poir. (*Oleaceen* *Forestieren*, XXIII. 1) „Forestiere“ (n. Forestier, Arzt zu Paris zu Poiret's Zeit), *F. ligustrina* Poir. s. *Bigelovia lig.* Rees (*Borya l. W.*), *F. acuminata* Poir. (*Bigelovia* s. *Borya ac.*) s. *Adelia acum.* Mchx.
- Forskohlea** L. (*Urticaceen*, X. 5) Forskohlee (n. Pet. Forsk., Prof. in Kopenhagen), z. B. *F. tenacissima* L. f., *angustifolia* L. etc.
- Forstera** L. (*Plumbagineen*, XX. 1) „Forstere“ (n. d. Gebrüd. Forster, Cook's Begleit. b. d. Weltumseglung), *F. sedifolia* L. f.
- Forsythia** Vahl (*Oleaceen*, II. 1) „Forsyth's“-Strauch (n. d. engl. Bot. W. A. Forsyth, schr. 1802 üb. d. Cult. d. Obstb.), Zier. *F. viridissima* Lindl. (China), *suspensa* Vahl (*Syringa susp.* Thb., Lilac *perpensa* Lam.) (Chin., Jap.), *scandens*, s. *Decumaria* L.
- Fothergilla** L. (*Corniculat.* *Cunoniaceen* od. *Hamamelideen*, XII. 2) „Fothergill's“-Strauch (n. d. Arzt in Uptom J. Fothergill, † 1780), Zier. *F. alnifolia* L. f. s. *Gardenii* Mchx. (N.-Amer.).
- Fourcroea (-croya)** Vent. (*Bromeliac.* od. *Amaryllideen*, VI. 1) „Fourcroy's“-Agave (n. Fr. v. Fourcroy, Gründ. d. Polytechnikums in

Paris, † 1809), z. B. *F. foetida* Vent. (*Agave foet.* L.) „Stinkagave“, *F. gigantēa* V. (*Agave cubensis*) mex. Gespinnst-Ag., s. g. Maguey-holzbaum.

**Fragaria** L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 5) Erdbeere, fr. fraise (-sier), e. straw-berry (lat. *fraga*, -orum Erdbeere v. fragro dufte), z. B. wild u. geb. *F. vesca* L. gem. Erdb. m. v. *sempertlorens*, fr. fraise de quatre saisons, Monats-E. (z. B. *Princesse royale*), *F. Majaufēa* Duch. (collina Ehrh.) Knackbeere (z. B. *vineux de Champagne*), *F. elatior* Ehrh. (moschata Duch.) Moschus-E., fr. capronnier, *F. virginiana* Duch. (z. B. Roseberry) Scharlach-E., *F. chiloēnsis* Ehrh. Chili-E., *F. grandiflōra* Ehrh. Ananas-E. — Zier. *F. indicā* Andr. (Ampel), e. yellow-str.-b., *vesca* L. v. *muricata* Duch. u. *grandiflōra* Ehrh. v. fol. variegat. Hort., *F. scabra* s. *chilensis* Ehrh. „Riesen-erdbeere“.

**Fragariastrum** Ser. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Erdbeer-Fingerkraut, s. *Potentilla fragariastrum* Ehrh. s. *fragariaefolia* Gm. (prostrata Fl. Wett. (deter. v. *Fragaria*).

**Fragifera** Koch (zu *Trifolium* sect. *Vesicastrum* Rchb.) (Legumin. *Trifolieen*, XVII. 4) Erdbeerklee, *Trif. fragiferum* L. etc. (*fraga* Erdbeere u. fero trage — näml. nach d. Blüten beerenförm. aufgebläsene Kelchröhren).

**Fragosa** Rz. Pv. (Araliaceen, V. 5) „Fragose“ (n. Joh. Fragoso, Leib-arzt Philipp's II., schr. 1572 üb. amerik. Arzneimittel).

**Fragraea** Reinw. (Contorten Loganiaceen, V. 1) Eisenholz v. Sumatra, Königsholz od. Tembesubaum Leun., *F. peregrina* Reinw. (vgl. *Fagraea*, wovon nur irrtümlich entstellt!).

1) **Franciscēa** Pohl (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Franzblume“, -strauch (n. Franz od. Franciscus II., Kaiser v. Österreich), *Gewächsh. F. uniflōra* Pohl, *eximia* Scheidw., *calycina* Benth. 2) **Franciscēa** (-*caria*) DC. (Crassulaceen, V. 5), *F. coccinēa* = *Crassula* s. *Rochea coccinēa* (*Calosanthos* c. Van Houtt.).

**Francōa** (-*kōa*) Cav. (Corniculaten Sedeen, X. 5) „Franco's“ -Dickblatt (n. d. span. Bot. d. 16. Jahrh.'s *F. Franko* in Valencia). — *Francoacēae* DC., A. Juss.

1) **Frangula** T. (sc. *Rhamnus*) L. (Rhamnaceen, V. 1) Faulbaum, „Bruch“-Wegdorn, Bruch- od. Pulverholz, Schwarzerle, fr. frangule, nerprun, bourgēne, aulne noir, rhubarbe de moines (— des paysans), e. black-berry-bearing alder od. breaking buck-thorn, s. *Frangula* *Alnus* Mill. (v. *frango breche* — Holz brüchig!). 2) **Frangula** Mill. (sect. von *Rhamnus*, V. 1), z. B. *Rh. rupestris*, *pumila* etc.

**Frankenia** L. (Violariēen Sauvageseen od. Frankeniaceen, VI. 1) „Frankenie“ (n. d. Prof. Frankenius z. Upsala, † 1661), z. B. *F. pulverulenta* L. u. *hirsuta* L. (*Nothria* h. Berg.).

**Fraxinaster** DC. (subgen. v. *Fraxinus*) (Sapotac. *Fraxineen*, XXIII. 2) Esche (deter. v. *Fraxinus* Esche), z. B. *F. excelsior* L., *angustifolia* Vahl, *parvifolia* Lam., etc.

**Fraxinella** T. (sc. *Dictamnus*) Pers. (Rutaceen, X. 1) weisswurziger Diptam, s. *Dictamnus albus* L., auch Eschwarz, fr. *fraxinelle* „Eschenstrauch“ (dem. *Fraxinus* — Ähnlichk. d. Blätt.).

**Fraxinus** T., L. (Sapotac. *Fraxineen* od. *Oleaceen*, XXIII. 2) Esche, fr. frêne, e. ash-tree (v. *φράξις* Zaun — Zaunholz!), Zier. *F. excelsior* L. s. *apetāla* Lam. m. v. v., z. B. v. *aurēa* W. (*Fr. aurēa* Pers.), v. *pendūla* Ait. Traueresche, fr. frêne parasol, v. *heterophylla* Vahl s. *monophylla* (*simplicifolia* W.), v. *angustifolia* Bauh., *F. parvifolia* W., *F. argentēa* Lois., *F. oxycarpa* W. (-*phylla* M.-B.), *F. americana* L. (*alba* Marshal, *acuminata* Lam.), *F. Ornus* L. Blumen-E., etc. — *Fraxinēae* (sc. *Sapotacēae*) Rchb.

- Fremontia** Torr. (Chenopodiaceen, V. 2) „Fremont's“-Gänsefuß (n. L. C. A. Fremont, schr. 1806 üb. Arachis, 1807 üb. Orobanche Diosc. etc.), Kalth. F. californica Torr.
- Frenela (-lia)** Mirb. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Fresnel's“-Cypresse (n. d. Physiker A. J. Fresnel ben.), F. australis, glauca, triquetra etc., s. Callithrix u. Cupressus.
- Freycinetia** Gaudich., DC. (Pandaneen od. Bromeliac., XXII. 1) „Freycinetie“ (n. d. franz. Schiffsap. Freycinet, auf d. bot. Reise unt. Gaudichaud's Begleit. 1817/20).
- Fritillaria** L. (Liliaceen, VI. 1) „Schachbrettblume“, Kaiserkrone, fr. fritillaire, e. fritillary od. crown-imperial (-thistle) (v. fritillus Schachbrett — scheckige Zeichnung einer Art!), Zier. F. imperialis L., fr. couronne imperiale, herbe aux sonnettes, e. imperial crown, m. v. v. (lutea maxima Hort. etc.), F. Meleagris L. Schachbrett- od. Brettspielbl., s. g. Kiebitzbl., F. persica L., fr. lis de Perse (— de Suse), e. persian fr. (Treibh.).
- Frullania** Raddi (Lebermoose, XXIV. 3) „Frullanie“ (n. d. Italiener Frullani), z. B. tamarisci u. dilatata Nees.
- Frustranča** L. (sc. Syngenesia L., XIX. 3) mit unfruchtbar. Randblütchen (frustrančus vergeblich).
- Fucaeāe** Ag., DC. Echte Tange (zu Ord. Fucoideāe Ag.), s. Fucus.
- Fuchsia** Plum. (Onagreen Myrobaleen, VIII. 1) „Fuchsie“ (n. d. Prof. in Tübingen Leonh. Fuchs, † 1565), Zier. F. coccineā Ait. (triphylla Plum.), s. Skinnera cocc. Forst., F. corymbiflora R. P. (Anden) m. v. nana, F. fulgens Lindl. (Mexiko), m. v. superba, v. floribunda u. v. pyramidalis; F. gracilis Ldl. (Mex.), microphylla Hb. u. Bpl., globosa Lindl. m. v. erecta u. v. maxima, F. serratifolia R. P., macrantha u. spectabilis Hook. (Königin d. Fuchsien), arborescens Sims (Schufia Spach — anagramm. Fuchsia!), excorticata L. f. (Neuseel.) etc.
- Fucoideāe** Ag., DC., Rchb. Tangalgen Rchb., Ledertange Seub., Schwarz-tange (fucus Tang, εἶδουαι gleiche).
- Fucus** L., Grev. (Tange, XXIV. 3) Seetang, fr. sart, goëmon (goesmond), e. tang (lat. fucus, gr. φύκος; Seetang, v. γίω wachse), z. B. F. vesiculosus L. gem. Blasentang, F. serratus L. Sägetang, etc.
- Fuligo** Hall. (Lycoperdaceen-Pilze, XXIV. 4) Russpilz, s. g. Lohblüte, s. Aethalium Lk. (fuligo, -inis Russ), z. B. F. candida Rebent. (Aeth. cand. Schidl.), F. septium s. flava Lk. „Lohblüte“, etc.
- Fumāna** Dun., Mill. (sc. Helianthemum Bauh. s. Cistus L.) (Cistineen, XIII. 1) heidelbeerblättr. Ciströschen (schwerl. v. fumus Rauch, sond. Eigennamen!), s. Chamae-Cistus Bauh.
- Fumaria** T., L. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) „Erdrrauch“, fr. capnoïde, fume-terre, fiel de terre „Erdgalle“, lait-battu u. pied de geline „Hühnerfuß“, e. fumatory (fumitory) (v. fumus Rauch — fein verteiltes Laub!), z. B. F. officinalis L., capreolata L. etc., s. Corydalis DC. u. Platycapnos Bernh. — Fumariacēa DC., -icēa Rchb.
- Funaria** Hedw., Schreb. (Moose, XXIV. 2) „Strick“- od. Drehmoos (funis Strick), z. B. F. hygrometrica Hedw. „wetteranzeigendes“. — Funariacēa Schimp.
- Fungi** L., DC., Rchb., Endl. Kl. d. Pilze od. Schwämme (fungus, gr. σπόγγος, fr. fonge, e. mushroom Schwamm).
- Funkia** Spreng. (Liliac. Hemerocallideen, VI. 1) „Funks“-Lilie (n. H. Chr. Funk, Apoth. in Gefrees am Fichtelgeb., † 1839), Zier. F. alba Andrews s. japonica Thb., caerulea Andr., grandiflora u. albo-marginata Hook., Sieboldi Hook., lancifolia Spr. m. v. fol. varieg. Hort. etc., s. Hemerocallis L. u. Hosta Tratt.

**Fusisporium** Lk. (Pilze, XXIV. 4) „Spindelsporen“-Schimmel (fusis Spindel, *σπορά* Spore — d. Sporidien spindelf!), z. B. *solani* Mart. s. g. „Kartoffelfäule“, *aurantiacum* Lk., s. *Camptosporum* aur. Spr.

**Gagēa** Ker (zu *Ornithogalum* Rchb.) (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Gagel“, Gelb- od. Goldstern (Paxton: n. d. engl. Mönch Thom. Gage, schr. üb. Amerika 1648, Wtst.: Sir Thom. Gage, bot. Dilettant dies. Jahrh.'s), z. B. *lutēa* Ker, fr. étoile jaune, s. *Ornithogalum* lut. L.

**Gaillardia** Sw., Foug. (*Galardia* Lam., Schreb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Gaillardie“, fr. gaillarde (n. Gaillard de Charentonneau, Liebh. d. Bot., Wtst. Marentonneau!), Zier. *G. picta* Sweet s. *Drummondii* DC. (bicolor var. *Drummondii* Hook.), fr. *G. peinte* m. v. *nana* Hort., *G. perennis* Hort. s. *lanceolata* Mchx. (*rustica* Cass.) m. v. *grandiflora* lutea Hort.

**Galactodendron** Kth. (Urticac. Artocarpeen, XXI. 1) „Milch“- od. Kuhbaum (*γάλα*. -ακτος Milch, *δένδρον* B.).

**Galanga** Rumph. (Scitamineen, I. 1) „Galgant“, e. galangal (malabar. kelengu!), *G. major* u. *minor* Rumph., s. *Alpinia* *Galanga* Sol.

**Galanthus** L. (Amaryllideen, VI. 1) Schneeglöckchen, eig. „Milchblume“ (*γάλα* Milch, *άνθος* Bl.), *G. nivalis* L., fr. perce-neige, violier d'hiver (- de Fevrier), violier bulbeux, galantine u. nivéole, e. snow-drop (-deep) m. v. *plicatus*, e. folded sn.-dr. (Caucasus).

1) **Galarrhoeus** Fr. (Hutpilze, XXIV. 4) „Milchfluss“, -pilz, Pepperling, Brätling (s. v. u. *δοά* od. *δοία* Fluss), z. B. essb. *deliciosus*, *piperratus* etc. — 2) **Galarrhoeus** (nicht -*rhaeus*!) Haw. (*Euphorbia*, XI. 3) „Milchfluss“, *G. creticus* Haw., s. *Euphorbia* *cret.* Mill.

**Galatella** Cass., DC. (zu *Aster* Rchb.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Milch-aster“ (v. *γάλα* Milch — weg. Milchsafte!), Zier. *G. punctata* Cass., *linifolia* Nees, *dracunculoides* DC., *Meyendorffii* Reg., *cana* Nees (*Aster canus* Waldst. Kit.).

**Galaxia** Thb. (Irideen, XVI. 1) „Milchschwertel“ (v. *γαλακτώ* gebe Milch), z. B. *ovata* u. *graminea* Thb., s. *Ixia* *Galaxia* u. *fugacissima* L. f., *G. narcissiflora* W. = *Sisyrinchium* n. Cav.

**Galbanum** Don (Umbelliferen, V. 2) Gummi-Galbanum, „Galban“- od. Mutterharzkraut, fr. galbanifère, e. galbanum, *G. officinale* Don (lat. galbanum Plin. Mutterharz, eine syrische Pfl.), s. *Opoidea* galbanifera Lindl., *Bubon* *Galbanum* s. *gummiferum* L.

**Gale** T. (sc. Myrica) L. (Amentac. Myricaceen, XXII. 4) gemeiner Gagel, Wachsbeere, brabanter Myrte, fr. galé (celt. gal = Balsam!).

**Galēga** T., L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Geisklee Seub., -raute, „Galei“ O. W., fr. rue de chèvre, e. goat's-rue (n. Ruelle das veränd. glaux, Wtst., v. *γάλα* Milch — den Ziegen Milch gebend!), Garten *G. orientalis* L., *G. officinalis* L., fr. Lavanèse, e. common g.-r., m. v. fl. alb. Hort. (bicolor Hort.), *G. tinctoria* L., fr. faux-indigo. — Galegēae (sc. Papilionacēae) Rchb.

**Galeobdolon** Sm., Huds. (Labiaten, XIV. 1) Gelb- od. Goldnessel, eig. „Wieselgestank“ (v. *γαλή* Wiesel od. Katze etc., *βδόλιος* Gestank), *G. lutēum* Sm., s. *Galeopsis* *Galeobdolon* L. (*Lamium* *Galeobd.* Crantz), Zier. var. fol. varieg. Hort.

**Galeopsis** L. (Labiaten, XIV. 1) Hohlzahn, Helmkrachen, fr. galéope, eig. „Mardergesicht“, auch Hanfnessel, fr. chambreule (chanvreule) (s. eb. u. *ὄψις* Gesicht etc.), z. B. *G. ochroleuca* Lam. Theekraut O. W. (*herba* *Galeopsisidis* Offizin.).

1) **Galēra** DC., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Mützenschwamm“ (galērus Mütze etc.), z. B. *lateritia* DC., s. *Agaricus* l. 2) **Galēra** Blum. (Orchideen, XX. 1) Mützen-O. (— d. *Columna* gewölbt).



- Galinsöga** Rz. Pv. (**-gaea** Zucc., **-gëa** Cav., **-gia** W.) (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Galinsogakraut“, Kleinstrahl, Knopfkrout O. W. (n. M. Galinsoga, k. Intendant zu Madrid), z. B. *parviflora* R. P., s. g. Franzosenkraut, s. *Mocinna* Lag. — *Galinsögäe* DC.
- Galipea** Aubl. (Rutaceen, II. 1) Angosturabaum (n. d. Galipons, Indianern am Orinoko), *G. Cusparia* St. Hil. s. *Angostura Cuspare* R. Sch., s. *Bonplandia* W.
- Galium** L. (Rubiaceen, IV. 1) Labkraut, Wald- od. Frauenstroh, fr. *caille-lait* (gaillet), *fleur de St. Jean*, e. runnet-herb (reinet-), *cheeserunnet* (-wort), *lady's bedstraw* (v. *γάλα* Milch — macht solche gerinnen, wie d. Kälberlab!), z. B. *G. verum* L. echtes L., s. g. Wegekr. od. Frauenstroh, e. our *Lady's-bed*, (*G. sylvaticum* L., e. wood-roof „Walddach“, -meister (echtem Waldmeister ähnlich!) etc.
- Galorrhoeus** Haw., s. *Galarrhoeus*!
- Galphima (-ia)** Cav. (Caryophyllen Malpighieen, X. 3) „*Galphimie*“, unechte Malpighie (*Anagramm* v. *Malpighia*!), z. B. *glauca* u. *hirsuta* Cav. — *Galphimicäe* Rehb.
- Gamolëpis** Less., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „*Vereinsschuppe*“ (*γάμος* Ehe, *λεπίς* Schuppe — d. Schupp. d. *Anthod.*'s bis mitten verwachsen), Zier. *G. Tagëtes* DC. s. *annua* Less., s. *Othonna* s. *Psilothonna* E. Mey. *Tagëtes*.
- Gamopetalae** DC., Endl. Kl. d. Ganzkronigen (s. eb. u. *πέταλον* Kronblatt — verwachs. Krone!).
- Ganja** Rumph., DC. (Tiliaceen, XIII. 1) Muspflanze D. (malay. Name!), *G. sativa* Rumph. s. *Corchorus capsularis* L.
- Garcinia** L. (Guttiferen Garcinieen, XI. 1) „*Garcinie*“ (n. d. Engl. Lawrence *Garcin*, Reis. d. 18. Jahrh.'s in Indien), *G. Mangostana* L. wohl-schmeck. Mangostane, fr. *brindone*.
- 1) **Gardenia** L. f., Ellis (Rubiaceen, Cinchonaceen, V. 1) (zu *Randia* Houst.) „*Gardenie*“, fr. *gardène* (n. Dr. Alex. Garden, Nat. in Carolina, Nord-Amer.), Treibh. *G. florida* L. s. g. *Cap-Jasmin* n. v. *plena* u. v. *Fortuneana* Hort., Warmh. *Stanleyana*, *G. radicans* Thb., *G. Rothmannia* L. s. *capensis* Thb. *Cap-Eisenholz*, *G. grandiflora* Hort. chines. Gelbschote, *G. Thunbergia* L. (*Thunbergia capensis* Montin). — *Gardeniacäe* Rich., -*nicäe* DC., Cham., Schldl. 2) **Gardenia** *Coldenia* Dietr., s. *Hypericum virginicum* (Dietr.) (*Hypericineen*, XVIII. 2).
- Gardoquia** Rz. Pv. (Labiaten, XIV. 1) „*Gardoquie*“, fr. *gardoquie* (n. d. Spanier *Don Diego Gardoqui*, Mitarb. d. Fl. Peruv., Wst. Finanz-min. Kön. Karl's IV. v. Span.), Zier. *G. betonicoides* Lindl. (*Cedronella mexicana* Benth., *Dracocephalum mex. Kth.*).
- Garidella** T., L. (Ranunculaceen, X. 3) „*Garidel's*“-Blume, fr. *garidelle* (n. d. Provencer *Pierre Garidel*, schr. Pfl. von Aix, † 1739), z. B. *G. Nigellastrum* L. „*Fenchelblume*“ u. *unguicularis* Lam.
- Garrya** Dougl. (Garryaceen od. Antidesmeen, XXII. 5) „*Garry's*“-Strauch (n. Nic. Garry, unterst. Douglas' Untersuch. d. Pfl. von Nordwest-Amer.), Zier. *G. elliptica* Dougl. (ähnl. *Viburnum*). — *Garryacäe* DC.
- Gasteria** Haw., Duv. (Liliaceen od. Bromeliaceen, VI. 1) „*Bauch*“-Aloe (v. *γαστήρ*, -*ερος*, -*στρος* *Bauch* — Blütenröhre an d. Basis), z. B. *ensifolia* Duv., s. *Agave ensif.*, *G. disticha* Duv. (*Aloë dist. L.*), *colubrīna* Nees, *subverrucosa* Salm-Dyck, etc.
- Gasteromycëtes** Fr. „*Bauch*“- od. *Balgpilze* (s. eb. u. *μύκης*, -*ητος* Pilz).
- Gastonia** Juss., Comm. (Araliaceen, XI. 5) „*Gaston's*“-*Aralie* (n. *Gaston* v. Bourbon, Sohn d. Kön. *Henri IV.*), z. B. *G. palmata* Roxb.
- Gastrolobium** R. Br. (Cassieen *Cäsalpinieen*, X. 1) „*Bauchhülse*“ (s. v.,

- λοβίον Hülschen — bauchig aufgetr. Hülse), z. B. bilobum R. Br. (Bstr. Neuholl.), Zier. calycinum, villosum, spinosum etc.
- Gastronēma** Herb., Sims (Amaryllideen, VI. 1) „Bauchfaden“ (s. v., *νήμα* Faden — d. Staubfäd. m. Antheren in d. bauchige Blüte eingeschl., Wtst.), Zier. G. clavatum Van Houtt., sanguinēum Lindl.
- Gaudinia** P.-B. (Gräser, III. 2) Ährenhafer Leun. (n. d. Bot. u. Pred. Gaudin zu Nyon, s. d. Aut.), G. fragilis P.-B., s. Avena fr. Host.
- Gaultheria** Kalm, L. (-thiera aut.) (Ericaceen, X. 1) Wintergrünstrauch, Theebeerenstr., canadischer od. Bergthee Rmpl., Scheinbeere Lauch., fr. gaulthérie, thé de Canada (- de Labrador, - de montagne) (n. d. schwed. Arzt Hugues Gaulthier in Quebec), Zier. G. procumbens L., fr. g. couchée, leucocarpa etc.
- 1) **Gaura** Jacq., Pers. (Onagrarien Oenotheren, VIII. 1) „Pracht-nachtkeze“ (*γαυρός* prächtig), Zier. G. Lindheimeri Engelm., G. biennis L., G. fruticosa scandens Loefl. (Combrētum laxum L.) etc.
- 2) **Gaura** Lam. (zu Lechēa L.) (Cistineen, III. 3) Leche's-Cistrose.
- Gay-Lussaccia** Hb. u. Bpl. (Ericaceen Vaccinieen, XVIII. 1) „Gay-Lussac's“-Torfheidelbeere, Buckelbeere Lauch. (n. d. Chemik. Gay-Lussac, † 1850), G. Pseudo-Vaccinium Cham., Schldl. (Brasil.), pulchra Pohl (Gewächsh.), G. dumosa Torr. u. Gr. (Decamerion d. Nutt.) etc., s. Andromeda u. Vaccinium.
- Gazania** G. (Compos. Gorterieen, XIX. 3) „Gazanie“ (n. Theod. Gaza, Übers. d. Theophrast, 1432), Zier. G. pavonina s. Pavonia R. Br. (Gorteria ringens Thb.), speciosa Less. (Gorteria pectinata Thb.) u. splendens Hort.
- Geaster** Pers., Fr. (-astrum Mich.) (Pilze, XXIV. 4) „Erdstern“ (*γη* od. *γέα* Erde, *αστήρ*, -έρος od. *αστρον*, lat. aster od. astrum Stern). — Geasteridēi DC.
- Geissöis** Lab. (Cassieen, X. 1) „Dachziegel“-Hülsenstr. (v. *γεῖσον* Dachziegel — Samen zweireihig ziegelartig), G. racemosa Lab. (Neucaledon.).
- Geissomeria** Lindl. (Acanthaceen, XIV. 2) „Ziegelkelch“, -ähren = Acanthus (*γεῖσον* Ziegel, *μοῖς* od. *-ος* Stück etc. — dicht ziegelartig ausseh. Blütenähren), Stuben: G. longiflōra R. Br.
- Gelasine** Herb. (Irideen, III. 1) „Lachschwertel“ (*γελασσινός* lachend — schön blaue od. violette Blüten!), Zier. G. azurea Herb.
- Gelsemium** Juss. (zu Bignonia Rchb.) (Bignoniaceen, XIV. 2) Carolina-Jasmin (gelsemium ital. Name für Jasmin), z. B. G. nitidum Mchx. s. sempervirens Pers., s. Bignonia semp. L.
- Genetyllis** (nicht -thyllis) DC. (Myrtaceen, XII. 1) „Venus“-M. (*γενετυλλίς* Schutzgöttin d. Geburt, Zuname der Venus), Zier. G. macrostegia u. tulipifera Hort.
- Genipa** Plum. (Cinchonac. Guettardeen, V. 1) Marmeladen-Büchsc, fr. genipayer (in Guiana genepapa, in Brasil. janipalea, Wtst.), G. Merianae Plum., s. Duroia Eriopila L. u. Gardenia L. f.
- Genipella** Rich. (zu Genipa Plum.), s. Alibertia Rich.
- Genista** L., Lam. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Genst“ od. „Ginster“, fr. genêt, e. lady's-slipper (v. d. celt. gen, Wtst.: lat. genu Knie?), z. B. sagittalis L. (Cytisus sag. Koch), fr. genistelle od. spargelle, G. tinctoria L. m. v. sibirica Hort., fr. fleur à teindre (herbe à jaunir, - aux teintures) u. gēnestrole, n. dyng-broom (dier's-), Stuben: G. canariensis L., alba L. u. ramosissima (Cytisus Atleyanus), monosperma Lam. (köstl. duft.) etc. — Genistēa Rchb.
- Gentiana** T. (Gentianeen, IV. 2 u. V. 2) „Enzian“, fr. gentiane, e. gentian, baldmony (*γεντιανή* Diosc. n. Gentius, Kön. d. Illyrier,

- der zuerst deren Wirkung erprobte, Paxton u. Wtst.), *G. lutea* L., e. bitter-wort, yellow g. (Offiz.), Zier. *G. acaulis* L., *verna* L., *asclepiadæa* L. s. g. Schellenkraut, wild *G. campestris* L., fr. gentianelle, etc. — *Gentianæae* DC. (-nae Juss., -nacæae Grck.) (zu Ord. Con-tortae Bartl.).
- Geoglossum** Pers., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Erdzunge“ ( $\gamma\eta$  od.  $\gamma\acute{\epsilon}\alpha$  Erde,  $\gamma\lambda\omega\sigma\sigma\alpha$  Zunge), z. B. *viride*, *hirsutum* etc.
- Geonoma** W. (Palmen, XXI. 6) „Erdpalme“ ( $\gamma\epsilon\omega\nu\acute{o}\mu\omicron\varsigma$  Landverteiler od. in d. Agrikultur erfahren — Stammspross. an d. Spitze werden zu neuen B.), z. B. *paniculigera*, Carderi Hort. Bull., *macrospatha* Spruce, etc.
- Georchis** Rchb. f. (Orchideen Neottieen, XX. 1) „Erd“-O. (s. v. u. Orchis — wächst auf d. Erde, nicht auf B.!), z. B. *subregularis* Rchb. f.
- Georgina** W. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Georgine“ od. Dahlie (n. d. Reis. in Sibirien, Prof. Georgi zu Petersburg, nicht nach König Georg III. v. Engl.!), s. *Dahlia*.
- Geracium** Rchb. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Habichtssalat“ (zu *Hieracium* L.) (Wtst. d. veränderte *Hieracium*! od. v.  $\gamma\eta\rho\acute{\alpha}\sigma\omega$  Perf.  $\gamma\epsilon\gamma\eta\rho\alpha\sigma\epsilon$ , altere — weg. d. Pappus!), z. B. *praemorsum*, *parviflorum* etc. Rchb.
- Geraniaceae** DC. (-niæae Rchb., -nia Juss.) Storchschnabelige, i. q. Grinales Endl. s. sogl.
- Geranium** L. (Geranieen, XVI. 4) Storchschnabel, fr. bec de cicogne (- de grue), géranier, e. stork's-bill (crane's-) (gr.  $\gamma\epsilon\sigma\acute{\alpha}\nu\iota\omicron\nu$  v.  $\gamma\acute{\epsilon}\sigma\alpha\nu\omicron\varsigma$  Kranich — schnabelige Frucht!), z. B. wild *G. columbinum* L., fr. pied-de-pigeon, e. dove's-foot, *G. Robertianum* L., fr. herbe à Robert, *G. rotundifolium* L., fr. mauvette „Malvchen“, *G. pratense* L., *silvaticum* L., wild u. Gärt. *G. sanguineum* L., *lancastrienne* Wither. etc.
- Gesnera** L., Rchb. (-ria Plum., Pers.) (Gesneraceen od. Scrophularineen, XIV. 2) „Gesnerie“ (n. Conr. Gesner, s. d. Aut.), Gewächsh. *G. s. Naegelia zebрина*, *cardinalis* Hort. s. *macrantha* Spr., *barbata*, *Bastarde Bethmanni* u. *Donkelaari*, *G. pulchella* Sw., s. *Achimenes coccinea* Pers. — *Gesneraceae* DC., -ræae Rchb.
- Gethyllis** L. (Amarylhideen, VI. 1) „Lust“- od. Duftlilie (-Narzisse), Papierlilie D. ( $\gamma\eta\theta\upsilon\lambda\lambda\iota\varsigma$  Porre, v.  $\gamma\eta\theta\omega$  ergötze), *G. ciliaris* L., s. *Papiria cil.* Thb., *G. plicata* Jacq., s. *Hypoxis* s. *Fabricia plic.* Thb.
- 1) **Gëum** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 3) Nelkenwurz, Benediktenkraut, Raffer O. W., fr. herbe de St. Benoît, e. herb-Bennet u. sanamund (v.  $\gamma\epsilon\acute{\upsilon}\omega$  schmecke, rieche? — ungewiss!), Zier. *G. coccineum* Sibth. „Scharlach“-N., wild. *G. urbānum* L., fr. gariot, e. throat-root, *G. rivale* L. Wiesen-Garaffel, etc., s. *Adamsia* Fisch. 2) **Gëum** (sc. Saxifraga) L. (Saxifragac., X. 2) nierenblättr. Steinbrech M.-Rchb.
- Gifola** Cass. (zu *Gnaphalium* Rchb.) (Compos. Gnaphalieen, XIX. 4) Schimmel-, Filz- od. Fadenkraut (Anagramm v. *Filago*!), z. B. *G. vulgaris* Cass. (*Gnaphalium germanicum* W. u. *pyramidatum* W.).
- Gilia** Rz. Pv. (*Gillia* Dietr.) (Polemoniaceen, V. 1) „Gil's“-Speerkraut (n. d. span. Bot. im 18. Jahrh. Ph. S. Gil, schr. mit Xarez üb. exotische Pfl.), Zier. *G. tricolor* Benth. m. v. v., *G. (Leptosiphon) brevicula* Gray, *G. laciniata* R.-P., *capitata* Dougl., fr. *G. à bouquets* etc., s. *Ipomeria*, *Ipomopsis* u. *Cantua*.
- Gillenia** Mch. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Gillen's“-Spiräe, fr. *Gillénie* (n. d. Arzt Ant. Gillen, s. d. Aut.), z. B. *G. trifoliata* Mch.

1) Ähnliche sind noch *Ifloga*, *Logfia* u. *Oglifa* Cass.

D. V.

- (*Spiraea trif. L. u. Gastonia palmata Roxb.*), fr. G. à trois folioles, e. three-leaved G.
- Gingko L.** (Coniferen Cupressineen od. Taxineen, XXI. 5) „Gingko-baum“ (vaterl. Name!), G. bilöba L. m. v. v. (*Arbor nucifera folio adiantino Kämpf.*), fr. gingo u. noyer de Japon, e. gingko-tree, s. *Salisburia adiantifolia Sm.*, e. maiden-hair-leaved Sal.
- Githago Desf.** (*Agrostemma*) L. (*Caryophylleen od. Sileneen*, X. 5) Rade, Kornblume (— rade), fr. lampette, e. darnel (git od. gith, n. *Plinius eig. d. Schwarzkümmel in Saaten!*), G. segētum Desf. (*Lychnis Githago Lam. s. segētum W. (nicaensis A. Br.) = Agrost. Gith. L.*)
- Glabraria L.** (Laurineen, XVIII. 4) Glatt- od. Leichtholz - Lorbeer (glaber, -bra glatt), s. *Arbor similis Camphorae od. Lignum laevis minus Rumph. (laevis glatt, levis leicht — n. Rumph. gering. spec. Gewicht).*
- Gladiölus T., L.** (Irideen, III. 1) „Schwertel“, Siegwurz, fr. gläieul (glayeul), espatule, e. sword-lily „Schwertlilie“ (dem. v. *gladius* Schwert), Gärt. u. Topfzier. G. communis L., fr. glé od. gläieul commun, e. common sw.-lil., G. gandavensis Hort. „Genter“-S. m. viel. v. v., byzantinus Mill., Colvilli Sweet, cardinalis Curt. „Scharlach“-S., ramosus Schneevogt, psittacinus Hook., etc.
- Glaucium T., L.** (Papavereen, XIII. 1) Hornmohn, Gilbkraut O. W., fr. glaucie, pavot cornu, e. horned poppy (v. *γλαυκός* blaugrün — näml. d. Blätter!), Zier. Gl. lutēum Scop. (*Chelidonium Glaucium L., Gl. flavum Crantz*), fr. gl. jaune, corniculatum Curt. s. phoenicēum G. (*Chelid. corn. L.*) m. v. tricolor Bernh.
- 1) **Glaux L.** (Primulaceen, V. 1) „Milchkraut“, Sermel O. W., fr. herbe au lait (— aux nourrices), e. milk-trefoil (v. *γάλαξ* Milch, Paxt. u. Wtst. v. *γλαυκός* s. eb.), G. maritima L. 2) **Glaux Bauh.** (sc. *Astragalus*) L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Schwielenblasen-Traganth.
- Glaziova Wendl.** (Palmen, XXI. 6) „Weddel's- od. Sprühpalme (— wie ein versprühender Springbrunnen!), Zier. G. elegantissima Wendl., s. *Cocos Weddeliana Hort. (Nam. in Brasil).*
- Glecōma (-chōma) L.** (Labiaten, XIV. 1) Gundelrebe, eig. Gunderrebe Mej., Gundermann, Grund- od. Erdrebe, Erdpheu, fr. lierre-terre, e. ground-ivy, cat's-foot, tunn-hoof (gr. *γλήζωρ*, lat. *pulegium Poley*, eine Lippenpfl.), s. Glechon Spr.
- Gleditschia L.** (Legumin. Mimoseen od. Cassieen, XXIII. 2) Lederhülsenbaum, s. g. Christusdorn (n. Prof. Gleditsch in Berlin, s. d. Aut.), Zier. G. triacantha L. m. v. v., fr. févier d'Amérique „amerik. Bohnhülsenb.“, e. honey-locust, amerik. thorny Acacia od. sweet-locust, e. auch three-thorned hon.-loc., G. inermis Hort. (*Mimosa Houstoni l'Hér.*), s. G. sinensis Lam. s. horrida W. m. v. inermis Hort. (*G. japonica Lodd.*).
- Gleichenia Sm.** (Farne, XXIV. 1) „Gleichen's“-F. (n. d. Bot. u. Mikrosk. Frhrn. v. Gleichen-Rusworm in Franken, † 1783). — *Gleicheniacēae Kze., DC.*
- Glinus L.** (Ficoideen od. Aizoideen Tetragoniaceen, XI. 4) „Klebrüster“, fr. glinole (*γλίρος* v. *γλία* Leim = klebr. Rüster F. W. Riemer, von Theophrast angew. auf Masholder, Paxt., Wtst.), z. B. G. lotoides L. u. dictamnoides L.
- Globularia L.** (Globularieen od. Buchnereen, IV. 1) „Kugelblume“, fr. boulette od. marguerite bleue, e. globularia (globulus dem. globus Kugel), Zier. G. longifolia Ait. (*salicina Lam.*). — *Globulariēae DC. (zu Personatae Bucherāe Rchb.).*
- Gloriösa L.** (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Prachtlilie“ (gloriosus ruhm-

- voll etc.), Zier. *G. superba* L. (Methonica Red.) (Ind.), Leopoldi Hort. (Westafri.), etc.
- Glossarrhen** Mart. (Violariaceen, V. 1 od. XIX. 6) Zungenveilchen, „Beutelszunge“ (*γλώσσα* Zunge u. *ἄρσόνιον* männlich etc. — Antherenspitze mit Zungenanhang), *G. floribundus* u. *pauciflorus* Mart. (Str. Brasil.), s. Schweiggera St. Hil.
- Glossodia** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Zungen“-O. (*γλωσσώδης* {zungenähnlich — Zungenanhang zwisch. Columna u. Labell), *G. major* u. *minor* R. Br. (Neuholl.).
- Gloxinia** l'Hér. (Gesneraceen, XIV. 2) „Gloxinie (n. d. Arzt Gloxin in Colmar, s. d. Aut.), Warmh. *G. hybrida* Hort. m. v. *crassifolia*, *speciosa* Ker (*Ligeria* sp. Ker), m. v. *erecta* Hort.
- Glumacēae** Bartl., Endl., DC., Rchb., Ord. d. Spelzblütigen od. Balgpflanzen (Graminēae u. Cyperoidēae).
- 1) **Glyceria** R. Br. (Gräser, III. 2) „Süssgras“, Schwaden Grck., Manna-schwengel, fr. herbe à la manne (manne de Prusse, - de Pologne), chien-dent aquatique (v. *γλυκερός* süß), *G. fluitans* R. Br. „Mannagrütze“, s. *Festuca fluit.* L. (*Poa* fl. Scop.), *G. aquatica* Wahlbg. „Wasserschwaden“ (*G.* s. *Poa altissima* Mnch., *Poa* aq. L., *G. spectabilis* M.-K.). 2) **Glyceria** Nutt. (Umbelliferen, V. 2) Wassernabel, *G. repanda* Nutt. u. *erecta* Nutt., s. *Hydrocotyle repanda* Pers. u. *erecta* L.
- Glycine** L. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Süssbohne“ (gr. *γλυκινός* od. *γλυκίς* süß), Zier. (Wanddekor.) *G. chinensis* Sims (*Wistaria* chin. DC.), m. v. v., *G. frutescens* L. (Wist. fr. DC. s. *speciosa* Nutt.), fr. Gl. d'Amérique, e. shrubby Bism. od. kidney-bean-tree, *G. subterranea* L., s. *Arachis africana* Wurm, fr. haricot de terre (- du Pérou), *G. arborens*, fr. haricot en arbrisseau „Bohnenbaum“, etc.
- Glycirrhiza** T. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Süssholz, „Süsswurzel“, fr. réglisse, e. sweet-root (s. eb. u. *ύλίζα* Wurzel), *G. echinata* L., *glabra* L., etc.
- Glycosmis** Corr. (-mīda Spr.) (Rutaceen od. Aurantiac., X. 1) „Süssduft“-Limonie (s. v., *όσμη* Duft), *G. pentaphylla* Corr., s. *Limonia* dent. (Sclerostylis Blum.), *G. arborea* Corr., *cyanocarpa* Spr. u. *chlorosperma* Spr., s. *Cookia cyan.* u. *chlor.* Blum.
- Glycyphylla** Raf. (Ericaceen, VIII. 1) „Süssduftblatt“ (*γλυκίς* u. *φύλλον* Laub — d. Blätt. riech. angenehm!).
- Glyptostrobus** Endl. (Coniferen, Cupressineen, XXI. 9) Nuss-Cypresse, s. *Cupressus nucifera* Hort. (v. *γλυπτός* Kupfer- od. Stahlstich, *στρόβος* Kiesel etc. — d. Früchte oben m. gefurcht. Torus).
- Gnaphalium** T., L. (Compos. Inuleen od. Gnaphalieen, XIX. 2) Flocken- od. Ruhrkraut, fr. herbe à coton, e. petti-cotty (v. *γναφάλιον* Flocke, Wolle etc.), z. B. *dioecum* L., fr. pied-de-chat „Katzenpfötchen“, e. dow-weed, s. *Antennaria* d. R. Br., *G. arenarium* L. (*Helichrysum* ar. DC.) „Sand-Immortelle“, -Immerschön Grck., fr. bouton d'or, e. everlasting-flower, als Zier. (Teppich) *G. lanatum* Hort. (*Helichrysum petiolatum* DC.), Gartenzier. *G. margaritaceum* L. perlköpf., fr. bouton d'argent od. perlière. — Gnaphaliēae Less.
- Gnetacēae** DC. (zu *Urticacēae* Rchb., *Piperacēae* Gaud., *Coniferae* Carr.), s. *Gnetum* L.
- Gnētum** L., Sm. (-ton Blum.) (Gnetaceen, XXI. 9) Meerträubel, z. B. *Gn. Gnemon* L. ind. *Gnemon*baum D. (st. *Cnetum* od. *Cnethum* v. *ζνιγ'θη* i. q. *ζνιδη* Nessel? — od. st. *Genetum* v. *γενητός* geboren? Wtst. d. veränd. *gnemon*! — ungewiss!).
- 1) **Gnidia** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Gnidischer“ Lorbeer od. ital. Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- Zeiland (v. Gnidus od. Cnidus, Seestadt in Karien), Zier. *G. imbricata* Thb., *radiata* Burm., *pinifolia* L. f., etc., s. *Passerina* u. *Daphne*.
- Godetia** Lindl., Spach (Onagrarien, VIII. 1) „Godetia“ (n. d. Bot. u. Reis. am Kaukasus, Ch. d. Godet, s. d. Aut.), Garten *G. rubicunda* Spach (*Oenothëra purpurëa* Curt.), fr. énothère pourpre, e. ruddy God. m. v. v., *G. Lindleyana* Spach (Oen. Lindl. Dougl.), etc.
- Goethëa** Nees, Mart. (Geraniac. Wallichien od. Malvaceen, XVI. 4) „Goethe“-Geranium (n. d. Dichter W. Goethe), z. B. *semperflorens* u. *cauliflora* Mart., s. *Pavonia* Cav.
- Goldfussia** Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Goldfuss“-*Acanthus*, *G. anisophylla* Nees, s. *Ruellia* anis. (n. d. Prof. Goldfuss in Bonn, † 184“).
- Gomotia** Mut. (-zia L. f., Schreb.) (Rubiaceen, IV. 2) „Gomozie“, Zier. *G. granadensis* L. f. Granatbeerensträuchlein, s. *Nertëra depressa* G.; viell. richtiger: *Gomezia* Mut. (Rubiaceen, IV. 2) (n. Bernh. Ant. Gomez, Verf. e. bot.-med. Werks üb. brasil. Pfl. 1803).
- Gomphidius** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Pflockgleicher“ (*γόμεφος* Pflock, Keil, *είδομαι* gleiche), s. *Gomphus* Pers. Keilpilz, z. B. *G. glutinosus* u. *viscidus*, schmieriger u. klebriger K.
- Gompholobium** Sm. (Cassieen, X. 1) „Pflockhülse“ (*γόμεφος* u. *λόβιον* dem. *λοβός* Hülse — diese wie ein Nagelkopf), Zier. *G. splendens*, *barbigërum* DC. „bartführende“, polymorphum R. Br., *virgatum* ds. etc., s. *Burtonia* R. Br. u. *Jacksonia* ds.
- Gomphrëna** L. (Amarantaceen, V. 2) Kugelamarant, s. g. Winterblume od. rote Immortelle, fr. fleur immortelle od. gomphrëne (v. *γόμεφωμα* Verbindung? — ungewiss!), Zier. *G. globosa* L. m. v. *nana compacta*, *aurantiäca* Decsn. (*Haageana* Klotzsch), etc.
- Gomphus** Pers., Nees (Pilze, XXIV. 4) „Keilpilz“ Kumm. (*γόμεφος* Pflock, Keil) (zu *Agaricus* L.), z. B. *roseus* s. *glutinosus* Pers. (Nadelw.).
- Gongora** Rz. Pv. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Gongora“-O. (n. Don Aut. Caballero y Gongora, Vicekön. von Neugranada, Wtst. Bisch. v. Cordova, Gönner v. Mutis), z. B. *Charontis* Rehb. f., *portentosa* Lindl. „abenteuerliche“, *quinquenervis* R.-P. (Südamer.) etc., s. *Coryanthes*, *Cirrhæa* u. a.
- Goniolimon** Boiss. (Plumbagineen, V. 5) „Eckwiderstoss“ (*γωνία* Ecke *Limonium*, s. d.), Zier. *G. tataricum* Boiss. (*Statice* tat. s. *strigosa* Pall.), *G. eximium* Boiss. (*Statice* ex. Schrank), *speciosum* Boiss. (*Limonium* spec. Pers.), *Stat. argentëa* Siev., etc.
- Goniophlebium** Blum, Presl. (Polypodiaceen-Farne, XXIV. 1) „Eckader“-F. (s. eb. u. *γλέψ*, -*εβός* Ader — die Nerven d. Wedel bilden drei- u. viereckige Figuren), *Stuben* *G. argütum* Sm., *subauriculatum* Blum.
- Gonolobëae** (sc. *Asclepiadëae*) Rchb., sogl.
- Gonolobus** R. Br. (*Asclepiadeen*, V. 2) „Kantenhülsen“-Wachspfl. (*γωνος* Eck, Kante, *λοβός* Hülse — diese kantig, dreirippig), z. B. *Schlingstr.* (Südamer.), *G. filiformis* R. Sch. (*Cynanchum leucanthum* Jacq. s. *Asclepias Jacquiniana* Dietr.), *guianensis* Spr. (*Cynanch. viridiflorum* Mey.).
- Goodenia** Sm. (Goodenovieen od. Campanulac. Lobelieen, V. 1) neuholl. Goodenough-Strauch, (n. d. engl. Bot. Dr. Goodenough, † 1827), *Stuben* *G. grandiflora* Sims, *ovata* Sm.
- Goodenoviëae** R. Br. (zu Ord. Campanulïnæ Bartl.), s. eb. *Goodenia* Sm.
- Goodia** Salisb. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Good's“-Ginster (n. Pet. Good, Samml. für d. Kew-Gärten in Neuholl.), *Gewächsh. latifolia* Sal. (Str. Neuholl.), *polysperma* DC. (*Cytisus tomentosus* Andr.), *simplicifolia* Spr. (*Platychilum Celsiusianum* Delaun.), etc.

- Goodyera** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) Spalt-O., Sacklippe (n. d. engl. Bot. John Goodyer zu Hampshire), *G. repens* R. Br. (Neottia rep. Sw., Satyrium r. L.), Gewächsh. pubescens Lindl.
- Gorinkia** Presl., s. *Conringia* Heist. (n. d. Nam. Conring, nicht Gorink!).
- Gordonia** Ellis (Theaceen od. Malvac., XVI. 8) „Gordonsstrauch“ (n. d. Gart.-Insp. Alex. Gordon zu Mile-Land, London), Zier. *G. javanica* Ell., s. *Franklinia* Alatumaha Marshal, *Lasianthus*, *Alcea* u. *Laplacea* Kth. *inaequalifera* Schott.
- Gorteria** L. (Compos. Gorterieen, XIX. 3) „Gorterie“ (n. d. holl. Prof. Joh. v. Gorter zu Harderwyk, † 1783), z. B. *G. (Gazania) ringens* Thb. u. *splendens* Hort., *pectinata* Thb. (*Gazania speciosa* Less.), *G. fruticosa* L. f. (*Tractylis oppositifolia* L.). — Gorterieae Rchb.
- Gossypium** L. (Malvaceen, XVI. 8) Baumwollpflanze, -strauch, -staude, fr. cottonier, e. cotton-tree (v. gossium Wulst v. d. arab. goz od. gothn sanfte Substanz), *G. herbaceum* L., *fr. carpas*, *G. religiosum* L. (Chin., Ind.) *Nanking-B.*, *G. arborcum* L. (Ind.).
- Graminēae** DC., Rchb. (-ina Juss.) (zu Ord. Glumacēae Bartl.) Gräser (gramen, -inis Gras).
- Grammanthes** DC. (Crassulaceen, V. 5) „Schriftblume“, fr. grammanthe (*γράμμα* Buchstabe, *ἀνθή* Blüte — d. Buchst. V auf d. Blumenblätt.), Zier. *G. gentianoides* DC., s. *Vauanthes* Haw. u. *Crassula* L.
- Grammatocarpus** Presl. (Loasaceen, XIII. 1) „Schriftfrucht“ *γράμμα*, -ατος Schriftzug, *καυτός* Fr. — d. Kapsel linienförmig gedreht), Zier. *G. volubilis* Presl. (*Scyphanthus elegans* Don).
- Grammatophyllum** Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schriftblatt“ (s. v., *γρίλλορ* Laub — Blätt. linienförm. gestreift), z. B. *Roemplerianum* Rchb. f., *speciosum* Blum. (Ind.), s. *Angraecum scriptum* Rumph. (*Epidendrum* scr. L. f., *Gabertia* scr. Gaud.).
- Grammitis** Sw. (Farne, XXIV. 1) Voll- od. „Schrift“-F. (v. *γραμμῆ* Schrift — linienförm. Sporangien), z. B. *Ceterach* Sw. (*Ceterach officinarum* W.).
- Granadilla** T., DC. (Passifloreen, XX. 4) „Granadille“, fr. grenadille, e. granadille (span. Name für *Passiflora* Passionsblume!), s. *Passiflora* L.
- Granatēae** DC., Seub. (zu *Lythariae* *Salicariēae* Rchb.) Granatbäume, s. sogl.
- 1) **Granatum** (sc. Punica) L. (Salicariēen Granateen, XII. 1) „Granatbaum“, fr. grénadier, e. granate, pomegranate (lat. pomum granatum „kernvoller Apfel“, v. granum Korn). 2) **Granatum** litoreum Rumph., s. *Xylocarpus Granatum* Kön. (Meliaceen, VIII. 1) ostind. Grenadillenholz, fr. grenadille de marqueterie.
- Graphophorum** Desv. (Gräser, III. 2) Pinselgras, „Schriftträger“ (v. *γραφή* Schrift, *φορός* tragend — d. Spelzen gekielt), z. B. *cynosuroides* Kön. (*Triodia cyn.* Spr.).
- Graphis** Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Schriftflechte“ (v. *γραφή* Schrift — Ansehen d. Flechte!), z. B. *Dumastii* Spr., s. *Fissurina* Dum. Fée.
- Gratiola** L. (Scrophularineen GratiOLEen, II. 1) „Gnadenkraut“ (v. *gratia* od. *grates* Gottesgnade), *Gr. officinalis* L., fr. *gratiola* od. *séné des prés*, „Wiesen-Sennes“.
- Grevillēa** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Greville's“-Silberstrauch (n. d. Bot. C. F. Greville, † 1809, Paxton, od. n. Rob. Kaye Greville, ber. schott. Kryptog.), Zier. *G. bipinnatifida*, *flexuosa*, *sericea*, etc.
- Grewia** L., Juss. (Tiliaceen, XIII. 1) „Grews's“, *Grew's-Capstr.* (n. Nehem. Grew, s. d. Aut.), z. B. *G. Microcos* L. (*Microcos paniculata* G.), *G. elastica* Juss. (Faserpfl. Ind.'s.).
- Greyia** Hook., Harv. (Saxifrageen, X. 2) „Grey's“-Kafferstrauch (n. Lord Grey of Groby?), *G. Sutherlandi* Hook.
- Griffinia** Ker (Amaryllideen, VI. 1) „Griffin's“-Narzisse (n. W. Griffin

Esq. v. South-Lambeth), Stuben Gr. Blumenavia K. Koch u. Bouché u. hyacinthina maxima.

**Grimmia** Ehrh. (Moose, XXIV. 3) „Grimm's“-M. (n. d. Arzt J. F. K. Grimm in Gotha, † 1821, schr. Fl. v. Eisenach), z. B. G. pulvinata Ehrh. „Polster“-M.

**Grossularia** Scop. (sc. Ribes) L. (Ribesiaceen, V. 1) Stachelbeere, „Kräuselbeere“, fr. grosseille (-eillier épineux), e. goose-berry-bush, fea-berry (feabe) (v. grossus dick, dem. grossulus kleine unreife Feige, od. viell. d. Altname „creutzelbeere“ latinisiert, Rümpler). — Grossulariäe (zu Peponiferae Leun. Ribesiaceae Rchb.), -aceae DC. Grck.

**Grubbia** Berg., Schreb. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Grubbia“ (n. Mich. Grubb, Vorst. d. ostind. Gesellsch., schr. Beitr. z. Capflora), G. rosmarinifolia Berg., s. Chamaelea africana Herm.

**Grinales** Endl. „Storchschnäbler“ (v. grus, -uis Kranich).

**Guaiaecum** L. (-jaecum Plum.) (Sapindac. Zygophylleen, X. 1) Franzosenholz v. St. Domingo, fr. gayac, bois-saint-à-pians (südam. Name d. Pfl. gujak!), G. officinale L. „Pockenholz“.

**Gujava** T. (-jaba) (Myrtaceen, XII. 1) Kujavebaum Leun. (vaterl. Name!), G. pyriformis G. s. alba dulcis Comm., pomifera Bauh. s. alba acida Pluk., s. Psidium pyrifera u. pomif. L.

**Guazuma** Plum., Juss. (Malvac. od. Büttneria, V. 1) Ochsenfrass, -brot (Nam. d. Pfl. in Mexiko), G. polybotrya Cav. u. tomentosa Kth., s. Bubroma pol. W. u. Theobroma Guazuma L.

1) **Guettarda** Vent. L. (Rubiaceae. Guettardeen, XXI. 7) „Guettard'sbaum“, fr. guettard (n. d. franz. Pflanzen-Physiol. Et. Guettard, 1748), G. speciosa L., fr. fleur de St. Thomé. — Guettardiäe (zu Rubiaceae) Rchb. 2) **Guettarda** Schreb. (Styracineen, XI. 1), G. argentea W., s. Halesia arborea Spr. Br.

**Guilandina** Juss. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) Kugel- od. Schusserbaum, fr. eniquier od. guénic, e. nicker-tree (n. Melchior Wieland, latin. Guilandus, Prof. in Padua, † 1590), G. Bonduc L., fr. bon duc, G. Moringa L. (Moringa polysperma G.) Behennussbaum, fr. ben, e. ben-nut, s. Hyperanthera Mor. Vahl, blaues Santel- od. Griesholz (lignum nephriticum), Zier. G. dioeca L. s. inermis Duham. (Gymnocladus canadensis Lam.), G. echinata Spr., s. Caesalpinia echinata autt. „Brasilienholz“.

**Guilelma** (-lielma) Mart. (Palmen, XXI. 6) „Wilhelminen“-P. (n. d. Kön. Kar. Wilhelmine v. Bayern, † 1841), G. speciosa Mart., s. Bactris Gachipaes Hb. u. Kth.

**Gunnëra** L. (Urticac. Artocarpeen od. Gunneraceen, II. 1) „Gunnerrpflanze“, fr. gunnëre (n. d. Prof. Gunner in Kopenh.), Ornament G. perpensa L. (Perpensum blitisperrum T.), Zier. G. scabra R. P. s. Panke acaulis Molin. „Panke“, s. g. Rhabarber-G., G. manicata, s. Misandra Comm. u. Acanthospöra Spr.

**Gustavia** L. (Myrtac. Melaleucac., XVI. 8) „Gustavbaum“ (n. König Gustav III. v. Schweden), Warmh. G. augusta L., s. Perigara hexapetala Aubl., Warmh. ferner G. speciosa DC., insignis Hook., fastuosa W., gracillima Miers, etc.

**Gutierrezia** Lag. (Compos. Solidagineen, XIX. 2) „Gutierrezie“, fr. gutierrezie (n. d. span. Bot. Gutierrez), Herbstzier. G. gymnospermoïdes Lag. (Gunthera viscosa Reg.), linearifolia Lag. (Galinsogea l. Spr.), etc.

**Guttiferae** Juss., DC., Endl., Rchb. (ungramm. Guttaeferae Kön.) Harzsafthaltige (gutta Tropfen, fero trage).

**Guzmannia** Rz. Pv. (Bromeliac., V. 2) „Guzmannie“ (n. d. span. Nat. u. Sammler A. Guzmán), Zier. G. tricolor R. P. (Pourretia sym-



- pagentëra R. P.) u. picta R. P. (Nidularium fulgens Lem.) etc., s. Pitcairnea l'Hér.
- Gwillimia** Rottl., DC. (zu Magnolia L.) (Magnoliaceen, XIII. 7) „Gwillimie“, asiat. Magnolie (n. d. franz. Bot. Guillemeau?), G. (Magn.) Yulan Desf.
- Gymnadenia** R. Br. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) „Nacktdrüsen“-O., Händelwurz O. W. (γυμνός nackt, ἀδην, -έρος Drüse), s. Orchis L. u. Habenaria W.
- Gymnanthëra** R. Br. (Asclepiad. Periploceen, V. 2) „Nackt-Anthere“ (s. eb., ἀνθηρὰ Staubbeutel), G. nitida R. Br. (Str. Neuholl.).
- Gymnocladus** Lam. (Cassieen Cäsalpinieen, XXII. 9) „Nacktabaum“, Schusserbaum (s. v., κλαδός Ast — nach d. Abfall. d. Blätt. auffall. nackte Aste!), Zier. G. canadensis Lam., s. Guilandina dioeca L.), fr. cliquier od. bon due du Canada, éscot Dietr., e. Kentucky-Coffee-tree, amer. stump-od. nickcr-tree „Knickerbaum“, s. Hyperanthera dioeca Vahl.
- Gymnogramma (-me)** Desv. (Farne, XXIV. 1) „Nacktschrift“-F. (s. v., γράμμα od. -μή Schriftzeichen — nackte Sporangien wie Schriftzüge!), Zier. G. peruviana argyrophylla s. argyrea Hort. u. chrysophylla Kaulf. aurea Hort. „Gold- u. Silber“-F., G. Wetenhalliana (Schwefelpuder, Blattquasten), sulphurea Desv., Lancheana Hort. (schönste Form!), etc., s. Acrostichum L., Grammitis Sw., Hemionitis L. u. a.
- Gymnomycetes** Rehb. „Nacktpilze“ (s. v., μύκηξ, -ητος Pilz).
- Gymnospermae** Endl., Kl. d. Nacktsamigen (στέμμα Samen) i. q. Coniferae Zapfenträger (Nadelhölzer).
- Gymnostachyum** Nees, Ch. Lem. (Acanthaceen, XIV. 2) „Nacktähren“-Acanthus (s. v., στάχυς Ähre — Ährenkolben blattlos! Wtst.), Zier. G. Verschaffelti Ch. Lem. (Blattpfl.), etc., s. Fittonia Coëm.
- Gymnōthrix** DC., P.-B. (Gräser, III. 2) „Nackthaar“ (s. v., θρίξ Haar — Borstenhülle d. Blüt. fällt ab), Zier. G. caudata Schrad., japonica Kth. u. latifolia Schult., G. crinita Hb. s. Pennisetum cr. Spr.
- Gynandrae** Endl. (zu Amphibrva Endl.) Kl. d. Weibermännigen (γυνή u. ἀνήρ, ἀνδρός Weib u. Mann — mit einand. verwachsen!).
- Gynandria** L. „Weibermännige“ (XX. Kl.) (s. eb. — verwachs. Geschlechtsteile d. Blüten!).
- Gynerium** Hb. u. Bpl., Nees (Gräser, XXII. 3) „Frauenhaar“, Pampasgras, fr. herbe géante des pampas (γυνή u. ζώιον Wolle — rauhaar. Spelzen d. weibl. Blütenchen), Zier. G. argentëum Nees, fr. Gyn. argenté od. roseau à plumes, e. silver-Gynerium.
- Gypsocallis** D. Don (Ericaceen, VIII. 1) „Gypsschöne“, fleischfarb. Heide, G. carneä D. Don, fr. bruyère à fleurs carneës, e. flesh-coloured Moor-Heath (γύψος Gyps. κάλλος Schönheit — auf Kalkboden, schöne Pfl., Wtst.), s. Erica saxatilis Salisb. (hederacëa L., bracteata Mnch.).
- Gypsophila** L. (Silenaceen, X. 2) „Gypslieb“, -kraut, fr. gypsophile u. soude vermiculaire „Wurm-Salzkraut“ (G. Struthium L. „Seifenkr.“), Zier. (Bouquete) G. paniculata L., elegans M.-B., Stevenii Fisch., scorzonrifolia Desf., muralis L. etc. (s. eb. u. φιλί Liebhaberin — liebt sonnig. trockn. Kalkboden).
- Gyrocarpus** Jacq. (Myrobalaneen, XXIII. 1) „Kreiselfrucht“ (v. γυρόω drehe im Kreise herum, περιστός Frucht — d. Fr. beim Hochwerfen weg. d. Flügel), G. americanus Jacq., asiaticus W. s. Jacquini Roxb. (Bäume).

- Habenaria** W., R. Br. (Orchid. Ophryd., XX. 1) Zaum- od. Zügel-O., Riemenlippe (v. habēna Zügel — Lippe riemenförm., Fadenorg. an d. Antherenbase), *H. bifolia* R. Br. (Platanthera b. Rehb., Orchis b. L.), *viridis* R. Br. (Plat. vir. Lindl., Satyrium v. L.), *albida* Sw. (Gymnadenia albida Rich., Orchis a. Scop. etc.).
- Hablitzēa (-tzia)** M. B. (**Habzelia** DC.) (Chenopodiaceae od. Annonaceae, V. 1 od. XIII. 7) Guineapfeffer (n. C. v. Hablitz, Reis. in d. Krim, Wittst. n. C. L. Hablitzl aus Preussen, in Russland erzogen, Begleit. v. S. G. Gmelin etc., schr. üb. Taurien), *H. tamoides* M. B.
- Habranthus** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) (zu Amaryllis Herb.) „Pracht“-Narzisse (*ἄρθος* reizend etc., *ἄρθος* Bl.), Zier. *H. intermedius* Herb., *kermesinus* Sweet, *Andersoni* Herb., etc.
- Habrothamnus** Endl. (Solaneen od. Celastraceen, V. 1) „Prachtstrauch“ (s. eb., *Γάυρος* Strauch), Winterzier. *H. elegans* Brongn., *corymbosus* Endl. (Meyenia Schldl.), *Regelii* Planch. (Guatemala), etc.
- Habzelia** DC. f. (Annonaceae, XIII. 7) Guineapfeffer, fr. coraya (v. habzeli, d. äthiop. Namen d. *H. aethiopicā* (Piper aethiop.), s. *Hablitzēa* M.-B.
- Hackēa** Schrad. (**Hakea** Wendl.) (Proteaceen, IV. 1) „Hake's“-Strauch (n. d. Bot. u. hannövr. Minist. Frhrn. v. Hake), Gewächsh. *H. petrophyllodes*, *florida* u. *nitida* R. Br., etc., s. *Conchium* Sm. u. *Banksia* R. Br.
- Haecquetia** Neck. (Umbelliferen, V. 2) Hüllen- od. Kleinkopfdolde, Doldenköpfchen (n. d. Prof. Balth. Hacquet in Lemberg, † 1788), z. B. *H. Epipactis* DC. gelbgrüne *H.*, s. *Astrantia* L. f. s. *Dondia* Epip. Spr.
- Haemadictyon** Lindl. (Apocyneen, V. 2) „Blutnetz“ (*αἷμα*, -ατος Blut, *δίτυνον* Netz — grosse dunkelgr. rotdurchad. Blätt.), Warmh. *H. nutans* A. DC. (*Echites rubro-venosa* Lind.) m. v. *maxima* (Prachtbelaubt!).
- Haemanthus** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Blutblume“, — Narzisse, fr. *hēmanthe* od. *fleur de sang*, e. blood-flower (s. e. u. *ἄρθος* — Blume tiefrot), Stuben *H. coccineus* L., fr. *serpentaire*, *H. puniceus* L., *cinnabarinus* Decsn., *albiflos* Jacq., *spiralis* Ait. (*Strumaria spir. Ker*), *multiflorus* L., *Toxicarius* L. (gift.).
- Haematococcus** Ag. (Urkornalgen od. Nostochineen, XXIV. 3) „Blutkügelchen“, s. g. roter Schnee (s. v., *κόκκος* Korn), s. *Protococcus nivalis* Ag.
- Haematoxylon (-um)** L. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Blut“- od. Campecheholz, Blauholz (s. v., *ξύλον* Holz — Farbe dess. blutrot!), *H. campechianum* L., fr. *campêche* od. *assourou*, e. blood-wood.
- Haemochäris** Salisb., DC. (Theaceen od. Ternstroemiaceae, XIII. 1) „Busch“- od. „Heckenthee“ (v. *αἷμος* Busch, Hecke, *χαῖρις* Freude — Wtst., *αἷμα* Blut? — Blum. meist schön rot?), s. *Gordonia* Spr., *Wickstroemia* Schrad., *Laplacēa* St. Hil.
- 1) **Haemodorum** Sm. (Liliac. Haemodoraceen, III. 1) Blutwurz, „-schlauch“ (*αἷμα* Blut, *δορός* Schlauch, Wtst.: *δώρον* Gabe — blutr. Wurzelknollen! *αἰμώδορον* Theophr. i. q. *Orobanche cruenta* Bertol.), *H. brasiliense* Spr. (Hagenbachia br. Nees). — Haemodoraceae R. Br.
- 2) **Haemodoron** Wallr. (Rhinanthac., XIV. 2) „Blut-Ervenwürger“ (zu *Orobanche* L.).
- Hakēa** s. *Hackea*.
- Halesia** L. (Styracineen od. Ebenaceen, XI. 1) „Hales“-Storaxstrauch, fr. *halésier* (n. Steph. Hales, s. d. Aut.), Zier. *H. tetraptera* L. Schneeflockenbaum od. „Vierflügelfrucht“, e. common snow-drop-tree, *H. stenocarpa* K. Koch, *H. arborescens* R. Br. (*Guettarda argentēa* W.), etc. (Austral.).

- 1) **Halicacäba (-um)** Rumph. (Sapindac., VIII. 3) gem. Herzerbse (gr. *ἄλικαζάβος* d. arab. alkekengi), s. *Cardiospermum Halicacäbum* L., fr. cardiosperme, pois-de-coeur, cor-inde, Alkekenge. 2) **Halicacäbum** (sc. Physälis) Scop. (Solanaceen, V. 1) Judenkirsche, fr. coqueret od. alkékengi, e. ebenso od. winter-cherry, s. *Physalis Alkekengi* L.
- Halianthus** Fr. (Alsinaceen, X. 3) „Salzblume“, Salzmiere Grck., See- miere (v. *ἄλις*, *-λός* Salz od. Meer — salz. Standorte), *H. peploides* Fr., s. *Honckenya pepl.* Ehrh. (*Arenaria p. L.*, *Alsine p. Wahlbg.*).
- Halimodendron** Fisch. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Salzstrauch“ (*ἄλιμος* salzig, *δέρδρον* Baum — salz. Standort!), Zier. *H. argentéum* DC. (*Caragana arg. Lam.*), *Robinia Halodendron* L. f.), e. silver-leaved Salt-tree (Sibir.).
- Halimus** Wallr. (Atripliceen, XXI. 5) „Salzmelde“, Wasserburgel, fr. halime (s. eb.), *H. portulacoides* Wallr. (*Obione p. Moq. Tand.*, *Atriplex p. L.*).
- Halodendron** L. f. (sc. *Robinia ds.*) (Legum. Galegeen, XVII. 4) „Salzbaum“ (*ἄλις*, *-λός* u. *δέρδρον*), s. *Halimodendron* Fisch.
- Halodiscus** Ser., Rmpl. (zu *Spiraea L.*) (Rosac. *Spiräac.*, XII. 4) „Salzscheibe“? (s. v., *δίσκος* lat. *discus* Scheibe? wahrsch. fehlerh. st. *Holodiscus* Lauch., s. d.).
- Haloragäe** DC., Rchb., Halorrhagidacäe Grck. Wassernussgew., s. *Haloragis*.
- Halorägis** Forst. (richt. **-orrhägis!**) (Halorageen, VIII. 4) „Seebeere“, Wassernuss (*ἄλις*, *-λός* Salz, Meer, *ῥάξι*, *-αγός* Weinbeere — Früchte Weinbeeren ähnl., am Meeresgestade!).
- Hamamelidäe** R. Br. (zu *Laurinäe* Rchb., Ord. *Umbelliflorae* Bartl.), sogl.
- Hamamēlis** L. (Hamamelideen, IV. 2) Zaubernuss, „Mitapfel“, Zaubersichel, e. witch-hazel (v. *ἄμα* zugleich, *μῆλον*, lat. *malum* Apfel — alte Frucht u. neue Blüte zusammen! Wtst.: eig. *Homomelis* v. *ῥμός* gleich — einem Apfel ähnl.), Zier. *H. virginica* L. s. *corylifolia* Mneh. m. v. *macrophylla* Hort., fr. *pistachier noir*, e. *virginian witch-Hazel* (wych-Hazel) virgin. Zauberst. — *Hamameläe* DC.
- Hamulium** Cass. (Compos. *Heliantheen*, XIX. 3) „Häkchen“-Alant? (v. *hamulus* Häkchen? — schwerl. v. *ἄμυλον* Stärkemehl!), s. *Verbesina alata* L.
- Hancornia** Gomez (Apocyneen, V. 1) „Hancornie“ od. Mangaiba (n. einem Portugies. Phil. *Hancorn*, Pfeiff.), *H. speciosa* Gom. u. *pubescentis* Mart. (Str. Brasil.).
- Hardenbergia** Benth. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Hardenberg's“ od. Kennedy's-Bohne (n. einer Gräfin Hardenberg, geb. v. Hügel), s. *Kennedya Vent.*
- Hardwickia** Roxb. (Cassieen, X. 1) „Hardwick's“-Hülsenbaum (n. d. Gen.-Maj. d. Artillerie Thom. Hardwick, Ostind. Compagnie), *H. binata* Rxb. (Faserpfl. Indiens).
- Harīna** Hamilt. (Palmen, VI. 2) „Stall“-P.? (lat. *hara* Schweinstall? Wtst.: ostind. Name!), *H. caryotoides* Ham. s. *Wallichia car.* Roxb.
- Harmala** Mneh. (sc. *Pegänum* L. (Rutac. *Zygophylleen*, XI. 1) gem. *Harmala*, Harmel- od. arabische Raute, fr. *harmale* (arab. harmel = Raute, Forsk.), *H. multifida* Mneh., s. *Pegan. Harm. L.*
- Harpalium** Cass., DC. (Compos. *Senecionideen*, XIX. 2) Starr- oder „Packsamenbl.“ (*ἄφραλις* od. *-λέος* festpackend — nämil. d. Samenhülle!), Zier. *H. rigidum* Cass., fr. *soleil rigide*, s. *Helianthus rigidus* Desf.
- 1) **Hartmannia** DC. (Compos. *Madien* od. *Sigesbeckien*, XIX. 2) „Hartmannie“ (n. K. J. Hartmann, schwed. Arzt etc., s. d. Aut.,

Pfeiffer n. Jos. Ad. Hartmann, Reis. etc.), z. B. H. Streetsii Gray u. H. Madia L., s. Hemizonia. 2) H. Spach (Onagrarien, VIII. 1) Hartm.'s-Nachtkerze, H. macrantha Spach, s. Oenothēra tetraplēra Cav.

- 1) **Hastingsia** Sm. (Labiaten, XIV. 1) „Hastingsie“ (n. Warren Hastings, Gen.-Gouv. Ostindiens, † 1818), Zier. H. coccinea Sm., s. Moluccella L. (Holmskioldia Retz.). 2) H. Kön. (Büttneriac., V. 1).
- Hauya** Moç. u. Sess. (Onagrarien Montinien, XXII. 4) „Hauy's“-Montinien (n. d. Mineralogen René Just. Hauy, † 1822 in Paris), z. B. H. elegans Moç. u. Sess.
- Haworthia** Duv., Salm-Dyck (Liliac. Aloideen, VI. 1) „Haworth's“-Aloë (n. d. engl. Bot. Haworth), H. albicans Duv., s. Aloë.
- Hebeclādus** Miers (Solanaceen, V. 1) „Flaumschoss“ (ἡβη Flaum, lat. pubes Mannbarkeitshaare, κλάδος Trieb, Ast), Zier. H. biflorus Hook. (Peru).
- Hebeclinium (-num)** DC. (Compos. Eupatoriaceen, XIX. 1) „Flaumlager“-Dosten (s. eb., κλίση Bett, Lager — Pubescenz d. Fruchtbodens), Zier. H. janthinum DC., s. Conoclinium j. Moore.
- Hebelōma** DC. (Pilze, XXIV. 4) Jugend-Blätterpilz Kumm., „Flaumrand“ (s. v., λῶμα Saum etc. — bez. d. gefransten Manschette, Wtst.), H. fastibile, truncatum etc., s. Agaricus L.
- Hebenstreitia** L., Thb. (Buchneren od. Selagineen, XIV. 2) „Hebenstreite“ (n. d. Prof. Hebenstreit in Leipzig, † 1757), Zier. H. dentata L. (alba Hort.), tenuifolia Schrad. (integrif. L.) etc.
- Hebradendron** Grah. (Guttiferen, XI. 1) „Hebräerbaum“ (ἑβραῖος hebräisch, δένδρον B. — rundum abspringende Antheren, wie durch Beschneidung), s. Garcinia amboinensis Gummiguttbaum (Stalagmiten cambogioides W. s. Gutta Offiz.).
- Hecatonia** DC., Richb. (zu Ranunculus L.) (Ranunculac., XIII. 7) Weissranunkel (ἑκατόν hundert — näml. Früchtchen in einer Blüte!), z. B. palustris u. pilosa Lour. s. cantoniensis DC., sowie Ran. pyrenaeus L., platanifolius L. etc.
- Hedēra** Sw., L. (Araliaceen, V. 5) Epheu, Eppich, fr. lierre (l'hierre), e. ivy, tree-ivy „Baumeppich“ (v. d. celt. hedra Cordel od. Wtst. ἑδρα Sitz v. ἕω sitze fest — an Stämmen etc.), wild u. Zier. H. Hélix L. europ. E. m. v. v. (palmata Hort. u. aborescens Hort., v. latimaculata elegans (um Spiegel herum), v. taurica Booth (Fenster. Ampeln), v. Leeana, v. digitata Hort., v. poetica Hort. etc.; H. hibernica Hort. irischer od. schott. E., H. colchica C. Koch (Roegneriana Hort.), H. algeriensis Hort. (canariensis W. u. maderensis Hort.). — Hederaceae A., Rich., DC.
- Hedycarya** L., Pers. (-ia Forst.) (Urticac. Monimieen od. Nyctagineen, XXII. 9) „Süssnuss“, Stielnuss (ἡδύς süß, κάρυον Nuss — nussf. Früchte sehr süß!), z. B. H. dentata L. (Str. Neuseel.), hirsuta Spr. (Bengal.) etc., s. Hydrocarya Spr.
- Hedychium** Kön. (Scitamineen Alpinien, I. 1) „Süssschnee“, Kranzblume D. (s. v. u. γιών Schnee — Liebl. Geruch), Warmh. H. coronarium Kön. (Kaempferia Hedychium Lam.), Gardnerianum Wall.
- Hedycrēa** Schreb. (Amygdalaceen od. Myrobalaneen, XII. 1) „Süßfleisch“, Zuckerpflaume D. (s. v., κρεάξ Fleisch — sehr süßes fleisch. Fr.), H. incana W. etc., s. Licania Aubl.
- Hedyotidēae** Cham., Schldl. s. Hedyōtis!
- Hedyōtis** Lam. (Rubiace. Cinchonaceen, IV. 1) „Süßohr“- od. Ohrkraut Leun., Oehrling D. (s. v., οὔζ, ὄτροξ Ohr — bez. d. Blätterform u. weg. süß. Geruchs), H. Auricularia L. (Valerianella palustris Burm.), hispida Lam. (Oldenlandia umbellata L.), graminifolia L. s. herbaea Forst. (Old. stricta Sw.) etc.

**Hedysarĉae** Rehb., s. sogl.

**Hedysarum** L. (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) „Süss“- od. „Manna-  
klee“, Hahnenkopf, fr. sainfoin u. tête de coq, e. cock's-head (gr.  
*ἡδύσαρον* v. *ἡδύς* süß u. *σάρον* Besen etc., Wtst. *αἰῶνια* Arom!),  
Zier. H. coronarium L. spanisch. H. od. Kron-Mannaklee, fr. sain-  
foin d'Espagne, e. garland-cock's-head m. v. fl. alb. Hort., H. capi-  
tatum Desf., H. sibiricum Poir., H. humile L., fr. tête de poule  
„Hühnerkopf“, H. cordatum Thb. (Hallia cord. Thb.), H. hamatum  
L. (Stylosanthes procumbens Schreb.), H. gyrans L. (Desmodium  
gyr. Desv.) beweglicher S., H. Onobrychis L. s. Onobrychis sativa  
Lam. s. viciaefolia Scop., Esparsette od. türk. Klee.

**Heinsia** DC. (-*zia* Van Houtt., -*zia* Scop.) (Rubiaceae. Cinchonac., V. 1)  
„Heinsius“-Chinastrauch (n. d. Philolog. Heinsius, Übers. v. Theo-  
phrast's Schr., Leyden 1613), Zier. H. tigrina.

**Helenium** L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Alant, fr. Hélénie, e. horse-  
heal od. bastard-sun-flower (gr. *ἑλέμιον* nach *ἑλέριος*, Sohn d. Kön.  
Priamus v. Troja? Wtst. wohl v. *ἥλιος* Sonne — Gestalt d. Blume!),  
Zier. H. autumnale L., tenuifolium Nutt., atro-purpureum Kth.  
Bouché m. v. grandicephalum Lem., lanatum Spr. (Actinella lan.  
Pursh), s. Trichophyllum l. Nutt., etc.

**Heleocharis** R. Br. (Juncaceen, III. 1) „Teichbinse“, -riet (*ἑλος*, -*εος*  
Teich etc., *χαίρις* Freude — wächst in Sümpfen!), H. palustris R.  
Br. (Scirpus p. L.), uniglumis Lk. (Scirp. un. Lk.), multicaulis  
Koch, etc.

**Helianthemum** T., Mill. (Cistaceen, XIII. 1) „Sonnenröschen“, fr. héli-  
anthème, fleur du soleil u. herbe d'or, e. sun-rose (*ἥλιος* Sonne u.  
*ἄνθεμον* i. q. *ἄνθος* Blume), Zier. H. polverulentum DC. (Cistus  
apenninus u. polifolius L.), grandiflorum DC. (variabile Spach), um-  
bellatum Mill., guttatum ds. (Cist. gutt. L.), vulgare G. (Chamae-  
Cistus Mill.) m. v. lutëum fl. plen., v. album fl. pl. etc., H. coccin-  
ëum Hort. v. fl. pl.

**Helianthus** L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sonnenblume“, fr.  
hélianthe, herbe au soleil, fr. u. e. girasol, e. sun-flower u. turnesol  
(*ἥλιος* u. *ἄνθος*), Zier. H. annuus L. (Peru) m. v. v. (uniflorus,  
macrophyllus, giganteus, flore pleno, globosus fistulosus Hort.), H.  
indicus L. m. v. nanus Hort. fl. pl., H. multiflorus L. m. v. fl. pl.  
u. orgyialis DC. (beide Nordamer.), H. argyrophyllus A. Gr., fr.  
soleil du Texas; H. tuberosus L., fr. topinambour, s. g. Erdbirne  
(cult.).

**Helichrysum** W., G. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Immerschön, Stroh-  
blümchen, fr. éternelle od. immortelle, fleur de paille, e. eternal-  
flower, everlasting- (gr. *ἑλί-* od. *ἡλιόχρουσος* „Sonnengold“ — glänz.  
goldgelb. Aussehen!), wild H. arenarium DC. Sand-Immortelle, s.  
Gnaphalium aren. L., Zier. H. bracteatum W. (lucidum Hänk. s.  
chrysanthum Pers.), Garten-Strohblume, m. v. v. brachyrrhynchum  
Sond., Humboldtianum Gaud. u. orientale G. (Bouquet-I.), macran-  
thum Benth. s. monstrosum Hort. m. v. monstr. purpureum nanum  
fl. pl., H. creticum, s. Tinaria G. Fr. „Mottenkraut“, etc., s.  
Elichrysum W. (s. d.).

**Heliconia** L. (Musaceen, V. 1) „Helikon“-Banane (n. d. Berg Helikon,  
Sitz der Musen, Myth.), Warmh. H. farinosa, discolor s. bicolor Benth.  
(Brasil.), Bihai Sw. „Pisang-H.“ (Musa Bihi Hort., Antill.) etc.

**Helietères** L. (Sterculiaceen, XVI. 7) „Schraubenfrucht“-Malve, „Schrau-  
benbohne“ Leun. (gr. *ἑλικτήριον*, -*ῆρος* Ohrgehäng — Kaps. spiral.  
gewunden), z. B. H. lanata Krz. (Oudemansia l. T. u. B.), H. Isora  
L. (Faserpfl. Ind. u. Jamaika's).

**Heliophĭla** L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Tagliebchen“, „Sonnen-

freund“ Rmpl. ( $\eta\lambda\iota\omicron\varsigma$  S. u.  $\gamma\iota\lambda\eta$ ) Freundin — Standort sonnig!), Zier. H. pilosa Lam. s. arabioides Hort. (Orthoscēlis pil. Spach), circaeoides L. f. Chamira cornuta Thb.) etc., s. Cleōme, Pilosa u. Peltaria L. — Heliophilēae Rehb.

**Heliopsis** Pers. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sonnenauge“ Rmpl., fr. héliopside (s. v.,  $\delta\psi\iota\varsigma$  Gesicht etc. — gelbgestrahlte Blüten!), Zier. H. canescens H. B. K. (Helianthus buphthalmoides Hort.), laevis Pers. etc., s. Acmella, Buphthalmum u. a. — Heliopsidēae DC.

**Heliotropium** T., L. (Boragineen, V. 1) „Sonnenwende“, fr. héliotrope, fleur des dames, herbe aux chancres „Skorpionschwanz“, -aux verrues „Warzenkraut“, e. héliotrope od. turnsol u. scorpion's-tail ( $\eta\lambda\iota\omicron\varsigma$  u.  $\tau\rho\omicron\pi\eta$ ) Wende, v.  $\tau\rho\acute{\epsilon}\pi\omega$  wende zu, drehe — wendet sich d. Sonne zu!), Zier. H. grandiflorum Don, s. corymbosum R. P., H. peruvianum L. m. v. v. (Boucheanum, Volaterranum etc.), fr. h. du Pérou od. herbe du Saint-Fiacre, e. widow-wail „Witwenklage“, s. g. Vanillen-Hel.; wild H. europaeum L.

**Helipterum** DC. (Compos. Anthemideen od. Inuleen, XIX. 2) „Schraubenflügel“-Immortelle (v. Helichrysum u.  $\pi\tau\acute{\epsilon}\theta\omicron\upsilon\nu$  Flügel od.  $\xi\lambda\iota\zeta$  Schraube — nur flaum. Pappus, sonst wie Helichrysum, Wst.) Sommer-Zier. H. anthemoides u. Sanfordi Hook. (Topf-Imm., Neuholl.), cassinianum DC., s. Schoenia Steetz.

1) **Helix** (sc. Hedēra) L. (Araliaceen, V. 5) europ. Epheu (s. Hedēra!) ( $\xi\lambda\iota\zeta$  alles Gewundene!). 2) **H.** (sc. Salix) L. (Salicineen, XXII. 2) Purpurweide, s. Salix purpurea L.

**Helleborine** Hall. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Nieswurz“-O., fr. élleborine (v. Hellebōrus, s. sogl. — von Haller weg. d. Ähnl. damit so benannt!), H. latifolia Bauh. (Epipactis Helleborine Crantz), s. Serapias latif. W. (Epip. lat. All.), H. angustif. Bauh. (Serapias longifolia L.).

**Hellebōrus** L. (Ranunculac., XIII. 7) Nieswurz, fr. u. e. hellebore od. fr. herbe de cru, e. sneeze-wort (gr.  $\xi\lambda\lambda\acute{\epsilon}\beta\omicron\theta\omicron\varsigma$ , n. Paxton v.  $\xi\lambda\iota$  bin tödlich u.  $\beta\theta\omicron\acute{\alpha}$  Speise — tötet durch ihren Genuss!), Zier. H. niger L. s. g. Christblume od. Schneerose O. W., fr. fleur d'hiver, e. christ-mass-rose, m. v. grandiflorus Hort., H. atrorubens W., Kit., purpurascens ds., orientalis Lam. (Griech.), olympicus Lindl., intermedius Guss. (Calabr.) m. v. abschasicus Hort., viridis L., wild H. foetidus L., fr. piēd de griffon „Greifenfuss“. — Helleborēae Rehb.

**Hellenia** W. (Scitamineen, I. 1) „Hellenius“-Gewürzllilie (n. C. N. Hellenius, Prof. in Åbo in Finnland, schrieb Dissert. acad. 1789 u. a.), H. coerulēa R. Br., rufa Presl., abnormis Ldl., grandiflōra Retz. (Costus speciosus Sm.), alba Retz. etc., s. Amōmum.

**Helminthia** Juss., Pers. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Wurmsalat“ Seub., -lattich M.-Rehb. (v.  $\xi\lambda\mu\iota\nu\varsigma$ , - $\nu\theta\omicron\varsigma$  Wurm — d. gestreift. Samen gleichen e. Hauf. Würmer), H. echioides G. scharfblättr., s. Picris ech. L.

**Helminthochorton** Ag. (-os Lk.) (Florideen-Tange, XXIV. 3) „Wurmtang“, -moos, -knotentang W. (s. eb. u.  $\chi\theta\omicron\tau\omicron\varsigma$  Futter etc. — wirkt wurmabtreibend), s. Sphaerococcus s. Ceramium Helminthochortos.

**Helobiae** (richt. **Heleobiae**) Bartl., Endl. Kl. d. Sumpflilien od. Schlammwurzler Rehb. ( $\xi\lambda\omicron\varsigma$ , - $\epsilon\omicron\varsigma$  Sumpf,  $\beta\iota\acute{\omega}\omega$  lebe).

**Helonia** L., W. (Juncaceen od. Melanthaceen, VI. 3) Torflilie, Schwindblume Rmpl., e. blazng-star (star-wort) (v.  $\xi\lambda\omicron\varsigma$  Teich etc.,  $\nu\eta\iota\acute{\alpha}\varsigma$  schwimmend — sumpflieb. Pfl.), Zier. H. latifolia Mchx. s. bullata L., s. Tofieldia calycina Wlhlbg. (Anthericum cal. L.) u. Scheuchzeria Pseudo-Asphodelus Scop.

**Helosciadium** Koch (richt. **Heleose.**) (Umbelliferen, V. 2) „Sumpfschirm“, Scheiberich O. W. (s. v.,  $\sigma\upsilon\acute{\alpha}\delta\iota\omicron\nu$  Schirmdach v.  $\sigma\upsilon\acute{\alpha}$  Schatten — in Sumpf wachs. Schirmpfl.).

- Helosëris** (st. **Heleos.**) (zu Cineraria) Rchb. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Sumpfsalat“ (s. v., *σέλις* Salat), s. Cineraria palustris L.
- Helôsis** Rich. (Balanophoreen, XXI. 1) Nagelstoss, -schosser (v. *ἤλος*; Nagel, Zwecke u. *ῶσις* Stoss — stösst nagelförmig hervor! Wtst. Schuppen nagelf.!), H. guianensis s. cayennensis Rich., s. Cynomorium cay.).
- Helospôra** Jacks. (Rubiaceen, IV. 1) „Nagelsamen“ (s. eb., *σπορά* Samen — diese krumm wie Krallen), H. flavescens Jacks. (kl. B.), s. Timonius fl. Bak. (Polyphragmon fl. Krz.).
- Helvella** L. (Pilze, XXIV. 4) Falten- od. Steinmorehel, fr. hélvelle (v. helveolus dem. helvus rötlich, od. helus i. q. olus, -ëris Gemüse, Helm. u. Rabenh. v. heluor schwelge: helvella jed. kl. Küchenkr.!), H. esculenta L. (essb.). — Helvellacëi Fr.
- Helwingia** W. (Santalac. od. Cornaceen, XXII. 3) „Helwingie“ (n. d. Bot. G. A. Helwing, Pred. zu Angersburg in Preussen, † 1748, schr. Fl. v. Preussen 1726 u. Flora campana Lps.), H. ruscifolia W., japonica W. (Osyris j. L.).
- 1) **Helxine** Rchb. (sect. v. Polygonum L.) (Polygonaceen, VIII. 1) „Windknöterich“ (gr. *ἑλξίνη* eine schleppende Pfl. v. *ἕλξω* schleife etc. — windend. Wuchs!), z. B. P. dumetorum L., Convolvulus L., tataricum u. Fagopyrum L. 2) **Helxine** Req. (Urticaceen, XXIII. 1) Wand- od. Glaskraut, Helxines herba Apoth. = Parietaria L., fr. helxine od. pariétaire, H. Soleirolii Requier, s. Parietaria Sol. Spr.
- Hemerocallis** L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) „Tagschöne“, -lilie, Affodil-Lilie Vilm., fr. hémérocale, e. day-lily (v. *ἡμέρα* Tag, *záλλος* Schönheit — nur b. hellem Tag offen!), Zier. H. fulva L. (crocea Hort.) m. v. v., flava L., fr. lis jaune, e. yellow day-lily, H. coerulæa W. (Funkia coer. Andr. s. ovata Spr.) etc., s. Funkia Spr.
- Hemiantra** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Halbanthere“ (v. *ἡμι* halb, *άντρο*, -δοος Mann, Staubbeutel — dies. nur halb!), Gewächsh. H. pungens R. Br. (Neuholl.).
- Hemiciidia** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Halbschliess“-Silberbaum (s. eb., *κλεις*, -δος Schloss — d. Frucht springt nur teilweise an d. Spitze auf), s. Dryandra R. Br.
- Hemimëris** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Halbblume“ (s. v. u. *μέρος*; Teil — ein Teil d. Blume viel grösser, so dass sie halb scheint), Gewächsh. H. urticifolia u. coccinea (Celsia linearis Jacq.), lineariifolia H. B., parviflora ds., etc., s. Celsia, Diascia DC., Alonsoa R. P.
- Hemionitis** L. (Farne, XXIV. 1) „Esels“-Farn, fr. hémionite, Halbmondkraut, Gitterfarn (gr. *ἡμιονίτις* v. *ἡμιώνος* Halb- od. Maulesel — bringt kein. befrucht. Samen hervor), Zier. palmata L. u. japonica Thb.; H. esculenta Retz. (Diplazium esc. Sw.) etc., s. Antrophyum Kaulf., Scolopendrium Sm. u. a.
- Hemitelia** Presl. (Baum-Farne, XXIV. 1) „Halbschleier“-F. (*ἡμιτελής*; halbvollendet — nämli. d. Fruchtschleiercheu zuletzt zurückgebogen), Warmh. grandifolia Spr. (Cyathea gr. W.).
- Henna** Alcanna Rauw. (Lythrarieen, VIII. 1) „Henna“- od. „Alkannawurz“, s. g. Schminckwurz (vaterl.), s. Lawsonia inermis L. f. s. alba (Alcannae verae radix zum Rotfärben!).
- Hepatica** L. (Ranunculac., XIII. 7) „Leberblume“, fr. hépatique, e. liver-wort (v. *ἥπαρ*, -ατος Leber — weg. d. Blattlappen), Zier. H. triloba Chaix (Anemone Hepatica L.) m. v. v., z. B. rubra fl. pleno, fr. herbe de la Trinité, e. three-lobed-Hep., angulosa Lam. (grossblum. azurbl.) etc.
- Hepaticæ** Juss. (-ci Rchb.) Kl. d. „Lebermoose“ (s. eb.) (einige geg. Leberkrankh.!).

- Heraclēum** L. (Umbelliferen, V. 2) Bärenklau, „Herakles“- od. Heilkraut Rmpl., fr. berce, e. comfrey u. bear's-breech (v. Ἡρακλῆς; Herakles od. Herkules, der sie zuerst anwandte, Plinius), Gart.-Zier. H. asperum M. B. s. Panaces Pers. (pubescens Villm., Rmpl.), giganteum Fisch., flavescens Baumg. (austriacum Pall.), wild H. Sphondylium L.
- Hermannia** L. (Sterculiac. od. Büttneraceen, XVI. 2) „Hermannie“ (n. Hermann, Arzt in Batavia, dann Prof. in Leyden, † 1695), Stuben H. fragrans (Str. Cap), alnifolia L. (Ketmia africana), triphylla L. (Connarus decumbens Thb.), etc., s. Ketmia T. u. Mahernia L. — Hermannieae DC.
- Herninium** R. Br. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Einknolle „Säulchen“-O., Ragwurz Grck., Hünge O. W., fr. hermin (v. ἑρμῖν. -ρος Bettstellenfuss — nur ein Fussstollen, d. i. eine Würzelknolle!), H. Monorchis R. Br. (Orchis Mon. Crantz, Ophrys Mon. L., Satyrium Mon. Pers.).
- Hernandia** L. (Myristiceen, XXI. 3) „Hernandie“, fr. hernandier (n. d. span. Bot. Dr. Franc. Hernandez, Leibarzt Philipp's II., 1593—1600 als Natf. in Westind.), H. ovigera L. „Eierbaum“, H. sonora L. „Rasselnuss“, span. Arbol de cañon „Kanonbaum“ (— Steinfrucht hohl m. losen Kernen!).
- Herniaria** L. (Illecebreen, V. 2) „Bruchkraut“ od. Tausendkorn, Harnkr. G. Frank, fr. herniaire od. herniole, herbe aux hernies, e. hern-hill, black-heath (v. hernia Bruchkrankheit — geg. diese angewendet!), H. glabra, hirsuta L. etc.
- Hertia** Less. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Hert's“-Fettpfl. (n. d. Bot. Joh. Casim. Hert, schr. de Pimpinella Saxifraga, Gissae 1726), H. s. Othonna crassifolia Less.
- Hesperaloe** (Liliaceen, VI. 1) Abend-Aloe, neue Zier. H. yuccaefolia rotblüh. Yucca (Tex.) (Ἑσπερος, lat. Hesperus od. vesp̄ra Abend etc.).
- Hesperidēae** L., Rehb. (—ides Endl., fr. hesperidées) „Hesperidenäpfel“ od. Orangen (v. Hesperia Hesperien od. Abendland, Spanien etc.) (s. eb.).
- Hesperis** L. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Abend“- od. Nachtviole, Frauenveil od. -Viole, Damaskenblume Wilm., Rmpl., Kilde O. W., fr. Julienne, Cassolette, Damas, Girarde etc., e. dame's-violet, rocket u. queen's-gilliflower (s. v.), Zier. H. matronalis L. m. v. v. (candidissima Hort. u. fl. alb. pleno Hort.), H. maritima Lam. (Cheiranthus m. L., Malcolmia m. R. Br.) Seestrand's-Levkoje, e. sea-rocket etc., m. v. fl. alb. Hort., H. bicolor Hort. (Malcolmia b. Boiss.), etc.
- Heterocentron** (-um) Hook., Arn. (Melastomac. Rhexieen, VIII. 1) „Wechselsporn“ (ἑτεροῦς anderer, wechselnd, abweichend, ζήτηρον Sporn etc. — d. Antheren d. läng. Staubfäd. m. gestielt. borstenförm., die d. kürz. nur an d. Basis zweihöcker. Connectiv), Warmh. H. rosēum Hook., subtrinervum ds., etc.
- Heteromorpha** Cham. (Umbelliferen, V. 2) „Wechselblatt“-Dolde (s. v., μορφή) Gestalt — nämll. d. beid. Teilfrüchtchen u. d. Blätt.), H. arborescens Schldl., s. Bupleurum arb. L.
- Heterotōma** Zucc. (Lobeliaceen, XIX. 6) „Anderschnitt“-Lobelia (s. v., τομή) Schnitt — Oberlippe d. Kelchs drei-, Unterl. zweispaltig), H. lobelioides Zucc., s. Heterosōma autt.
- 1) **Heuchēra** L. (Saxifrageen, V. 2) „Heucher's“-Steinbrech, fr. Heuchère (n. J. H. v. Heucher, Prof. z. Wittenberg, † 1747), H. americana L. Alaunwurzel, e. alum-root, s. Cortusa amer. Herm. u. Sanicula amer. spicata Pluk., Zier. H. micrantha Dougl. (N.-Amer.), villosa



- Mchx. (N.-Am.). 2) **Heuchĕra** dichotōma Murr. (Rubiaceen, V. 1), s. Oldenlandia pentandra Retz.
- Hevĕa** Aubl. (Euphorbiaceen, XI. 3) Kaoutschuk- od. Federharzbaum, fr. hĕvé (hewe Nam. d. B.'s in Guiana, Wtst.), H. guianensis Aubl., syn. Jatropha s. Siphonia Schreb. Cahuchu s. elastica Schr.
- Hexacentris** Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Sechssporn“ (ἕξ sechs, ζέν-τρον Sporn etc. — im Ganzen sechs Antherensporne! Wtst.), Warnh. H. mysorensis Wight (Mysore in Ostind.), s. Thunbergia L.
- Hexandria** L. VI. Kl. d. „Sechsmännigen“ (s. eb., ἀνῆρ, -δοός Mann, Staubgefäß!).
- 1) **Heyderia** K. Koch (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Riesen-Thuja, H. decurrens Koch (Libocedrus dec. Torr.), s. Thuja gigantĕa Carr. (n. d. Bot. Ed. Heyder, s. d. Aut.). 2) **H.** Fr. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) „Heyder's“-Morchel.
- Heynĕa** Roxb. (Hesperid. Meliaceen, X. 1) „Heyne's“-Orange (n. d. Bot. u. Indien-Reis. Dr. Benj. Heyne, † 1819), Zierb. H. quinquejuga Spr., s. Trichilia russinervis Blum.
- Hibbertia** Anderss., Salisb. (Dilleniaceen, XIII. 3) „Hibbertie“ (n. G. Hibbert, der durch Niven am Cap sammeln liess, † 1838), Ampel H. perfoliata Hüg. u. grossulariaefolia Sims, H. volubilis Andr. (Dillenia scandens W.).
- Hibiscus** L. (Malvaceen, XVI. 8) Eibisch, syrische Rose, Blumenbaum, fr. guimauve „Mistmalve“ (gr. ἰβίσκος od. ἐβίσκος, dem Ibis gew. Pfl., Paxt., Wtst.), Zier. H. syriacus L. s. Ketmie arborĕa Hort., fr. ketmie, H. rosa sinensis L. chines. Malvenrose Rmpl., H. splendens Grah. (Neuholl.), H. rosĕus Thor. (Süd-Eur.), Warnh. H. Cooperi Hort. (scheckblättr.), H. liliiflorus Cav., phoenicĕus W. (Ind.), Cameroni Knowl., mutabilis L., fr. fleur-changeante, Thunbergii Hort. (Sida vesicaria Cavend., africana Mill. s. grandiflora Hort.), Gartenbl. H. Trionum L. Stundenblume, cannabinus L., obtusifol. W. etc.
- Hicorius** Raf. (Juglandeen, XXI. 8) (zu Juglans L.) „Hickorynussb.“ (vaterl.), s. Carya amer. Nutt. etc.
- Hieracium** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Habichtskraut“, fr. épervière (herbe à l'épervier, e. hawk's-herb (-weed) od. kite's-foot u. sange (v. ἱέραξ, -ζος Habicht), z. B. H. murorum L., fr. pulmonaire des Français, Gartenbl. H. aurantiacum L., fr. ép. orangée, e. orange-hawk-weed od. golden mouse-ear, etc.
- Hierochlōa** R. u. Sch. (-chlōē Gm., Rchb.) (zu Holcus L.) (Gräser, XXIII. 1) „Heiligen“- od. Mariengras, Darrgras Seub. (v. ἱερός heilig, γλῶσα od. -όη Gras — s. g. Heiligen-Gras in Preussen), H. borealis R. u. Sch. s. repens P.-B., s. Holcus bor. Schrad. s. odoratus L.
- Higginsia** Rz. Pv., Pers. (Rubiace. Cinchonac., IV. 1) „Higgins“-Chinastrauch (n. Don O'Higgins, span.-amer. Beamten), z. B. aggregata, obovata u. verticillata R. P., s. O'Higginsia Rz. Pv., Campylobotrys Lindl. u. Evosmia H. B. K.
- Himantoglossum** Spr. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Riemen“- od. Rollzunge (v. ἴμαξ, -άντος Riemen, γλῶσσα Zunge — d. drei Labiumlappen lang riemenförmig!), z. B. hircinum Spr. (Loroglossum h. Rich.), s. Satyrium L.
- Himantophyllum** Ait., Spr. (Amaryllideen, VI. 1) „Riemenblatt“ (s. eb., φύλλον Laubblatt), s. Imantophyllum Hook. u. Clivia Lindl. (s. d.).
- Hindsia** (schlecht **Hinsia**) Benth. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Hinds“-Chinastrauch (n. R. B. Hinds Esq., Nat.-Liebh. u. Reis. 1836/42, nicht Wtst.: n. d. brasil. Nam. d. Pfl. Hinsia!).
- Hippeastrum** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Ritterstern“ (v. ἵππεῖς, -έως Ritter, ἄστρον lat. astrum Stern — d. Blätt. stehen zweizeilig

- od. „reitend“, d. Blüt. sternf. Wtst.), Warmh. *H. fulgidum* fl. pl. Van Houtt., Johnsii, reginae, vittatum Herb. m. v. v. (Winterbl.).
- Hippion** Schmidt, Spr. (Gentianeen, V. 2) „Rossveilchen“, Bitterblatt (v. *ἵπιος* Pferd u. *ἴον* Veilchen — gröss. als ein Veilchen), z. B. obtusifolium Schm. u. axillare ds., *H. vernum* etc., s. *Gentiana* etc.
- Hippocastānum** T. (sc. *Aescūlus*) L. (Sapindac. Hippocastaneen, VII. 1) „Rosskastanie“, fr. maron d'Inde, e. common horse-chestnut (s. eb. u. *καστανὸν* Kastanie), Zier. v. v. fl. pleno, argenteo-variegata u. laciniata Hort., v. rubicunda Schubert. — Hippocastanëae DC. (-nacëae Grck.).
- Hippocratëa** L. (Theaceen Malpighieen, III. 1) Waldmandelbaum (n. *Hippocrates* v. Kos, s. d. Aut.), *H. comosa* Sw. (*Cōa scandens* Plum.), *aspera* Lam. (*Tonsella scabra* Schreb.) etc. — Hippocratëae (sc. Theaceae) Rchb., -ticëae Juss., H. B. K., -teaçëae DC., Kth.
- Hippocrëpis** L. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) „Pferdehuf“- od. Hufeisenklee (s. v. u. *ζοηπίς*, -ἶδος; Schuh — Form d. Hülsen wie Hufeisen!).
- Hippomäne** L. (Rutac. Euphorbiaceen, XXI. 9) Mancinellenbaum, fr. hippomanes od. poirier vénimeux, eig. „Rosstrunst“ od. „Rossmanna“ (s. v. u. *μαρία* Raserei, Brunst, od. *μάρνη*, später *μάρνη* Manna — bei d. Alten ein Kraut in Arkadien etc.), *H. Manzinella* L. Curaregiftbaum, fr. manceniller, *H. biglandulosa* L. s. *Sapium acuparium* Jacq., fr. glutier. — Hippomanëae Rchb.
- Hippomarathrum** Fl. Wett. (sc. Sesçli) L. (Umbellifer., V. 2) „Rosfenchel“ (s. v., *μάραθρον* Fenchel), *H. pelviforme* Fl. Wett., s. *Sesçli articulata* Crantz.
- Hippophäë** (nicht Hippophaea!) L. (Santalac. Elaeagneen, XXII. 4) Sand- od. Seedorn, eig. „Rosstöter“ od. „Rosslight“, fr. hippophaë u. argousier (v. *φάω* töte, *H. d. Alten* aber = *Euphorbia spinosa*! nach *Andern* v. *φάος*, -εος; Licht — d. Genuss d. Blätt. für d. Augen der Pferde angebl. heilsam!), Zier. *H. rhamnoides* L. gem. Meerdorn, fr. lumière de cheval (Besingstrauch, Wolff) u. grisët, e. seabuckthorn, shallow-thorn.
- Hippüris** L. (Onagreen Halorageen, I. 1) Tannenwedel, eig. „Pferdeschweif“, fr. pesse od. pin aquatique, e. horse-tail (-willow), s. *Limnopenuce* Vaill., *Pinastella* Dill. (*ἵπιος* u. *οὐά, ἵπποῦρις* d. Alten = *Equisetum* u. *Ephedra*!). — Hippuridacëae Grck., -deae Lk.
- Hiraea** Jacq., L. (Caryophylleen Malpighieen, X. 3) „De la Hire's“-Malpighie (n. d. franz. Bot. de la Hire, † 1727), z. B. *H. reclinata* L. (*Trioptëris Hiraea* Banks), *odorata* W., *pinnata* W. (*Flabellaria paniculata* Cav.) etc. — Hiraeacëae Kth.
- Hircūlus** Tausch. (sc. *Saxifraga*) L. (Saxifrageen, X. 2) „Böcklein“-Steinbrech, cistblumiger St. Grck. (dem. *hircus* Bock — zwei hornförm. Griffel).
- Holcus** L. (Gräser, XXIII. 1) Ross- od. Honiggras, Darrgras Seub., Wolff, fr. houque u. cousse-couche (v. *ὄλκος*; an sich ziehend, Plinius: zieht Dornen aus d. Fleisch!), s. *Hierochlōa* u. *Arrhenatherum* P.-B.
- Holeracëae** L. i. q. Oleracëae Endl. Küchenkräuter (holus od. olus, -ëris Gemüse).
- Holodiscus** Ser. (nicht *Halodiscus* autt.!) (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) (zu *Spiraea* L.) „Ganzscheiben“-Spiräe (v. *ὄλος* ganz, *δίσκος*, lat. *discus* Scheibe — diese in d. Blüte mit ganzem Rand! Lauch.), z. B. *Sp. ariaefolia* Sims.
- Holoschoenus** Lk. (Cyperaceen, III. 1) Kugelriet (s. eb. u. *Schoenus* Knopfgras), *H. vulgaris* Lk., s. *Scirpus Holoschoenus* L.
- Holostëa** (sc. *Stellaria*) L. (Alsinaaceen, X. 3) grossblum. Sternmiere, Waldsternkraut, e. wood-row (-rovel „Waldroogen“) (v. *ὄλοστεός*

ganz knöchern — Kapseln! Paxt. u. Wtst. nach Plinius: Gegensatz, wie *lucus a non lucendo* — weich. Kraut!).

- Holostëum** L. (Alsineaceen, X. 3) Spurre, Schachtkohl Grök., fr. mignonne Ackernelkengras Wolff (s. eb.), *H. umbellatum* L.
- Holostigma** Spach (Onagrarieen, VIII. 1) (zu *Monopsis Salisb.*) „Ganz“ od. Kugelnarbe (s. v., *στίγμα* Narbe — diese ungeteilt!), Zier. Bottae Spach (Oenothera *Bistorta Veitchiana* Hort. „Veitch's Nachtkerze“), s. *Sphaerostigma bistortum* Walp.
- Homalia** Brid. (Moose, XXIV. 2) (zu Leskča Hedw.) „Gleichmoos“ (*ὁμαλός* gleichmässig — d. Sporangium an d. Basis gleich).
- 1) **Homalium** Jacq., Schreb. (Amygdaleen Homalineen, XIII. 3 od. XVIII. 4) „Regelrechtblume“ (s. eb. — gleichförm. Verteilung d. Staubfäden in Büschel!), z. B. *racemosum* Jacq. (Str.), *H. Racoubea* Sw. (*Racoubea guianensis* Aubl.) etc., s. *Blackwellia* Comm. u. *Capimoga* Aubl. 2) **Homalium** Pers. (Coniferen Abietineen, XXI. 9), *H. incanum* Pers., s. *Pinēda* inc. Rz. Pv. (Str.).
- Homogyne** Cass. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Brand- od. Alplatlich (*ὁμός* gleich, *γυνή* Weib, Bot. Stempel — ausser zwitterigen auch weibl. Blüten, deren beider Narben gleich), *H. alpina* Cass., s. *Tussilago alpina* L.
- 1) **Honckenya** Ehrh. (zu *Arenaria*) Rchb. (Alsineaceen, X. 3) „Honckenye“ od. Salzmiere, Porselei O. W. (n. Gerh. Aug. Honckeny, † 1794, schr. syst. Verz. d. deutsch. Gew.), z. B. *peploides* Ehrh. 2) **Honckenya** W. (Tiliaceen, XIII. 1) „Honckenys“-Linde.
- 1) **Hoppēa** L. (Sapotac. Mimusoopen, XVIII. 4) „Hope's“-Süssblatt (n. d. schott. Bot. Thom. Ch. Hope, schr. Tentamen inaug. de montibus etc. Edinb. 1787), z. B. *H. tinctoria* L. f. u. *dealbata* Hance. 2) **Hoppēa** Roxb. fehlerh. st. **Hoppēa** Dietr. (Tiliac. od. Dipterocarpeen, XIII. 1) „Hoppe's“-Flügelfruchtbaum, s. sogl.
- 1) **Hoppēa** Rchb. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Hoppee“ od. Hufattich-Cinerarie (n. d. Bot. Hoppe, s. d. Aut.), Zier. *H. speciosa* Rchb. (*H. s. Cineraria sibirica* L.). 2) **Hoppēa** Roxb. (Sapotaceen, X. 1) „Hoppe's“-Baum, *H. odorata* Rxb. (B. Ostind.), *dichotōma* W. (*Platera pusilla* Roxb.). 3) **Hoppēa** Nees (Cyperaceen, III. 1). 4) **H. W.** (Gentianeen). 5) **Hoppēa** Dietr. (s. v.).
- Hordëum** L. (Gräser, III. 2) Gerste, fr. orge, e. barley (v. horreo bin stachlig Leun. od. horridus rauh — weg. d. Grannen, od. Wtst.: *hordus* i. q. *fordus* schwer, trüchtig? — Brot daraus?), gebaut *H. vulgare* L. gem. vierzeil. (Winter- u. Sommer-) Gerste, e. beer- od. square-barley, *H. disty'chum* (-on) L. „zweizeil.“ od. „Sommer“-G., fr. pomette, e. buttleodon-barley, *H. hexastachyon* L. „sechszel.“ G., wild *H. murinum* L., fr. orge-follette (-sauvage), e. rye-grass „Mäusegerste“, Zier. *H. jubatum* L. „Mähnen“-G., e. maneaed-b.
- 1) **Horminum** T., L. (Labiaten Salviaceen, XIV. 1) Pyrenäen-Melisse, „Reizkraut“ (gr. *ὄρμινον*, -μῖνος v. *ὄρᾶω* rege auf, Dioscorides: reizt z. Liebe), Zier. *H. pyrenaicum* L. (*Melissa pys.* Scop.) s. g. Ritterkreuz. 2) **Horminum** Mnch. (sc. *Salvia*) L. (Labiaten, II. 1) Scharlei, Scharlachkraut, Zier. *H. coloratum* Mnch. (*sativum* Mill.), s. *Salvia colorata* Thore m. v. v., fr. sauge ormin, Prudhomme.
- Hornungia** Rchb. (Crucifer. Siliculos. XV. 1) „Hornungsschötchen“ (n. ein. Apoth. Hornung in Aschersleben), *H. petraea* Rchb., s. *Hutchinsia* p. R. Br.
- Horsfieldia** Blum. (Myristicaceen, XXII. 13) „Horsfield's“-Muskatnussbaum (n. d. engl. Reis. in Java Thom. Horsfield), *H. aculeata* Blum., *odorata* W., s. *Myristica* Spr.

- Hortensia** Comm., Pers. (sc. Hydrangea) Sm. (Saxifrageen, X. 2) „Hortensia“ (n. Commerson's Geliebten Hortense Barré ben., Wtst. n. d. Astronomin Hortense Lapaute, † 1788), Zier H. speciosa Pers. s. mutabilis Hort. (Hydrangea hortensis Sm. s. opuloides Lam.).
- 1) **Hosta** Jacq. (Verbenaceen, II. 1) „Host's“-Verbene (n. d. Arzt u. Bot. Host in Wien, s. d. Aut.), H. coerulea Jacq., s. Cornutia Plum.
- 2) **Hosta** Tratt. (Liliaceen, VI. 1) „Host's“-Tag-Lilie, H. japonica Tratt., s. Hemerocallis jap. W. 3) **Hostia** Mnch. (zu Barkhausia Rchb.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Host's“-Pippau, H. foetida Mnch. (B. s. Crepis foet.). 4) **Hostia** Fl. Flum. (Myrsineen, V. 1)
- 5) **Hostea** W. (Asclepiadeen, V. 2).
- Hoteia** Morr., Decsn. (Spiräac. od. Saxifrageen, X. 2) japanische Spiräe (n. d. japan. Bot. Ho-Tei, Wtst. n. ein. span. Bot.!), Zierstr. H. s. Spiraea japonica Decsn. Hort., fr. Hoteia du Japon, e. japanese Hoteia, s. Astilbe rivularis Hamilt. (Spiraea barbata Wall.).
- 1) **Hottonia** L. (Primulaceen, V. 1) „Hottonie“, Wasserfeder, fr. hottone, plume d'eau (plumeau od. -mette), mille-feuille-queue-de-cheval, auch lustre d'eau (n. Pet. Hotton, Prof. z. Leyden, † 1708), H. palustris L., Zier. H. indica L., s. Limnophila gratioloides R. Br. —
- 2) **Hottonia** W. (Onagrariaceen, XXI. 5), H. serrata W., s. Serpicula verticillata L. u. Udora Spr.
- Houlletia** Brongn. (Orchid. Vandeen, XX. 4) „Houllet's“-O. (n. d. franz. Gärtn. u. Reis. in Brasilien mit Guillemin, Houllet), H. picta Rchb. f.
- Houstonia (-tonnia)** L. (Rubiaceen, IV. 1) „Houston's“-Strauch (n. d. engl. Bot. W. Houston, s. d. Aut.), z. B. coerulea L. (Chamaejasme inodora Pluk.), H. purpurea L. (Knoxia p. Lam.), coccinea Jacq. (Bouvardia Jacquinii Hb.).
- Houttuynia** Thb., Schreb. (Aroid. Saurureen od. Alismaceen, III. 3 od. VII. 3) „Houttuynie“ (n. d. holl. Arzt u. Bot. Houttuyn), Zier. H. cordata Thb., „Herzblatt“-Echsenchwanz (Chin., Jap.), s. Polyparea cochinchinensis Lour., H. capensis Houtt., s. Montbretia cap. Bak.
- Hovea** R. Br. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Hove's“-Ginster (n. d. poln. Bot. Ant. Pantal. Hove, Reis. in d. Krim u. in Persien, Wtst. n. W. How, schr. Phytol. Brit. 1650), Gewächsh. Celsii latifolia, pungens, major etc.
- Hovenia** Thb., Schreb. (Rhamnaceen, V. 1) „Hoven's“-Süssdorn (n. ein. Bot. Dav. v. d. Hoven, holl. Commiss. in Japan, Wtst.), H. dulcis Thb., span. Arbol de corintas „Korinthenbaum“.
- Howardia** Weddell (Cinchonaceen, V. 1) „Howard's“-Chinabaum, H. caracasensis Wedd.
- Howea** Becc. (Palmen, XXI. 6) „Howe's“-Palme, H. Belmoreana Becc. (n. W. E. Howe, s. d. Aut.).
- Hoya** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Hoy's“-Wachspfl., s. g. „Porzellan- od. Wachtblume“ (n. d. engl. Zücht. Thom. Hoy, Ob.-Gärtn. d. Herz's v. Northumberland), Stuben H. carnosa R. Br., Warmh. bella Hook. (Ampelpfl.), imperialis Lindl. (Borneo), variegata de Vriese (Jap.) etc.
- 1) **Huegelia (Hügelia)** Benth. (Polemoniaceen, V. 1) „Hügelie“ (n. d. Baron K. v. Hügel zu Wien, Reis. in Ostind. u. Austral. 1831/36), H. cyanea Rchb. (collomioides DC.). 2) **Huegelia** Rchb. (Araliaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Hügel's“-Aralie, Zier. H. coerulea Rchb., fr. Huegelie azurée, e. blue H., s. Didiscus coer. Hook. u. Trachymene coer. Grah. 3) **Huegelia** R. Br. (Diosmeen Boronieen, VIII. 1), s. Decadantha Rchb. s. Boronia Sm.
- Hugonia** L. (-na Cav.) (Hugoniaceen, XVI. 6) „Hugonie“ (n. d. engl. Bot. J. Hugon, schr. 1711 bot. System), H. mystax L. „Knebelbart“-H. (Aegoceros etc. Raj.), s. Modira canni Rheed.

- 1) **Humboldtia** Vahl (Boragineen, V. 1) „Humboldtie“ (n. Al. v. Humboldt), *H. laurifolia* Vahl (Str. Ceyl.), s. *Batschia* l. Vahl. 2) **H.** Rz. Pv. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Humboldt's“-O., z. B. *cordata* R. P., s. *Stelis* cord. Sw. 3) **H.** Wall. (Cassieen, X. 1), *H. Brunonis* Wall. 4) **H.** Neck. (Gentianeen, V. 2).
- 1) **Huměa** Sm. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Hume's“-Aster (n. d. Lady Hume, Bar. of Wormleybury Hertsh., † 1837), Zier. *H. elegans* Sm., fr. *Humée élégante*, m. v. v. (z. B. purpurěa), s. *Calomeria amarantoides* Vent. (Razumovia paniculata Spr.). 2) **Humea** Roxb. (Tiliaceen, XIII. 1).
- Humiria** (Houn-) Aubl. (-ium Rich., A. Juss.) (Meliac. Humiriaceen, X. 1) „Humirie“ (bei den Galipons in Guiana houniri), *H. balsamifera* Aubl. (*Vantanea paniculata* Urban), *H. contractum* Moric. (Myrodendron amplexicaule W.). — Humiriaceę Mart. (zu Meliaceę od. Styracęe Rchb.).
- Humulus** L. (Urticaceen, XXII. 5) Hopfen, *H. Lupulus* L., fr. houblon, vigne du nord, e. hop- od. hops-plant u. bind (d. germ. Humal latinisiert! nicht etwa humilis — weil auf der Erde = humus kriechend).
- Hunnemannia** Sweet (Papaveraceen, XIII. 1) „Hunnemannie“ (n. d. engl. Reis. u. Samml. J. Hunnemann, † 1839), Zier. *H. fumariaefolia* Sweet.
- Huntleya** Batem. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Huntley's“-O. (n. d. Geistl. u. Samml. Huntley), z. B. *violacea* Lindl. u. *Meleagris* ds.
- 1) **Hura** L. (Rutac. Euphorbiac., XXI. 9) Sandbüchsenbaum, fr. sablier (südamer. Name hura!), *H. crepitans* L., s. g. Rasselbüchse, fr. hura. 2) **Hura** Kön. (Scitamineen, I. 1), *H. Siamensium* Kön., s. *Globba Koenigiana* Spr.
- 1) **Hutchinsia** Wight Arn. (Aselepiad., V. 2) „Hutchinsie“ (n. d. Irländerin Miss Hutchins, Kryptogamistin). 2) **Hutchinsia** R. Br. (zu *Lepidium* Rchb.) (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Hutchinsie“ od. Remse O. W., Stein- od. Zwergkresse, *H. petraea* u. *alpina* R. Br., s. *Lepidium* u. *Hornungia* petr. Rchb. 3) **Hutchinsia** Ag. (Tange, XXIV. 3) „Hutchins“-Tang, z. B. *fastigiata* vierteil. *H. Wagn.*, s. *Polysiphonia* Grev. u. *Callithamnion* Lyngb.
- Hyacinthus** T., L. (Liliaceen, VI. 1) „Hyazinthe“, fr. hyacinthe (Jacinthe), e. hyacinth, crow-toes, our Lady's-flower (gr. Ὑάκινθος *Hyacinth*, Liebl. d. Apollo, Myth., die Hyacinthe d. Alten = *Gla-diolus communis*, viell. v. d. arab. jakuth „rot“ abzuleiten), Zier. *H. amethystinus* L., fr. Jac. améthyste, e. blue-bottle od. amethystine h., m. v. v. (s. *H. hispanicus* Lam. s. *angustifolius* Med.), *H. orientalis* L. gem. Garten-H., fr. Jac. cultivée, e. oriental h., m. v. v. (Holländ., Pariser, einf. Passe-tout, *H. albus* Jord, fr. blanc de montagne, *H. praecox* Jord. fr. romaine blanche „früheste Topf-H.“).
- Hybanthus** Jacq. (Violaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Buckelveilchen“, „blume“ (ὕβανθος bucklig, ἄρισθος Bl. — bez. d. Form d. Kronblätt.), *H. havanensis* Jacq., s. *Viola Hybanthus* L. (klett. Bstr. Südamer.).
- Hydnum** L. (Pilze, XXIV. 4) Stachelpilz, essb. *H. Erinaceus*, fr. érinace od. hydne, fr. u. e. urchin (gr. ἵδρον od. οἶδρον Trüffel). — *Hydnē* DC.
- Hydrangæa** L. (Saxifrageen od. Corniculat. Cunoniac., X. 2) „Wasserstrauch“ (v. ἵδωq in comp. ἕδωq- Wasser, ἄγγος-, εος Urne — Ähnl. d. Frucht m. ein. Wassergefäß, Lauch.), Zier. (Topf) *H. Hortensia* Comm. (*hortensis* Sm.) s. *japonica* v. Sieb. (*opuloides* Lam., *Hortensia rosęa* Desf. s. *speciosa* Pers. japan. Rose Leun.), *H. arborescens* L. (*vulgaris* Mchx., *frutescens* Mnch.), *H. Otasca* v. Sieb. (n. Siebold's in Japan geborn. Tochter ben.) etc.

- Hydrastis** L. (Ranunculac., XIII. 7) „Wasserbürgerin“ (v. ἵδωρ, ἵδωο- u. ἀστὴ Stadtbewohnerin, Wtst. n. ein. Amerikanerin ben.), *H. canadensis* L. (Warneria Mill.).
- Hydrilla** Rich. (Hydrocharideen, XXII. 8) „Wasserquirl“, *H. verticillata* Casp. (Ἵδωο- u. ἴλλω wälze — quirlständ. Blätter!), s. *Serpicula* vert. L. f. u. *Udora occidentalis* Koch.
- Hydrocarÿes** Lk. „Wassernussgew.“ (v. ἵδωο- in compos. Wasser, ζάρον Nuss).
- Hydrocëra** Blum. (Oxalideen od. Balsamineen, V. 1) „Wasserhorn“ (s. v. u. ζέρας od. ζερός Horn — 5 spitze, sitzende Narben!). — *Hydroceræa* Blum. (zu Ord. Gruinales Bartl.).
- Hydrocharidëae** DC., Rchb. -ides Juss. Froschbissgew., Nixenkräuter Rchb. (zu Ord. Hydrocharidinae Bisch., s. sogl.).
- Hydrochäris** L. (Hydrocharideen, XXII. 8) Froschbiss, *H. morsus ranae* L., fr. morène, e. frog-bit (s. v. u. χάρις, -ιδος Freude — Fundort!).
- Hydrochlōa** P.-B. (Gräser, XXI. 6) „Wassergras“ (s. v., γλοά od. -οῆ Gras), s. *Hydropyrum* Lk.
- Hydroclëis** L., Rich., Comm. (Alismac. od. Butomeen, XIII. 5) „Wasserstolz“ Rmpl., fr. hydroclëide (s. v. u. ζλέος Ruhm, Wtst. ζλέος Schlüssel — schliess. Milchsaft ein!), Zier. *H. Humboldti* Endl. (Limnochäris Humb. L., C. Rich. u. *Stratiotes nymphoides* W.).
- Hydrocotÿle** T. (Umbelliferen, V. 2) „Wassernabel“, Nabel O. W., fr. hydrocotyle, goblet (gobelet od. écuelle d'eau), herbe aux Patagons (s. v. u. ζοτύλη Höhlung, Nabel — d. rund. Blätt. mitten vertieft), *H. villosa* L. (*Centella* v. s. *Mercurialis afra* L.), spananthe W. spärlich blüh. (Spananthe articulata Jacq.), vulgaris L., etc. — *Hydrocotyleae* DC., Spr.
- Hydrolapāthum** Huds. (sc. Rumex) L. (Polygonaceen, VI. 3) „Wasserpimper“, e. water-sorrel, Flussampfer Grek., Butterweckenkraut (z. Einwickeln von Butter!), Hunger- od. Pockenkr., Rossampfer, wilder Rhabarber, fr. oseille à longues feuilles (s. v., ζάλαθρον Ampfer).
- Hydrolëa** L. (Hydroleaceen, V. 2) „Wasser-Ölstrauch“, „-Olive“, Kleber D., fr. coutarde (s. v. u. Olea Öl- od. Olivenbaum, od. olëum Öl — d. Blätt. ölig, schmierig!), *H. crispa* u. *urens* L. (*Wigandia* cr. u. ur. Kth.), *spinosa* L., *zeylanica* Vahl (Nama zeyl. s. *Steris aquatica* Burm.).
- Hydropeltidëae** DC., Bartl. „Wasserschildpfl.“ od. Wasserrosen, sogl. (πέλιτη Rundschild, εἶδομαι gleiche).
- Hydropeltis** Mchx. (Nymphäac. Hydropeltideen od. Podophylleen, V. 1) „Wasserschild“ (s. eb. — bez. der aufliedend. Blätt!), z. B. *purpurea* Mchx., s. *Brasenia peltata* Pursh.
- Hydrophäce** Hall. (Najadeen, I. 1) „Wasserlinse“ (s. v. u. φακῆ Linse), s. *Lemna* L.
- Hydrophyllum** L. (Asperifolien od. Hydrophylléen, V. 1) „Wasserblatt“, Rinnenblume D., fr. hydrophyllé u. feuille d'eau (s. v. u. φύλλον Laub — Blätt. m. Wasserrinnen!), Zier. *H. virginicum* Lam. u. *canadense* L., etc., s. *Nemophila* Benth., *Eutöca* R. Br. u. *Phacelia* Juss. — *Hydrophyllëae* R. Br.
- Hydrophÿta** Endl., Lyngb. „Wassergew.“ i. q. Algae Tange (s. v., φυτόν Gewächs).
- 1) **Hydropiper** Endl. (sc. Elatine) L. (Lythrarieen Elatineen, VIII. 4) „Wasserpfeffer“-Tännel, fr. hydropiper, e. betle (betel). 2) **Hydropiper** (sc. Polygonum) L. (Polygoneen, VIII. 3) „Wasserpfeffer“-Knöterich (s. v. u. piper, gr. πέπερι Pfeffer).
- Hydropyrum** Lk. (Gräser, XXI. 6) „Wasserweizen“, Sumpf-Kappengras, wilder Reis (s. v. u. πυρός Weizen, nicht πυρόν Wachtfeuer!), *H. esculentum* Lk., s. *Zizania aquatica* L.

- Hygrocybe** Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Wasserschale“, Glaskopf Kumm. (*ὕγροϋς* nass, *κρυβή* Höhlung, Napf etc. — d. hohle Hut nass!), *H. conica*, *coccinea* etc., s. *Agaricus* L.
- Hypophila** R. Br. (Acanthaceen, XV. 2) „Nässefreundin“ (s. eb., *φιλή* Freundin — wächst in Sümpfen), z. B. *H. formosa* R. Br. u. *brasilensis* Spr., etc., s. *Ruellia* L. u. *Dicliptera* Juss.
- Hymenaea** L. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) Locustbaum (v. *ἡμεναῖος* hochzeitlich — d. Blätterpaare nähern sich in d. Nacht einander), *H. courbaril* Jacq. ostind. Heuschreckenb., s. g. Locustholz, fr. *courbaril*, *H. Candolleana* u. *floribunda* Kth. (B. Süd-am.), s. *Trachylobium* aut.
- Hymenathërum** Cass. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Hautantherenblume“ (v. *ἡμῆν*, -*ένος* Häutchen, *ἀθήρ* -*έρος* Spreuschuppe — d. Antheren-Connectiv häutig, breit), Zier. *H. tenuilobum* DC. s. *tenuifolium* Cass. (Tex.).
- Hymenocallis** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) (zu *Pancretium* L.) „Schönhaut“ -Narzisse (s. eb. u. *záλλος* Schönheit — sehr zarte Blütenabschn.), *H. speciosa* Herb., s. *Pancretium Dryandri* s. *speciosum* Salisb.
- Hymenodictyon** Wallr. (Rubiaceen Cinchonaceen, V. 1) Netzflügel Frucht, „Hautnetz“ (s. v. u. *δίκτιον* Netz — Samen von netzförm. Flügel umgeben), z. B. *flaccidum* Wall., s. *Cinchona* fl. Spr.
- Hymenomycetes** Fr., Rchb., Endl. „Hautpilze“ (s. v. u. *μύκης*, -*ητος* Pilz).
- Hymenophyllum** L., Sm. (Farne, XXIV. 1) „Hautwedel“-F. (s. v., *φύλλον* Laubblatt — Blätt. häutig, zart), z. B. *cruentum* Cav., *asplenoides* Sm. (*Trichomanes* aspl.), etc. — *Hymenophyllaceae* Endl., Grck., -lléae Bory (zu *Polypodiaceae* DC.).
- Hymenoxys (-is)** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Spitzhaut“-Blume (s. v. u. *ὄξυς* spitz — Pappusblättchen häutig u. zugespitzt), Zier. *anthemoides* u. *californica* DC. (*Shortia* calif. Hort.).
- Hyobanche** Thb., L. (Personaten Orobanchen, XIV. 2) „Schweinswürger“, fr. fleur de fève „Saubohnenblüte“ (v. *ὕς*, *ἰός* Schwein u. *ἄγγω* würgen) z. B. *sanguinea* L. (*Orobanche mauretana* Petiv.).
- Hyophorbe** G. (Palmen, XXI. 8) „Schweinefutter“ (s. eb. u. *φορβή* Speise), z. B. *Commersonii* Mart., *indica* G. etc., s. *Arca*.
- Hyoscyamus** L. (Solaneen, V. 1) Bilsenkraut, eig. „Schweinsbohne“, fr. *hyosciame* (*jusquiame* u. *lugan*), e. hen-bane, musk-crawfoot (v. *ὕς*, *ὕός* u. *ὕαμος* Bohne — d. bohnenart. Kapseln auch f. Schweine giftig).
- Hyosérís** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Schweinesalat“, fr. lait-de-cochon (s. v., *σέρις* Salat), z. B. *amplexicaulis* Mchx. (*Krigia* ampl. Schreb.) etc., s. *Dens leonis* Pluk.
- Hyospáthe** Mart. (Palmen, VI. 3) „Schweinskolbe“ (s. v., *σπάθη*, lat. *spatha* Blütenscheide — in Brasil. „Schweinspalme“!), *H. elegans* Mart.
- Hypechusa** Alfd. (Legumin. Viciaen, XVII. 4) „Aushaltungs“-Wicke, gelbe W. (v. *ὑπέχω* Part. Fem. unterhalte, halte aus — Sinn undeutlich!), *H. lutea* Alfd. = *Vicia* lut. L.
- Hypēcōum** L. (Papaveraceen, IV. 2) Gelbauge Seub., Lappenblume Leun., fr. *hypēcoon* (v. *ὑπὴξω* töne dazu, rassele — d. Samen in d. reif. Frucht! nicht n. Paxton: *ὑπήκοον* Diosc. unterthan, lat. *procumbens* niederliegend!).
- Hypoelytrum** Lk., Nees, s. *Hypoelytrum* Rich.
- Hyperanthēra** Forsk., Vahl (**-antha** Perring) (Cassieen od. Diosmeen, X. 1) „Oberanthere“, Flügelsamen-Moringa, Behennuss D., *H. Moringa* Vahl (*Guilandina* Mor. L. s. *Mor. pterygosperma* G.) (*ὕπερ* g

über, ober, ἀνθροῶ Staubbeutel — d. 5 läng. fruchtb., d. 5 kürz. unfruchtb.), H. dioeca Pers. (Guil. dioeca L. s. Gymnocladus canadensis Lam.).

**Hyperica** Juss., -icēae Chois., -einēae DC., Rehb., -cacēae Grck., fr. hypericoïdes „Hartheugew.“, sogl.

**Hypericum** T., L. (Hypericeen, XVIII. 2) Harthen, Johanniskraut, fr. herbe de St. Jean, e. park-leaves (gr. ὑπερίζον Johanniskr. v. ἔτρο unter u. ἐοίχη od. ἐοείχη Heidekr., Paxton: ὑπέρο u. εἰκὼν, -όνος Bild — wég. d. ansehnl. Blüten!?), H. perforatum L., fr. millepertuis, Zier. H. Ascyron L. (s. d.), calycinum L. (Kleinas.), fr. éclair od. Millepertuis à grandes fleurs (à grand calice), e. large-calyxed Hypericon, androsaemum L., fr. toute-saine, e. tutsan, H. Kalmianum L., W. (Hstr. Nordam.), linarioides, Gewächsh. H. japonicum L., Thb., sessiliflorum, fr. bois à Baptiste, etc.

**Hyperrhiza** Bosc., Nees (Pilze, XXIV. 4) Wurzelstreuung Kumm. (ὑπέρο über, ὄζα Wurzel — überird. Fibrillen wurzelart. zu einem caudex!), z. B. liquaminosa N. Saft-W.

**Hyphaena** G. (-ne Pers.) (Palmen, XXII. 6) „Gewebe“-P., Dum- od. Astpalme, fr. doume Pfefferkuchenbaum (— Fruchtschale essbar!) (v. ἰγαίω überspinne od. ἰγή Gewebe — Fruchtfasern z. Verspinnen!), H. thebaïca Mart. (Douma theb. Duham.), s. Cucifera theb. Pers. (cuci, gr. χοῖζι Kokosnuss).

**Hypholoma** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Gewebe“- od. „Fadensaum“ ἰγή Gewebe, λῶμα Saum — d. Manschette spinnwebartig), z. B. H. lateritium DC.

**Hypomycetes** Rehb., Endl. „Fadenpilze“ (s. eb. u. μύκης, -ητος Pilz).

**Hypnum** L. (Moose, XXIV. 2) Astmoos, fr. hypne (gr. ὑπνον Moos an Bäumen i. q. σφάγρον, Wst. v. ἕπνος Schlaf — einschläf. Wirkung!), Guirlanden H. serpens, velutinum, splendens u. cupressiforme L.

**Hypocalymna** Endl. (Myrtaceen, XII. 1) „Unterhüll“-Myrte (ὑπὸ u. ζάκνυμα od. -μυά Hülle — Eierstock unten, d. Blüt. von trocken. Bracteolen umgeben), Gewächsh. Cunninghami Endl.

**Hypochaeris** (-choeris) L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Ferkelsalat“, Kosten O. W., fr. laitue-de-cochon (- de porc), porcelle (ὑπὸ für, χοίρος, lat. porcellus Ferkel), z. B. pinnatifida Cyr. (Boebera p. Spr.) etc.

1) **Hypocistis** T. (sc. Cytinus) L. (Cytineen, XX. 8) „Hypocist“, W. (succus Hypocistidis Offiz.), s. Thyrsine Gled. 2) **Hypocystis** Beckm., s. Asarum Hypocistis L. (Aristolochieen Asarineen, XI. 1) (gr. ὑποχιστί; Wurzelschmarotzer v. ὑπὸ u. χίστιος, lat. Cistus — schmarrotzt an Cistuswurzeln).

**Hypocyrtia** Mart. (Gesneraceen, XIV. 2) „Unterbuckel“ (ὑπὸ unten, κυρτός bucklig — Kronröhre hinten an d. Basis), H. gracilis Mart. (Brasil.).

**Hypoëlytrum** Rich. (Cyperaceen, III. 1) „Unterhüllen“-Segge (ὑπὸ u. ἔλυτρον Decke, Hülle), s. Hypelytrum Nees (Hypolytrum Vahl, auch Hypaelyptum Vahl), z. B. argentëum Vahl s. senegalense Pers., filiforme, pungens etc.

**Hypoglossum** (sc. Ruscus) L. (Sarmentac., XXII. 11) Zungen-Mäusedorn, „Unterzungen“-M., auch Ruscus Hypophyllum „Zungenblatt“, fr. double-langue, hippoglosse (fehlerh. st. hypogl.), langue de cheval u. laurier alexandrin (v. ὑπὸ u. γλώσσα Zunge — d. Blüten auf d. Blätt. unter besond. Deckblättern stehend!).

**Hypogynia** Juss. „Unterweibige“ od. „stemplige“ (ὑπὸ u. γυνή — d. Stempel od. Fruchtknoten unter d. Blume!).

**Hypolytrum** Vahl s. Hypoëlytrum Rich.



**Hypopetalia** Juss. „Unterkronblättrige“ (*ἔπιθ* u. *πέταλον* Kronblatt — diese understandig!).

**Hypophegëa** (sc. Monotröpa) L., Wallr. (Ericaceen Monotropeen, X. 1) Fichten- od. „Buchenspargel“, Buchen-Ohnblatt (*ἔπιθ* u. *γηγῶδες*, lat. fagus Buche), s. Hypopitys (s. d.).

**Hypophyllum** (sc. Ruscus) L. (Sarmentac., XXII. 11) „Unterblatt“-Mäusedorn, s. Hypoglossum (*ἔπιθ* u. *γέλλιον* Laubblatt, — Blüt. an d. Blattunterseite!).

**Hypopityacëae** Klotzsch, Grck. (zu Ericacëae Rehb.) Fichtenspargelartige, sogl.

**Hypopitys** Scop. (sc. Monotröpa) L. (Ericac. Hypopityaceen, X. 1) „Fichtenspargel“, Ohnblatt (— Pfl. ohne Laubblätter!) (*ἔπιθ* u. *πίτυς* Fichte — schmarotzt an deren Wurzeln!), s. Monotröpa Hypophegëa Wallr.

**Hypostaminëa** Juss. mit unterständ. Staubgefäßen — näml. unter d. Fruchtknoten! (stamen, -inis Staubfaden).

**Hypoxis** L. (Amaryllideen od. Hypoxideen, VI. 1) „Untenspitzkapsel“, s. g. Härtling (*ἔπιθ* u. *ὀξύς* spitz — Basis d. Kapsel! Wtst. d. Blätt. spitzig!), H. Arnotti, decumbens L. (Anthericum sessile Mill.), stellata Thb., minuta L. (Helonias m. L. f.) etc., s. Fabricia Thb. u. Gethyllis L.

**Hypoxylon** Bull. (Sphaeriaceen-Pilze, XXIV. 4) „Holzstielchen“ Kumm. (*ἔπιθ* unten, *ξύλον* Holz — leder. fast holzig. Substanz), z. B. vulgare, filiforme etc.

**Hyptis** Jacq. (Labiaten, XIV. 1) „Beuglippe“, Linksblume D. (v. *ὑπτίως* zurückgebeugt — Form d. Blüten!), z. B. capitata Jacq. (Clinopodium capense Sw.), Chamaedrys W. (Clinop. Cham. Vahl) etc., s. Nepeta, Brotera Spr. u. a.

**Hyssopus** L. (Labiaten, XIV. 1) „Ysop“ (Isop Rmpl.), fr. hyssope (hyssope), e. hyssop (gr. *ὑσσωπός* v. *ὑς*. *ὑός* Schwein u. *ὑψ*. *ὕλιος* Gesicht — rüsselart. Blume! Wtst. hebr. esob, arab. azzof = heil. Kraut, nicht näher bekannt!), Zier. H. officinalis L. m. v. v. (fl. albo u. rosë Hort., cristatus L. s. ocimifolius (Elsholtzia crist.), Lophanthus L. chines. Ysop od. Katzenkr. (Cataria flor. inversis Hall.) etc.

1) **Hystrix** Rumph. (sc. Barleria) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Stachel“-Barlerie (gr. *ὑστρίξ* Stachelborste), H. frutex Rumph., s. Barl. Hystr. L. 2) **Hystrix** (sc. Aspalathus) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Dornhülle“. 3) **H.** (sc. Merisma) Spr. (Pilze, XXIV. 4) Stachelpilz, s. Hydnum Hystrix u. Echinus Hall. (Hericum hystrinum Pers.). 4) **Hystrix** Mch. (Gräser, III. 2) „Stachelgras“, s. Echinochlöa P.-B. (— sehr lange, spitze Grannen!).

**Jacaranda** Juss. (Bignoniaceen, XIV. 2) brasil. Jacarandabaum, s. g. Palisanderholz (Polixanderholz<sup>1</sup>) (vaterl. Name!), J. brasiliensis Juss., e. black-rose-wood „schwarz. Rosenholz“, s. Machaerium Pers., Warmh. J. grandiflora u. mimosaefolia Ker. 2) **Jac.** Barrel. (Araliaceen, V. 5) „Goldblatt-Allheil“, J. arborëa Barr., s. Panax chrysohyllum Vahl (Amer.).

1) **Jacëa** Pers. (sc. Centaurëa sect. Rchb.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Wiesenflockenblume, fr. jacëe u. tête de moineau „Spatzenkopf“ Wolff, s. Rhaponticum Scop. s. Cyänus Fl. Wett. Jacëa (v. jacëo liege nieder), ferner z. B. Centaurëa splendens, Rhapontica L. etc.

1) Palisander n. Goeppert v. pao santo bras. = heilig. Holz (auch Polyxander, Polisander u. a. m.) (Köln. Zeit. Nr. 226. 2., 1851).

- 2) **Jacēa** Camer. (Violaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Heil-Veilchen“ (v. ἵον Veilchen u. ἀζόουαι heile, Wtst.).
- 1) **Jackia** Blum. (Pölygalaceen, XVII. 3) „Jackie“ (n. d. engl. Reis. in Sumatra 1813/22 W. Jack, s. d. Aut.), z. B. *J. excelsa* Blum. (*Monnina* exc. Spr.). 2) **Jackia** Spr. (Büttneriac., V. 1 od. XVI. 5), *J. spectabilis* Spr., s. *Wallichia speciosa* DC. 3) **Jackia** Wall. (Rubiaceen, V. 1), *J. ornata* Wall., s. *Zuccarinea* orn. Spr.
- 1) **Jacksonia** R. Br. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Jackson's“-Baum (n. d. schott. Bot. G. Jackson), *Treibh. J. trifurcata* (*Gompholobium* f. Sm.), *spinosa* R. Br. (Neusüdwaless), s. *Gomphol. spin.* u. *Daviesia* sp. Sm. 2) **Jacks.** Raf. (Capparideen, XIII. 1).
- 1) **Jacobaea** T. (sc. Senecio) L. (Compos. Astereen, XIX. 2) *Jakobs-Kreuzkraut*, *Jakobsblume*, fr. *jacobée*, fleur od. herbe de St. Jacques, e. St. James-wort (rag-) u. *segrum* (n. d. Apostel Jakobus — blüh. um Jakobstag!) 2) **Jacobaea** Vaill. (Senecio, sect. a Rchb. flor. radiatis) *Strahlblüt-Greiskräuter*, z. B. *elegans*, *erucifolius* etc. 3) **Jac.** Plum., s. *Pectis* L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1), *J. humifusa* Plum. u. *Pectis ciliaris* L. 4) **Jac.** Comm., s. *Othonna* L. (Compos. Senecionideen, XIX. 2), *J. africana* Comm., s. *Oth. parviflora* L.
- Jacobia** DC. (Lythrarieen od. Melastomac. Rhexieen, VIII. 1) (zu *Trembleya* DC.) „*Jakobie*“ (n. Jakob Trembley, schr. Mem. pour servir à l'hist. d. l. vie etc. de Charl. Bonnet, Bern 1795).
- 1) **Jacquinia** L. (Myrsineen od. Solaneen Ardisiaceen, V. 1) „*Jacquinie*“ (n. d. Prof. Jacquin in Wien), *Treibh. J. armillaris* L. „*Jacquin's-Armbandstrauch*“ (Antill.), *aurantiaca* Ait. (*Sandwichsins.*). 2) **Jacquinia** aculeata, s. *Medeöla* Pers. ac. (*Melanthaceen*, VI. 3). 3) **Jacq.** Mut. (Tiliaceen, XIII. 1).
- 1) **Jaegera** Gies. (Scitamineen, V. 1) „*Jäger's*“-*Banane* (n. d. Bot. G. F. Jäger). 2) **Jaegeria** H. B. K. (Compos. Sigesbeckieen, XIX. 2) „*Jägersblume*“, z. B. *urticaefolia* Spr. (*Viborgia* urt. Kth.), *uliginosa* Spr. (*Spilanthus* ul. Sw.) etc., s. *Polymnia* L. u. *Verbesina* L.
- 1) **Jalapa** T. (sc. Convolvulus) L. (*Convolvulac.*, V. 1) „*Jalapenwinde*“, fr. u. e. *jalap*, *Jalapenwurz* (vaterl. n. d. mexik. Distrikt Jalapa). 2) **Jalapa** (sc. *Mirabilis*) L. (*Nyctagineen*, V. 1) *Wunderblume*, e. *marvel*.
- Jambolana** Rumph., s. *Jambolifera* L. sogl.
- Jambolifera** L. (Rutac. Rutarieen, VIII. 1) „*Jamboli*“- od. *Kümmelraute* (vaterl. *jamboli* = *olivenart.* Frucht), *J. pedunculata* L. (B. Ostind.), *aromatiche Malabar-* od. *Tangu-Gewürznelke*, s. *Cyminosma* G. = *Caryophyllus* Tangu aromat. malabar. Pluk.
- Jambos** Adans. (*Jambosa* Rumph.) (sc. *Eugenia*) W. (Myrtaceen, XII. 1) „*Jambusenbaum*“, fr. *giambo* (*jambosier*, *jambe-longue*) (malay. *jambu Schambu*), *J. malaccensis* DC., s. *Eugenia* *Jambos* L., *J. vulgaris* DC. s. g. *Rosenapfel*.
- Janipha** Kunth (Rutac. Euphorbiaceen, XI. 3) *Brechnuss* (n. d. brasil. *janipaba*!), *J. frutescens* Löfl., s. *Jatropha* *Janipha* L. s. *carthagenensis* Jacq.
- Jasione** L. (Campanulac. od. Lobeliaceen, V. 1) *Schafrapunzel*, *Monke* O. W., *Schafscabiöse* Rmpl., „*Jasonsblume*“, fr. *jasione*, e. *sheep's-bit* (gr. *ιασώνη* Theophr. v. *Ἰάσω* Heilgöttin, Wtst. v. *ιασις* Heilung od. ἵον Veilchen u. *σιος* (θεός) göttlich — vortreffl. Heilpfl.!), z. B. *J. montana* L., e. *mountain-sh.-b.* u. *perennis* Lam.
- Jasmīnum** L. (Contorten Jasmineen, II. 1) „*Jasmin*“, fr. u. e. *jasmin*, e. *jessamin* od. *jasmine* (v. *ἰάσμη* *Jasmin* d. Perser, arab. *ysmyñ* Paxton, *jasmin* d. Perser), *Warmh. J. officinale* L. m. v. v. echter *J.*, *Stuben gracile* u. *odoratissimum* L., *azoricum* L., *glaucum* Hb., *Kth. (ligustrifolium* Lam.) (Cap), *J. Sambac* Ait. arab. *J. m. v. v.*,

- J. grandiflorum L. s. g. spanischer J., Gärten J. fruticosans L., fr. j. jaune, e. shrubby j., nudiflorum Lindl., fr. j. à fleurs nues, e. naked-flowered j., humile L.
- Jatröpha** L. (Euphorbiaceen, XI. 3) „Arztkost“, Brechnuss, fr. médicinier (v. *ιατρούς* Arzt u. *τροφή* Nahrung, Wtst. *γάγω* esse), J. Manihot L. Maniok- od. Cassavebrot-Strauch (s. g. Yucca- od. Stärke-wurzel), J. elastica L., s. Hevča guianensis Aubl. Kaoutschukbaum.
- Ibëris** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) Bauernsenf, Schleifenblume Rmpl., e. clown's-mustard u. candy-tuft, mithridate-mustard (gr. *ιβηρίς* v. Iberia Ebroland, eine kressenart. Pfl.), Zier. I. umbellata L., fr. thlaspi-lilas (taraspi) od. -en ombelle, e. umbelled-candytuft, m. v. v., amara L. (Thlaspi am. Crantz), m. v. hesperidiflora Hort., Topf. I. sempervirens L., fr. taraspi vivace od. corbeille d'argent, e. ever-green candituft, Tenoreana DC., pinnata Gouan, fr. thlaspi odorant, e. sweet-scented c., etc.
- Icacina** A. Juss. (Myrobalaneen od. Oleineen, XII. 2) Senegal-Cacaopflaume, I. senegalensis A. Juss.
- Icaco** Plum. (Myrobalaneen, XII. 2) westind. Cacaopflaume, fr. icaquier (-caque) (vaterl. in Bras. acaja), s. Chrysobalanus Icaco L. s. Guai-  
era Marcgr.
- 1) **Icica** Aubl. (Burseraceen od. Amyrideen, VIII. 1) Icica-Myrrhe, Elemiharzbaum Seub. (vaterl. Name in Guiana!), I. altissima, brasiliensis etc., s. Amÿris L. 2) **Icica (Isika)** coerulea Borkh. (Lonicereen, V. 1) blaue Heckenkirsche, s. Xylosteum canadense Duham. s. Solonis Eaton (Lonicera coer. L.), Isika lucida Mch., s. Lonicera alpigena L.
- Icosandrae** Lauch. (sect. v. Crataegus L.) (Pomaceen, XII. 2) „Zwanzigmännige“ (*είκοσι* zwanzig, *άνιρ*, -*άνθρωπος* Mann, Staubgefäss), z. B. Oxyacantha, monogyna etc.
- Icosandria** L. XII Kl. „Zwanzigmännige“ (s. eb.).
- Idaea** (sc. Vaccinium Vitis) L. (Siphonandraceen od. Vaccinieen, VIII. 1) Preisselbeere, fr. airelle rouge, e. red-bilberry (Idaeus, vom Berg Ida auf Creta).
- Idaeus** (sc. Rubus) L. (Rosaceen, XII. 3) Himbeere, fr. framboise (-sier), e. rasp-berry (ras- od. hind-berry), -bush od. -tree, auch framboise (s. eb.).
- Jeffersonia** Barton (Ranunculac. Podophylleen, V. 1 od. VIII. 1) „Jefferson's“-Entenfuss (n. d. Unions-Präs. Thom. Jefferson, † 1826), Zier. J. diphylla Pers. s. Bartonis Mchx. (binata Bart.) „Zweiblatt“, s. Podophyllum diphyllum L. (Virgin.).
- Jenkinsonia** Sweet (Geraniaceen, XVI. 5) „Jenkinson's“-Pelargonium (n. Jam. Jenkinson, schr. descript. of brit. plants, Kendal 1775), z. B. J. quinata u. tetragona Sw., s. Pelargonium u. Chorisma Lindl.
- Ifloga** Cass., DC. (zu Gnaphalium Rchb.) (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) Haarstempel-Fadenkraut, s. Trichogyne DC., z. B. Fontanesii Cass. (Anagramm von Filago, wie auch Gifola, Logfia etc.).
- Ignatia** L. (-tiana Lour.) (Contorten Strychneen, V. 1) „Ignatiushohne“ (e. Ignatius Loyola, Stift. des Jesuiten-Ordens), I. philippinica Lour., s. Strychnos Ignatii Berg.
- Jirasekia** W. (Primulaceen, V. 1) „Jirasek's“-Gauchheil (n. ein. Bot. Joh. Jirasek, schr. mit Haenke u. A. Beob. auf Reis. n. d. Riesengebirge, Dresd. 1791), z. B. alpina Schm. s. tenella Rchb., s. Anagallis tenella L.
- 1) **Ilex** L. (Sapotac. Aquifoliac. od. Ilicineen, IV. 4) Stecheiche, Hülsen, s. g. Stechpalme, fr. chène-verte u. yeuse od. houx, e. holly-tree od. knee-holly, evergreen oak (lat. ilex, -icis Stecheiche v. d. celt. ec od. ac Spitze), Zier. I. Aquifolium L. m. v. v., fr. houx-commun,

- e. common-holly, Theepfl. I. paraguariensis St. Hil. Paraguay-Thee, s. g. Mate (nicht Maté). 2) **Ilex** T. (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 5) eigentl. Stecheiche, fr. yeuse. — Ilicinæe Seub. Stechpalmen od. Hülsenartige (s. 1) Ilex).
- Illairia** Lenne, C. Koch (Loasaceen, XIII. 1) „Illaire's“-Brennwinde (n. ein. Berliner Bot. Illaire), Zier. I. canarinoïdes marienglockenart.
- Illecëbrum** T., L. (Portulacac. od. Illecebran, V. 1) Knorpelblümchen Seub., fr. illecëbre, panarine od. herbe au panaris „Nagelgeschwürkr.“ (v. illecëbra Anreizung), z. B. cymosum L. (Paronychia cym. T.), verticillatum L. etc. — Illecebræe DC., R. Br. (zu Paronychiacæe St. Hil. od. Portulacacæe Rchb.).
- Illicium** L. (Magnolieen Illicieen, XIII. 7) Stern-Anis (v. illicio Locke an), I. anisatum L. (Anisum stellatum Mat. med.), fr. u. e. badiane, e. stellated od. indian anise. — Illiciæe DC. (zu Magnoliacæe Rchb.).
- Illippe** Kön. (Sapotaceen, XI. 1) Butterbaum (v. ἰλλῶς schielend, ἴππος Pferd, ἴ Stute? — unklar!), I. Malabaris Kön., s. Bassia longifolia L.
- Illus** Haw. (Amaryllideen, VI. 1) „Schiel“-Narzisse (ἰλλῶς schielend), z. B. triandrus, cernuus Haw., albus etc.
- Imantophyllum** Hook. (**Himantoph.**) Hook. (Amaryllideen, VI. 1) „Riemenblatt“ od. Clive's-Lilie, s. Clivia Lindl. (ἰμάς, -ἄνθος Riemen, φύλλον Laubblatt), Stuben I. miniatum Hook. m. v. splendens Hort.
- 1) **Imbricaria** Hoffm., Schreb. (Flechten, XXIV. 3) Ziegel- od. Schindelflechte, fr. imbricaire (v. imbrex, -icis Schindel od. Dachziegel). 2) **Imbricaria** Comm. (Sapotaceen, VIII. 1) „Schindel“- od. „Ziegelbaum“, fr. bembrice, I. maxima Poir. s. g. Molukken-Eisenholz (— zu Schindeln benutzt!), s. Mimusops L. 3) **Imbricaria** Sm. (Myrtaceen, V. 1) „Regenschirm“-M. (imbricus v. imber, -bris Regen — Blüt. wie ein Regenschirm stehend).
- Impatiens** Riv., L. (Oxalideen Balsamineen, V. 1) Springkraut, Balsamine (lat. impatiens ungeduldig — d. frisch. Kaps. springen beim Berühren auf), wild I. noli tangere L., Topf od. Garten I. Balsamina L. m. v. v., fr. bellesamine od. jalousie, e. Balsam od. common-garden-balsamine, v. Solferino, v. nana Hort., I. glanduligera Royle s. Roylei Wall., I. tricornis L., e. cornigerous B., etc.
- Imperata** Cyr. (bess. -tia!) (Gräser, III. 2) „Imperati's“-Gras (n. Ferrante Imperati, neapolit. Bot. d. 16. Jahrh.'s), z. B. cylindrica Host u. saccharifera Hort., s. Saccharum cylindricum Lam. s. Lagurus cyl. L.
- Imperatoria** T., L. (Umbelliferen, V. 2) Meisterwurz, Ostritz O. W., fr. imperatoire, Angélique française, e. master-wort (lat. imperatorius kaiserlich v. imperator Herrscher — weg. d. unvergleich. Kraft!).
- Incarvillæa** Juss. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Incarville's“-Trompetenblume, fr. incarvillée (n. d. franz. Missionair in China R. P. d'Incarville), Zier. I. chinensis Lam., s. Bignonia Tecoma Juss.
- Indigofera** L. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Indigopflanze“, fr. indigotier (indigo Indigofarbe u. fero trage), Zier. I. australis R. Br., decora Lindl., Dosua Ham., etc.
- Inga** Plum., W. (sc. Mimosa) L. (Mimoseen, XXIII. 1) „Inga“-M. (inga westind. Name d. Pfl.), z. B. I. bigemina W., I. Sassa W. abyssin. Inga-M., Warmh. Harrisii u. pulcherrima Cerv.
- Inocarpus** Forst. (Sapotac. Mimosopeen od. Lucumeeen, X. 1) „Sehnen“- od. „Faserfrucht“ (v. ἴς, ἰνὸς Sehne etc., σαρκός Frucht — faser. Hülle!), I. edulis L. (B. Austral.), s. Gujanus Rumph.
- Inocybe** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Raufaserkopf Kumm. (s. eb., *zυβή* Höhlung, Napf etc. — fransig. Hut!), z. B. rimosa, pyriodora etc., s. Agaricus L.

- Inophyllum** (sc. Calophyllum) Pers. (Guttiferen, XIII. 1) „Sehnenblatt“, Tacamahaca-Harzbaum W. (s. v., *γιύλλορ* Laub, Blatt).
- Intsia** Nor., Thou. (sc. Acacia s. Mimosa) L. (Mimoseen, XXIII. 1) indisches od. „Intsi“-Eisenholz (vaterl. madagassischer Name!), s. Tamarindus Intsia Spr.
- Intybus** (sc. Cichorium) L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Cichorie, Endivie, fr. u. e. endive (v. tubus Röhre? — röhr. Stengel? Wtst. arab. hendibeh!).
- Inula** L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Alant, Flöhkraut, fr. aunée od. inule, herbe aux puces, e. elecampane od. flea-wort (aus d. gr. *ἐλέριον* durch Corruption? od. Wtst. v. *ἰρώω* (*ἰρέω* u. *ἰρώω*) leere aus — Wirkung d. Wurzel, Plinius), Gärten I. Helenium L., grandiflorum W., oculus Christi u. suaveolens L.
- Joachimia** Tenore (Gräser, III. 2) „Joachim's“- od. Raupengras (n. Dr. Jochim Jung in Lübeck, vgl. Jungia! Wtst. n. Joachim Murat, Schwager Napoleon's I.), J. phalaroides Ten. (Beckmannia eruciformis Host), s. Cynosurus eruc. Ait.
- Jochroma** Benth. (Solanaceen, V. 1) „Veilchenfarbe“ od. blauer Prachtstrauch (*ἴορ* Veilchen, *ροῶμα* Farbe), s. Habrothamnus cyanus Ldl.
- Johannia** W. (Joannēa Spr., Joannesia Pers.) (Compos. Carlineen, XIX. 1) „Johannesblume“ (n. d. Erzherz. Johann v. Oesterreich, Pfeiffer), J. insignis W. (Chuchiraga Juss.), brasiliensis Spr., s. Flotovia glabra Spr., J. microphylla Tratt. (insignis W. var.).
- 1) **Johnsonia** R. Br. (Commelyneen, III. 1) „Johnsonie“ (n. d. Apoth. Thom. Johnson), z. B. J. hirta u. lupulina R. Br. 2) **Jolms.** Catesb. (Viticeen od. Verbeneen, IV. 1), J. americana Cat., s. Callicarpa L. 3) **Johns.** Adans. (Hesperideen, XVIII. 2).
- Jolithus** (sc. Lepraria) Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Veilchenstein“-Fl., s. g. Veilchenmoos (*ἴορ* Veilchen, *λίθος* Stein — Geruch der Steinflechte nach Veilchen!).
- Jondraba** Med. (zu Biscutella Rchb.) (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Brillenschote (*ἴορ* Veilchen, Draba Hungerblümchen), J. auriculata L., hispida DC. etc.
- Jonesia** Roxb. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Jones“-Hülsenbaum (n. P. Jones, schr. mit Kingston Fl. Devoniensis etc., London 1829), Gewächsh. J. Asoca Rxb. (Asjogam Rheed.) (B. Ostind.), J. pinnata Roxb., etc.
- Jonidium** Vent. (Violarien, XIX. 6) Ipecacuanha-Veilchen, „Veilchengleiche“ (*ἴορ* u. *εἶδομα* gleiche), J. Ipecacuanha Vent. wahre Veilchenwurz (Brechwurz), s. Pombalia Ipec. Vand. (Viola Ipec. L. s. Jonidium Vent.).
- Jonopsidium** DC., Rchb. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) stengelloses Löffelkraut (Jonopsis u. *εἶδομα*), Zier. J. acaule Rchb., s. Cochlearia ac. Desf. s. pusilla Broter., s. Jonopsis DC.
- 1) **Jonopsis** DC. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) „Veilchengleiche“ (s. v. u. *ὄψις* Gesicht, Aussehen — dem Veilchen sehr ähnl.). 2) **Jonopsis** Hb., Kth. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Veilchengesicht“ (s. eb.), J. pulchella Kth., s. Cybelion Spr. „Cybele“-Veilchen.
- Jonquilla** DC. (sc. Narcissus) L. (Amaryllideen, VI. 1) „Jonquille“, binsenblättr. Narzisse, fr. narcisse jonquille, e. jonquil-Narcissus m. v. fl. pl. (fr. jonquille v. jone, lat. juncus Binse).
- Jonthlasi** T., DC. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Veil-Täschelkraut“, fr. jon-thlasi (*ἴορ* u. Thlasi Täschelkr. — Blüt. wie gelbes Veil, Frucht wie Thlasi!), s. Clypeöla Jonthl. L.
- Josephinia** Vent. (Bignoniaceen od. Pedalieen, XIV. 2) „Josephinie“ (n. d. Kaiserin Josephine v. Frankr.), z. B. J. imperatricis Vent. u. grandiflora R. Br. (Neuholl.).

- Josikaea** Jacq. (sc. *Syringa*) (Oleaceen, II. 1) „Josika's“-Lilac M.-Rchb. (n. d. Freifrau Josika ben.).
- Jovibarba** DC. (Crassulac., XI. 5) „Zeus“- oder „Jupitersbart“ (zu *Sempervivum*) (*Jovis* Gen. v. Jupiter u. barba Bart — Ausläufer aus d. untersten Achseln).
- 1) **Ipecacuanha** Vent. (sc. *Jonidium*) (Violarien, XIX. 6) Brechwurzel, wahres Brechweihen (aus d. portug. i klein, pe am Wege, caa Kraut u. goene Brechen erregend). 2) **Ipec.** Arrud. (sc. *Cephaëlis*) Rich. (Cinchonaceen, V. 1) echte Ipecacuanha, Brech-Kopfbeere (Brasil.).
- Ipomœa (-mœa)** L. (Convolvulaceen, V. 1) Trichterwinde, fr. ipomœe (v. ἵψ, ἰπὸς Wurm, ὄμοιός ähnlich), Zier. J. purpurœa Lam. s. hispida Zucc. m. v. v., fr. ipomœe-pourpre, e. morning-glory, tuberosa L., fr. liane à tonnelles, I. bona nox L. (*Calonyction speciosum* Chois.), fr. Ip. de Paprès-midi, e. excellent Ip., I. pes tigridis L., fr. piède de tigre, I. hederacœa s. Huberi (*Pharbitis* hed. Chois.), I. coccinœa L., Topf etc. violacœa (*rubrocoerulea*) Hort. u. limbata elegantissima Hort. — beide v. v. von purpurœa Lam., I. mexicana m. v. grandiflora alba Hort., s. *Calonyction macrantholeucum* Colla, Warmh. gossypifolia etc.
- Ipomopsis** Rich., Benth., Mchx. (Polemoniaceen, V. 1) „Trichterwindengleiche“ (v. *Ipomœa* u. ὄψις Aussehen), Zier. I. elegans Mchx. (*Gilia coronopifolia*) m. v. v. (lutœa, superba etc. Hort.), I. s. Cantua picta Hort. (*Polemonium rubrum*) etc., s. *Ipomœria* Nutt.
- Ipsœa** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Korkbaum“-O.? „Wurm“-O.? (v. ἵψος Korkbaum? od. ἵψ, ἰπὸς Wurm? — unsicher!), z. B. I. speciosa Ldl. (Ceyl.).
- Iresine** W. (Irsine Spr.) (Amarantaceen, XXII. 5 od. Chlenopodiaceen, V. 2) „Wollast“-Amarant, s. g. Straussfeder (v. εἶδος st. ἔθος od. ἔριον Wolle), Teppichbeete I. Herbstii Hook., s. *Achyranthes Verschaffelti* Lam., m. v. fol. aureo-variegato Hort.), I. Lindeni Van Houtt., I. eriantha Lam. (*Celosia* er. Vahl), glomerata Spr. (*Pfaffia glauca* Spr.), I. persica Spr., javanica Spr. (*Aerva* jav. Juss., *Ilcebrum* jav. L., *Amaranthus albus gangeticus* Pluk.) etc.
- Iria** Rich. (sc. *Cyperus*) L. (Cyperaceen, III. 1) Schwertlilien-Cypergras? (v. Iris Schwertlilie, Gen. ἰριος v. ἰρις od. εἶρις Regenbogen? — od. εἶριον Wolle? — culmo seminudo, zur Hälfte nackt, zur Hälfte wollig? — unbek., Wtst. d. Name malabarisch!).
- Iriarta (-tœa)** Rz. P.v. (Palmen, XXI. 8) Stelzenpalme (n. d. span. Gönn. d. Bot. Joh. Iriarte, I. exorrhiza Mart., andicœla Spr. (*Ceroxylon* and. Hb.), Treibh. *ventricosa* Mart., altissima u. *praemorsa* Kl. etc.
- Iridœae** R. Br., DC., Rchb. (-dacœae Grck., -des Juss.) Schwertlilien od. Schwertelgewächse (*Iris*, -idis).
- Irio** DC. (sc. *Sisymbrium*) L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) glatte Rauke, fr. laitue de muraille, s. *Sisymbrium glabrum* W. (lat. irio = gr. ἐρίσιμον, v. ἐρίομαι errette — mediz. Kraft, scharf wie Senf!).
- Iris** T., L. (Irideen, III. 1) Schwertlilie, fr. Iris, flambe u. glaëul (lat. gladiolus „Schwertel“), e. flag, flower de luce, spurge-wort u. sword-grass (v. ἰρις, -ιδος od. εἶρις, Gen. auch ἰριος Göttin Iris u. Schwertlilie, st. ξίρις — Farbe des Regenbogens!), Garten: I. pumila L. Zwerg-Schw., I. germanica L. m. v. v. Himmelslilie, Violenzwurz, fr. glaëul bleu, sibirica L., florentina L. Veilchenwurz, fr. Ir. armes de France, e. godder, versicolor L., panormitana, Susiana L. Fürstin od. Dame in Trauer (Pers.), fr. deuil od. crêpe, fleur du Diable, iberica Hoffm. m. v. ochracœa, persica L., reticulata M. B., Xiphium L. s. hispanica Hort., xiphoides Ehrh. (anglica Hort.),

- engl. od. portug. etc., wild I. Pseud-Acōrus L. Wasser-Schw., spuria L. Bastard-S., graminēa L. grasblättr.
- Irpex** Tod. (Pilze, XXIV. 4) „Eggenpilz“ Kumm. ( $\epsilon\gamma\pi\eta\zeta$  od.  $\delta\theta\pi\eta\zeta$ , lat. urpex Egge — Unterseite d. Hutes!), z. B. lacteus etc., s. Hydnium L.
- Isātis** C. Bauh. (Crucifer. Nucamentaceen, XV. 2) Waid, fr. guède, e. woad, green-weed u. pastel (gr.  $\iota\sigma\acute{\alpha}\tau\iota\varsigma$  Pfl. z. Blaufärben, od. v.  $\iota\sigma\acute{\alpha}\zeta\omega$  glätte — galt als Mitt. geg. Hautkrankh.), wild u. cult. I. tinctoria L., s. g. deutscher Indig, fr. pastel, e. dyer's-weed u. pastel.
- 1) **Ischaemum** P.-B. (Gräser, XXIII. 1) „Blutstillgras“, Schuppengr. D. (v.  $\iota\sigma\chi\omega$  hemme,  $\alpha\acute{\iota}\mu\alpha$  Blut), z. B. muticum L., aristatum L., hispidum Kth. (Andropogon virens Spr.). 5) **Isch.** (sc. Andropogon) L. (Gräser, III. 2) gem. Bartgras Grck.
- Isertia** Schreb. (Cinchonac. Guettardeen, XXI. 7) „Isert's“-Chinabaum n. d. Chirurg. P. E. Isert, in dän. Diensten, schr. 1788 Reise in Guinea), I. coccinea Vahl = Guettarda cocc. Aubl.
- Isika** Ad., Borkh. = Icaica Aubl. (subgen. v. Lonicera) (Lonicereen, V. 1) Doppelfrucht Lauch., z. B. L. s. Is. coerulea Borkh. (nicht etwa v. Isicus der Isis geheil., sond. icica vaterl., Wtst. d. verstämm. Xylosteum!).
- Ismene** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Ismene“-Narzisse (n. Ismene, Tocht. d. Oedipus u. d. Iokaste, Myth. — Seestrandspfl.), I. Amancaes Herb., nutans Herb. etc., s. Paneratum.
- Isnardia** L. (Onagrarien Jussieueen, IV. 1) „Isnardie“, Sumpfranke, Sapfel O. W. (n. Ant. Danty d'Isnard, Prof. z. Paris, † 1724), I. palustris L. (Dantia p. Thou.), s. Ludwigia repens Sw.
- Isochilos (-us)** R. Br. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Gleichlippe“ ( $\iota\sigma\sigma$  gleich,  $\chi\epsilon\iota\lambda\omicron\varsigma$  Lippe — d. Labell mit den übr. inn. Teilēn), z. B. linearis u. prolifer Hort. Kew., s. Cymbidium u. Elleanthus Presl „Wickelblume“.
- Isoëtæe** Bartl., Rchb. (zu Selaginēen Endl.) Brachsenkräuter, s. sogl.
- Isoëtes** L. (Lycopodiaceen. Isoeteen, XXIV. 1) Brachsenkraut, Brassenfarn, fr. calamaria ( $\iota\sigma\omicron\varsigma$  od.  $\iota\sigma\sigma$  gleich,  $\xi\tau\eta\varsigma$  Geselle? od.  $\xi\tau\omicron\varsigma$  Jahr? — d. ganze Jahr gleich! — ungewiss!), I. lacustris L. u. echinospora Durieu, s. Calamaria Dill.
- Isolëpis** R. Br. (Cyperaceen od. Juncaceen, III. 1) „Gleichschuppe“, Zartriet, Frauenhaar (s. v.,  $\lambda\epsilon\pi\iota\varsigma$  Schuppe — Schuppen gleichf.), Topf u. Dekor. I. gracilis Nees (Ostind.), s. g. Frauenhaar u. pygmaea Roth (Chili) (Ampeln) etc., s. Scirpus u. Heleochäris R. Br.
- Isolirion** Catesb., Bak. (Liliaceen, VI. 1) (sect. v. Lilium — aufrechte Blumenform!) (s. v. u.  $\lambda\epsilon\iota\omicron\mu\omicron\nu$  Lilie), z. B. bulbiferum L., Catesbaei Walt. (Nordamer.) u. gigantium Wall. s. cordifolium Don, Thunbergianum R. u. S. (Jap.) m. v. v. (z. B. bicolor Sieb, marmoratum ds.).
- Isonandra** Hook., Wight (Myrsineen od. Sapotac. Styraceen, XI. 1) Gutta-Perchabaum (s. v. u.  $\acute{\alpha}\nu\eta\theta$ , - $\delta\omicron\acute{\omicron}\varsigma$  Mann — 12 gleichlange Staubgefäße!), I. Gutta Hook., auch Tubanbaum gen.
- Ispogon** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Gleichbart“ (s. v.,  $\pi\acute{\omega}\gamma\omega\nu$  Bart — d. Nuss überall gleichbartet!), Treibh. I. anemonifolius R. Br., Baxteri, cuneatus, formosus R. Br. etc., s. Protëa L.
- Ispopyrum** L. (Ranunculaceen, XIII. 7) Tolldocke, Muschelblümchen Leun., eig. „Gleichweizen“ (s. v. u.  $\pi\upsilon\rho\acute{\omicron}\varsigma$  Weizen — die Samen gleichen Getreidekörnern), z. B. wild u. Garten: I. thalictroides L. u. anemonoides (aquilegioides) L., etc., s. Aquilegia W.
- Isōra** L. (sc. Helictères) (Sterculiaceen od. Bombaceen, XX. 7) „Isora“-Schraubenmalve, s. Helictères jamaicensis Jacq. (nicht v.  $\epsilon\iota\sigma\theta\acute{\omicron}\mu\omicron$  blicke an, sond. Wtst. malabar. isora-murre!).

- Isotōma** R. Br., Lindl. (Campanulaceen od. Lobeliaceen, XIX. 6) „Gleichschnitt“—Lobelia, Gleichsämler Vilm. (s. v. u. *τομῆ*; Schnitt — nämli. d. Blumenlappen!), Zier. I. axillaris Lindl. (Neuholl.), petraea F. Müll.
- Itēa** L. (Corniculaten Cunoniaceen od. Saxifrageen Escallonieen, V. 1) „Itee“, virginische Weide, fr. Itée (gr. *ἰτέα* lat. vitis Wiete, Weide — weidenähnl. Blätter u. am Wasser), Zier. I. virginica L., s. Diconangia Mitch. „Doppelkegelkapsel“.
- Iteoidēae** Bisch. Ord. der Weidengewächse (s. eb. u. *εἶδομαι* gleiche).
- Ittnera** Gm. (Najadeen, XXI. 1) Wassernymphe (n. d. Univ.-Curator F. de Ittner in Freiburg, † 1821), I. major Gm., s. Najas major DC. s. monosperma W. (Fluvialis latifolia Mich.).
- Juanulloa** Rz. Pr. (Solanaceen, V. 1) „Juanullo“ (n. Don Georg Juan u. Don Ant. Ulloa, Condamines' Begleiter in Südamer. zur Gradmessung), I. parasitica R. P. (Str.).
- Jubaea** Hb., Kth. (Palmen, XXI. 6) „Mähnenpalme“, Chili-P. (v. juba Mähne — feinfiederige Wedel; Wtst. nach Juba, Kön. v. Numidien, schr. unter Augustus üb. Bot. u. Geogr.), Stuben I. spectabilis Hb., Kth., s. Cocos chilensis Molin.
- Juglandacēae** Græk., -dēae DC. Wallnussartige (zu Amentacēae DC.) s. sogl. Juglans, -ndis!
- Juglans** L. (Juglandaceen, XXI. 9) Wall- od. Welschnussbaum, eig. „Jupiter's-Nuss“ (Jovis glans), fr. noix od. noyer de jauge, e. walnut-tree; z. B. J. regia L. m. v. v., fr. noyer commun, e. royal od. common w.-n., Zierb. J. nigra L., fr. pacane (-nier), noyer noir, J. cinerea L. (oblonga Mill., cathartica Mehx.) Ölnuss, fr. n. cendré, e. butter-nut (Amer. oil-nut), J. fraxinifolia Lam. (Pterocarya caucasica C. G. Mey.), J. alba L. (Carya alba Nutt.) Hickorynussb. etc., s. Carya Nutt.
- Jujūba** (sc. Rhamnus) L. (Rhamnaceen, V. 1) „Jujuba“ od. Judendorn, rote Brustbeere, fr. jujube (-bier) u. gingeole, nerprun jujubier, e. jujub (-be) (vaterl. Name!), s. Zizyphus Jujuba W.
- Juliflorae** Endl. Klasse der Kätzchenträger (*ἰουλιος* st. *οὔλιος* Wickel etc., floreo blühe).
- Juncaginēae** Juss., -aginacēae Rich., Græk., -cīnae Bartl., -cacēae Bartl., -cēae Rchb., -ci Juss. Binsenartige, Gras- od. Simsenlilien Rchb. (s. sogl.).
- Juncus** T., L. (Juncaceen, VI. 1) Binse Græk., Simse Rchb., Seub., fr. jonc, e. bent-rush, bul-rush u. reak (v. jungo verbinde — dient zu Geflecht!).
- 1) **Jungermannia** L., Nees (Lebermoose od. Jungermanniaceen, XXIV. 3) „Jungermann's“-Moos, fr. jongermanne, carpolévide (n. Prof. Jungermann in Giessen, † 1653), z. B. bicuspidata L. — Jungermanniacēae Rchb. (zu Sporangioobr̄ya Kapselmoose Rchb.), „Jungermannien“-Lebermoose. 2) **J.** (sc. Mniium) L. (Moose, XXIV. 2) „Jungermann's“-Sternmoos.
- Juniperus** T., L. (Conifer. Junipereen od. Cupressineen, XXII. 5) Wachholder, fr. genièvre (genévrier), e. juniper-tree (v. juvenis jung u. pario gebäre — Abortivmittel: Juniperus Sabina! Paxton: n. d. celt. jeneprus rauh, steif!), J. communis L. m. v. v. (z. B. suecica Hort., hibernica Pyramiden-W., cracovia u. pendula), J. Oxycedrus L. span. od. Ceder-W., fr. cèdre piquant, cedride, e. sharp-cedar, J. virginiana L. Ceder-Sadebaum, s. g. rote Ceder, fr. cèdre rouge, e. red-Cedar, m. v. v., J. lycina L., s. g. Olibanum od. Weihrauch-Wachholder, fr. manne d'encens, J. Sabina L. Sadebaum, etc. — Juniperēae Rchb.
- Jurinēa** (-aea) Cass. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Kornblumen- od. Silberscharte Seub., Flockenwurz O. W. (n. L. Jurine, Prof. in Genf, † 1819), J. cyanoides Rchb. s. Pollichii Koch, etc., s. Serratula L.



- Jussiaea** St. Hil., L. (-sieuæ Pers., -sieuæ Rottl.) (Onagrarieen, X. 1) „Jussieu's“ -Kerze (n. Bernh. de Jussieu, s. d. Aut.), z. B. *peruviana* L., *racemosa* Rottl., *J. edulis* autt., s. *Antichorus* Schreb.
- Justicia** L. (Acanthaceen, II. 1) „Justicie“ (n. d. schott. Gärtn. u. Bot. J. Justice, schr. t. brit. gardener's director, 1767 u. a.), Warmh. *J. carnæa* Lindl. (Bras.), *coccinæa* Aubl. (Cayenne), *speciosa* Roxb. (Peristrophe Nees) (Ind.), *J. Adhatoda* L. s. *arboræa* Ait., fr. *carantine*, ind. Nussb., s. *Adhatoda Zeylonensium* Herm., *J. americana* L., s. *Dianthæra* am. Mill., etc.
- 1) **Iva** L. (Compos. Ambrosiaceen, XXI. 5) „Iva“ (alt. bot. Name, urspr. yua, Wtst. v. abigo treibe ab, nämll. d. foetus, wie *Teucrium* s. *Ajuga Iva* L.), z. B. *annua* u. *frutescens* L., *ciliata* W., etc., s. *Ambrosia* L. 2) **Iva** (sc. *Teucrium*) L. (Labiät., XIV. 1) Erdkiefer, Schlagkraut, fr. *ivette*.
- Ixia** L. (Irideen, III. 1) „Klebzwiebel“, Abendblume Perring (v. Ἰξίος Mistel, Vogelleim, lat. viscum), Zier. I. *patens* Ait., *maculata* L. m. v. v. (*viridiflora* Lam., *conica* Salisb., *incarnata* Jacq.).
- Ixiolirion** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Ixia-Narzisse“ (v. *Ixia* s. eb. u. *Ἰξίον* Lilie — d. *Ixia* sehr ähnlich), Zier. I. *Pallasii* Fisch. m. v. *tataricum* Schult. u. *Ledebouri* Fisch., Mey.
- Ixora** L. (Rubiæ. Cinchonac., IV. 1) „Ixorastr.“ (Paxton v. iswara, eine malabar. Gotth., der d. Blumen dargebr. werden, Wtst. *isora*!), Warmh. I. *coccinæa* L., *Griffithii* Bot. Mag., *odorata* Hook. (Coffea od. Forst.), *alba* L. (*Jasminum indicum* Pluk.), *owariensis* Poir. (*Pavetta* ow. P.-B.).
- Kadsura** Juss. (Ranunculac. Anonac. od. Menispermeen, XIII. 7) japan. Kugelfaden od. Flaschenbaum (jap. Name d. Pflanze), *K. japonica* Dun., s. *Uvaria* jap. (Sphaerostema, fehlerh. -stemma Blum. — d. Staubfäden unten zu ein. Kugel vereinigt).
- 1) **Kaempferia** Spr. (-ia W., Pers., -pheria L.) (Scitamineen, I. 1) „Kämpferie“ (n. d. Bot. Kämpfer), *K. Galanga* L. *Galgant* = *Alpinia* Gal. Sw. (*Caecölus Philippensis* Petiv.), *K. rotunda* L. *Veilchen-Gewürz* lilie. 2) **Kaempferia** Houst. (Verbenaceen, IV. 1) Kämpfer's-Schnittblume, s. *Tomex verbenacca* Sw.
- Kageneckia** Rz. Pv. (Rosac. Spiräaceen, XXIII. 2) „Kageneck's“ -Spiräe (n. d. Graf. Friedr. Kageneck, österr. Gesandten in Madrid), *K. lanceolata* u. *oblonga* Rz. (Bäume), *glutinosa* Kth. (*Lydaea* Lyday Mol.) klebästige, etc.
- Kalanchöë** Adans. (**Kalench.**- Haw.) (**Cal.**-) (Crassulaceen, X. 1) „Kalanchöë-Dickblatt“ (chines. N. d. Pfl. *calankoë*, Wtst.), *K. aegyptica* DC. (*Cotylædon nudicaulis* L., Vahl), s. auch *Veræa* W. u. *Crassula* L.
- 1) **Kali** T., Scop. (sc. *Salsöla*) L. (Chenopodiaceen, V. 2) gem. Salzkraut (*Kali*, eine alkalische Salzbase, Chemie), s. *Kali* *Tragus* Scop. 2) **Kali** folio *graminö* Loes. (Chenopodiaceen, V. 2 od. I. 2), s. *Corispermum intermedium* L. „Wanzensamen“. 3) **Kali** *curassavica* *procumbens* Pluk. (Portulacac., X. 1), s. *Trianthema monogynum* L. „eingriffel. Dreiblume“.
- Kalmia** L. (Ericaceen Rhodoraceen, X. 1) „Kalmie“ (n. Pet. Kalm zu Åbo in Finnland, Linné's Schüler), Zier. *K. latifolia* L., e. *calicoflower*, *angustifolia* L. (*Chamaedaphne sempervirens* Catesb.), e. (in Amerika) *sheep-laurel*.
- Kandelia** DC. (Rhizophoreen, XI. 1) Wurzel- od. Leuchterbaum (malab. kandel, lat. *candëla* Leuchter — weg. d. langen, lederartigen, lang hängenbleibenden Früchte vom Ansehn ein. Kronleuchters!), s. *Rhizophora Candel* L.

- Karatas** Jacq. (sc. Bromelia) L. (Bromeliaceen, VI. 1) „Karatas“-Ananas, Karat-Aloe, fr. karatas (in Brasil. karaquata-acanga).
- Kataf** Forsk. (sc. Amyris) L. (Terebinthac. Amyrideen, VIII. 1) arabischer Balsam (arab. kataf!).
- 1) **Kaulfussia (-fusia)** Nees (Compos. Astereen, XIX. 2) „Kaulfuss“-Aster (n. d. Prof. Kaulfuss z. Halle, † 1830), Zier. K. amelloides Nees (Charieis heterophylla Cass.) s. Neesii Hort. m. v. v. 2) **K.** Blum. (Mesodmeen-Farne, XXIV. 1) „Kaulfuss“-F., s. *Aspidium aesculifolium* Blum.
- Kennedyā (-dīa)** Vent. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Kennedystrauch“ (n. d. Zücht. Kennedy, Firma Lee u. Kennedy in Hammersmith, schr. m. Lee Catal. of pl. and seeds, Lond. 1774), Treibh. K. bimaculata, coccinea, rubicunda Vent., macrophylla ds., cordata Ldl., etc., s. *Glycine* L.
- Kentia** Blum. (Palmen, XXI. 8) „Kent's“-P. (n. d. Miss Kent, schr. Sylvan sketches, Lond. 1825), z. B. K. sapida Mart. (Arēca s. Sol.), Zier. K. Canterburyana Bull.
- Keraudrenia** Gay (Büttneriaceen, V. 3) „Keraudrenie“ (n. Cl. Keraudren, Marine-Generalarzt, Pfeiffer), z. B. K. hermanniaefolia Gay (Str. Neuholl.).
- 1) **Kernera** Med. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) „Kerner's“- od. Felsen-Löffelkraut, Stein-Löffelkr. Seub., K. saxatilis Med. (Cochlearia sax. od. Camelina u. Myagrum) (n. d. Bot. J. S. Kerner). 2) **Kernera** W. (Potamoogen od. Fluvialen, I. 1), K. oceanica W. (Zostera oc. L.), s. Caulinia Pers. u. Posidonia Kön. „Kerner's“-Seegras. 3) **Kerneria** Mch., Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Kerner's“-Zweizahn, s. *Bidens* T.
- Kerria** Lk. (**Keria** DC.) (Rosac. Potentilleen od. Tiliaceen, XIII. 1) „Kerrie“ („Kerie“), japan. Ranunkelstr. Gold- od. Nesselröschen, Judenpappel Leun. (n. d. engl. Bot. John Bellender-Ker, s. d. Aut., od. n. W. Kerr, Samml. für d. Kew-Gärten, Rümpl.), Zierstr. K. japonica L. m. v. v. (z. B. fl. pleno Hort.), s. *Corchorus japonicus* L., Thb. (*Rubus* j. aut.).
- 1) **Ketmia** T., Scop. (Malvaceen, XVI. 8) „Ketmie“, fr. Ketmie (Name in Syrien), Zier. K. rosca Hort. (*Hibiscus rosæus* Thor.), s. g. Festblume, fr. fleur de sabale, K. liliiflora Hort. (*Hibisc. lil. Cav.*), s. g. Ludwigsblume, fr. fleur de St. Louis, K. syriaca Scop. (*Hibisc. syr. L.*) syrischer Eibisch (veralt. Ketmie, Rmpl.), K. *Trionum* Scop. „Stundenblume“ (*Hib. Tr. L.*) etc. 2) **Ketmia** folio quinque-fido Burm. (Sterculiaceen, XVI. 8), s. *Bombax gossypinum* L. „Baumwollenbaum“.
- Khaja (-ya)** A. Juss. (Hesperideen Meliaceen, X. 1) afrikan. Mahagoniholz (vaterl.!), Kh. senegalensis A. Juss.
- Khutrow** (sc. *Abies*) Loud. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Smith's“- od. *Khutrow*“-Fichte, fr. sapinette de l'Himalaya, Epicéa pleureur, e. Kh.-spruce-fir, s. *Abies Smithiana* Lindl. (*Pinus* Kh. Royle s. *Smithiana* Wall. und *Picea Morinda* Lk. (vaterl.).
- Kielmeyera** Mart. (Ternstroemiaceen od. Guttiferen, XIII. 1) „Kielmeyer's“-Glanzblatt, s. g. Drehstamm (n. d. Staatsrat K. v. Kielmeyer in Stuttgart, † 1844), K. speciosa M., s. *Bonnetia* Schreb.
- Kieseria** Reinw., Nees (Ternstroemiaceen Theaceen od. Guttiferen, XIII. 1) „Kieserie“ (n. d. Prof. d. Med. D. G. Kiefer in Jena), K. sericea Rw., stricta Nees (*Bonnetia* str. Mart.) etc.
- Kigelia** DC. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Kigelie“, s. g. Götzenholz (malabar. kigeli-keia, Wtst.), K. pinnata DC. (Afrika).
- Kiggelaria** L. (Capparideen Flacourtieen od. Terebinthaceen, X. 5 od. XXII. 9) „Kiggelarie“ (n. d. holländ. Bot. Francis Kiggelaar, schr.

- Phytographia curiosa Amsterd. 1702), *K. africana* L. (B.) u. *integrifolia* autt. (Str. Cap).
- Kinkina** Adans., s. *Cinchona* L. (vaterl.).
- Kirganelia** Juss. (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Kirganelie“ (v. kirganeli, Nam. d. Pfl. auf d. Malabarküste), *K. s. Urinaria indica* Burm. (Kirganeli Rheed.), *K. virginica* Juss. (Str.), s. *Phyllanthus Kirganelia* W.
- Kitaibelia** W. (Malvaceen, XVI. 8) „Kitaibel's“-Malve (n. d. Prof. P. Kitaibel in Pest, † 1818), Zier. *K. vitifolia* W., e. vine-leaved *K.*, fr. Kitaibélie à feuilles de vigne.
- Kittelia** Rchb. (Lobeliaceen, XIX. 6) „Kittel's“-Lobelia (n. M. Kittel, s. d. Aut.).
- Klaprothia** Hb., B., *K.* (Loasaceen, XIII. 1) „Klaproth's“-Brennwinde (n. d. Nat. Klaproth, schr. Beitr. z. chemisch. Kenntnis d. Mineralkörper, 6 Bde. 1795—1815), *K. mentzeloides* H. B. K., s. *Guapurium herbaceum* Spr.
- Klattia** Bak. (g. n.) (Irideen, III. 1) „Klatt's“-Schwertlilie (n. F. W. Klatt, s. d. Aut.), *K. partita* Bak.
- Kleinia** L. (zu *Cacalia* L.) (Compos. Baccharideen, XIX. 1) canarische Pestwurz M.-Rchb. (n. d. Bot. J. H. Klein), Zier. *Cacalia Kleinia* L., *Kl. articulata* L. „gliederstengl.“, *ficoides* Haw., *fulgens* Hook. etc.
- Klopstockia** Karst. (Palmen, XXI. 5) „Klopstock's“-Wachspalme (n. d. deutsch. Dicht. Klopstock), *Kl. cerifera* Karst. u. *Quinduensis* ds. (Columbia in Süd-am.), s. *Ceroxylon* Hb., Bpl.
- Klotzschia** Cham. (Umbelliferen, V. 2) „Klotzsch's“-Dolde (n. d. Bot. Klotzsch in Berlin).
- Klugia** Schldl., Endl. (Gesneriac. od. Bignoniaceen, XIV. 2) „Klugie“ (n. Friedr. Klug, schr. Bücher-Verz. d. Gesellsch. naturf. Freunde in Berlin, 1828), Treibh. *Kl. azurca*, Warmh. *zeylanica* Schdl.; *Klugia* Endl. s. *Didymocarpus* W., *Klugia* A. Juss. s. *Loxonia* Jack discolor u. *hirsuta* Jack (Sumatra).
- Knappia** Sm. (Gräser, III. 2) „Knapp's“-Gras (n. J. L. Knapp, Verf. d. brit. Gräser), *K. agrostidea* Sm., s. *Mibora verna* Adans.
- Knautia** Coult., L. (Dipsaceen od. Aggregaten, IV. 1) „Knaut's“-Grindrose, Ackersternkopf, Kleppel O. W. (n. d. Arzt Christoph Knaut z. Halle, † 1716), *Kn. arvensis* Coult. (*Scabiosa* arv. L.) u. *silvatica* Dub., *K. palaestina* L. f. (*Pterocephalus brachiatus* Spr.), *orientalis* L. f.
- Knightia** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Knight's“-Silberfichte (n. d. Präsid. d. Gartenbau-Gesellsch. Thom. Andr. Knight Esq., † 1838), *K. excelsa* R. Br. (hoh. straff. B.).
- Kniphofia** Mnch., A. Rich. (Liliaceen, VI. 1) „Kniphofie“ (n. Joh. Jer. Kniphof, † 1765, schr. Lebendig Official Kräuterbuch, Erfurt 1733/34), *K. Quartiniana* A. Rich. s. *aloïdes* Mnch., s. *Tritoma Uvaria* Gawl.
- 1) **Knorrëa** Moç. u. Sess. (Terebinthac. Bursereen, VI. 1) „Knorr's“-Terebinthenbaum (n. G. Wolff. Knorr, schr. üb. Gartenpfl. 1770—72), s. *Hedwigia* Sw. 2) **Knorria** Sternb., Göpp. (foss. Farnpalmen, XXIV. 1) „Knorr's“-Schuppenbaum, s. *Lepidodendron* Brongn.
- Knowltonia** Salisb. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Knowlton's“-Adonisröschen (n. d. Curator d. bot. Gart. s. z. Eltham, Thom. Knowlton, † 1781), *K. rigida* Sal. (*Adonis capensis* L. f.).
- Knoxia** L. (Rubiaceen, Cinchonaceen, IV. 1) „Knox's“-Chinastrauch (n. Rich. Knox, schr. Berichte v. Ceylon 1681), *K. scandens* P. Br. *Aegiphila elata* W.). *K. zeylanica* L. „Ceylon-Veronika“, s. *Dentelaria zeyl.* Raj., *K. brasiliensis* Spr., s. *Declieuxia herbacea* Schldl.
- Kobresia** W. (Cyperaceen, III. 1) „Kobresie“, Hüllsegge (n. Dr. v. Kobres in Augsburg, Förd. d. Bot., verkaufte 1811 sein Naturalienkabinet

- an d. Kronprinzen v. Baiern), K. s. Elyna Schrad., caricina W., s. Carex bipartita All. s. hybrida Schkuhr.
- Kobus** Banks (Magnoliaceen, XIII. 7) zierliche Magnolie (vaterl.), s. Magnolia gracilis Salisb.
- Kochia** Roth (Chenopodiaceen, V. 2) „Kochie“, Pfriemenblatt, Staudich O. W. (n. d. deutsch. Floristen W. Dan. Koch, Prof. z. Erlangen, † 1849), K. scoparia Schrad. (Chenopodium scop. L.), s. g. Studentenkraut Rmpl.
- 1) **Koelera (-ia)** Pers. (Gräser, III. 2) „Koeler's“-Kammgras, Kamm-schmiele, Ritschgras O. W. (n. G. L. Koeler, Prof. in Mainz, schr. Descr. graminum etc., 1802), K. cristata Pers. 2) **Koelera laurifolia** W. (Menispermaceen, XXII. 4) „Koeler's“-Mondsamenbaum, s. Limacia Becc. (B. St. Domingo).
- Koelpinia** Pall. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Kölpin's“-Milche (n. Al. Bernh. Koelpin in Greifswald, Pallas' Zeitgenossen, schr. üb. d. sibir. Schneerose 1779), K. linearis Pall., s. Lampsana s. Rhagadiö-lus Koelpinia L.
- 1) **Koelreutera** Spr. (-ia Laxm.) (Sapindaceen, VIII. 1) Koelreuter's“-Gelbrispentbaum (n. d. Prof. Joh. Koelreuter in Karlsruhe, † 1806), Zierb. K. paniculata Laxm. s. Paullinioides l'Hér., fr. savonnier paniculé, e. panicle-flowered K., s. Sapindus chinensis L. 2) **Koelreutera hygrometrica** Hedw., s. Funaria h. Hedw. (Moose, XXIV. 2).
- 1) **Koenigia** Comm. (Büttneriaceen, XIV. 2) „Königie“ (n. d. dän. Nat. u. Reis. Joh. Gerh. König) (schwerl. Paxton: n. d. Schweiz. Math. Sam. König!). 2) **Koenigia** L. (Polygonaceen, III. 3), z. B. K. islandica L., nepalensis Don.
- Kohlrauschia** Kth. (Caryophyllen, X. 2) „Kohlrausch“-Nelke (n. d. Pädag. u. Geschichtsschr. Kohlrausch in Hannover, † 1867? od. Physiker Kohlrausch in Erlangen, † 1858? ungew.), K. prolifera Kth., s. Dianthus prolifer L. (Tunica prol. Scop.)
- 1) **Kolbea** Schldl. (Melanthac. od. Juncaceen, VI. 3) „Kolbe's“-Giftililie (n. d. Reis. M. B. Kolbe, schr. Besch. d. Vorgeb.'s d. Guten Hoffn. u. d. Hottentotten, Frkft. 1745), K. elegans P.-B., Breyntiana Schldl. (Tulipa Br. L.). 2) **Kolbia** P.-B. (Passifloreen, XVI. 2) (n. d. Nam. Kolb).
- Koniga** R. Br. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Meerstrands-Steinkraut, K. maritima R. Br. (n. Charl. König, Insp. d. brit. Museums, mit Sims 1805—1806 Annales of Botany), s. Alyssum mar. L., Teppichg. K. variegata Hort., etc., s. Adyssetum (-on) Adans., Glyce u. Farsetia libyca Spr.
- 1) **Kopsia** Blume (Apocynen, V. 1) „Kopsie“ (n. d. Prof. Kops, m. Van Hall, Miquel etc. Verf. d. Fl. batäva, fig. col. etc. Amsterd. 1800—1860). 2) **Kopsia** Dumort. (zu Orobanche Rchb.) (Personaten Orobancheen, XIV. 2), z. B. coerulea Vill., arenaria Borkh. etc.
- 1) **Kosteletzkya** Presl (Malvaceen, XVI. 6) „Kosteletzky“-M., z. B. hastata Pr. (s. d. Aut.). 2) **K.** J. Eck. (Algen, XXIV. 3).
- Krameria** Loeffl. (Polygalaceen, XIV. 2 od. IV. 1) „Kramerie“ (n. d. öster. Arzt etc. G. H. Kramer, schr. elenchus vegetab. et animal. per Austriam inferiorem etc. Viennae 1756), z. B. triandra Loeffl. (peruvian. ratanhia), s. Ixina L. (Str. Amer.).
- 1) **Krockeria** Mnch. (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Krocker's“-Klee (n. d. Bot. A. Krocker, schr. Fl. Silesiaca etc.), K. s. Lotus oligoceras-tos Mnch. 2) **Kr.** Neck. (Anonaceen, XIII. 6).
- Kuhnia** L. f., Schreb. (Compos. Eupatoriaceen, XIX. 1) „Kuhn's“-Wasserdost (n. Adam Kuhn, Linné's Schüler), K. Critonia W. s. Dalea eupatorioides L. (Eupatorium alternifolium Ard.), s. Critonia P. Br., Kleinia L. u. Jaumea Pers.

- 1) **Kunthia** Hb., Bpl. (Palmen, VI. 1) „Kunth's“-P. (n. d. ber. Bot. K. Sig. Kunth in Berlin, A. v. Humboldt's Freunde), *K. montana* H. B., *xalapensis* Dietr. (Chamaedorea Schiedeana Mart.). 2) **K.** Dennst. (Terebinthac. Bursereen, X. 1), s. *Garuga* Roxb.
- 1) **Kunzēa** Spr. (Rosac. Prockieen od. Pomaceen, XII. 1) „Kunzee“ (n. d. Prof. Kunze in Leipzig), *K. tridentata* Spr. (*Tigarea trid.* Pursh), s. *Purshia* DC.
- Kutchubaea** Fisch. (Rubiaceen, V. 1) „Kutschuby's“-Gardenie (n. Kutschuby, Minist. d. Innern in Russland zu Fischer's Zeit), *K. insignis* Fisch.
- Kydia** Roxb. (Polygonaceen, VIII. 3) „Kydie“ (n. d. Colonel Rob. Kyd, Dir. d. bot. Gart. z. Calcutta), *K. calycina* u. *fraterna* Roxb.
- Kyllingia** L. f., W. (-ga Rottb.) (Cyperaceen, III. 1) „Kylling's“-Kopfriet (n. d. dän. Bot. P. Kylling, † 1696, schr. *Viridarium danicum*, 1628), z. B. *monocephala* L., s. *Schoenus coloratus* L. u. *Mariscus col.* Vahl.
- 1) **Labatia** Sw. (Styraceen, X. 1) „Labat's“-Storaxbaum (n. d. franz. Mönch u. Missionair J. B. Labat, † 1738 in Paris). 2) **Labatia** Scop. (Aquifoliaceen, IV. 4) „Labat's“-Stechpalme.
- Labiatae** Juss., DC., Rehb. „Lippenblüter“, Rachenblumige (v. *labium* Lippe) XIV. 1 L.
- Labiatiflorae** Bartl., DC., Ord. d. Lippenblumigen (s. eb. u. *flos*, -öris Blume) i. q. *Labiatae* Juss.
- Lablab** Savi (sc. *Dolichos*) L. (Legum. Phaseoleen, XVII. 4) gem. od. „Lablab“-Faselbohne (arab. *lablab* od. *liblab*), Zier. *L. vulgare* Savi s. *microcarpus* DC. (*Dolichos purpureus* Jacq.), fr. *dolique d'Egypte*, e. *hyacinth-bean* m. v. fl. *alba* Hort. u. *albus nanus* Hort., s. *Lablavia* Adans.
- Labrusca** (sc. *Vitis*) L. (Ampelideen, V. 1) filziger Weinstock, fr. *vigne labruce* od. *de renard*, e. *wild-vine* od. *fox-grape* „Fuchstraube“ (*labrusca* wilde Weinrebe, v. d. hebr. *busca* Wtst.), s. *Vitis aestivalis* Mehx. Sommerrebe v. Carolina.
- Laburnum** Med., DC., Mill. (zu *Cytisus* Rehb.) (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Goldregen, Bohnenbaum, fr. *laburne* od. *l'aubours*, *faux ébenier*, e. *Pea-scod-tree*, *bean-trefoil*, *bean-tree*, Zier. *L. vulgare* Gris., s. *Cytisus Laburnum* L., *L. nigricans* L., *Adami* Poir., *alpinum* Mill. (*Cyt. alp.* Mill.) etc. (st. *albumum* Splint, von *album* se. *lignum* — sehr weiss. Splint u. hart. Holz, Plin.).
- Lachenalia** Jacq., L. (Liliaceen, VI. 1) „Lachenal's“-Hyazinthe (u. Werner de Lachenal, Prof. d. Bot. z. Basel, † 1800), Warmh. *L. orchiooides* Ait. (*Phormium* s. *Hyacinthus orch.* L. f.), *tricolor*, *quadricolor*, *uniflora*, etc.
- Lacis** Schreb. (Podostemeen, XIII. 2) „Schlitzblatt“ D. (gr. *λαξις* Fetzen — geschlitzte Blätt. u. Blütenscheide), z. B. *foeniculacea* Schr. (*Marathrum foen.* Hb.) s. g. *Passecarne-Gemüse* v. *Neugranada* „übertrifft Fleisch“, *fluviatilis* W. (*Mourera fl.* Aubl.) etc.
- Lacistēma** Sw., W. (Urticac. od. Myricaceen, II. 3) „Schlitzfaden“, Gagelpfeffer D. (s. eb. u. *στῆμων* Staubfaden, lat. *stamen* — diese zweiteilig), *L. piperoides* W. (*Piper aggregatum* Berg.) (Str. Jamaica, Surin.).
- 1) **Lactuca** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Lattich“, fr. *laitue*, *laiteron*, e. *lettice*, *lettuce* (v. *lac*, -ctis Milch — führt Milch in d. Gefässen!), *L. sativa* L. *Lattich-Salat*, v. *romana* Hort. „Römersalat“, s. g. *Sommer-Endivie* (z. B. *gelber Pariser*, *Romaine blonde maraichère*, *gelber Alphange*, *Forellen-* u. *Strunksalat*), v. *capitata*

- Hort. „Köpfsalat“ (z. B. Steinkopf, Eiersalat, Kopf-Montrée, Schwedenkopf etc.), v. Stech- od. Rupfsalat, s. g. Latsche, Schnittsalat, v. augustana Hort. Spargelsalat (Strunks.); wild L. scariöla L. Wild-L., virosa L. „Gift“-L., etc. 2) **Lactuca** (sc. Ulva) L. (Algen, XXIV. 3) Meer-Lattich, fr. laitue de mer.
- 1) **Ladänum** Alp. (**-nium** Spach) (Cistaceen, XIII. 1) „Ladänum“-Gummi (v. d. *λῆδος*-Strauch gesamm. Harz = ladänum), L. creticum Alp., s. Cistus cret. L. u. ladaniferus L. 2) **Ladänum** (sc. Galeopsis) L. (Labiaten, XIV. 1) schmalblättr. Hohlzahn, s. Galeopsis angustifolia Ehrh.
- 1) **Laelia** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Lälia“-O. (Laelius, römischer Geschlechtsname), z. B. grandiflora Ldl. (Mex.). 2) **Laelia** Adans. (Cruciferen Buniadeen, XV. 1) Zacksenbote, L. cochlearioides Pers. (Bunias cochl. L.), s. Calepina Corvini Desv.
- Lagenaria** Ser. (Cucurbitaceen, XXI. 9) „Flaschenkürbis“, s. g. Calabasse, fr. gourde-calabasse u. coui od. courge-bouteille, e. bottle-gourd od. large-american-gourd (v. *λάγγρος*, lat. lagena Flasche, weitbauchige mit engem Hals), Zier. L. vulgaris Ser. (Cucurbita Lagenaria L. s. leucantha Duchesn.) m. v. Gurda Ser. Pilgerflasche, fr. gourde de pèlerin, L. v. Cugurda L. Heberkürbis, fr. gourde siphon od. courge en entonnoir, v. clavata Ser. Herkuleskeule (L. clavaeformis Hort.), v. pyrotheca Sw. Pulverflasche, fr. gourde poire à poudre, e. powder-horn, v. depressa Ser., v. longissima Hort., fr. g. massue-très-longue.
- Lagerstroemia** L. (Lythrarieen, XIII. 1) „Lagerstroem's“-Baum (n. Magn. v. Lagerstroem, Dir. d. ostind. Kompagnie z. Gothenburg in Schweden, † 1759), L. regina Roxb. prachtvoller L., L. grandiflora Roxb. (Dua-banga gr. Kurz).
- Lagetta** Juss. (Myrobalaneen, VIII. 1) Leinwand- od. Spitzenbaum Leun., Schnurrende (Nam. d. B.'s in Jamaica lagetto), L. funifera Mart. u. lintearia Lam. (Archipel), s. Daphne brasiliensis Raddi, etc.
- Lagoecia** L. (Umbelliferen, V. 2) Hasenkümmel, „-haus“, Federknopf D. (v. *λαγώς* Hase, *οἶκος* Haus — Samen in Wollhüllen, wie kl. Häschen!), L. cuminoides L. (Cuminum sylvestre Bauh.).
- Lagopodium** Ser. (zu Trifolium Rchb.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) „Hasenpfötchen“ (s. eb. u. *ποδίον* dem. v. *ποῦς*, *πόδος* Fuss, Socke — Aussehn d. zott. Köpfchen!), s. Trifolium arvense L.
- Lagopus** Ser. (Leguminos. Trifolieen, XVII. 4) „Hasenfuss“, -pfötchen i. q. Lagopodium! (s. eb.).
- Lagosëris** Lk., M. B. (zu Barkhausia Rchb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Hasensalat“ (s. v. u. *σέλις* Salat), L. taraxacoides Lk. etc., s. Crepis u. Barkhausia Mnh.
- Lagunaea** Cav., Schreb. (Malvaceen, XVI. 8) „Laguna's“-Malve (n. d. span. Arzt u. Bot. d. 16. Jahrh.'s Andr. Laguna), L. aculeata Cav. (Hibiscus Solandra l'Hér. s. Solandra lobata Murr.).
- Lagunaria** DC., Endl. (Malvaceen, XVI. 8) „Lagunamalvenartige“ (s. eb.), z. B. L. Pattersoni DC. (lilablüh. Prachtb.).
- Lagurus** L. (Gräser, III. 2) „Hasenschwanz“, Sammetgras, fr. lagurier, lagure, e. hare's-tailgrass (s. v. u. *ὄβρα* Schwanz — kurze, weiche Ähre!), Zier. L. ovatus L., fr. l. à épis ovales, gros Minet, e. egg-eared-h.-t., L. cylindricus L., s. Saccharum cyl. Lam.
- Lalage** Lindl. (Leguminosen, XVII. 4) „Lalagestrauch“ (n. der von Horaz verwetigten Lalage — prächt. Aussehen!), L. ornata Ldl. (Neuholl.).
- Lallemantia** Fisch., Mey., M. B. (Labiaten, XIV. 1) „Lallemant's“-Drachenkopf (n. Avé Lallemant, Adjunkt d. bot. Gartens in Petersb.), z. B. iberica M. B. (Dracocephalum ib. M. B.) (Ölpfl.).

- 1) **Lamareckia** Mneh. (zu Cynosūrus Rchb.) (Gräser, III. 2) Goldschwanzgras (n. d. Prof. J. B. de Lamareck in Paris, † 1829), Zier. *L. aurăa* Mneh. (Cynosurus aur. L.), fr. Lamareckie dorée. 2) **Lamareckia** Rich. (-ckea Pers.) (Solaneen, V. 1) „Lamarck's“-Stechapfel, *L. coccinăa* s. glaberrima Rich., s. Datūra L. 3) **Lamareckia** Bursa Olivi (Tange, XXIV. 3), s. *Codium* Bursa Ag.
- Lambertia** Sm. (Proteaceen, IV. 1) „Lambert's“-Silberstrauch (n. d. Bot. Aylmer Bourke Lambert Esq.), *L. formosa* Sm. (Str. Neuholl.).
- Laminaria** Lamx. (Leder-Tange, XXIV. 3) Riemen- od. „Blatt“-Tang (lamina Blech, Blatt), z. B. *esculenta* Lamx., *digitata* Lamx. etc. — Laminaričae Ag. „Blatt“-Tange“.
- Lamium** L. (Labiaten, XIV. 1) Taubnessel, Bienensaug, Saug O. W., fr. lamion (-mier), oeil de chat, e. archangel, dead-nettle (blind-) (v. *λάμος* Schlund od. *Λαύλα* fabelh. Ungeheuer, Haifisch — aufger. Rachen!), *L. album* L., fr. lamier blanc, pièd-de-poule, *L. maculatum* L. rotes Bienenhütel etc.
- Lamprophyllae** Bartl., DC. „Glanzblattgew.“ (*λαμπρός* glänzend, *φύλλον* Laub).
- Lamprostachys** Boj. (Labiaten, XIV. 1) „Glanz-Ziest“ (s. eb. u. *Stachys* Ziest, v. *στάχυς* Ähre — schöne, glänz. Endtraube).
- Lapsāna** T., Vāill. (**Lapsāna** L.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Rainkohl, Hasenlattich, Milche Grck., fr. lamsane, herbe aux ragades „Rainkr.“ (gr. *λαμψάνη* u. *λαψάνη* v. *λαπάζω* purgiere).
- Lanaria** Ait., Thb. (Amaryllideen, VI. 1) „Woll“-Hyazinthe, Filzlinie (v. lana Wolle — Blume u. Fruchtknoten filzig), *L. plumosa* Ait., s. *Hyacinthus lanatus* L. (Argolasia Juss.).
- Lansium** Blum., Rumph. (Hesperideen Meliaceen, X. 1) echter „Lansabaum“ Leun. (wahrsch. vaterl. Name zu Grund liegend), *L. domesticum* Jack (*Cipadessa fruticosa* Blum., Str. Molukken), *L. montanum* Jack (Milnaea m. Roxb.) (Str. Sumatra).
- 1) **Lantāna** L. (Verbenaceen, XIV. 2) Schneeball-Verbene, s. g. Wandelröschen Rmpl., fr. lantamier (nicht v. lana Wolle, sondern Wtst. v. lentare biegen), Zier. *L. hybrida* Hort. Blendling von *L. Camāra* L., *L. nivea* Vent., *crocea* Jacq. (— Ähnlichk. m. *Viburnum*!). 2) **Lantāna** (sc. *Viburnum*) L. (Lonicereen, V. 3) filziger Schneeball, gem. Schlinge, Bandstrauch u. Pabstweide Rmpl., fr. hardeau od. mancienne (-sienne, mentiane), e. way-faring-tree od. wild guelder-rose.
- Laodicăa** s. *Lodoičăa* Comm.
- Lapăchys** Torr. u. Gr. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Drummond's Rudbeckie, schönste Obeliskenblume, s. *Rudbeckia Drummondi* Hook. = *Obeliscaria pulcherrima* DC. (v. *λαπάζω* höhle aus u. *laxiere*?).
- Lapageria** Rz. Pv. (Smilaceen, XXII. 6) „Lapagerie“, Warmh. *L. rosăa* R. P. (n. d. Nam. Tascher de la Pagerie, d. Familiennamen d. Kaiserin Josephine, Dietr. u. Wtst.: n. d. Bot. Jos. Lapagerie).
- Lapăthum** T., Scop., Lam. (zu *Rumex* Rchb.) (Polygonaceen, VI. 3) Zwitterblüt-Ampfer (gr. *λάπαθον* Ampfer v. *λαπάζω* purgiere), z. B. *R. Hydrolapăthum* Huds. Fluss-A., *Nemolapăthum* Ehrh. sc. conglomeratus Murr.
- 1) **Lapeyrousia** Gawl., Pourr. (-peyrousia autt.) (Irideen, III. 1) „Lapeyrouse's“-Schwertel (n. d. Bot. La Peyrouse), z. B. *L. abyssinica* Bak. (Geissorrhiza ab. R. Br.) „Schindelwurzel“, *bracteata* Thb. (*Gladiolus* br. Thb.). 2) **Lapeyrousia** Thb. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 3), *calycina* Thb. (Osmites cal. L. f.).
- Laplacăa** H. B. K. (Ternstroemiaceen, XIII. 5) „Laplace's“-Baum (n. d. berühmt. Math. etc. Laplace), *L. speciosa* Kth. (Süd-am.), *inaequaliterata* Schott (*Gordonia semiserrata* Spr. — nur zur Hälfte gesägte Blätt., daher „ungleichseitig“!).

- Lappa** T. (sc. *Arctium*) L. (Composit. *Carduaceen*, XIX. 1) Klette, fr. cousins, e. base-rocket (lat. *lappa* v. d. celt. *llap* Hand, gr. *λάγῳ* ergreife — wegen d. häckrigen Kelchschuppen!), *L. major* G. (Arct. *Lappa* L.), *L. minor* DC. (*glabra* Lam.), *tomentosa* Lam. (Arct. *Bardana* W.) etc.
- Lappago** Schreb. (Gräser, XXIII. 1) „Kletten“- od. Stachelgras (s. eb. — stachlig gefranste Kelchspelzen), z. B. *L. racemosa* Schreb., s. *Cenchrus rac. L.* u. *Phalāris muricata* Forsk.
- 1) **Lappula** Mch. (sc. *Myosōtis*) L. (Boragineen, V. 1) „Klettchen“- od. Stachelsamen-Vergissmännicht (dem. *lappa* Klette — Klettenfrüchte!).
- 2) **Lappula** L., DC. (Tiliaceen, XI. 1) (sc. *Triumfetta*) Jacq. — hakeige Kapseln).
- Lapsana** T. s. *Lampsana* T., Vaill.
- Larbrēa** St. Hil. (zu *Stellaria* Rchb.) (Alsinaceen, X. 5) Wasser-Sternmiere, -Weichling Grck.. -Hornkr. (n. d. Abbé de l'Arbre, schr. *Fl. de l'Auvergne*, 1795), *L. aquatica* St. Hil. = *Malachium aq. Fr.* (*Cerastium aq. L.*).
- Lardizabāla** Rz. Pv. (Menispermaceen od. Berberideen *Lardizabaleen*, XXIII. 2) „Lardizabal's“-Schlingstr. (n. d. span. *Nat. Mich. Lardizabal y Uribe*), *L. bi-u. triternata* R. P. (Chili), s. *Boissieria trit. Domb.* — *Lardizabalēae* DC. (zu *Berberidēae* DC.).
- Laricio** Poir. (sc. *Pinus*) L. (Coniferen, XXI. 9) „Lärchenkiefer“, Meerstrands- od. corsische Kiefer Rmpl., fr. *pin de Corse*, e. *corsican* od. *larch-pine*, s. *Pinus maritima* Mill. od. *sylvestris* v. *marit.* Ait. (v. *larix*, -īcis Lärche).
- Larix** DC. (sc. *Pinus* L., sc. *Abies* Poir.) (Coniferen, XXI. 9) „Lärche“, fr. *mélèze*, e. *larch-tree* (larsh, larynx-tree) (lat. *larix*, -īcis Lärche), wild u. Zier. *L. decidua* Mill. s. *europaea* DC. (*excelsa* Lk., *vulgaris* Fisch.) m. v. *pendula* Hort., *L. americana* Mchx. (*pendula* Salisb., *microcarpa* Poir., *Pinus laricina* Dur. etc.), fr. *mél. d'Amérique*, e. *american larch*, *L. davurica* Turcz., *sibir. Ceder*, Lärche v. *Dahurien* in *Sibir.*, etc.
- Larochēa** Pers. (Crassulaceen, V. 5) „Laroché's“ od. schönrotes Dickblatt (n. d. Genfer Arzt u. Bot. Franç. *Laroché*, schr. üb. *Ixia* u. *Gladiolus*), Topfbl. *L. coccinea* Pers. (*Crassula c. L.*, *Dietrichia c. Tratt.*); s. *Rochea* DC.
- Laserpitium** T. (Umbelliferen, V. 2) Laserkraut, fr. *laser*, *sermontaine*, e. *lazer-wort* (laser-) (gr. *λάσαρον* i. q. *Σίλγιον*, eine Arznei- od. Speisepfl., u. *pix*, -īcis Pech etc., Wst. *πιτῆζω* tröpfle), z. B. *latifolium* L., *Siler L.* etc.
- Lasiagrostis** Lk., Kth. (Gräser, III. 2) „Rauhgras“ (*λασιός* rauh etc., *ἀγροστί*; Feldgras — d. Kronspelzen rauhhaarig), s. *Stipa splendens* s. *Calamagrostis* Wahlbg. (*Calamagr. speciosa* Host, *Arundo spec. Schrad.*).
- Lasiandra** DC. (Melastomaceen, X. 1) „Zotten-Staubfaden“ (s. eb. u. *ἀνδρο. -δρό*; Mann, Staubfaden — diese meist behaart), Winter-Topfbl. *L. Fontanesiana* DC., *coerulea* (*Melastoma coer. Hort.*), *lepidota* Naud., *macrantha* Lindl., etc.
- Lasiopetalum** Cass., Sm. (Büttneriaceen, V. 1 od. XVI. 7) „Woll-Blumenblatt“ (s. v. u. *petalum* gr. *πέταλον* Kron- od. Blumenblatt — diese unten rostfilzig), Treibh. *L. parviflorum* Rudg. (Str. *Neuholl.*), *ferruginēum* Andr., *arborescens* Ait. (*Gaya platyphylla* Spr.), *purpurea* Sims (*Thomasia p. Gay*) etc.
- Lastūla** Alfd. (Legumin. *Vicieen*, XVII. 4) „Haarflocken“-Platterbse (*λασιός* zottig, *τίλον* Flocke), *L. hirsuta* Alfd. = *Lathyrus hirs.* *L. Lastraea* Presl (-strēa *Bory St. Vinc.*) (*Farne*, XXIV. 1) „Delastre“-



Farn (n. C. J. L. Delastre, schr. 1835 üb. d. Veget. d. Depart. de la Vienne), Zier. *L. patens* Presl (eleg. Grosswedel).

**Latania** Comm. (Palmen, VI. 1) Schirmpalme (fr. u. ind. latanier nach vaterl. Namen!), Warmh. *L. borbonica* Lam., fr. latanier rouge (cléophore), s. *Livistonia* s. *Corypha chinens.* Mart. (Ins. Bourbon od. Mauritius).

**Lathraea** L. (Orobanchen, XIV. 2) „Geheim“-Schmarotzer, Schwammkraut, Schuppenwurz, fr. clandestine od. herbe cachée u. écaillée, *L. squamaria* L., fr. auch herbe à la matrice (*λαθραίοz* heimlich). s. *Orobanche* L.

**Lathyrus** L. (Euphorbia) L. (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) kreuzblättr. Wolfsmilch, Spring- od. Maulwurfskraut M.-Rchb., fr. catapuce (gr. *λαθυρίς* v. *λά* sehr u. *ἔλω* heile od. *γορρός* heftig — Samen stark purgierend).

**Lathyrus** L. (Legumin. Viciaen, XVII. 4) Platt- od. Blatterbse, fr. gesse, e. chickling-vetch (gr. *λάθυρος*, Paxton *λά* als Augment od. sehr, *γορρός* hitzig — früher als *Aphrodisiacum*, Wtst.), Saaten *L. tuberosus* L. Erdmandel od. -nuss, fr. suron, gesse-tubéreuse, magon (macusson, mégusson, minson), e. earth-pea od. -nut, Zier. *L. odoratus* L., spanische Wicke, m. v. v., fr. gesse odorante od. pois de senteur, e. lady's-pea (sweet-), z. B. v. Kronprinzessin v. Preuss., *L. tingitanus* L., fr. gesse de Tanger, *L. latifolius* L. Bouquetwicke (Wolfschote) m. v. v. (albo, roseo, splendens Hort.), grandiflorus Bot. Mag. s. biflorus Raf., e. large-flowered-everlasting-pea, etc.

1) **Laugeria** Sw., Vahl (bess. **-gieria** Spr.) (Ehretiaceen od. Hydrophylléen, V. 1) „Laugier's“-Wasserblatt, fr. laugier (n. Laugier, schr. anal. de l'amphibole du cap de Gattes), Zier. *L. odorata* L. (Edechia Loeff.). 2) **Laugeria** Jacq. (**-gieria** Rz. Pv.) (Rubiace. Guettardeen, V. 1), s. *Guettarda hirsuta* u. *tomentosa* R. S.

**Lauræae** Rchb. (**-ri** Juss., **-raceae** DC.) (zu *Laurinæae* Vent., Rchb., Ord. d. Lorbeergew.), s. *Laurus*!

1) **Laurœola** (sc. *Daphne*) L. (Thymeläaceen, VIII. 1) lorbeerblättr. Seidelbast, immergrüner S., Zindelbast, Lorbeerstaude Vilm., fr. laurœole mâle od. des Anglais, e. spurge-laurel, s. *Thymelæa Laurœola* Scop. (dem. v. *Laurus*). 2) **Laurœola** Meissn. subgen. v. *Daphne* (Thymel., VIII. 1), z. B. D. *Laureola* u. D. *pontica* L.

1) **Lauro-Cerasus** T. (sc. *Prunus* L. s. *Cerasus* Lois.) (Amygdalaceen, XII. 1) Kirschlorbeer, eig. „Lorbeerkirsche“, fr. laurier-cerise, amandier, laurier au lait, e. cherry-bay (-laurel) od. laurel-cherry (v. *Laurus* Lorbeer u. *Cerasus* Kirsche). 2) **Laurocerasus** Lauché Gruppe v. *Prunus* „Kirschlorbeerbäume“, z. B. Pr. *Lauro-Cer.*, *caroliniana* Mill., *lusitanica* L.

**Laurus** Plin., T., L. (Lauraceen, IX. 1) Lorbeer, fr. laurier, e. laurel, bay-tree (v. d. celt. blaur d. i. schöngrün, Paxton u. Wtst., letzt. auch viell. v. laus Lob — mit Lorbeer gekrönte Sieger!), Zier. *L. nobilis* L. edler L., *L. Sassafras* L. u. *L. Benzoin* L., *Lindera Benzoin* Meisn. „Benzoe-Lorbeer“ (N.-Amer.).

**Lavandula** L. (Labiaten, XIV. 1) „Lavendel“, fr. lavande, e. lavender od. spike (nard) römischer Lavendel, *L. Spica* L. f. (v. lavo bade, wasche — beim Baden d. Römer!).

**Lavatera** T. (Malvaceen, XVI. 8) „Lavater“, Pappelrose Rmpl., Erne O. W., fr. lavatère (n. d. beiden Schweizer Ärzten etc. in Zürich Lavater, Freunden Tournefort's), Zier. *L. arboræa* L. Malvenbaum, fr. mauve de mer (-en arbre), e. mallow-tree, tree-like *Lavatera*, *L. trimestris* L. Dreimonats-Pappel, Sommer-P. Vilm., fr. mauve-fleur, e. three-monthly L. m. v. fl. albo.

**Lavauxia** (-zia) Spach (Onagrarieen, VIII. 1) Löwenzahnblättr. Nacht-

- kerze, *L. mutica* Spach, s. *Oenothera taraxacifolia* Sweet (n. Franç. Delavaux, Gründ. d. bot. Gartens z. Nîmes).
- Lavoisiera** DC. (Melastomac. Merianeen od. Lythrarieen, X. 1) „Lavoisiere“ (n. d. ber. Chemiker etc. Lavoisier, guillot. 1794), *L. alba* DC. etc. — Lavoisieræ DC. (zu Melastomacæe Rchb.).
- Lavradia** Vand., Velloz. (*Lauradia* Spr.) (Violarieen Droseraceen, V. 1) „Lavradiostrauch“ (n. d. Marquis v. Lavradio, Vicekön. v. Brasilien), *L. alpestris* Mart. s. *ericoides* St. Hil. (Str. Bras.), elegantissima St. Hil. (Sauvagesia el. St. Hil.), etc.
- Lawsonia** L. (Lythrarieen, VIII. 1) Alkanastrauch (n. John Lawson, schr. Beschr. Vorst. Carolina, Lond. 1709), *L. Acronychia* L. (*Acronychia laevis* Forst.).
- Lazarölus** Borkh., Med. (Pollveria Med.) (Pomaceen, XII. 4) Pollviler od. Bollweiler-Birne, fr. poirier cotonneux, e. Bollwyler pear-tree, s. *Pirus* Pollveria L. s. *Bollwilleriana* DC. (tomentosa Mch., auricularis Knoop) (v. *λασιώσ*; rauh u. Azarölus, s. d.).
- Lebeckia** Thb. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Lebeck“-Mimose, fr. ébénier de l'Orient, s. *Mimosa* Lebeck L. (n. d. arab. loebach), *L. contaminata* Thb. (*Spartium* cont. L. f.), *cytisoides* Thb. (*Ebënus capensis* L. f.), etc.
- Lebretonia** Schrank (Malvaceen, XVI. 8) „Lebreton's“-Malve (*Levretonia* Schrk.) (n. F. Manuel Lebreton, schr. de botanica à l'usage d'amateurs, Par. 1787), z. B. *L. coccinea* Schrk. (*Pavonia* Schrankii Spr.).
- Lecanora** Ach. (Flechten, XXIV. 3) Kuchenflechte, „Schüsself.“ (v. *λεκανή* Schüssel etc. u. *ὄρω* sehe aus — d. Scheibe anfangs concav!), z. B. *L. varia*, *ventosa*, *tartaræa* etc.
- Lechenaultia** R. Br. (Goodenovieen, V. 1) „Lechenault's“-Goodenovie (n. d. franz. Reis. Lechenault de la Tour), z. B. Warnh. *L. formosa* R. Br., *grandiflora* DC. (*biloba* Lindl.), *multiflora* Lodd. etc.
- Lecythidæe** Rich. (zu Melaleucacæe Rchb.) Topfbaumgew. Leun., s. sogl. **Lecythis** Loeffl. (Melaleucac. Lecythideen, XIII. 1) „Topfbaum“, Topfruchtbaum (v. *λεκυθος* od. *λεκος*, -εος Topf — d. Frucht gleicht einem bedeckelten Topf!), *L. Ollaria* L., fr. marmite de singe (Jacapucaya Maregr.), *L. bracteata* W. (Coutoupita guian. Aubl.).
- 1) **Ledebouria** Roth (Sarmentac. od. Smilaceen, VI. 1) „Ledebour's“-Hyazinthe (n. d. Prof. Ledebour in Dorpat, s. d. Aut.), *L. hyacinthina* Roth (*Erythronium indicum* Rottl.). 2) **Ledeb.** Lk. (Umbelliferen, V. 2), Ledebour's od. taurische Bocksdolde, *L. pimpinelloides* Lk. (*Tragium tauricum* Ledeb.).
- 1) **Lëdon** Clus. (Ericaceen, X. 1) i. q. *Lëdum* L. Porst (gr. *λεῖδος* lat. *Lëdum*, Porststrauch), z. B. *L. latifolium* Clus. = *Kalmia latifolia* L. 2) **Lëdon** (sc. *Cistus*) Lam. (Cistaceen, XIII. 1), s. *Ledonia* Dun. mittelländ. Cistrose, *Ladanum-Gummistrauch*, s. *Cistus ladaniferus* *Monspeliensum* Duham.
- Lëdum** L. (Ericaceen, X. 1) Porst od. Porsch, Knie-Porst, wilder Rosmarin, fr. lëdon u. romarin de Bohême od. sauvage, e. sweet-willow (-gale), s. g. niederländ. Myrte (gr. *λεῖδος*; *Ladanum*-Strauch), Zier. *L. palustre* L., fr. lëdon des marais, s. g. Bienenheide Vilm., Mottenkraut Rmpl., Wanzenkr. Leun., Brauerkr. Vilm., fr. auch herbe aux punaises.
- Leea** L. (Ampelideen od. Hesperideen Leaceen, V. 1) Wasserrebe (n. Jam. Lee, Gründ. d. Hammersmith-Züchtereie, † 1795), *L. sambucina* L., *javanica* Blum. (*Staphylæa indica* Burm. u. *Aquilicia* Cav.), *L. spinosa* Spr., s. *Aralia chinens.* L. — Leaceæ (sc. Hesperidæe) Rchb.

- Leersia** Sm., Soland. (Gräser, III. 2) „Leersie“ od. Reisgras (-quecke), *L. oryzoides* Sm. deutsch. Reis Rmpl. (n. d. Univ.-Apoth. Joh. Dav. Leers zu Herborn, † 1774), s. *Oryza clandestina* A. Br.
- Legnötis** Sw., W. (Rhizocarpeen od. Elaeocarpeen, XIII. 1) „Bortenohr“, Saublume Dietr. (*λέγνυς* od. -*ror* Borte, *ὄζ. ὄτος* Ohr — gefranst. Kronsaum), z. B. *elliptica* Sw. u. *L. Cassipourea* Sw. (Cassipourea guian. Aubl.).
- Leguminosae** Juss., DC., Endl., Rchb. Kl. od. Ord. d. Hülsenpfl. (v. legümen, -inis Hülsenfrucht).
- Leycesteria** (Leyc.-) Wall. (Rubiaceen, V. 1) „Leycesterstrauch“ (v. W. Leycester, Ober-Richter in Bengalen, eifr. Beförd. d. Gartenbaus), *L. formosa* Wall.
- Leimanthium** Mchx., W. (Melanthac. od. Juncaceen, XXIII. 1) „Weisenblume“ (*λείμων* Wiese, *ἄρθρον* dem. v. *ἄρθρον* Blume), z. B. *laetum*, *pellucidum* W. etc., s. *Melanthium* u. *Veratrum*.
- 1) **Leiocarpum** DC. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Glattfrucht“-Rebhuhnblättch (*λείος* glatt, *ζαγοτός* Frucht — Achenien glatt), s. *Perdicium* L. 2) **Leiocarpus** Blum. (Euphorbiaceen, XI. 9). 3) **Leiocarpus** DC. (Myrobalanceen, X. 5) (zu *Anogeissus* Wall.).
- Leiochilus** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Glattlippe“ (s. eb. u. *ζεῖλος* Lippe).
- 1) **Leiophyllum** Pers. (Ericaceen, X. 1) „Glattblatt“, Sandmyrte Lauch. (s. v., *γυλλόν* Laub — d. Blätt. beiderseits sehr glatt), *L. buxifolium* Ell. (Ammysine b. Pursh, *Ledum* b.). 2) **L.** Miq. (Piperaceen, II. 3) (zu *Artanthe* Miq.) „Glanzblatt“-Pfeffer — Blätt. oben glänzend glatt, unten weichhaar.).
- Lembotropsis** Griseb. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Nachenkiel“, Schiffchenblume od. Ähren-Geisklee Rmpl. (*λέμβος* Nachen, *τοόπις* Schiffskiel — d. Carina nachenförm.), Zier. *L. nigricans* Gris., s. *Cytisus nigr.* L.
- Lemna** L. (Najadeen od. Lemnaceen, II. 1) Wasser- od. Meerlinse, Entenfloß, -grün Leun., fr. lentille d'eau (- de marais), canillée od. lenticule, e. duck-meat (-weed), fen-lentil (gr. *λέμνα* od. *λέμμα* Schale, Schuppe, od. Wst. v. *λέμνη* Sumpfteich!), s. *Hydrophace* Hall. — *Lemnaceae* (zu *Najadeae*) DC.
- 1) **Lemonia** Lindl. (Rutaceen, V. 1) „Lemon's“Raute (n. Bar. Sir Charl. Lemon, nicht Wst. v. *λείμων* Wiese!). 2) **Lemonia** (zu *Gladidölus*) Pers. (Irideen, III. 1) „Lemon's“-Schwertel.
- Lemo ferus** Rumph. (Hesperid. Aurantieen, XVIII. 2) wilde Lemone od. Orange (Lemo od. Limo, s. g. *Pompelmuse* od. *Citrone*).
- 1) **Lennæa** Klotzsch u. Otto (Leguminos., XVII. 4) *Lenné's*-Hülsenstr. (n. d. Landsch.-Gärtn. *Lenné*). 2) **Lennæa** (sc. *Monstera*) C. Koch (Aroideen, XXI. 3) durchbrochenblättr. Baumwörder, s. *Philodendron pertusum* Kth. u. *Monstera deliciosa* Liebm.
- Lennöa** H. B. K., Llal. Lex. (Primulac. od. *Lennoaceen*, V. 1) „Lennö's“-Schmarotzerpfl. (n. d. Nam. *Lenno*), *L. coerulea* H. B. K. (Mex.) (Schmarotz. an d. Rhizom von *Perimenium parviflorum* Gray, einer Compositen), vgl. Manuel de Villada, *Apuntos relativos à la Lennoa coer.* H. B. K., *La Naturaleza* V.
- Lens** T. (zu *Eryum* Rchb.) (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Linse, fr. lentille, e. lentil (lens, -tis Linse, celt. lentil, viell. v. *lenis* mild — als Speise, Wst.), *L. esculenta* Mch. s. *sativa* Hall., s. *Eryum* *Lens* L. Saatlinse, E. *dispermum* Rxb. s. *camelorum* Spr. etc.
- Lentago** DC. (sc. *Viburnum*) L. (Lonicereen, V. 3) canadischer Schlingbaum (v. *lento* biege etc.), fr. *viorne* du Canada od. *luisant*, e. *tree* od. *Canada-Viburnum*.

- Lentibularia** Gesn. (Lentibularieen, II. 1) Wasserhelm (v. lens, -tis Linse u. tubulus Röhrchen — Wurzelschläuche!), *L. major* Riv., s. *Utricularia vulgaris* L. — *Lentibulariæ* DC., -riacæe Rich., Græk. Schlauchkräuter od. Wasserhelmgew.
- Lenticula** Scop. (Najadeen od. Lemnaceen, II. 1) Linschen (dem. v. lens, -tis Linse), z. B. *trifulca* u. *minor* Scop., s. *Lemna tris.* u. *min.* L.
- Lentiscus** T. (sc. *Pistacia*) L. (Terebinthaceen, XXII. 5) Mastixbaum, fr. pistachier lentisque, e. lentisk (v. *lentescere* bin klebrig — *Mastix-Gummi*!).
- 1) **Leonōtis** R. Br. (richtig. **Leontōtis**!) (Labiaten, XIV. 1) „Löwenohr“ (v. *λέων*, -οῦτος Löwe, οὖς, ὄτος Ohr), z. B. *Leonurus* R. Br. (*Phlomis Leonōtis* Pers.) goldfarb. Löwenohr od. Löwenschweif (ὀβόα Schwanz — Ährenstand d. Blüt.!). 2) **Leonōtis** Spr. (Contorten od. Myrsineen, V. 1), L. *glycariya* Spr., s. *Theophrasta* gl. Spr.
- Leontice** L., Mchx. (Papaveraceen od. Aristolochieen *Taccaceen*, VI. 1) Löwenblatt, *L. Leontopetalum* L. (gr. *λεοντιζή*) eine Pfl. — Blumenblatt von d. Form einer Löwenfussspur!, *L. altaica* Pall., *Chrysogonum* L. gefiedertes, *Alberti* Reg. (Turkestan) etc.
- Leontodon** L. (Compos. *Cichoriac.*, XIX. 1) „Löwenzahn“, Dohr O. W., fr. liondent, dent-de-lion u. tête de moine, e. dandelion od. lion's-tooth (*λέων*, -οῦτος Löwe, ὀδών od. ὀδύς, -οῦτος Zahn — scharfzahnige Blätter!), *L. Taraxacum* L. Röhrchenkraut, Kettenblume etc., fr. pissenlit, s. *Taraxacum officinale* Web., *L. autumnalis* L. (*Apargia* aut. W.), *hastilis* L. (*Aparg. hispida* W.) etc.
- Leontopetalon** (-um) Moris. (sc. *Leontice*) L., s. *Leontice*!
- Leontopodium** Pers., R. Br. (sc. *Gnaphalium*) L. (Compos. *Gnaphalieen*, XIX. 2) „Löwenfuss“, s. g. Edelweiss, fr. pas-de-lion, e. lion's-paw (-leaf) u. padelion (s. v. u. *πῶδιον* Socke v. *πούς*, -ῦδος (Fuss)).
- 1) **Leonurus** L. (richt. **Leonturus**!) (Labiaten, XIV. 1) „Löwenschweif“ (s. v., οβόα Schwanz — ähriger Blütenstand!), *L. Cardiaca* L. Herzgespann, fr. mélisse sauvage, e. lion's-tail, archangel u. cardiac. 2) **Leonurus** (sc. *Phlomis*) L. afrik. Löwenschweif od. Löwenohr (*Leonōtis Leonurus* R. Br.), s. *Sideritis africana* Barth.
- Leopoldia** Herb. (*Amaryllideen*, VI. 1) „Leopold's“-Narzisse (n. *Leopold I.*, Kön. v. Belgien).
- Leopoldina** (bess. **-dinia**) Mart. (Palmen) „Leopoldinen“-P. (n. d. verstorb. Kaiserin *Leopoldine* v. Brasilien, geb. Erzherz. v. Österreich), *L. pulchra* Mart.
- Leotia** Hill. (Pilze, XXIV. 4) Kappenpilz Kumm. (v. *λειώτης*: Glätte? dann bess. *Liotia*! — glattes *Hymenium*! Wtst.), z. B. *circinans* u. *lubrica*.
- Lepechinia** W. (Labiaten, XIV. 1) „Lepechinie“ (n. d. russ. Bot. J. *Lepechin*, schr. Tagebuch d. Reisen durch versch. Provinzen d. russ. Reichs in 1768/69), *L. spicata* W. (*Uricia* *pyramidata* Hortul.), s. *Horminum clinopodifolium* Pers., etc.
- Lepidium** L., R. Br. (Crucifer. *Siliculos.*, XV. 1) „Schuppenkresse“, *Karse* O. W., Pfefferkraut Græk., fr. lepidier, passage (chasse-rage) (*λεπίδιον* dem. v. *λεπίς*: Schuppe — Schötchen wie Sch.!), *L. sativum* L. Gartenkresse, fr. anitor, e. garden-cresses, *L. vesicarium* L., fr. pied de corneille, etc. — *Lepidiæe* Rchb.
- Lepidocarpon** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Schuppenfrucht“, -kopf, schöner Silberbaum M.-Rchb., s. *Protea speciosa* Thb. s. *cristata* Lam. (*λεπίς*, -ῖδος Schuppe, *καρπός* Frucht).
- Lepidocarÿon** (-um) Mart. (Palmen, XXI. 7) „Schuppennuss“-P. (s. eb. u. *ζιόνον* Nuss — Blütenkollb. zwischen Schuppen!), z. B. *enneaphyllum* Barb. Rod., *gracile* u. *tenue* Mart. (Südam.).

- Lepidodendron** Brongn. (foss. Lycopodiaceen-Farne, XXIV. 1) „Schuppenbaum“ (s. v. u. *δεριδοορ* Baum — Schaft wie beschuppt!).
- Lepidosëris** Rehb. (zu *Barkhausia* Rehb.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Schuppensalat“ (s. v. u. *σέλις* Salat — Kelchschuppen!), z. B. *Bivoniana* Rehb. (*Crepis purpurea* Biv.), *hiemalis* Biv., etc., s. *Barkh.* u. *Crepis*.
- Lepigōnum** Wahlbg., Fr. (Alsiniaceen, X. 3) „Schuppensamen“ od. Salzmiere Leun., Meersandkr. (v. *λέτος* Schuppe u. *γόνος* Kind, Samen — Sam. zusammengedrückt, wie eine Sch.), *L. marimum* Wahlbg., s. *Arenaria media* L. s. *marina* Sm.
- Lepiōta** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Schuppenhut“-P. (v. *λέτος* Schülfe, Schale, st. *Lepiōta* v. *λεπιδοτός* schuppig — schuppiger Hut!), *L. procera* DC. (*Agaricus proc.* L.) s. g. Parasolpilz od. Bubutzen, auch s. g. Schulmeister.
- Lepiphōrum** G. Don (zu *Rhododendron* L.) (Ericaceen od. Rhodoraceen, X. 1) Schuppenblatt, z. B. *chrysanthum* Pall. (v. *λέτος* s. v., *γορός* tragend — d. Blätt. sind schülferig!).
- Lepismium** Hook. (Cactaceen, XII. 1) „Schuppen“-Cactus (v. *λεπισμύς* Schelfe — Kelchschuppen dachziegelförmig!), s. *Cereus squamulosus* DC.
- Lepra** Ehrh., Hall. (*Lepraria* Ach.) (Flechten, XXIV. 3) „Krätz“- od. „Schorf“-Flechte, fr. *lèpre* (gr. *λέπρω* Aussatz — krätzart. Aussehen!), s. *Verrucaria* Hoffm.
- Leptadenia** R. Br., DC. (Aselepiadeen, V. 2) „Dünnrösen“-Stapelie (*λεπτός* dünn, *ἀδής*, *-έρος* Drüse — d. Narbenkörperchen sehr klein!), z. B. *pyrotechnica* R. Br. s. g. March (Innerafr.).
- Leptālix** Raf. (zu *Fraxinus* L.) (Oleac. od. Sapotac., XXIII. 2) „Dünn“-Esche (v. *λεπταλέος* i. q. *λεπτός* dünn u. *ἀλις* od. *ἡλις* Kamerad), z. B. *mandschurica* Rupr., *Novae-Angliae* Mill.
- Leptandra** Nutt. (Scrophularineen, II. 1) „Dünnanthere“, virgin. u. sibir. Ehrenpreis (*λεπτός* u. *ἀνήρ*, *-δός* Mann, Staubbeutel!), *L. virginica* Nutt. u. *sibirica* ds., s. *Veronica* L.
- Leptaurëa** (sc. *Zoega*) L. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Gold-Feinstrahl“ (s. v. u. *aureus* golden — analog *Centaurea* gebildet!), s. *Zoega aleppica* Jacq.
- Leptocarpaea** DC. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) (zu *Sisymbrium* L.) „Dünnschote“ (s. v. u. *λαπτός* Frucht — dünne, lange Schoten!), z. B. *Loeselii* DC. (Sisymb. *Loes.* L.), „Lösel's“-Rauke.
- Leptochlōa** P.-B., Röm. (Gräser, III. 2) „Dünngras“ (s. v., *χλόα* od. *-η* Gras — dünnährig!), *L. cynosuroides* u. *filiformis* Röm., s. *Poa chinensis* L.
- Leptodactylon** Hook., Arn. (Polemoniaceen, V. 1) „Dünnfinger“ (zu *Gilia* R. P.) (s. v., *δύκτυλος* od. *-or* Finger — d. Blätt. haarspaltig!), *Zier. L. californicum* Hook.
- Leptogium** Fr. (Gallertflechten, XXIV. 3) „Weichboden“-Fl. (v. *λεπτός* *-γειος* od. *-γαιος* auf weichem, zartem Boden vorkommend).
- Leptonia** Lk., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Zürling“ Kumm. (v. *λεπτός* mache dünn — häutiges Hutfleisch), z. B. *chalybea*, *Linkii* etc., s. *Agaricus* L.
- Leptoptëris** Col. (Farne, XXIV. 1) „Dünnwedel“-F. (s. v., *λεπτός* Farn), *Zier. L. superba* Col. (*Todëa* sup. Sw.).
- Leptopyrum** Rehb. (Ranunculac. *Isopyreen*, XIII. 7) *Doldocke* M.-Rehb., eig. „Dünnbirne“ (s. v. u. *pyrum* Birne — kleine Blüt. auf haarfein. Stielen, Wst. kleine, liniennabelige Samen!), *L. fumarioides* Schrk.
- Leptorrhynchus** Benth., DC. (Compos. *Astereen*, XIX. 2) „Dünnrüssel“ (s. v., *δρυγγος* Rüssel — dünne, schnabelige Achenen!), *Zier. L. aureus* Benth. (*Helichrysum elegans* Hort., *Morna* el. s. *nitida* Lindl. u. *Waitzia* aur. Steetz), *suaevölens* Bth. (*Morna nivea* Ldl., *Helichr.*

- decumbens Portenschl. u. Waitzia corymbosa Wendl. v. Benthamiana Walp.) etc., s. Viraya Gaudich.
- Leptosiphon** Benth. (Polemoniaceae, V. 1) „Dünnröhre“ (s. v., *σίφων* Röhre — enge Röhre d. Blumentrichters!), Zier. L. rosëus u. hybridus Hort., m. v. Vilmorinianus Hort., androsacëus Benth. (Gilia andr. Steud.) m. v. fl. albo Hort., L. lutëus Benth. (Gilia l. Steud.) u. aurëus Bth. (Gilia lutëa v. aurëa Hort.) m. v. rosëus.
- Leptospermum** Forst., Sm. (Myrtaceae, XII. 1) „Dünnsamens“-M., Theeod. Südsee-Myrte D., fr. leptosperme (s. v., *σπέρμα* Samen — zahlr. sehr kleine Samen), L. Thea W. (Melaleuca Thea Wendl.), L. scoparium Forst. (Melal. scop. L.) „Besen“-Myrte, s. Billotia Collad.
- Leptosyne** DC. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Feinheitsblume“ (*λεπτοσύνη* Feinheit, Zartheit — in allen Teilen zart), Zier L. Douglasii DC. u. maritima A. Gray, s. Agarista DC.
- Leptotes** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Dünnblatt“-O. (*λεπτότης* Feinheit, Dünne — linienförm. Kronblätt!), z. B. L. bicolor Ldl. m. v. serrulata Hort.
- Lepturus** R. Br. (Gräser, III. 2) „Dünnschwanzgras“ (s. v., *οὐρά* Schwanz — dünne, fadenf. Ähre!), L. repens R. Br., etc., s. Rottboellia Roth u. Monerma subulata P.-B.
- Leschenaultia** R. Br., s. Lechenaultia!
- Leskëa** Hedw. (-kia W., Brid.) (Laubmoose, XXIV. 2) „Leske's“-Moos (n. d. Prof. N. G. Leske in Marburg, † 1768), z. B. L. sericea Hedw., s. Hypnum L.
- Lepedëza** Rich., Mchx. (-zia Nutt.) (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) „Lepedez“-Esparsette (n. d. Gouv. v. Florida im vor. Jahrh. Lepedez), Zier. L. bicolor Turcz., fruticosa Mchx. etc., s. Anthyllis, Medicago u. Hedysarum L.
- Leucadendron** L. (bess. **Leucod.** R. Br.) (sc. Melaleuca s. Myrtus) (Myrtac. Melaleucac., XXII. 4) „Weiss“- od. Silberbaum (*λευκός* weiss, *δένδρον* Baum — silberglänz. Blätter!), L. argentëum Lam. (Atlasgebirg), s. Protea stellaris, L. sphaerocephalum Berg. (Protea sph. L.) etc.
- Leucanthëum** T., DC. (sc. Chrysanthemum) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Weissstrahl-Wucherblume, grosse Gänseblume, s. g. Marguerite, fr. marguerite grande u. oeil de boeuf, marguerite des champs (s. eb. u. *ἀργεμύον* i. q. *ἀργός* Blume), L. vulgare T. = Chrys. Leuc. L.
- Leucas** Burm., R. Br., Benth. (Labiaten, XIV. 1) Weissfilzkraut (*λευκός* od. -zī weissanzuseh. Pfl. — Blüt. meist weiss dickbehaart!), z. B. indica, zeylanica, martinicensis etc., s. Phlomis L.
- Leuce** Dub. (subg. v. Populus L.) (Salicaceen, XXII. 7) Silber- od. Weisspappel (*λευκή* weisse — d. Blattunterseiten weissfilz!), z. B. alba L., canescens W., tremula L. etc.
- Leucobryum** Hampe (Moose, XXIV. 2) „Weissmoos“ (*λευκός* weiss, *βρύον* lat. Bryum Moos), z. B. L. vulgare Hampe, s. Dicranum glaucum Hedw.
- Leucodonium** (st. Leuco-Codonium) Rchb. (zu Cerastium L.) (Sileneen, X. 5) „Weissglocken“-Hornkraut (s. v. u. *κόδων* Glocke), z. B. C. arvense L., tomentosum L. etc.
- Leucojum** L. (Amaryllideen, VI. 1) Knoten- od. Märzblume Leun., Milchlöckchen Seub., Sporkelblume O. W., fr. perce-neige, e. spring-snowflake (gr. *λευκόνιον* eig. Weiss-Veilchen — erscheint mit d. Veilchen!), L. vernum L., s. Nivaria verna Mch., fr. grelot blanc od. nivéole du printemps.
- Leucomëris** Don (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Weissstück“ (s. v. u. *μέρις* od. -σος Stück, Teil — d. Blätt. unten flockig, filzig!), Zier. L. decora Krz., spectabilis Don (Eupatorium sp. autt.).

- 1) **Leucophäë** autt. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) Weisszunderblatt (*λευκοφαῖς* weissschimmernd), *L. canariensis* Hort. (Chaorra-Strauch), Teppichg. candicans, macrostachya etc. 2) **Leucophäë** Webb (Labiaten, XIV. 1) Weissschimmerblatt, s. Marrubiastrum Mnh.
- Leucophyta** R. Br. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Weisspflanze“ (s. v., *γυτὸν* Gewächs), Teppichg. *L. Brownii* Less. (Hstr. Neuholl.).
- Leucopogon** R. Br. (Epacrideen, V. 1) „Weissbart“ (s. v., *πάγων* Bart Kronsaum m. weiss. Längsbart!), Treibh. *L. Drummondii* DC. (Neuholl.), *microphyllum* R. Br. (Perōa m. Pers.).
- Leucopsidium** DC. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Weissaugähnliche“ (v. *Leucopsis*, s. sogl. u. *εἶδομαι* gleiche — d. *Leucanthemum* ähnl.!), Zier. *L. arkansanum* DC.
- Leucopsis** DC. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Weissauge“, -gesicht (*λευζός* u. *ὄψις* Auge, Angesicht — Achenen wollig, Strahlenpappus länger etc.), s. *Aplopappus* DC.
- Leucopus** Lk. (Pilze, XXIV. 4) „Weissfuss“, Violethut (*λευζός, ποῖς* Fuss — sehr weiss. Strunk, Hut violet od. blau!), s. *Agaricus* L.
- Leucorchis** E. Mey. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Weissorchee“ (s. v. u. *Orchis*), *L. albida* E. Mey., s. *Gymnadenia* a. *Rich.* (*Orchis albida* Scop., *Satyrium* a. L.).
- Leucosinapis** DC. (Cruciferen Siliquos. XV. 2) (zu *Sināpis* L.) „Weissenf“ (— m. weiss. Samen!), s. *Sināpis alba* L.
- 1) **Leucospermum** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Weissamen“-Silberbaum (s. v., *σπέρμα* Samen), z. B. *L. conocarpon* R. Br. „Kegelfrucht“-W., *attenuatum*, *grandiflorum* R. Br., etc., s. *Protea* u. *Leucodendron* R. Br., *L. puber* R. Br., s. *Diastella bryiflora* Salisb. 2) **Leucospermum** Benth. (Labiaten XIV. 1) (zu *Teucrium* Benth.).
- Leucothōë** D. Don (Ericaceen, X. 1) (zu *Andromēda* L.) schöne Rosmarinheide (*Λευκοθουή* mythol. Name aus *λευζός* u. *θούός*, -ή hurtig), Zier. *L. floribunda* Don, s. *Androm. pulchra* s. *floribunda* Bot. Mag. (*Aganota pulchra*), e. many-flowered *Andromēda*.
- 1) **Leucoxydon** (sc. *Bignonia*) L. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Weissholz“ (s. v., *ξύλον* Holz). 2) **Leucoxydon** (sc. *Vitex*) L. (Verbenac., XIV. 2) „Weissholz“-Müllen (Str. Ceyl.). 3) **Leucoxydon** Blum. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Weissholz“-Glanzblatt (— weiss. Holz u. glänz. lederart. Blätt.).
- Levisanus** Petiv., Thb., Schreb. (sc. *Protēa*) L. (Proteaceen od. Myrtac. *Bruniac.*, V. 1) stabwurzblättr. *Brunie* od. *Kopfhēide*, *L. capensis* Pet. Gaz., s. *Brunia Levisanus* L. f. s. *abrotanoides* Berg. (n. d. engl. Geistl. *Levisanus*) (*Erica capitata* s. *nodiflora* Port.).
- Levista** (sc. *stia*) Pursh (richtig. *Lewisia*!) (Alismac. od. *Portulacac.*, XI. 1) Bitter- od. *Tabakswurzel* Leun. (n. *Meriweather Lewis*, engl. Statth. v. *Louisiana* 1804—06), *L. rediviva* Pursh.
- Levisticum** Koch (Umbelliferen, V. 2) *Liebstöckel*, fr. *livèche*, *sermentaire* u. *séseli des montagnes*, e. *lovage* (gr. *λεβυστικόν* libysches Kraut, Paxton: v. *levo* erleichtere, *Wtst.* d. veränd. *Ligusticum*!), *L. officinale* Koch, s. *Ligusticum Levisticum* L.
- Liātris** G. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Glatt“- od. *Prachtscharte* Rmpl., fr. *liatride* (v. *λείος* glatt, *ιατρός* ή d. *Hebamme*), Zier. *L. spicata* W. (*Serratula spic.* L.), fr. *liatride* en *épi*, e. *long-spiked* L., *L. elegans* W. (*Serratula speciosa* Ait. s. *Stachelina eleg.* Walt.), *odoratissima* W. (*Anonŷmos* Walt.).
- 1) **Libanōtis** Scop. (Umbelliferen, V. 2) *Heilwurz* (gr. *λίβανωτίς* v. *λίβανος* Weihrauch u. *ὄζω* rieche — *Weihrauchdolde*!), *L. montana* Crantz, s. *Athamanta* Lib. L. (Seseli Lib. Koch, *Turbith.* Tausch.), *L. sibirica* Koch, s. *Atham.* L. 2) **Lib.** (sc. *Cachrys*) L. (Umbellif., V. 2) *Weihrauch-Gerstendolde*.

- Libertia** Spr., Dumort. (Irideen Patersonieen, XX. 2) „Libert's“—Rüsselschwertel (n. d. belg. Mademoiselle M. A. Libert de Malmédy, lief. Abbild. v. Lebermoosen), *L. azurca* Spr., s. *Sisyrrhinchium formosum* (Nematostigma A. Dietr.).
- Libocedrus** Endl. (Coniferen, XXI. 9) Weissceder Jess. (v. *λεῖβω* tröpfle u. *Cedrus Ceder* — harzreich!), *L. Doniana* Endl., s. *Thuja chilensis* Chiliceder, *L. decurrens* Torr., s. *Thuja gigantica* Carr. s. *Heyderia decurrens* Koch.
- Libonia** C. Koch (Acanthaceen, XIV. 2) „Libon's“—Strauch (n. d. Gärtner. Libon in Lüttich, † 1861 in Brasil.), z. B. Winter-Zier. *L. floribunda* C. Koch (Bras.) u. *penrhosiensis* (Sericobonia ignea Hort.).
- Licania** Aubl. (Rosac. Amygdalac., XII. 1) Süßfleisch-Mandel (v. *λεῖκ-νυρ* syncop. aus *λεῖκνυρ* Mulde?, Wtst. d. veränd. calignia, Nam. d. B.'s in Guiana), *L. incana* Aubl., s. *Hedycera* Schreb.
- Lichenes** DC., Endl., Rehb., Kl. d. Flechten, XXIV. 3 (gr. *λεῖζην* lat. lichēn Flechte, v. *λεῖζω* lecke, streiche hin, — krieche auf d. Oberfläche etc.).
- Licuāla** Rumph. (Palmen, III. 1) Strauch-, Roll- od. Cigarren-P. (Name d. P. in d. Macassar-Sprache auf Celebes), *L. Rumphii* Blum. „Rumpf's“ Rollp., *L. spinosa* Wurm, peltata Roxb. etc.
- Liebigia** Endl. (Cyrantdrac. od. Bignoniac., XIV. 2) Liebig's od. Tromsdorf's-Krummfaden (n. d. Chemik. Just. v. Liebig), *L. speciosa* Endl., s. *Tromsdorfia speciosa* Mart.
- Ligeria** Ker (Gesneriaceen, XIV. 2) „Ligerie“ (v. Fluss Liger d. i. Loire? od. st. Ligyria v. *λυγυός* fein, hell,? — ungew.), Zier. *L. caulescens* u. *speciosa* Ker (*Gloxinia* sp. Ker).
- 1) **Ligularia** Cass., DC. (Compos. Adenostyleen, XIX. 2) Bandblume Rimpl. (v. *ligula* Blatthäutchen), Zier. *L. sibirica* Cass., fr. *Ligulaire de Sibérie*, *macrophylla* DC. m. v. *speciosa* DC. (*Cineraria macroph.* Ledeb.), *L. Kaempferi* Sieb., Zucc. (*Tussilago japonica* L. f.) m. v. *aureo-mac.* S. Z. u. *fol. argenteo-varieg.*, etc., s. *Senecio*. 2) **Ligularia** Sweet (Geraniac., XVI. 5), s. *Pelargonium Athamantoides* DC., *incisum* W., *trifidum* Jacq., etc. 3) **Ligularia** Duv., A. Br. (*Saxifragac.*, X. 2), s. *Saxifraga sarmentosa* L. s. *ligulata* Murr.
- Ligulatae** G. (sc. Compositae) „Zungenblütige“ Compositen, i. q. *Cichoriaceae* (XIX. 1) (*ligula* dem. v. *lingua* Zunge).
- Liguliflorae** L. (s. eb.) Zungenblütige Compositen (XIX. 1).
- Ligusticum** L., Koch (Umbelliferen, V. 2) Liebstöckel, fr. *livèche*, *sermentaire*, e. bladder-seed „Blasensamen“ (*Ligusticus* aus Ligurien), Zier. *L. Levisticum* L., *L. peloponnesiacum* L. (*Athamanta goloka* Haq.), s. *Molospermum cicutarium* DC., fr. *livèche du Peloponèse*, e. water-hemlock-like bl.-s.
- Ligustrina** Reg. (Oleaceen, II. 1) Amur-Liguster, Zier. *L. amurensis* Reg. (*ligustrinus* ligusterartig, s. *Ligustrum*), s. *Syringa amur.* Rupr.
- Ligustrum** L. (Oleaceen, II. 1) „Liguster“, Rainweide (nicht Rhein —!), fr. *frésillon* od. *trône*, e. *privet* od. *prim* (print) (v. *ligo* binde — Zweige z. Flechten!), *L. vulgare* L., fr. *trône*, s. g. Beinholz, Zaunriegel u. Dintenbeerstrauch, m. v. v. (z. B. *sempervirens* Pieri, ital. *lig.*, v. albo- u. aureo-varieg. Hort.
- Lilac** T., Juss. (Oleaceen od. Jasmineen, II. 1) „Lilak“ od. Nägelein, s. *Syringa* L. (in Persien lilac — lilafarb. Blütensträusse!). — *Lilacae* Vent. — *Lilacum* s. *Lilium* (fehlerh.!).
- Lilia** Juss., -aceae Bartl., DC. „Liliengew.“, s. *Lilium*!
- Lilium** (richt. **Lilacum**!) *Perpensa* Lam. etc. (Oleaceen, II. 1), s. *Lilac* T. (*Syringa suspensa* etc.).
- 1) **Liliago** (sc. *Anthericum*) L. (Liliaceen, VI. 1) „Lilien“-Zaublume



- od. Grasilie Grck. 2) **Liliago** (sect. v. Anthericum Rchb.), z. B. ramosum L. (Phalangium ram. Lam.) u. Liliago Pers. (aus Liliium geb.).
- Liliastrum** Lk. (sc. Anthericum) L. (Liliaceen, VI. 1) grosse Zaunblume M.-Rchb. (deter. v. Liliium, Wtst.: ἀστράον Bild!), s. Czackia Liliastrum Andrez.
- Lilium** T. (Liliaceen, VI. 1) „Lilie“, fr. lis, e. lily u. luce, auch ray (v. d. celt. li = weiss), Zier. (Topf) L. auratum Lindl. „Goldband“-L. Rmpl., fr. lis à bandes dorées, e. golden-rayed lily, speciosum Thb. s. lancifolium Hortul. (superbum Thb.) japan. Pracht-L., fr. lis brillant, e. japanese lily, longiflorum Thb., eximium Court., Washingtonia Kellogg, tigrinum Gawl., tigr. splendens Van Houtt., fulgens Morr. s. sanguineum Hort. m. v. atro-sang., superbum L., Gärt. a) Hang- od. Rollblumen-L.: Martagon L. Türkenbund m. v. v. (z. B. dalmaticum Moly s. Martagon Catanii Vis.), pomponium L., chalcidonicum L.; b) Steh- od. Geradblumige: L. candidum L. m. v. v., bulbiferum L. Feuerl. m. v. phoeniceum Bauh., etc. — Oder: I. Notholirion, Himalaya- od. unechte L. (ρόδοζ unehelich, λελιουορ Lilie), z. B. roseum u. Hookeri, II. Eigntl. od. echte L.: a) Eulirion Trichter-L. (ελ' schön), z. B. candidum, longiflorum, cordifolium Don s. giganteum Wall., Riesen-L. von Nepaul; b) Archelirion Erz- od. Offenlilien (ἀροζή Anfang u. Herrschaft!), z. B. auratum, speciosum, tigrinum; c) Isolirion Gerad-L. (ἴσοζ gleich, aufrecht), z. B. bulbiferum, Catesbaei Walt.; d) Martagon Türkenbund-L., z. B. pomponium, chalcidonicum etc. Essb. Knollen: L. kamschatcense L. (nigrum Sieb., Fritillaria k. Don u. Sarana k. Fisch.) schwarze od. Serenna-L. (vaterl.).
- 1) **Limacia** Lour. (Menispermaceen, XXII. 6) „Schnecken“-Mondsamen (v. limax, -ācis, gr. λειμαξ, -αζοζ Schnecke — schneckenf. zurückgebog. Griffel). 2) **Limacia** Dietr. (Bixaceen, XIII. 1) Schneckenfrucht-Orleanbaum (— d. Frucht schneckenf.!).
- Limacium** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Schneckenpilz“ (s. eb. — Manschette klebrig, wie eine Schnecke), z. B. eburneum u. discoidum (essb.).
- Limetta** Risso (st. Limonetta) (sc. Citrus) L. (Hesperideen Aurantieen, XVIII. 2) „Limette“, Bergamotte od. Perette, süsse Citrone Leum., fr. limette (-ttier) (dem. v. Limon, arab. limoun Citrone).
- Limnanthemum** Gmel. (Gentianeen, V. 1) „Teichblume“ Seub., -Enzian, Seekanne, Tauche O. W. (v. λίμνη Teich, Sumpf, ἄρθευορ i. q. ἄρθοζ Blume), L. nymphaeoides Lk. s. peltatum Gmel., s. Villarsia nymph. Vent. (Schweykertia n. W., Menyanthes Nymphoides L., Pers.).
- Limnanthes** R. Br. (Geraniaceen, X. 1) „Sumpfbblume“ Vilm. (λίμνη ἄρθη od. -θοζ Bl.), Zier. L. Douglasii R. Br. m. v. grandiflora Hort. (Californ.), alba Hartweg, etc.
- Limnochäris** Hb., Bpl. (Hydrocharideen, XIII. 1) „Teichfreude“, -blume (s. v. u. χάριζ Reiz, Freude — Standort!), Zier. L. Humboldtii Rich., s. Hydroclēis Hb., Endl.
- Limnochlöa** (-öe) P.-B. (Cyperaceen, III. 1) „Pfuhlsmise“ (s. v. u. χλόε od. -ύη Gras etc. — Sumpfstandort), z. B. acicularis, caespitosa L. etc., s. Scirpus L.
- Limnopence** Vaill. (Halorageen, I. 1) „Sumpffichte“, Tannenwedel (s. v. u. λέβζη lat. picea Pechtanne — tannenart. Aussehen d. Pfl.!), s. Hippūris L.
- Limodorum** T., Thb. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) Dingel, fr. limodore (gr. λιμοδόροον od. λειμοδ.- Unkraut unt. d. Kümmel! F. W. Riemer, v. λειμών Wiese u. δῶροον Gabe, Wtst. λιμοδ. st. Αιμοδόροον Theophr. = Orobanche cruenta!), z. B. triste Thb., abortivum Sw. etc., s. Orchis etc.
- Limonia** G., L. (Aurantieen od. Bixaceen, X. 1) „Limonelle“ Dietr.,

*L. acidissima* L., *lučida* Forst. etc. (v. Limon, arab. limoun Citrone — citronenart. Frucht!).

- 1) **Limonium (Limónium)** (sc. Citrus) Risso (Hesperid. Aurantieen, XVIII. 2) „Limonienbaum“, *Limone* od. *Sauer-Citrone* Leun., fr. *limon* (-monier), e. *lemon* (-tree) (s. eb.), s. *Citrus medica* Hayne. 2) **Limonium** (sc. Statice) L. (*Plumbagineen*, V. 5) *Juften-Gerbkraut*, *Widerstoss*, fr. *limoine* (gr. *λειμόνιον* Wiesenpfl.), *Zier. L. speciosum* Pers. (*Statice speciosa* L.) gem. *Strandnelke*, fr. *Immortelle bleue*, e. *wild-marsh-Beet*, m. v. v. 3) **Limonium** G. Frank i. q. *Pyröla* L. (*Ericaceen*, X. 1) *Wintergrün*, fr. *limonellier*?

**Limopeuce** Vaill. s. *Limnopeuce*! (v. *limus* Schlamm u. *πέζκη* Fichte — Schlammfichte, s. g. Tannenwedel).

**Linacëa** Græk., -*nëa* DC., *Rehb.* „*Flachs-* od. *Leingew.*“, s. *Linum* L.!

**Linaria** T. (*Scrophularineen*, XIV. 2) „*Leinkraut*“, *Frauenflachs* od. *Flachskraut*, *Drunt* O. W., fr. *linaire* od. *lin sauvage*, auch *pélore*, *velvete*, *élatine* u. *véronique femelle*, e. *toad-flax* od. *snap-dragon* (v. *Linum* Lein od. *Flachs* — ähnl. *Habitus*!), *wild L. vulgaris* Mill., s. *Antirrhinum Linaria* L., *Zier. L. bipartita* W. m. v. fl. *albo, elegans* u. *triphylla, triornithophora* W. „*Dreivogel*“-*Fr.*, fr. *lin. à grandes fleurs*, e. *three-bird's-toad-flax* m. v. *carnea* Hort., *alpina* DC. *blaue Johannisblume*, *Unsrer Frauen Haar*, *L. Cymbalaria* Mill. (*wild an Mauern* u. *Ampelpfl.*) m. v. *fol. roseo-varieg.*

- 1) **Lindëra** Thunb. (*Lauraceen*, VI. 1) „*Lindere*“ (n. d. schwed. Bot. *Linder, nobilis Lindestolpe*, *Joh.*, schr. *Fl. Wiksbergensis, Stockh. 1716*), z. B. *umbellata* Thb., *Benzoin Meisn.*, *falscher Benzoebaum*. 2) **Lindëra odorata** Aschers. (*Umbelliferen*, V. 2) *wohlriech. Süssdolde* = *Myrrhis odorata* Scop.

**Lindernia** All. (*Scrophularineen*, XIV. 2) „*Lindernie*“, *Gelbmäulchen* (n. d. Bot. *Balth. v. Lindern* in *Strassb.*, † 1755), *L. pyxidaria* L. (*Gratiöla inundata* Kit.), *japonica* Thb. (*Ambulia* Lam.).

**Lindheimëra** Gray, *Engelm.* (*Compos. Senecionideen*, XIX. 2) „*Lindheimer'sblume*“ (n. d. Bot. u. *Reis. Dr. Ferd. Lindheimer*), *Zier. L. texana* Gray.

- 1) **Lindleya** Hb., *Kth.* (*Rosac. Amygdaleen*, XI. 5) „*Lindley'smandel*“ (n. d. Prof. d. Bot. *John Lindley* in *Lond.*), z. B. *L. mespiloides* Kth. 2) **Lindleya** Nees (*Theaceen* od. *Ternstroemiaceen*, XVI. 8) „*Lindley's-thee*“, z. B. *L. fruticosa* Nees, s. *Gordonia semiserrata* Spr. (*Wikstroemia* Schrad.).

**Lindsaea** (-*sea*, -*saya*) *Dryand.* (*Farne*, XXIV. 1) „*Lindsay's*“-*F.* (n. d. engl. *Kryptog. Lindsay*), z. B. *elongata* Cav., *falcata* *Dryand.* (*Adiantum* f.).

- 1) **Lingua** (sc. *Ranunculus*) L. (*Ranunculac.*, XIII. 7) *grosser Hahnenfuss*, eig. „*Zunge*“ (lat. *lingua* Zunge). 2) **L.** (sc. *Othonna*) L. (*Compos.*, XIX. 4) „*Zungen*“-*Schleierblume*. 3) **L.** (sc. *Serapias*) L. (*Orchideen*, XX. 1) „*Zungenorche*“ (*Orchis Lingua* Scop.). 4) **L.** (sc. *Acrostichum*) L. (*Farne*, XXIV. 1) „*Zungen*“-*F.*

- 1) **Linkia** Cav. (*Proteaceen*, IV. 1) „*Link's*“ *Silberbaum* (n. d. Bot. *H. F. Link*). 2) **Linkia** Pers. (*Solaneen*, V. 1). 3) **Linkia** *Lyngb.* (*Nostochineen*, XXIV. 3).

**Linnaea** Gron. (*Lonicereen*, XIV. 2) „*Linnäe*“, *Rande* O. W., *nord. Moosglocke* od. *Moorkriecher* (n. d. schwed. *Nat. K. v. Linné*, lat. *Linnaeus*), *wild* u. *Zier. L. borealis* Gron., fr. *Linnée boréale*, e. *northern Linnaea*.

**Linophyllum** (sc. *Thesium*) L. (*Santalaceen*, V. 1) „*Leinblatt*“, *Verneinkraut* *Græk.* (*λίνον* Lein, *φύλλον* Blatt).

**Linosýris** DC. (*Compos. Baccharideen*, XIX. 2) *Goldschopf* (v. *Linum*

- u. *Osyris* — mit beiden Ähnlichk.), *Zier. L. vulgaris* Cass. (*Chryso-cōma Linosyris* L.), fr. *L. vulgaire* u. *dorelle*, e. *common-Linos*.
- Linum** L. (*Linaceen* od. *Caryophylleen*, V. 5) *Lein*, *Flachs*, fr. *lin* (filasse de lin „Flachs“, les filasses), e. *aise*, *line*, *flax* (-weed) (gr. *λίνον* v. d. celt. *lin* Faden), geb. *L. usitatissimum* L., *Zier. L. grandiflorum* Desf. (*grandifl. rubrum* Hort.), fr. *lin à grandes fleurs*, e. *large-flowered* od. *crimson flax*, *campanulatum* s. *flavum* L., fr. *lin à fleurs campanulées*, e. *bell-shaped-flax*, *perenne* L. (*montanum* Hort.), *sibiricum* Ait., *wild L. catharticum* L. „*Purgier*“-L., fr. *lin sauvage purgatif*.
- Liparia** L. (*Leguminos. Galegeen* od. *Genisteen*, XVII. 4) „*Fettstrauch*“ (v. *λίπαρος* fettig glänzend — näml. Stengel u. Blätt.!), z. B. *sphaerica* L. (*Genista afr. ruscifol.* Raj.), *umbellata* L. (*Borbonia* u. *autt.*) etc.
- Liparis** Rich. (*Orchid. Malaxideen*, XX. 1) „*Fettblatt*“-O., *Ständling* O. W., *Glanzwurz* ds., *Glanz-O.* (s. eb.), z. B. *L. Loeseli* Rich. (*Malaxis* Loes. Sw., *Ophrys* Loes. L., *Sturmia* Loes. Rehb.).
- Lippia** L. (*Verbenaceen*, II. 1 od. XIV. 2) „*Lippie*“, fr. *Lippie* (n. d. franz. Arzt u. Reis. in Abyssinien Dr. Aug. Lippi, † 1713, viell. auch Fr. Jos. Lipp, schr. *Enchiridium bot.*, Wien 1765), *Ampel L. montevidensis* u. *L. canescens* Kth. (*filiformis* Schrad. s. *repens* Hort.), fr. *L. blanchatre*, e. *whitish Lippia*, *Topf. L. citriodora* Hort. (*Aloysia* citr. Pers. u. *Verbena triphyllos* l'Hér.) „*Citronenstrauch*“.
- Liquidambar** L. (*Amentaceen Balsamaceen*, XXI. 9) *Storax-* od. „*Amberbaum*“ (v. *liquidus* flüssig u. *ambra* Amber- od. *Balsamharz*), *Zier. L. styraciflua* L. m. v. „*Storaxbaum*“, fr. *L. copal* od. *Copalme* de l'Amérique, e. *sweet-Gum-Liquidambar*, *L. imberbis* W. (*Liq. orientalis* Mill., *Platanus* or. Pock.).
- Liquiritia** Mnch., Pers. (*Legumin. Galegeen*, XVII. 4) „*Lakritzenholz*“, gem. *Süssholz*, fr. *régliste*, e. *licorice* (-r<sub>is</sub>) (v. *liquidum* u. *radix*, -icis Saft und Wurzel), *L. officinalis* Mnch., s. *Glycyrrhiza glabra* L. (*Apoth. liquiritiae radix* Süssholzwurzel, liefert „*Lakritzensaft*“, *Wtst. d. veränd. Glycyrrhiza*!).
- Liriodendron** Juss., L. (*Magnolien*, XIII. 6) *Tulpenbaum*, „*Lilienb.*“, fr. *tulipier*, e. *tulip-tree* u. *canoe-wood* (v. *λείριον* Lilie, *δένδρον* B., nicht etwa *λίρα* Leier, weg. d. Form d. Blätt.), *Zier. L. Tulipifera* L. (*Tulipifera Liriodendron* Mill.) m. v. v., *Tulpen-* oder *Leierblatt-B.*, *L. liliifera* L. (*Sampacca montana* Rumph.).
- Lisianthus** L. (*Gentianeen*, V. 1) „*Glattblume*“, *Bauchbl. D.* (v. *λίς* od. *λίσος* glatt, *άνθος* — glatte Beschaff. d. Blume u. ganzen Pfl.), *Gewächsh. Russelianus* Hook., *calygonus* u. *acutangulus* Rz. Pv., *coeruleus* Aubl., etc.
- 1) **Lissanthe** R. Br. (*Epacrideen* u. *Styphelien*, V. 1) „*Glattblüte*“ (s. eb. u. *άνθη* Blüte), z. B. *sapida* R. Br. (*Str. Neuholl.*), *strigosa* ds. (*Styphelia* str. Sm.) etc., s. *Ardisia* G. 2) **Lissanthe** Knight, *Salisb.* (*Proteaceen*, IV. 1) *Glattgriffel*, s. *Lissostylis* R. Br.
- Lissochilus** (-os) R. Br. (*Orchid. Vandeen*, XX. 1) „*Glattlippe*“ (s. v., *χειλος* Lippe — diese unbehaart!), *L. speciosus* R. Br. (*Cymbidium giganteum* Thb., Cap).
- Lissostylis** R. Br. (*Proteac.*, IV. 1) (zu *Grevillea* R. Br.) *Glattgriffel*, s. *Lissanthe Knight* (s. v. *στυλίς* Griffel).
- 1) **Listera** R. Br. (*Orchid. Neottieen*, XX. 1) „*Listere*“ od. *Zweiblatt* Grck., fr. *double-feuille* (n. d. Leibarzt d. Königin Anna v. Engl., Mart. Lister, † 1711), z. B. *L. ovata* u. *cordata* R. Br. 2) **Listeria** Raf., *Neck.* (*Rubiaceen*, IV. 1).
- Lita** Schreb. (*Gentianeen*, V. 1) „*Schlicht*“-*Enzian*, *Dünnling* D. (*λιτός* schlicht, dünn etc.), z. B. *L. aphylla* D. (*Gentiana aph.* Jacq.), *coerulea* W. u. *rosea* W., s. *Vohiria* Aubl.

- Litchi (Litschi)** Sonner. (Amyrideen od. Sapindac., VIII. 1) chines. Zwillingspflaume (chines. Name d. Pfl.), *L. s. Litscha chinensis* Lam., *s. Dimocarpus Litchi* W. (*Nephelium L.*, *Sapindus edulis* Lour.).
- Lithophila** Sw., Schreb. (Paronychieen, II. 1) Stein-Nagelkraut, „Stein“- od. „Felslieb“ (*λίθος* Stein, *γίλος*; Liebhaber — Standort stein. Orte!), *L. muscoïdes* Sw.
- Lithospermum** T., L. (Boragineen, V. 1) „Steinsamen“, Schminke O. W., fr. grémil, herbe aux perles, e. gremil (gray-mill), stone-drop (s. eb. u. *στέλινα* Samen — hart wie Stein!), Zier. *L. purpureo-coeruleum L.*; fr. grémil violet, e. purple-blue Gromwell od. gremil, Garten: *L. pulchrum* Lehm. (Pulmonaria virginica L.), fruticosum *L. u. petraeum A. D. C.*, canescens Lehm. *s. conspicuum* Spr., e. whitish Gromwell, *L. officinale L.*, fr. millet d'amour „Liebeshirse“ (-gris, perlé, perlé du soleil).
- Litsaea (sëa)** Lam., Nees (Amyrideen od. Sapindaceen, VIII. 1) „Litsäe“, Strahl-Lorbeer, Zwillingspflaume (aus d. chines. od. japan. Namen litchi gebildet, vgl. Litchi Sonner.), z. B. *angustifolia* Krz., *s. Actinodaphne* Nees, *L. chinensis* Lam. (Litschi chin. Sonner.), *s. Tetranthëra laurifolia* Jacq. u. *Dimocarpus Litchi* W.
- Littaea** Tagliab. (*Lyttaea* Brign.) (Bromeliaceen, VI. 1) „Lyttae“ (zu Ehr. d. Herzogs v. Lytta bei Mailand, Gönn. d. Bot., Wtst. n. d. Duca Antonio Littä in Lainate, in dess. Gart. d. Pfl. 1815 zuerst in Europa blühte), Zier. *L. geminiflora* Brign. (*Yucca Boscii* Hort.), *albicans* (Agave a.), *modesta* W. Hook. (windend) etc. *s. Uvularia L.*
- Littorella** L. (*Litor.*- autt.) (Plantagineen, XXI. 4) Strandling, „Üferkraut“, fr. littorelle (v. litus od. littus, -öris Strand etc. — besond. an salz. Wassern, Wtst.), *L. lacustris L.*, *s. Plantago uniflora L. f.*
- Livistona (-la)** R. Br. (Palmen, VI. 1) „Livistone's“-P., Schirmpalme Rmpl. (n. Murray Baron v. Livistone bei Edinburg, Freund Balfour's), *L. chinensis* Mart. Latanenapfel-P., *s. Latania* Comm., *Stuben L. humilis* R. Br., *rotundifolia* etc.
- Livonia**, *s. Libonia*!
- 1) **Lloydia** Salisb. (zu *Ornithogalum* Rchb.) (Liliaceen, VI. 1) „Lloyd's“-Vogelmilch (n. George N. Lloyd, schr. bot. terminology, Edinb. 1826), *L. alpina* Sal. (*Ornithog. serotinum* Rchb., *Anthericum ser. L.*).
- 2) **Lloydia** Neck. (Compositen).
- Loasa** Adans., Schreb. (*Loosa L.*, Pers.) (Sedifloreen Loasaceen, XIII. 1 od. XVIII. 2) Brennwinde (aus d. südamer. Namen geb.), Zier. *L. aurantia s. lateritia* Hook. (*Cajophora later.* Presl), m. v. *Herberti* Hort., *L. acanthifolia* Lam. (*Ortiga chilensis* Feuill.). — *Loasacëae* DC.
- Lobadium** Raf. (subg. v. *Rhus L.*) (Terebinthac. Sumachineen, V. 3 od. XXII. 5) Gewürz-Essigbaum, *L. aromaticum* (*Rhus aromatica* Ait.) (v. *λοβός*; Lappen u. *ἄδος*; Fülle — Scheibe mit 5 Lappen, darunter d. Blütenblätt. eingefügt stehen), *s. Toxicodendron cuneatum* Mill.
- Lobelia** L. (*Campanulac.* od. *Lobeliaceen*, V. 1 od. XIX. 6) „Lobelië“, Spaltglöckchen, Spleisse O. W., fr. lobélie (n. Lobel od. Matth. de l'Obel, lat. *Lobelius*, Bot. am Hof Jakob's I. v. Grossbrit., † 1616), Zier. *L. Erinus L. m. v. v.* (z. B. *hybrida grandiflora superba* Hort., v. *speciosa* Hort., v. *gracilis erecta* Hort., v. *marmorata* Hort., Topf-Zwergbl. v. Miss. Murphy, Topf: *L. erinoides u. ramosa* Benth., Gartenbl. *L. fulgens* W. (*Rapuntium f. Presl*), m. v. *multiflora* Hort., *L. cardinalis* Hort. (*Rapuntium card.* Presl), fr. cardinale „Scharlach“-L., etc. — *Lobeliacëae* Juss., DC., *Lobeliëae* zu *Campanulacëae* Rchb.
- Lobularia** Desv. (zu *Alyssum* Rchb.) (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Lappen“- od. Meerstrands-Steinkraut (dem. v. lobus Lappen — zweitheil.

- Pubescenz), *L. maritima* Desv., s. *Alyssum marit.* Lam. (Clypeöla m. L., Koniga m. R. Br.).
- Locheria** Neck. (Compositen) „Lochersblume“ (n. den Schweizer Hans Locher-Balber, schr. Nekrolog auf P. Usteri M. D. Bürgerm. v. Zürich, 1832), Zier. *L. magnifica*.
- 1) **Lochnera** Rchb. (Apocynen, V. 1) „Lochner's“ od. rosenrotes Immergrün, *L. rosäa* Rchb., fr. *Pervenche rose* od. de Madagascar, e. old-maid, s. *Vinca rosäa* L. (*Catharanthus ros.* G. Don) (n. M. Lochner, schr. Comment. de Ananassa etc., Norimb. 1719). 2) **Lochneria** Scop. (Tiliaceen, XIII. 1).
- Lockhartia** Hook., Rchb. f. (Orchideen, XX. 1) „Lockhart's“-O. (n. Dav. Lockhart, Vorst. d. bot. Gart. in Trinidad, Neugranada), z. B. *pachyglossa* ds., „Dickzunge“, *elegans* Hook. (*Fernandezia* e. Lodd.).
- Locusta** (sc. *Valeriana*) L. (Valerianeen, III. 1) Rapünzchen Grck., s. *Valerianella olitoria* Mnch. (*Valeriana Locusta* L. var. a. *olitoria* L., *Fedia ol.* Vahl (*locusta* Heuschrecke)).
- Lodoicea** Comm. (**Laodicea** Labill.) (Palmen, XXII. 13) Meer- od. See-cocos-P., maldivische Nuss (n. *Laodice*, Prinzessin v. Troja? od. st. *Ludovicäa*? unsicher!), *L. Sechellarum* Lab. (*Cocos maldivica* Pers.), auch s. *Lontärus* u. *Borassus* L.
- Loeflingia** L. (Loeffl.- Röm.) (Portulacac. od. Paronychieen, III. 1) „Loefling's“-Knaul (n. Pet. Löffling, Linné's Schüler), *L. indica* L. (*Pharmacæum depressum* L. f.), *renifolia* Lag. etc.
- Loeselia** L. (Polemoniaceen, V. 2) „Loeselia“ (n. Joh. Lösel, Prof. zu Königsberg, † 1652), z. B. *ciliata* L. (*Hoitzia Loeselii* Spr.).
- Logania** R. Br. (Gentianeen od. Loganieen, V. 1) „Logan's“-Bitterblatt (n. d. engl. Statth. von Pennsylv. J. Logan, † 1736), z. B. *pentacrina* Scop., Gm. (*Ruyschia Surubea* Jacq., Aubl.) — *Loganiæae* R. Br.
- Logfia** Cass. (zu *Gnaphalium* Rchb.) (Compos. Gnaphalieen, XIX. 4) Fadenkraut (*Anagramm v. Filago*), z. B. *brevifolia* Cass.
- Loiseleuria** Desv. (Rhodoraceen Azaleen, V. 1) „Loiseleur's“- od. niederlieg. Azalee, *L. procumbens* Desv. (n. *Loiseleur-Deslongs-champs*, s. d. Aut.), s. *Azalea proc.* L. (*Chamaelædon proc.* Lk.).
- Lolium** L. (Gräser, III. 2) Lolchgras, fr. *zizanie*, e. *tare* (v. d. celt. *loloa* Raygras), z. B. *L. perenne* L., fr. *raygras de l'Angleterre*, engl. *Ray-* d. i. *Rasengras*, e. *ray-* od. *rye-grass*, *L. temulentum* L. *Taunelgras*, fr. *ivroie* (*ivraie*) od. *gerzerie*, e. *damel*.
- Lomaria** W. (Farne, XXIV. 1) „Saum“- od. „Randfarn“ (*λωμα, -ατος*; Saum — Stand d. Indusien od. Samenhalter!), z. B. Zier-Baumfarn *L. gibba* W. u. *Pattersoni* Spr., etc., s. *Onoclea* Sw.
- Lomatia** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) Flügelsamen (s. eb. — Frucht m. breit. Hautsaum!), Zier. *longifolia* R. Br., *ilicifolia* etc. R. Br. (Str. Neusüdwaales), s. *Embothrium* Forst.
- Lomatogonium** A. Br. (Gentianeen, V. 2) „Fransenkante“ Koch (Hallier) s. v. u. *λωνια* od. *λωνος* Ecke, Kante — d. beiden Narben m. d. Carpidien-Nähten d. Länge nach zusammen!), *L. carinthiacum* A. Br. (*Gentiana car.* Fröl., *Swertia car.* Wulf.).
- Lomatophyllum** W. (Liliaceen, VI. 1) „Randblatt“-L., Bandlilie D. (s. v., *φύλλον* Laub — d. Blätt. am Rand knorpelig!), z. B. *L. borbonicum* W. (*Phylloma aloiflora* Haw.).
- Lomentacæae** DC., Rchb. „Gliederschotige“ Cruciferen (v. *lomentum* Gliederschote).
- Lonas** Adans., G. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) geruchlose Immortelle (*Anagramm v. Santolina*, wozu früher gehörig), Zier. *L. inodora* G. s. *umbellata* Cass., fr. *Lonas sans odeur*, e. *scentless Lonas*, s. *Athanasia annua* L.

- 1) **Lonchitis** L. (Farne, XXIV. 1) „Lanzenfarn“, Buchtenf. D. (*λογγίτις* lanzenähnlich), z. B. *pedata* L. (*Pteris podophylla* autt.). 2) **L.** (sc. *Polypodium*) L. (Farne, XXIV. 1) scharfer Schildfarn Grck., s. *Aspidium Lonchitis* Sw. (*Polystichum Lonch.* Roth).
- Lonchocarpus** H. B. K. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Lanzenhülse“ (*λόγγη* Lange, *καρπός* Frucht — Hülse lanzettf.), z. B. *formosianus* DC. (Ins. Formosa), *macrophyllus* Kth. etc., s. *Dalbergia*, *Robinia* etc.
- Lonicera** L. (Caprifoliac. od. Lonicereen, V. 1) „Lonitzere“ Grck., Geisblatt, Heckenkirsche, fr. *chèvre-feuille*, e. honey-suckle (n. d. Bot. Adam Lonitzer, lat. *Lonicærus*, Prof. u. Arzt in Frankfurt a. M., † 1586), L. *Xylostæum* L. Hecken- od. Hundskirsche, *nigra* L. Hundbeere, e. dog's-berry, L. *alpigena* L., *tatarica* L., etc.
- Lontarus** Rumph. (Palmen, XXII. 6) „Lontar“, Wein- od. Palmyrapalme, fr. *lontard* (v. d. vaterl. *lontar*), L. *domestica* G., s. *Borassus flabelliformis* L.
- Lopezia** Cavend. (Myrobalanen, I. 1) „Lopezie“ (n. d. span. Nat. Francisco Lopez, Wtst. n. Thom. Lopez, schr. üb. d. neue Welt), Zier. L. *coronata* Andr. s. *racemosa* Cavend. (mexic. Jacq.) u. *miniata* DC.
- 1) **Lophanthus** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Kamm“- od. „Schopfbblume“ (*λόφος* Kamm etc., *ἄνθος* — Blüt. in Büscheln!), z. B. *chinensis* Benth., s. *Hyssopus Loph.* L. 2) **Loph.** Forst. (Hermanniac. od. Büttneriac., XVI. 2), L. *tomentosus* Forst., s. *Waltheria Loph.* Forst.
- Lophospermum** D. Don (Bignoniaceen, XIV. 2) „Kammsame“ Rmpl. (s. v. u. *σπέρμα* Samen — diese von breit. Kammsaum umgeben), Ziergitterpfl. L. *scandens* Don s. *erubescens* Zucc. m. v. *Andersoni* Hort., Balkon-Hängpfl. *spectabile* Hort.
- Loranthaceæ** Don „Riemenblumenartige“ (-*thidææ* Gray, -*thææ* Bartl., Rchb.) (s. sogl.).
- Loranthus** L. (Caprifoliac. Lorantheen, VI. 1) „Riemenblume“ (*λωρόν* lat. *lorum* Riemen, *ἄνθος* Bl. — Kronzipfel riemenf.), L. *europæus* Jacq. (Krain, Litorale etc.).
- Loroglossum** Rich. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Riemenzunge“ (s. eb. u. *γλώσσα* Zunge — d. Labell lang zungenf.), L. *hircinum* u. *anthropophorum* Rich., s. *Himantoglossum hirc.* Spr. u. *Acæras anthr.* R. Br.
- Lotææ** Rchb. Schotenkleeartige, s. *Lotus*!
- Lotus (-us)** DC. (Nymphaeaceen, XIII. 1) weisser Lotus, ägypt. Seerose (*λωτός* — wovon jedoch nicht *Lotophagen* Homer! s. sogl.), s. *Nymphaea Lotus* L.
- 1) **Lotus** L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Schoten- od. Hornklee, Schüchel O. W., fr. *lotier*, *méillot de l'Allemagne*, e. *lote* (-tree) (gr. *λωτός* Theophr., s. sogl.), L. *corniculatus* L. (— Hörnchen an d. Hülsen spitze!), Zier. L. *Tetragonolobus* L. (Tetrag. *purpureus* Mnch.) engl. Erbse, fr. *lotier pourpre*, e. *purple-trefoil*, L. *jacobaeus* L. *Jakobs-klee*, fr. *l. de l'île de Jacques*, e. *St. James-island's-trefoil*. 2) **Lotus** (sc. *Rhamnus* L. s. *Zizyphus* T.) (Rhamnaceen, V. 1) *Lotus* od. *essb.* *Judendorfn* W., fr. *lotos* (*lotus*), *lotier des anciens*, - *des lotophages* (*λωτοφάγοι* Homer, die Frucht vom Lotusbaum Essende, Nordaf.). 3) **Lotus** (sc. *Nymphaea*) L. (Nymphäaceen, XIII. 1) ägypt. Seerose, fr. *lotier d'Egypte*. 4) **Lotus** (sc. *Diosp̄ros*) L. (Sapotaceen, XXIII. 2) s. g. italien. od. indische Dattelpflaume M.-Rchb., e. *bastard-lote-tree* „unechter Lotusbaum“.
- 1) **Loudonia** Lindl. (Halorageen, VIII. 4) „Loudon's“-Seebeere (n. d. engl. Bot. J. C. Loudon). 2) **Loudonia** Berter. (Papilionaceen).

- Louichéa** Schreb. (**Lovichea** P'Hér.) (Chenopodiaceen, od. Urticaceen, V. 2) Kampherkraut (n. René Louiche des Fontaines, s. Desfontaines), L. Pteranthus Forsk. s. cervina P'Hér., s. Camphorosma Pter. L.).
- Lowéa** Lindl. (Rosaceen, XII. 5) „Lowe's“-Rose, Berberitzenblatt-R., s. Rosa berberifolia autt. (n. d. Baccalaureus R. T. Lowe, Univers. Cambridge, schr. Primitiae et Novitiae Faunae et Florae Maderae et Portus Sancti, Lond. 1851).
- Loxanthéra** Blum. (Loranthaceen, VI. 1) „Schräganthere“ ( $\lambda\omicron\epsilon\chi\delta\zeta$  schräg etc.,  $\acute{\alpha}\nu\theta\rho\acute{\alpha}$  Staubbeutel — diese stehen schief), L. speciosa Blum., s. Loranthus L.
- Lubin** Vent., Lk. (Primulac. Lysimachieen, V. 1) „Lubin's“-Lysimachie (n. d. franz. Beamt. u. Bot. in Ostindien S. Lubin), L. atropurea Lk. (Lysimachia atr. L.), spathulata Vent. (Lys. mauritiana autt.) etc.
- Lucidor** (sc. Antholyza) L. (Irideen, III. 1) „Lichtgeschenk“-Rachenlilie, gestielte R. Dietr. (lux, -cis Licht,  $\delta\acute{\omega}\theta\omicron\nu\gamma$  Gabe, — wie in Theodor!).
- Luculia** Sweet (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Luculi“-Chinastrauch (n. d. nepaulischen Nam. d. Pfl. luculi-swa), Zier. L. gratissima, s. Cinchona gr. u. Mussaenda Luculia autt.
- Lucuma** Juss. (Sapotac. Mimosopeen od. Lucumene, X. 1) „Lucumbaum“ (Nam. in Peru). — Lucumae Juss., DC.
- Ludia** Lam., Comm. (Bixaceen, XIII. 1) „Spottblatt“, Änderling D. (v. ludo spiele, spotte — näml. d. Blätt. in d. Form!), L. heterophylla Lam. „verschiedenblättr.“.
- Ludolfia (-phia)** W. (Rohrgräser, III. 2) „Ludolf's“-Rohr (n. d. Prof. Matth. Ludolf in Berlin, † 1756), L. macrosperma W. Riesenrohr (Arundinaria n. Michx., Miegia n. Pers.), glaucescens W. (Panicum arborescens L.) etc.
- Ludovia** Poit., Pers. (Pandaneen Cyclantheen od. Palmen, XXI. 9) „Ludovie“, L. lancaefolia A. Br., s. Carludovica lanc. Hort. Par. (Salmia W.), s. Carludovia Rz. (Carlodovica R. P.) Karl-Luisen-Palme (n. d. span. König Karl IV. u. dess. Gemahlin Mar. Louise, † 1819).
- Ludvigia** Gronov. (-wiglia L.) (Lythrarieen, IV. 2) „Ludwigie“ (n. d. Prof. Chr. Gottl. Ludw. in Leipz.), L. decurrens Walt. s. jussoides Mchx. (Carolina), L. aquatica Clayt. (Ammannia ramosior L.), s. Ludwigiaria DC.
- Luffa** T., Cavend. (Cucurbitaceen, XXI. 5) Kanten- od. Beissgurke, Schwammkürbis Rmpl. (arab. louff), Zier. L. cylindrica s. Poppia Fabiana Hort. (L. Petola Ser.), fr. Paponge, Torchon, Concombre à noyan etc., e. cylindrical-fruited Luffa, L. acutangula Ser. „scharfkantige“, fr. L. à fruits anguleux, e. strainer-vine, s. Cucumis acutangula Ser. u. Momordica Luffa L.
- 1) **Lunaria** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) „Mondviole“, Mondveil Vilm, fr. lunaire, e. moon-wort (v. luna Mond — Form d. Samen!), Zier. L. biennis Mch. (annua L., inodora Lam.) Silberblatt O. W. (— silberne Schoten-Scheidewände!), rediviva L. (odorata Lam.), s. g. Flittern, fr. lunaire vivace, e. revived moon-wort. 2) **Lunaria** (sc. Rumex) L. (Polygonaceen, VI. 3) Mondampfer. 3) **Lunaria** (sc. Osmunda) L. (Farne, XXIV. 1) Mondfarn, -raute, fr. lunaire, bulbonac u. ménisse, e. lunary, bolbonac (Fiederlappen mond!). 4) **Lunaria** Plum. (Lentibularien, II. 1) Wasserhelm, L. palustris Plum., s. Utricularia foliosa L.
- Lunularia** Mich. (Lebermoose, XXIV. 3) „Mondbecher“ Leun. (dem. v. luna Mond — d. Kaps. halbmond!). L. vulgaris Mich. (Marchantia cruciata L. s. Staurophora pulchella W.).

- Lupēria** DC. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Trauer“-Levkoje (v. *λυρός* traurig — schmutzig gelbrot), s. Matthiöla tristis R. Br.
- Lupinaster** Mneh., DC. (zu Trifolium Rchb.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) sibirischer Klee (deter. v. Lupinus, s. d.), z. B. Trif. alpinum L., montanum L., L. macrocephalus Pursh, etc.
- Lupinus** T., L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Lupine“ oder „Wolfsbohne“, fr. lupin, e. lupine (v. lupus Wolf — hungrig wie ein Wolf jed. Boden verzehrend, Wtst. n. Plinius), Zier. L. nanus Dougl. m. v. v. Zwerg-L., fr. l. nain, e. dwarf-l., polyphyllus Dougl., varius L. weissblau (semiverticillatus Desv.), fr. l. petit bleu, L. lutēus L. (auch gebaut!), fr. l. jaune odorante, sulphurēus Dougl. (Californ.), tricolor elegans Hort. etc.
- Lupularia** Ser. (zu Medicago L.) (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Hopfenklee“, s. Medicago lupulina L. (v. lupulus Hopfen).
- Lupulina** Desv. (zu Trifolium L.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Hopfen-Kleeartige (s. eb.), z. B. Tr. procumbens etc.
- Lupulus** (sc. Humulus) L. (Urticaceen, XXII. 5) gem. Hopfen, fr. vigne du nord, e. hop's-plant od. bind (dem. v. lupus Wolf? — ungewiss! Wtst. schlingt sich um Weiden u. dgl. = „Weidenwolf“ (Lupus salictarius Plin.).
- Lussacia** Spr. (Ericac. Vaccinieen, X. 1) „Gay-Lussac's“-Heidelbeerstrauch (n. d. franz. Nat. Gay-Lussac), L. vaccinium Spr. (Vacc. brasiliense Spr. s. Gay-Lussacia Pseudo-Vaccinium Schldl.), L. buxifolia Spr. (Gay-Luss. b. Hb.) etc., s. Thibaudia glandulosa Hb.
- Luxemburgia** St. Hil. (Violaceen Sauvagesieen, XIII. 1 od. XVI. 8) „Luxemburgie“ (n. d. Herzog v. Luxembourg, unt. dess. Patronage St. Hilaire 1816—1822 Brasil. bereiste), L. speciosa St. Hil. s. octandra St. Hil. (Str. Bras.), s. Plectanthera Mart.
- Luzula** DC. (Juncaceen, VI. 1) „Hainsimsengras“, Marbel Grck. (v. lucus Hain — Standort! Wtst. v. luceo glänze — Blüt. u. Blätt. mehr. Arten!), L. albida DC., silvatica Gaud. s. g. Lichel, campestris DC. gemeiner Marbel, etc.
- Lycaste** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Lykaste“ (Paxton: Nam. einer schön. Frau in Sicilien, von Lykastos, Stadt auf Creta, abgeleitet.), z. B. Skinneri Ldl. (Guatem.).
- Lychnis** T., L. (Caryophylleen od. Sileneen, X. 5) „Lichtnelke“, Lichte O. W., fr. lychnide (v. *λύχνος* Leuchte), Topfbl. L. fulgens Fisch., Haageana Lem. m. v. fl. albo Hort., hybrida aurantiaca Hort., Gartenzier. L. chalcedonica L., s. g. brennende Liebe, fr. fleur de Jérusalem „Jerusalemkreuz“ m. v. v., coeli rosa Desc. (Agrostemma c. r. L.) u. flos Jovis DC. „Jupiters“-L., L. Viscaria L. v. fl. pl. Pechnelke, fr. bourbonnaise, atrape-mouche, alpina L. (Viscaria alp. Fr.), sylvestris Hoppe v. fl. pl. Hort., wild u. Gart. L. flos cuculi L. „Kukuks“-Lichte, fr. fleur de coucou od. lampette déchirée, e. cuckoo-flower, L. Preslii Sek., L. grandiflora Jacq. (China) etc.
- 1) **Lychnitis** (sc. Phlomis) L. (Labiaten, XIV. 1) lichtnelkenart. Flammenlippe. 2) **L.** (sc. Verbascum) L. (Scrophularineen, V. 1) lichtnelkenart. Wollkraut Grck. (v. *λύχνος* Leuchte, Kerze!).
- Lycium** L. (Solaneen, V. 1) Bocks- od. Wolfsdorn, Hexenstrang od. Teufelszwirn Rmpl., fr. lyciet (liciet), e. goat's- od. box-thorn (*λύχνος* Diosc. v. *λύκος* Wolf od. *Λυκία* Lycien), Gartenstr. L. barbarum Ait. (vulgare Dun. s. flaccidum Mneh.), L. europaeum L., ruthenicum Murr., chinense Mill. (barbarum var. chin. Ait., barbarum Lour.).
- Lyeoctōnum** (sc. Aconitum) L. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) „Wolfstod“-Eisenhut, Wolfs-Sturmhut Grck., -wurz, fr. tue-loup (étrangle-, herbe



- au -), e. wolf's-bane (yellow w.-b.), libbard's-bane (v. *λίχοξ* u. *κτό-ροξ* Mord).
- Lycogāla** Mich. (Pilze, XXIV. 4) Blut- od. „Wolfsmilch“ (s. v. u. *γάλα*, -*κτος* Milch), z. B. plumbēum Mich.
- Lycoperdon** Mchx. (Pilze, XXIV. 4) Staub- od. Kugelpilz, Bovist, eig. „Wolfs“-F.-, fr. vesse- od. pisse de loup „Wolfswind“ etc. (*λίχοξ* u. *πέοδομαι* farze), z. B. L. gigantēum Riesen-Bovist, gemmatum stachelwarziger, etc.
- Lycopersicum** Dun. (-on T.) (sc. Solānum) L. (Solaneen, V. 1) „Wolfspirsich“, s. g. Paradies- od. Liebesapfel, Tomate, fr. tomate (*λίχοξ* u. Persica Pfirsich), L. esculentum Dun. s. Humboldtii W., L. pyriforme Dun. (Solanum pomiferum Cav.), L. procumbens Dun. (Südamer.).
- Lycopodiaceae** DC., Rchb., Seub. Bärlappgew., -**podinēae** DC. dsgl., s. sogl.
- Lycopodium** L. (Lycopodiaceen, XXIV. 1) „Wolfssuss“, Bärlapp, Kolbenmoos D., fr. lycopode, pied-de-loup, mousse-massue od. plicaire, e. earth-moss (s. v. u. *πόδιον* Fussesocke v. *πόξ*, -*όδοξ* Fuss — Form ähnl. d. Wolfsfährte!), L. clavatum L. etc.
- Lycopsis** L. (Boragineen, V. 1) „Wolfsgesicht“, Krummhals, Wall-Ochsenzunge, fr. licope, lycopside u. face-de-loup (s. v. u. *ὄψις* Gesicht), s. Echioides Riv.
- Lycopus** L. (Labiaten, XIV. 1) „Wolfssuss“, Wolfstrapp, Zigeunerkraut D., fr. lycope, coumène, lance du Christ, e. mother-wort (s. v. u. *πους* Fuss), z. B. L. amethystinus Steven (Amethystea coerulea L.) etc.
- Lycōris** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Lykoria“-Narzisse (zu Amaryllis L.) (Wst. n. d. Nereide Lycoris, od. n. *Λυκώρεια* Gegend bei Delphi), Zier. L. aurea Herb. (Amar. aur. Ait.).
- Lygēum** L. (Gräser, III. 1) „Nuss“- od. „Bindgras“ (v. *λυγώω* biege, binde), z. B. L. Spartum L.
- Lygodium** Sw. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) Kletterfarn, „Schling“-Mondfarn (v. *λυγωδής* geschmeidig — im Orient zum Flechten), Zier. L. japonicum Sw., scandens Sw. (Osmunda scand. autt.).
- Lygodysoḗa** Rz. Pv. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Weidenrut“-Stinkkraut (*λίχοξ* Weidenrute, Dysodea v. *δυσωδής*, -*εος* übelriechend), z. B. ciliata Lk. u. foetida R. P. (Paederia f. L.).
- 1) **Lyonia** Nutt. (zu Andromēda Rchb.) (Ericaceen, X. 1) „Lyon's“-Torf- od. Rosmarinheide (n. d. Sammler in Amerika John Lyon), L. ferruginēa, rigida u. paniculata Nutt., s. Andromēda L. 2) **Lyonia** Raf. (Polygonaceen). 3) **L.** Ell. (Asclepiadeen).
- Lysimachia** L. (Primulaceen, V. 1) Gilbweiderich, Felberich O. W., Friedlos Jess., fr. lysimaque, herbe à cent-maux (Plinius: n. d. König Lysimachus, wahrsch. aber v. *λύω* löse, *μάχη* Kampf — lasse d. Kampf los, daher „Friedlos“, od. löse d. Schmerzen, daher herbe à cent-maux!), wild u. Zier. L. vulgaris L., e. common Loose-strife, fr. corneille, L. Nummularia L. (Ampelpfl.) „Pfennigkraut“, Lechenaultii Duby etc.
- Lysimachion** Tausch. (zu Epilobium Rchb.) (Onagrarieen, VIII. 1) Weidenröschen (s. v.), z. B. E. angustifolium L. etc.
- Lysipōma** Hb. Bpl. Kth. (Campanulac. Lobeliaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Lösdeckel“ (*λύσις* Lösung, *πώμα* Deckel — d. Kapsel springt m. ein. Deckel auf), z. B. acaulis Kth. (Lobelia androsacēa W.), aretioides Kth. (Lob. glandulosa W.), etc.
- Lythracēae** Grck., -**rariae** Rchb., -**rariēae** DC. „Blutkrautgew.“, s. sogl.
- Lythrum** L. (Lythraceen, XI. 1) „Blutkraut“, Weiderich, fr. salicaire, e. blit (blites, blits), blood-flower (v. *λύθρον* Blutschmutz — Farbe d. Blumen u. ehemed geg. Blutfluss), Zier. L. virgatum L. s. austri-

áčum Jacq. (*Salicaria virg. Mnch.*) (N.-Amer.), fr. salicaire effilée, e. rod-like *Lythrum*, *L. Salicaria* L. „Weiderich“, m. v. roseum *superbum* Hort., fr. salicaire commun, e. willow-herbe, *L. Cuphëa* L. (*Cuphea viscosissima* Jacq.), *L. fruticosum* L., etc.

- Maackia** Rupr. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Maack's“-Cäsalpinie (n. d. Gymn.-Dir. Maack in Irkutsk), *M. amurensis* Rupr.
- Maba** Forst. (Ebenaceen, XXII. 8) Maba- od. Teufelsbaum, fr. mabouier, Maba-Eisenholz (maba Nam. d. Baums auf d. Tonga-Ins.), *M. buxifolia* Pers. (Ferrelia bux. Kön.), *M. Ebenus* Spr. (*Ebenus vulgaris* Roxb.) gem. Ebenholz.
- Maburnia** P.-Thou. (Irideen, III. 1) „Burmans“-Schwertel (Anagramm v. Burmania!), s. *Burmannia capensis* Mart.
- Machaeranthëra** Nees (Compos. Astereen, XIX. 2) „Säbelanthere“ *μάχαιρα* Säbel, *ἀνθήρα* Staubbeutel — Antheren m. Messeranhang an d. Spitze), *Zier. M. tanacetifolia* Rehb. f., s. *Aster tanac. H. B. K.*
- 1) **Machaerium** Pers., Kth. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Säbelhülse“ (s. eb. — Hülse säbelf. zugespitzt!), *M. acuminatum* Kth. (*Nissolia arborëa* Jacq.), *ferruginëum* Kth. (Niss. ferr. W.). 2) **Machaerium** Juss. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Säbelchen“, Palisanderholz (*μαχαίριον* dem. v. *-μαίρα* Säbel), s. *Jacaranda brasiliensis* Juss.
- Machilus** Nees, Wall. (Laurineen, IX. 1) Duft-Lorbeer, *M. odoratissimus* Wall. (*Persea* od. *G.*) (Name indisch. Ursprungs).
- Machlis** DC. (Compositen) „Buhlerin“ (v. *μαχλός* geil etc. — d. ☉ Blüt. nackt).
- Macis** W. (Myristiceen, XIII. 1) Muskatblume, s. *Myristica moschata* Rumph. s. *officinalis* L. (v. d. gr. *μάξιο* Makir, ind. Gewürz — n. *Aemilius Macer*, Verf. d. ältest. mediz. Werks „*Macer floridus de virtutibus herbarum*, d. ganze Mittelalter hind. citiert, s. *Jessen Bot. d. Gegenwart u. Vorzeit*, S. 130).
- Mackaya** Arnott (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Mackay's“- od. Rotpfahl-Kürbis (n. Dr. Mackay, Dir. d. Gart.'s am Trinity-College z. Dublin, † 1862), s. *Erythropalum* Blum.
- Macleania** Grah., Hook. (Ericaceen Vaccinieen, X. 1) „Macleans“-Heidelbeere (n. John Maclean Esq., Kaufm. u. Bot. in Lima, Peru), *M. coccinea* Deesn. etc.
- Macleya** R. Br. (Papaveraceen, XIII. 1) „Macleys“- (n. A. Macley, Sekr. d. Linné'sch. Gesellsch. in Lond.), *Zier. M. cordata* R. Br., s. *Bocconia cord.* W.
- Maclura** (-ria) Nutt. (Urticaceen Moreen, XXI. 4) Osagendorn Rmpl., -orange (n. d. engl. Geologen W. Maclure, † 1840 in Mexiko), *M. aurantiaca* Nutt., fr. Maclure épineux (mâle u. femelle), e. osage-orange, s. *Morus* s. *Broussonetia tinctoria* L., Vent.
- Macradenia** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Langdrüsen“-O. (*μαστός* lang, gross, *ἄδην*, -eros Drüse — langgeschwänzte Pollenmass!), z. B. *polystachya* Spr. (*Epidendron* p. Thou.) etc.
- Macrocarpium** Spach (sect. v. *Cornus* L.) (Cornaceen, IV. 1) „Grossfrucht“-Cornelstr. (s. eb. u. *μαστός* Frucht), z. B. *C. mas* L. echte Cornelkirsche.
- 1) **Macrochilus** Knowl., Westc. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Langlippe“ (s. v. u. *χελός* Lippe — lange, ungeteilte Lippe!), s. *Miltonia* Lindl.
- 2) **Macroch.** Presl (Lobeliaceen, XIX. 6) „Langlippen“-Lobelie (= lang herabhäng. schmale Lippenzipfel!), s. *Lobelia* L.
- Macrochlōa** Kth. (Gräser, III. 2) „Lang“- od. Pfiemengras (s. v. u. *χλόα* Spross, Gras — sehr hohe Gräser!), z. B. *tenacissima* Kth., s. g.

- Espartero gras od. Halfa (Algerien — dient zu Matten, Geflechten u. als Papiersurrogat).
- Macrocnēnum** P. Br., Vell. (Cinchonaceen, V. 1) „Langschienen“-Chinastr., „Stengelblume“ D. (s. v. u. *ζυγίμη* Schienbein — sehr lange Blumenstiele!), *M. speciosum* Jacq., *s. Mussaenda* spec. autt.
- Macrolobium** L., Schreb. (Cassieen Cäsalpinieen, III. 1) „Lang“- od. „Grosslappe“ D. (s. v. u. *λοβίον* dem. v. *λοβός* Lappen — d. ob. Kronblatt sehr lang), z. B. *hymenaeoides* W. (*Vouapa bifolia* Aubl.), *staminēum* Mey. (B. Guiana), *pinnatum* W. (*Outea guian.* Aubl.), *sphaerocarpum* W. (*Vouapa Simira* Aubl.).
- Macropiper** Miq. (Piperaceen, II. 3) „Langpfeffer“ (s. v. u. *piper* Pfeffer — grosse Blätt!), z. B. *excelsum aureo-pictum* Bull.
- Macroscēpis** Hb. Bpl. Kth. (Apocynen, V. 2) „Lang“- od. „Grossdecke“ (s. v. u. *σκέπη* Decke etc. — d. Kelch grösser, als d. Krone u. an d. Basis m. Brakteen), z. B. *obovata* Kth., *longiflōra* Spr. etc., *s. Cynanchum* L.
- Macrostylis** Bartl. (Rutaceen, V. 1) „Langgriffel“-Raute (s. v., *στυλίς* Griffel — diese lang hervorstehend), z. B. *lanceolata* u. *barbigēra* Bartl., *s. Agathosma* W. u. *Diosma* L.
- Macrōtis** Raf. (Ranunculaceen, XIII. 1) „Langohr“, traubiges Christophskraut (s. v. u. *ὄτις*, *ὄτος* Ohr — lange Blütentraube), *s. Actaea racemosa* L.
- Macrothyrus** Spach (zu *Aesculus* L.) (Sapindaceen, VII. 1) „Gross“- od. „Langstrauss“ (s. v., *θύσος* „Thyrus“ u. Strauss — langer Blütenstiel), Zier. *M. parviflōra* Walt. *s. macrostachya* Mehx.
- Macrotrōpis** DC. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Grosskiel“ (s. v. u. *τροπίς* Schiffskiel — Kielblatt. so gross als d. Fahne), z. B. *foetida* u. *inodōra* DC., *s. Anagyris chinensis* u. *inodōra* Spr.
- Macrozamia** Miq. (Cycadeen-Farne, XXIV. 1) „Hoch-Zamia“ (s. v. u. *Zamia* — hoh. d. *Zamia* ähnl. Gewächs!), Treibh. *M. spiralis* Miq. u. *plumosa* Hort. Bull.
- Madaria** DC. (Composit. Sigesbeckieen, XIX. 2) „Glatzenblume“, zierl. Ölmadie (Gatt. aus Arten von *Madia* gebildet, v. *μαδάρος* kahlköpfig?), Zier. *M. elegans* DC. *s. corymbosa* Hort., fr. *Madaire élégante*, *s. Anthēmis elegans* Hort.
- Madia** Don, Mol. (-*dēa* Sol.) (Compos. Sigesbeckieen, XIX. 2) Öl-, „Madiē“, Klebsaat (v. d. chilenischen *madi*, od. v. *μαδάω* lat. *mado* bin schmierig od. matschig — Charakter v. *Madia sativa*!), geb. *M. sativa* Mol. Ölmadie, Zier. *M. elegans* Don (*Madaria* el. DC. *s. corymbosa* Hort. — *Madiēae* DC.
- Magnolia** L. (Ranunculac. Magnolieen, XIII. 6) „Magnolien“- od. Biberbaum Rmpl., fr. magnolier od. laurier tulipier „Tulpen-Lorbeer“ (n. d. Prof. Pet. Magnol z. Montpellier, † 1745), Zierb. *grandiflora* L. m. v. v., *obovata* Thb. *s. purpurea* Sims, *Yulan* Desf. *s. conspicua* Salisb. (Südchina) m. v. (Blendlingen) triumphans, *Alexandrina*, *Soulangeana* etc., *glauca* L. *s. fragrans* Sal. Biber- od. Sumpf-M., fr. *arbre de Castor*, e. *beaver-wood* od. *swamp-Magnolia*, *tripetala* L. *s. umbrella* Lam. „Schirmbaum“, fr. *arbre parasol*, e. *elk-wood* etc., *macrophylla* Mehx. (*Michauxii* Hort.) etc. — *Magnoliēae* DC.
- Mahagōni** Ad. (sc. Swietenia) L. (Rutaceen, X. 1) „Mahagonibaum“ (Meublesholz — westind. Name *maagoni*!).
- Mahaleb** (sc. Prunus) L. (Amygdaleen, XII. 1) Weichselkirschbaum, Steinweichsel, St. Luzienholz, Felsenkirsche, Dintenberg, fr. *Bois de St. Lucie*, *prunier odorant*, e. *Mahaleb-cherry-tree*, *perfumed ch.-tr.* (arab. Name *mah-haleb*!), *s. Prunus odorata* Lam. m. v. v.
- Mahernia** L. (Büttneriaceen, XVI. 2) „Mahernie“ (Hermannie) (Ana-

- gramm v. *Hermannia*!), *Zier. M. glabrata* Hort. (jonquillenduft. Stubenpfl.), *incisa* Jacq., *odorata* Andr.
- Mahonia** Nutt. (Berberideen, VI. 1) „Mahon'strauch“, fr. Mahonie, e. ash-berberry (n. d. amerik. Bot. Bernh. Mac-Mahon zu Anfang dies. Jahrh.'s, schr. Gartenkalender, Philad.), *Zier. M. Aquifolium* Nutt. (Berberis Aq. L.) stechpalmlblättr., fr. M. à feuilles de houx, e. holly-leaved ash-berb., *M. fascicularis* DC. (Berb. pinnata Lag.), *M. nervosa* Nutt. (glumacæa DC.), repens G. Don (Berb. rep. Lindl.) etc.
- Majanthëmum** Roth (Smilacineen, VI. 1) „Mai“- od. Schattenblume Grck. (v. Majus Monat Mai u. *ἄνθεμον* i. q. *ἄνθος* Bl.), *M. bifolium* Schmidt s. *Convallaria* Web., s. *Convallaria bif. L.* u. *Smilacina bif. Desf.*
- Majorāna** Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Majoran“ od. „Mairan“ Grck., fr. marjolaine, e. majoram (marjoram, -rom, -rum) (n. d. arab. maryamych od. marjamie), *M. hortensis* Mnch. s. *vulgaris*, s. *Origānum Majorāna* L.
- Malabatrīca** (sc. Melastōma) L. (Melastomaceen, X. 1) Schwarzbeere, Tomalopatira (*Fructus niger*) Rumph. (gr. *μαλάβαθρον* ind. Gewürz od. Nelkenblatt, Betel), s. *Laurus malabatrūs*!
- Malachium** Fr. (zu *Cerastium* Rchb.) (Alsineen, X. 5) „Weichling“ Grck. od. Weichkraut Seub. (gr. *μαλάχιον* weiches Kleid — weichanzufühl. Pfl.), *M. aquaticum* Fr. (*Cerast. aq. L.*, *Larbræa aq. Ser.*).
- Malaguëta** (sc. *Amomum*) L. (Scitamineen, I. 1) Malaguëta-Pfeffer, Cardamome (Name in Guinea).
- Malaxis** Sw. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Zartorche“ (v. *μαλαζός* lat. mollis weich, zart), z. B. *paludosa* Sw. (*Ophrys palud. L.*), *monophyllos* Sw. etc. — *Malaxidæe* Lindl.
- Malcolmia** R. Br. (Crucifer. Siliquosen XV. 2) „Malcolmie“ (n. d. Zücht. W. Malcolm in Lond., † 1835, schr. 1771 A Catal. of Hothouse and Greenhouse), *Zier. M. maritima* R. Br. m. v. alba, bicolor Lois., Chia R. Br. levant. M. (Chios), s. *Cheiranthus Chius* L.
- Malōpe** L. (Malvaceen, XVI. 8) „Malvenantlitz“, fr. malope, fausse mauve (v. *Malva u. ωτι*) Antlitz, Ansehn, Wtst. d. veränd. *μαλάγγη*, Plin.), *Zier. M. trifida* Cavend. (*Malopa tr. Lem.*), m. v. *grandiflora* Hort., *parviflora* l'Hér. (*Palavia malvaefolia* Cavend.).
- Malpighia** L. (Caryophylleen Malpighieen, X. 3) „Malpighie“, amerik. Kirsche, fr. moureiller, brin d'amour (n. Marcello Malpighi, Prof. in Bologna, † 1693), z. B. *argentæa* Jacq. (*Bunchosia arg. DC.*), *cocco-lobaefolia* Spr. (*Byrsonima c. DC.*), *Armeniāca* Cav. (*Bunchosia Arm. DC.*), *crassifolia* L. s. *Moureila* Aubl. (*Byrson. ferruginæa* Hb., Bpl.) (Bstr. Südam.). — *Malpighiaceæ* DC., -iae Juss., -iæe Rchb., -inae Bartl. Fam. u. Ord. d. Malp.-Gew.
- Malus** T. (zu *Pirus* L.) (Rosac. Pomaceen, XII. 4) Apfelbaum, fr. pommier, e. apple-tree (gr. *μήλον* od. *μάλον* lat. malum Apfel, Obst, malus Apfelbaum), *Zier. M. spectabilis* Kaido fl. pleno Prachtapfel Rmpl., *M. floribunda* v. Sieb. „blütenreicher“, *Toringo* v. Sieb.
- Malva** L. (Malvaceen, XVI. 6) „Malve“, fr. mauve, e. mallow, auch Rosen- od. Käsepappel Grck., fr. fromageon (lat. malva, gr. *μαλάγγη* v. *μαλώσω* erweiche — als Heilmittel), z. B. wild *M. rotundifolia* L., fr. petite mauve, wild u. *Zier. M. moschata* L. „Moschus“-M., fr. m. musquée, e. musk-mallow (*M. trifida* Cav.), *M. Alcæa* L., *Siegmar'swurz*, *silvestris* L., Gärten: *mauretanica* L. *Zebra-M.*, fr. m. d'Algier, e. mauritanian *M.*, *crispa* L., *miniata* Cav. (*Sphaeralcæa m. Spach*) *menuigr. M.*, fr. m. à fleur cinabre, e. vermilion *M.* etc. — *Malvacæe* Juss., R. Br., DC., Rchb., -væe Rchb.
- Malvaviscus** Ad., Ait. (Malvaceen, XVI. 6) Baum- od. Tutenmalve, fr. mauvisque Bastard-Eibisch Wolff (Wtst. aus *Malva* u. *ισζός* ähnl.

- od. *Hibiscus* gebildet), Treibh. *M. arborëus* Cav., s. *Achania* s. *Hibiscus Malvariscus* Ait.
- Malvinda** Med. (*Malvinda* Burm.) (Geraniac. od. Sterculiaceen, XVI. 8) „indische Malve“ (aus *Malva* u. *indica* geb.), z. B. *M. ulmifolia* Burm. (*Waltheria* ind. L.), *palmata* „Handblatt“-M. (*Sida* p.).
- Mammëa** L. (Guttiferen *Garcinieen*, XIII. 1) Brüstebaum, „Mammei“ D., *Mammibaum*, fr. *mamei* (n. d. amerik. *mammey*, lat. *mamma* Mutterbrust — brustwarzenähnl. Griffel), *M. americana* L. Aprikosenbaum von St. Domingo, fr. *Abricotier d'Amérique*.
- Mammillaria** Haw. (zu *Cactus* Rehb.) (Cacteen, XII. 1) „Zitzen“-*Cactus* (v. *mamilla* Brustwarze — ganz m. solchen Höckern besetzt!), Zier. *M. coronaria*, *densa* u. *longimamma* (gelb), *Lehmanni* u. *simplex* (blassgelb), s. *Cactus mammillaris* L.
- Mancinella** (sc. *Hippomäne*) L. (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Manchinell“- od. Giftapfelbaum (*manzanilla* dem. v. d. span. *manza* Apfel — Früchte wie ein Franzapfel).
- Mandevillëa** Lindl. (Apocynen, V. 2) „Mandeville's“-Hundswürger (n. H. J. Mandeville Esq., Min. in Buenos-Ayres, Wtst.: n. John Mandev., Reis. in Asien u. Afrika, † 1771), z. B. *Gewächsh. M. suaveolens* Lindl. (Schlingstr.), s. *Echites* DC.
- Mandihoca** Piso, s. *Manihot*!
- Mandirola** Van Houtt. (Gesneriac., XIV. 2) „Mandirola“ (unbek. Etymologie!), Zier. *M. multiflora* Van H., s. *Achimenes* m. *Gard.*, *picturata*, *Roetzlii*.
- Mandragöra** T. (Solaneen, V. 1) Hexenkraut, Alraunwurzel, fr. *mandragore*, *racine du Saint-esprit*, *mainde-gloire*, e. earth-apple, *mandrake* (v. *μάγδα* Viehstall u. *αγροά* Sammelplatz — wächst um Ställe, Wtst. *μάγδα* *αγροά* od. *-οης* betäub. Pfl., hebr. *dudaim*, als Schlaf- u. Liebestrank gebr., *Riemer*), *M. acaulis* G., s. *Atröpa Mandragöra* L.
- Manettia** L., Mut. (Rubiaceen, Cinchonaceen, IV. 1) „Manettie“ (n. Xaver Manetti, Dir. d. bot. Gartens z. Florenz), *Gewächsh. M. bicolor* Paxt., *fimbriata* Schldl. (*Nacibe* Aubl.), *picta* W., *lanceolata* Vahl (*Ophiorrhiza* l. Forsk.), etc.
- Mangifëra** L., (Terebinthaceen, Anacardieen, V. 1) Mangobaum, „Mangoträgerin“, Mangopflaumenb., fr. *manguier* (-gier), e. mangrove (ind. Name d. Frucht *manga*), Warmh. *M. indica* L., s. *Manga* Rumph.
- Mangium** Rumph. (Rhizophoreen, XI. 1) Leuchter- od. Stelzenbaum (vaterl. *mangle*), *M. candelabrum*, *celsum*, *minus* etc. Rumph., s. *Rhizophöra Mangle* L. Mangrovebaum, fr. *palétuvier*, *M. caseolare* Rumph., s. *Sonneratia acida* L. (B. Molukk.) (*Rhizophöra* s. *Aubletia caseol.* L., G.), s. sogl.
- 1) **Mangle** Pluk., DC. (sc. *Rhizophöra*) L. (Rhizophoreen, XI. 1) „Mangle“- od. Mangrovebaum, Wurzel-, Leuchter- u. Stelzenbaum, Wurzelsenker (indischer Name des B.'s!), s. *Candëla americana* Catesb. 2) **Mangle** Sloan. (Anacardiaceen, XXIII. 2 od. *Myoporineen*, XIV. 2), *M. laurocerasifolia* Sl. oriental. Nierenbaum, s. *Anacardium orientale* Bauh. (*Avicennia tomentosa* L. s. *Bontia germinans* L. f.).
- Manglilla** Juss. (sc. *Bumelia*) W. (Sapotaceen od. *Lucumeeen*, V. 1) Eisenholz (*manglilla* dem. v. *mangle* in Peru), s. *Sideroxyflon Manglilla* Lam. (*Myrsine* M. R. Br.); *M. Chrysophyllum* Lam., s. *Duhamelia Manglilla* Domb.
- Mangostana** Rumph., G. (sc. *Garcinia*) L. (Guttiferen, XI. 1) wohl-schmeck. Mangofrucht, fr. *mangoustan* (-gostan) (malayisch. Name der Frucht!).

- Manicaria** G. (Palmen od. Pandaneen, XXI. 5—10) „Ärmel“- od. „Sackpalme“, westind. Netzpalme, *M. saccifera* G. (v. manīca Ärmel, Manschette — Blütenscheide!).
- 1) **Manihot** Plum. (Euphorbiaceen, XXI. 11) Manihotwurzel, fr. manioc (-chot) (brasil. Name!), *M. utilis* Pohl, s. *Jatropha Manihot* L. Cussave, „Maniokmehl“. 2) **Manihot** DC. (sc. *Hibiscus*) L. (Malvaceen, XVI. 8) (zu *Abelmoschus*) indischer od. Manihot-Eibisch, schwefelg. M.-Rchb.
- 1) **Manna** Don (Sapotaceen Fraxineen, II. 1 od. XXIII. 2) „Manna“-Esche (*μάρνα* Mannazucker v. d. arab. mann Geschenk — Gabe d. Himmels), *M. rotundifolia* Don s. *Fraxinus rot.* Ait., W. u. Fr. *Ornus* L. 2) **Manna** nepalensis Don (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) Mannaklee von Nepaul, s. *Hedysarum Hamiltonii* Spr.
- Manzanilla** (-canilla Plum.) (sc. *Hippomäne*), s. *Mancinella*!
- Mappa** Juss., Spr. (sc. *Ricinus*) L. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Molukken-Wolfsmilchbaum, „Tafeltuchb.“ Leun. (v. mappa lat. u. ital. Serviette etc. — Blätter zu Tischdecken! nicht Wtst.: nach Marc. Mappus, Arzt z. Strassb., schr. üb. Thee etc. 1691, vgl. d. folgende!)
- Mappia** Schreb. (Dilleniaceen, XIII. 6) „Mappus“-Dillenie (s. eb.).
- Maranta** L. (Marantaceen od. Cannac., I. 1) „Maranta“, Pfeilwurz, e. arrow-root (n. d. venetian. Arzt Barthol. Maranta, † 1754), *M. arundinacea* L., Zier-Blattpfl. *M. striata* u. *zebrina* Sims, s. *Calathæa* G. F. W. Mey u. *Phrynium* Roxb., W.
- Marasmius** (-ium) Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Welk“-P. (*μαρασμὸς* Altersschwäche, v. *μαραίνω* welke — d. Hutlamellen werd. zuletzt lederartig), *M. alliaceus* Fr. Mousseron d. Küche, Gewürz-P.
- Marathrum** Raf. (Umbelliferen, V. 2) Fönchel od. Fenchel, *M. foeniculaceum* Hb. (Lacis f. Spr.) (gr. *μάραθρον* od. -θρον, lat. foeniculum), s. *Foeniculum* T. (*Hippomarathrum* Dub.).
- Marattia** Sw. (Osmundaceen od. Wasserfarne, XXIV. 1) „Maratti“-Farn (n. d. Prof. G. F. Maratti in Rom, schr. 1760 de floribus *Filicum*), Zier. *M. alata* Sm. u. *elegans* Endl. — *Marattiaceae* Kaulf.
- Maregravia** Plum., L. (Guttiferen, XIII. 1) „Maregrav's“-Gummistrauch (n. d. Reis. in Brasil. u. s. f. G. Maregrav, † 1644 in Guinea), *M. umbellata* L., *pieta* W. (Str. Bras.), *spiciflora* Rich. (Str. an Vulkanen auf Guadeloupe). — *Maregraviaceae* Juss.
- Marchantia** March. f., Raddi (Lebermoose, XXIV. 3) „Marchantie“, Stein-Lebermoos, Leberkraut Leun., e. lichen (geg. Leberkr. gebr.) (n. d. franz. Gart.-Dir. Nic. Marchant z. Blois, † 1678), *M. polymorpha* Radd., fr. *hépatiche* des fontaines. — *Marchantiaceae* Cord.
- Margäris** DC. (Rubiaceen Coffeaceen, XXII. 7) „Perlkaffee“, s. g. *Perlitas* der Mexikaner, Pfeiffer (*μαργαρίς*, -ίδος Perle — weg. d. Beeren!), *M. barbigera* u. *nudiflora* DC.
- Margarita** Gaud. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Margarite“, fr. marguérite, eig. Gansblümchen od. Masliebchen (s. eb. — Wtst. d. Strahlblütchen perlmutterartig rot u. weiss!), *M. Bellidiastrum* Gaud. (*Arnica* Bellid. W.), s. *Bellidiastrum* Mich.
- Margaritaria** L. (Euphorbiaceen, XXII. 7) „Perlenknopf beere“, *M. nobilis* L. (*μαργαίτις*, lat. margarita Perle — Frucht aus 4—5 glänz. Knöpfen).
- Marianus** (sc. *Carduus*) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Mariendistel“, fr. chardon Marie, e. Lady's-thistle od. milk-th. (n. Maria, d. Mutter Christi, von deren Milch d. weissen Blatflecken herühren sollen), s. *Silybum Marianum* G.
- Marīca** Schreb. (Irideen, III. 1) Sumpflilie Rmpl., Morastl. D. (*marīcus* v. mare, d. celt. mar Moor! Wtst. d. veränd. America — im

- tropischen Amerika z. Hause), *M. paludosa* W. (*Cipura paludosa* Aubl.).
- Marila** Pers., Sw. (Guttiferen Clusiaceen, XIII. 5) „Durchschein“-Schweinsgummi (*μααίλη* glühende Kohle — durchscheinende Adern! Paxton, Wtst.: Name d. B.'s auf d. Antillen!), *M. racemosa* Sw., s. *Bonnetia* rac. Sw. (B., Amer.) (*Mahurëa* Aubl.).
- Mariscus** Hall., Vahl (sc. *Cladium*) R. Br. (Cyperaceen, III. 1) „Moor“-od. Bollsimse D., deutsche Schneide (n. d. celt. *mar Moor*, latinisiert!), s. *Schoenus Mariscus* L. u. *Cladium germanicum* Schrad.
- Marmelos** (sc. *Crataeva*) L. (Capparideen, XI. 1) Schleimapfel, fr. *poire à trois feuilles* (v. d. portug. *marmelo* Quitte, wovon auch *marmelade*!), s. *Cucurbitifera* Pluk.
- Marrubiastrum** Mch. (sc. *Leonurus*) L. (Labiaten, XIV. 1) „Andorn“-Löwenschweif, fr. *marrubiastrum*, *faux marrube* (deter. v. *Marrubium*, s. d.), s. *Chaiturus* W. *Marrubiastr.* Rchb. s. *leonuroides* W.
- Marrubium** L. (Labiaten, XIV. 1) Filz- od. Weichandorn, fr. *marrube*, *ped de loup*, e. *hoare-hound* (v. *μάρορ* lat. *marum* Katzenkraut, hebr. *mar bitter*, rob viel, schwerlich Linné: v. *Maria* Urbs, Stadt in Latium).
- Marsdenia** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Marsden's“-Wachspfl. (n. d. Admir.-Schr. W. Marsden, schr. hist. of Sumatra, Lpz. 1785), *M. tenacissima* R. Br. (Faserpfl. Indiens).
- 1) **Marshallia** (-*lia*) Gmel., Schreb. (Compos. Eupatorineen od. Heliantheen, XIX. 1 od. 3) „Marshal's“-Blume (n. Humphrey Marshal), *M. bulbosa* Raf., *aliena* Spr. (Montevid.). 2) **Marshallia** Pursh (Proteaceen, IV. 1), *M. lanceolata* Pursh, s. *Persoonia lanc.* Mchx.
- Marsilea** (-*ia* Grck.) L. (Marsiliaceen, XXIV. 1) „Marsilie“, Roll- od. Schneckenfarn, Kleefarn Seub., Schleimfarn Endl., fr. *marsile* (nicht n. d. Grafen Aloys Ferd. Marsilli v. Bologna, sond. nach L. F. Marsigli, lat. *Marsilius*, schr. de generatione Fungorum, Romae 1714), *M. quadrifoliata* L., *salvatris* Hanst. „Retterin“ (— fristete den Gefährten der Burk'schen Austral-Expedition das Leben, Leunis). — *Marsiliaceae* R. Br., Bartl., Rchb. (zu *Hydropterides* Endl.) Wurzel-farne Rchb.
- 1) **Martagon** Cam. (sc. *Lilium*) L. (Liliaceen, VI. 1) Türkenbund, Krull- od. Berglilie, Goldwurz, fr. *martagon*, e. *martagon*, *king's-spear* u. *turk's-cap* (v. Mars, -tis u. *ἀγών* Kampf, -preis, Wtst.: n. d. Alchymisten st. *Martigenus* eisenbürtig, Kind des Mars!). 2) **Martagon** Bak. (sect. v. *Lilium* L.), z. B. ausser *Martagon* L. noch *byzantinum* Hort. s. *chalconicum* L., *pomponium* L., *dalmaticum* Moly m. v. album Hort., *superbum* L., *speciosum* Thb. s. *lanceifolium* Hort., *canadense* L. s. *penduliflorum* Red. etc.
- Martinezia** Rz. Pv. (Palmen, XXI. 11) „Martinez“-P. (n. d. span. Bot. *Martinez y Leache* Miquel, schr. *Disput. de vera et legitima Aloës electione*, Pompejopoli, 1644, Wtst.: n. Quer Josef y Martinez, Prof. z. Cadix, † 1764, schr. *Fl. v. Spanien*), Zier. *M. caryotaefolia* Hb., Kth., *erosa* (Antill.).
- Martynia** L. (Bignoniaceen od. Sesameen, XIV. 2) Gemshorn od. Elephantenrüssel, fr. *cornaret*, e. *elephant-trunk* (n. John Martyn, Prof. in Cambridge, † 1768, schr. *Fl. v. Cambridge*), Zier. *M. proboscidea* s. *annua* L. (*alternifolia* Lam.), fr. *ongles du diable* etc. m. v. v., *M. fragrans* Lindl., *lutëa* Lindl., *spathacea* Spr. (*Holoregmia viscida* Nees), *perennis* L. (*Gloxinia maculata* l'Hér.) etc.
- Maru** (sc. *Origanum*) L. (Labiaten, XIV. 1) arabischer Majoran (v. d. arab. *mary-amych*).
- Marum** Hall. (sc. *Teucrium*) L. (Labiaten, XIV. 1) Katzen-Gamander *M.*-Rchb., Katzenkraut, fr. *marjolaine de Crête*, e. *mastich* (-stick)

- (v. d. hebr. mar, gr. *μάρορ* brennend bittere Pfl.), *H. hispanicum nigrum* Hall., Bocca., s. *Teucrium multiflorum* L.
- Marūta** Cass., DC. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Marute“, Stinkkamille, fr. maroute (wahrsch. Marum-Geruch! s. eb.), s. *Cotūla* L. Laugenblume.
- Masdevallia** Rz. Pv. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Masdevall's“-O. (n. d. span. Arzt u. Bot. Jos. Masdevall), z. B. *M. attenuata* u. *Shuttleworthi* Rehb. f.
- Massonia** L. (Liliaceen, VI. 1) „Masson's“-Meerzwiebel (n. d. schwed. Reis. in Südafr. 1772 u. 1786/96 Fr. Masson, schr. *Stapeliae novae* etc.), *M. corymbosa* Sims (*Scilla* cor. Sims), *ensifolia* (*Polianthes pygmaea*), *lanceolata* Thb. s. *angustifolia* L., etc.
- Mastix** W. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Mastix“-Pistazie, fr. mastic, e. mastich-tree (gr. *μαστίχη* Mastix, Harz der Pistazie), s. *Pistacia Lentiscus* W.
- Mastixia** Blum. (Cornaceen, IV. 1) „Peitschen“-Cornelstr. (v. *μάστιξ*, -γος Peitsche — dünne, schlanke Triebe!).
- Matricaria** Vaill., L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Mutterkraut“, echte Kamille, fr. matricaire, oeil de soleil, e. mother-word od. camomil (-mile) (v. matrix, -cis Gebärmutter — heil. Kraft d. Kamillenthees für Kindbetterinnen!), Offiz. *M. Chamomilla* L., Gartenbl. *M. eximia* Hort. m. v. *grandiflora* Vilm., *M. Parthenium* L. (*Chrysanthem. s. Pyrethrum Parthenium* Sm., Pers.) Metterich Vilm. Jungfernkrl., Mädchenblume, Mutterkamille, Fieberkraut, e. common feverfew od. -pellitory, m. v. *aurēum* Hort., fr. pyrèthre dorée, e. golden-feather (Teppichg.) v. fl. pl., wild u. Zier. *M. inodora* L. (*Chrysanth. inod. L.*, *Matricaria grandiflora* Hort., *Pyrethr. inod. Sm.*), *parthenioides* Desf. (*Anthémis* p. Bernh.) m. v. *multiplex* Hort., fr. m. Mandiane.
- Matricarioides** Less. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) (zu *Tanacetum* L.) „Mutterkraut“-Rainfarn (s. v., *εἶδομαί* gleiche).
- 1) **Matthiöla** R. Br. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) Levkoje, fr. giroflée, gazon de Mahon (n. Pet. Andr. Matthioli, lat. Matthiölus, von Siena, Leibarzt d. Kaisers Karl V., † 1577, schr. *Compend. de plantis* etc.), Gart. u. Topf: *M. annua* Sw. Sommer- u. *M. incana* R. Br. Winter-Levkoje, beide m. v. v., s. *Cheiranthus annua* u. *incana* L. 2) **Matthiöla** Plum. (*Rubiace. Guettardeen*, V. 1) „Matthioli's“-Guettarde, *M. scabra* Plum. (*Guettarda* sc. Lam.).
- Maulhia** (*Maulia*) Thb. (Liliaceen, VI. 1) „Maulie“ od. blaue Tuberosa (n. H. D. Joh. Maule, schwed. Kaufm., Linné's Zeitgenossen), *M. capensis* Thb., s. *Agapanthus umbellatus* l'Hér. s. *Crinum africanum* L.
- Maurandia** Ort., Jacq. (*Scrophularineen*, XIV. 2) „Maurandy's“-Kletterpfl. (n. Dr. Maurandy, Prof. in Carthagen), Zier. *M. Barklavana* Lindl. m. v. v. (*lilacina* Vilm., *coccinea* Hort., *purpureo-grandiflora* Hort. etc.), *M. semperflorēns* Ort. (*Usteria scandens* Cav.) u. *antirrhiniflora* W., etc.
- Mauritia** L. f. (Palmen, XXII. 6) „Moritz“-P. (n. d. Prinz. Moritz v. Nassau-Oranien. † 1665), Zier. *M. aculeata* Hb. Kth., *flexuosa* L., *vinifera* Mart., Wein- od. gem. Fächer-P., guaraunischer Palmwein, Leun. od. Ipuruma.
- Maurocenia** Mill. (*Sapotac. Aquifoliaceen*, V. 3) Instrumentenholzbaum (n. J. F. Maurocenus, schr. *Catal. pl. et. Patav. 1713*), *M. Frangularia* Mill., s. *Cassine Maurocenia* L.
- Maxillaria** Rz. Pv. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Kinnbacken“-O. (v. maxilla Kinnbacken — bezügl. d. vorgezogn. Basis der Columna), z. B. *aromatica* Hook. (*Colax* ar. Lindl.), *picta* Hook. (*Bras.*) etc.
- 1) **Maximiliana** Mart. (Palmen, XXIII. 3) „Maximilian's“-P. (zu Ehr. d. Prinzen Maximilian v. Neuwied), *M. regia* Mart. u. *insignis* ds.



(Brasil.). 2) **Maximiliana** St. Hil. (-nia Schrk.) (Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Maximilian's“-Schneckensamen (n. Maximilian I., König v. Bayern), s. *Cochlospermum* Kth., *M. Gossypium* St. Hil., s. *Bombax gossypinum* L. falsch. Seidenwollenbaum.

**Maximowiczia (-witschia)** Rupr. (Menispermeen od. Annonaceen, XXI. 5) „Maximowicz“-Spaltantherenstr. (n. d. russ. Reis. u. Bot. Maximowicz), z. B. *chinensis* s. *amurensis* Rupr., s. *Kadsura chin.* Turcz.

**Meconopsis** Vig., DC. (Papaveraceen, XIII. 1) „Mohngleiche“ (*μυζων* Mohn, *ψυς* Aussehn), z. B. *M. cambrica* Vig., s. *Papaver cambr.* s. *Stylophorum* c. Spr.

**Medeola** L. (Melanthac. od. Smilaceen, VI. 3) „Medea“-Spargel (dem. v. Medea, d. Giftmischerin v. Colchis, od. v. medeo heile — Heilkraft), Ampelpfl. *M. asparagoides* L., s. *Myrsiphyllum* s. *Asparagus medeoloides* Thb. (*Dracaena medeol.* L. f.).

1) **Medica** Risso (sc. Citrus) L. (Hesperid. Aurantieen, XVIII. 2) Cedrat od. Cedrot M.-Rchb. echte Citrone (Orangerieb.), s. *Citrus Malus* Blackw., „Citronenapfel“ (*Medicus* aus Medien). 2) **Medica** (zu *Medicago* Rchb.) (Legumin. Loteen, XVII. 4) e. medick, z. B. *M. lupulina* Scop. Hopfenklee, fr. lupuline, orbicularis W.

**Medicago** L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Schneckenklee, e. snail-clover (-trefoil) (ob von *medico* heile? od. Wtst.: *medicus* medisch, aus Medien eingeführt die Luzerne!), z. B. geb. *M. sativa* L. Luzerne od. ewiger Klee, fr. trèfle de Bourgogne, e. lucern od. medick-fodder, wild *M. lupulina* L. „Hopfenklee“, fr. trèfle noir, mêlilot des champs, mignonette od. minette dorée, *M. falcata* L. „Sichelklee“, fr. lente (vgl. *Medica* Rchb.).

**Medinilla** Gaudich. (Melastomac. od. Lythraceen, X. 1) „Medinille“ (Wtst.: n. D. José de Medinilla y Pineda, Gouv. d. Marianen), *M. farinosa* Gaudich., Gewächsh. *magnifica* Lindl.

1) **Medium** T. (sc. Campanula) L. (Campanulaceen, V. 1) grossblum. Glockenblume, Marienglocke, fr. medium od. mariette (gr. *μῦδιον* ein Kraut, *μῦδιος* medisch, Wtst. v. *medius* mittler — mittelgrosse Blumen?). 2) **Medium** (sc. *Convolvulus*) L. (*Convolvulac.*, V. 1) linealblättr. Winde.

**Meesia** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Meese's“-M. (n. d. niederl. Gärtner Dav. Meese, schr. Fl. Frisica, 1760), z. B. *M. serrata* G., s. *Walkera serr.* W. — *Meesiacēae* Schimp.

**Megapterium** Spach (Onagrarien, VIII. 1) Grossflügel-Kerze, grossfrücht. Nachtkerze (*μεγὰς* gross, *πτερόν* Flügel — vierflügl. Kapsel), Zier. *M. Nuttallii* Spach (*Oenothera macrocarpa* Pursh).

**Melaleuca** L. (Myrtac. Melaleucaceen, XVIII. 2) Cajaputbaum, fr. caieput (*M. Cajeputi* Roxb.), „Schwarzweiss“- od. Silberbaum Leun. (*μελάς* schwarz, *λευκός* weiss — Stamm schwarz, Äste u. Blätter weiss), Zier. *M. squamea* Lab., *M. Leucadendron* L. „Weissbaum“ (— auch d. Stamm weiss!), *viridiflora* (*Metrosideros quinque-nerva* Cav.), *pulchella* R. Br., etc.

**Melampyrum** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Schwarzweizen“, altd. „Schwartweizen“ Mej., woraus: Wachtelweizen, Gletsch O. W. (*μελάς* u. *πυρός* Weizen — d. Samen schwärzt unter Mehl das Brot), in Saaten: *M. arvense* L., fr. mahon od. millet jaune (-sauvage), auch rouge-herbe (rougerelle), e. cow-wheat, Wald: *M. nemorosum*, *silvaticum*, *cristatum* u. *pratense* L.

**Melandrium (-dryum)** Röhring (Sileneen, X. 5) Lichtnelke, Lichte O. W., fr. ben (Wtst.: n. Girol. Melandri, schr. mit Moretti Analyse chimica di Colchico autunn. etc., Padua 1805), *M. rubrum* Græk. s. *sylvestre* Röhl. u. *M. album* Græk. s. *pratense* Röhl. (*Lychnis dioica* L. α. diurna u. β. vespertina Sibth.).

- Melanorrhoea** Wall. (Terebinthac. Anacardiaceen, XXIII. 2) „Schwarzfluss“ (s. v. u. *δολία* Fluss etc. od. *δένω* u. *δέω* rinne — an d. Luft schwarzwerd. Saft), z. B. M. glabra Wall. (B.).
- Melanosināpis** Schimp. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) (zu Sināpis L.) „Schwarzsenf“ (*μελάς*, *-άνος* u. Sināpis Senf — schw. Samen), M. communis Schimp., fr. rouette sauvage, s. Brassica s. Sināpis nigra Koch, L.
- Melanoxylon** Schott. (Cäsalpinieen, X. 1) „Schwarzholz“ (s. v., *ξύλον* Holz — B. m. braunsch. H.), M. Braīna Schott (B. Brasil).
- Melanthacēae** Endl. i. q. Colchicacēae DC., Giftlilien, s. Melanthium L.
- 1) **Melanthium** L. (Juncaceen od. Melanthaceen, VI. 3) „Honigblume“, -binse, fr. *mēlanthe* (gr. *μελάνθιον* Diosc. eig. „Schwarzkümmel“, F. W. Riemer, Wtst.: v. *μέλι* Honig u. *άνθος* — Kronblätt. an d. Basis m. Honigsäckchen!), M. uniflorum Jacq., s. Tulipa Breyiniana (Kolbea Schldl.), M. indicum L. (Angularia ind. R. Br.), M. spicatum Van Houtt. (Wurmbea purp. autt.). 2) **Melanthium** Diosc. (Ranunculac., XIII. 5) = *Nigella sativa* L. (s. eb. 1).
- Melastōma** Burm., L. (Lythraeiden Melastomaceen, X. 1) „Schwarzmund“, -schlund D., -beere, Erdbeerstrauch Leun., fr. *melastome* (*μελάς* schw., *στόμα* Mund — anhaltend schwarzen Mund machende Beeren! Paxt., Wtst.), Warmh. M. malabathricum L. (Indien) etc., s. Osbeckia L. — Melastomacēae Don, DC.
- Meleagris** (sc. Fritillaria) L. (Liliaceen, VI. 1) Schachblume, s. g. Kiebitzei, fr. *meléagride* (v. Meleagris Perlhuhn, in ein solch. verwand. Schwester des Meleager, Myth. — Ähnlichk. mit d. Gefieder des Perlhuhns, Wtst.).
- Melia** L. (Hesperideen Meliaceen, X. 1 od. XVI. 5) „Mannabaum“ (*μελία* od. *-ίη* Manna-Esche v. *μέλι* lat. mel Honig), M. Azederach L. Zedrach-M., fr. margousier Paternosterbaum od. Paradiesblume, fr. lilas des Indes. — Meliae Juss., -iacēae DC. (zu Hesperidēae Rchb. od. Ampelidēae Bartl.).
- Melianthus** T., L. (Sapindac. Paullinieen od. Rutaceen Zygophylleen, XIV. 2) „Honigblume“, -strauch, fr. *mélianthe*, fleur à miel, e. honeyflower (s. v., *άνθος*; Bl.), z. B. Winterpfl. major L. (Cpl.), minor L., fr. pimprenelle d’Afrique.
- Melica** L. (Gräser, III. 2) Perl- od. Schöngras, eig. „Honiggr.“, fr. canfe u. *mélica* (v. *μέλι* Honig — d. Mark d. Stengels honigsüss), z. B. M. nebrodensis Parlat. s. glauca Schult., uniflora Retz., nutans L. etc.
- Melicocca** Juss., L. (Sapindaceen, VIII. 1) Honigbeerenstrauch, „Honigfrucht“ D. (s. v., *κόκκος* Korn, Beere — d. Frucht m. süßsäuerl. Fleisch), M. bijuga L. span. Mamoncilla „Zitzensucklerin“ (Melicoccus bijugatus Jacq.), diversifolia Juss. (Stadmannia d. Spr.), s. Nux americana Comm.
- Melilōtus** T., L. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) Stein- od. „Honigklee“, „Melilotenkl.“, Klever O. W., fr. u. e. *mélilot*, fr. trèfle miellé (gr. *μελίλωτος* nach Honig riechend. Klee), z. B. cultiv. M. coeruleus Desr. Siebenzeit O. W., fr. m. bleu, e. blue m. od. great-sweet-scented m., wild M. officinalis Desr. s. arvensis Wallr., etc.
- Melissa** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Melisse“, Meter O. W., fr. *mélisse* od. thé de la France, e. balm-mint, balsamint (gr. *μέλισσα* Biene od. Bienenhonig — d. Bienen anlock. Pfl.), M. officinalis L. Citronen-Melisse, fr. citragon (citronelle, herbe de citron), e. balm mint gentle, m. v. fol. varieg. Hort.
- Melissophyllum** Riv. (sc. Melittis) L. (Labiaten, XIV. 1) „Melissenblatt“, melissenblättr. Biensauge Grck., Bergmelisse Wolff, fr. *mélisse bâtarde* (melissière, -lissot) (s. eb. u. *θύλλον* Laubblatt).

- Melittis** L. (Labiaten, XIV. 1) Biensauge Grck., Immenblatt M.-Rchb. v. *μέλιττα* i. q. *μέλισσα* Biene, Imme — d. Bienen anlock. Pfl.), *M. Melissophyllum* L. (s. eb.), *M. grandiflora* Sm. etc.
- Melo** T. (sc. Cucumis) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) echte od. Zucker-„Melone“, fr. *mêlon* sucré, e. melon (melo v. *μηλον* Apfel, Melone od. Pfebe) m. v. v. (a. Cantaluppen, b. Netz-M., c. Maltheser-M., Zier. Vilmorin's Kletter-M.).
- Melocactus** C. Bauh., DC. (sect. v. *Cactus* Rchb.) (Cacteen, XII. 1) „Melonen“-Cactus, fr. *mêlon-cardon* herissé od. *mêlocacte*, e. melon-thistle (Melo s. eb. u. *Cactus*), Stuben: *M. communis* Lk., Otto (St. Domingo).
- Melochia** L. (Büttneriaceen, XVI. 2) arab. Salatstrauch (aus Melochieh, dem arab. Namen v. *Corchorus olitorius*, gr. *κόρχορος* schlechte Gemüsepfl.), *M. parvifolia* Hb., *portoricensis* Spr. s. *crenata* Bert. etc., s. *Abutilon* Adans.
- Melodinus** Forst (Apocynen Carisseen, V. 2) „Apfelwirbel“-Hundswürger, s. g. Windapfel D. (v. *μηλον*, lat. *malum* Apfel u. *δινος* od. *δίνη* Wirbel etc. v. *δινέω* winde, Wtst.: Stengel windend!), *M. phylloides* Lab.
- Melongena** T. (sc. Solanum) L. (Solaneen, V. 1) Eifrucht- od. Apfel-Nachtschatten, eig. „Melonenerzeuger“, fr. *melongène* u. *mayenne* od. *béringène* (aubergine) *Melangana*-Apfel Wolff, s. *Solanum pomiferum* Pluk. (v. melo Melone u. -gênis, gr. *-γένος* in compos. erzeugend).
- Melopèpo** T. (sc. Cucurbita) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Turban-Kürbis M.-Rchb., fr. *melonnée* (aus melo Melone u. *pèpo*, gr. *πέπων* Pfebe, Kürbis).
- Melothria** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Haarblumen“-Zaunrübe, s. g. Kümmerling D. (gr. *μηλωθρον* Rebe, Zaunrübe = *Vitis alba* Plin.), *M. cucumerina* L. (Cucumis *parva repens* Pluk.) u. *pendula* L. s. *scandens* P. Br., s. *Trichosanthes cucumerina* L., *foetida* etc.
- Melvilla** Anders. (Lythrarieen, XI. 1) „Melville's“ Kelchhöcker-Weiderich (n. Lord Rob. Dundas Melville, engl. Minist. 1807, Wtst.: Melville, schr. les Amours des plantes, Paris 1835), Zier. *M. speciosa* Anders., s. *Cuphea* Jacq.
- 1) **Memecylon** L. (Melastomac. od. Loranthaceen, XI. 1) Safranbaum Dietr., Leun. (gr. *μεμήγυλον* Diosc. Frucht d. Erdbeerbaums, *Arbutus*), z. B. *edule* Roxb. (Ostind.) u. *tinctorium* Kön. (ramiflorum Lam.) etc., s. *Epigaea repens* L. 2) **Memecylon** Mitch., Burm. (Sapotaceen od. Ericen, IV. 1), *M. umbellatum* Burm., s. *Samara laeta* L. (Str. Ostind.). — *Memecylæe* DC. (zu Ord. *Myrtinae* Bartl.).
- Menispermum** T., L. (Menispermeen, XXII. 6) „Mondsamen“, fr. *menisperme*, e. moon-seed (v. *μηνη*, *-νος* Mond u. *σπερμα* Samen — dies. halbmondf.), Zier. *M. canadense* L. (*angulatum* Mch.) m. v. *lobatum* DC. (*M. virginicum* L., *carolinian* Hort.), M. *Chondrodendron* Spr. „Knorpelb.“ (*Chondrod. tomentosum* R. P.), *M. Cocculus* L. (*Cocculus suberosus* DC.) „Kokkelskörner“ (*cocculi indicii*), *M. palmatum* L., s. g. Colombowurzel, fr. *calumbé* (colombo), *M. Limacia* Spr. (*Limacia scandens* Lour.) etc. — *Menisperma* Juss., *-mæae* DC. (zu *Laurinæe* Rchb., Ord. *Cocculinæ* Bartl.).
- Mentha** L. (Labiaten, XIV. 1) „Münze“, „Münse“ (nicht Münze!), fr. *menthe*, e. mint (lat. *menta* od. *-tha*, nach Minthe, gr. *Μένθη*, Tocht. d. *Cocytus*, von *Proserpina* aus Eifersucht in eine Minze verwandelt, Myth.), Gärt. *M. crispa* L., fr. baume „Balsam“, *M. piperita* Huds. „Pfeffer“-M., e. pepper-mint, *M. gracilis* fol. varieg. Hort., wild *M. rotundifolia* L., *aquatica* u. *arvensis* L., etc.

- Menthastrum** Sloan. (Labiaten, XIV. 1) unechte Minze (zu *Mentha* Rehb.) (deter. v. *Mentha*), z. B. *M. sylvestre*, *M. maximum* Sloan., s. *Bystropogon suaveolens* l'Hér.
- Menyanthes** L. (Gentianeen, V. 1) Fieber-, Biber- od. Bitterklee, Zotten- od. Zottelblume Ö. W., fr. *menyanthe*, trèfle des marais (-d'eau), nymphaeu (*M. nymphoides* L.), e. water-od. marsh-trefoil (-clover), bog-bean u. feverfew (v. *μηρίς* Zorn etc. od. *μην*, -ρός Mond u. Monat? od. *μηνίω* zei:ge an — näml. Sumpf, Wtst. — ungewiss! *ἀργη* Blume), *M. trifoliata* L. etc.
- Menziesia** Sm. (Ericaceen Rhodoreen, VIII. 1) „Menzies“-Kugelstrauch (n. Archimbald Menzies, schott. Chirurg u. Bot. unter Vancouvers 1791—1794 Reis. an d. Nordwestküste v. Nordam.), Zier. *M. globosa* Sm., *polifolia* Juss., s. *Daboecia* u. *Andromeda* L.
- 1) **Mercurialis** T., L. (Euphorbiac. od. Acalypheen, XXII. 8) „Merkurs“- od. Bingelkraut, fr. *mercuriale*, foirelle u. cagarelle, auch chou de chien, e. mercury (dog's-) (n. d. Gott Merkur, der seine Heilkraft entdeckte, Plin., od. *Mercurius* Quecksilber Offiz.), wild. *M. annua* L., s. g. Speckmelde od. Winterkraut, fr. *rimberge* u. *foirande*, Wald *M. perennis* L. 2) **Mercurialis** (sc. *Tragia*) L. (Rutac. Euphorbiac., XXI. 3) „Tragus“- od. „Bocks-Bingelkraut“, s. *Croton* Gronov.
- Merendëra** Ramond (Colchicaceen, VI. 3) „Merendere“, Zier. *M. Bulbocodium* Ram., fr. *mërendère bulbocode* (Colchicum montanum L. s. *Bulbocodium autumnale* Lapeyr.) (v. d. span. *Quita meriendas* = *Colchicum autumnale* L. abgeleitet!).
- 1) **Meriana** Sw. (Melastomaceen, VIII. 1 u. X. 1) „Merian's“-Erdbeerestr. od. Schwarzmundbeere (n. d. Dame Mar. Sibylle Merian v. Frankf. a. M., ber. Insektenmalerin u. Reis. in Surinam, † 1717), z. B. *M. leucantha* Sw. u. *purpurea* Sw. (Jamaika), s. *Rhexia* L. 2) **Meriana** Trew (Irideen, III. 1) „Merians“-Schwertel, *M. flore rubello* Trew, s. *Gladiolus Merianus* Jacq. (*Watsonia humilis* Mill.). 3) **Meriana** Fl. Flum. (Convolvulac., V. 1) Merians-Winde.
- Meristostigma** A. Dietr. (Irideen, III. 3) „Spaltnarbe“ (*μεριστός* geteilt, *στέγμα* Narbe — 3 zweiteilige Narben), z. B. *anceps* D., s. *Oviëda* anc. Spr.
- 1) **Mertensia** Don (Boragineen, V. 1) „Mertensie“ (n. d. Bot. Mertens), z. B. *virginica*, *sibirica*, *davurica* etc. 2) **Mertensia** H. B. K. (Ulmaceen Celtideen, XXIII. 1), z. B. *laevigata* Kth., s. *Celtis* s. *Momisia* l. Dietr. 3) **Mert.** Soland. (Myrsineen, V. 1). 4) **Mert.** W. (Osmundaceen, XXIV. 1). 5) **Mert.** Roth (Florideen, XXIV. 3).
- Merulius** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Holz- od. Hausschwamm (schwerl. n. Wtst. v. *merula* Amsel, vielm. v. *μηρός* Hüftknochen od. *μέρος* Stück etc. u. *ὄλος* od. *ὄλος* verderblich — verderbl. Holzschwamm!), *M. lacrymans* Fr., „Thränenschw.“
- Mesembryanthëum** L. (Aizoideen od. Ficoideen, XII. 4) „Mittagsblume“, Zaserbl., Eiskraut, fr. *ficoïde*, fleur de midi, e. fig-marigold (v. *μεσημβροία* Mittag, *ἀνθεμον* Bl., n. Linnë *μέσος* mitten u. *ἐμβρονον* Embryo — mitten mit Blume wie ein Embryo!), Zier. *M. crystallinum* L. Eispfl., fr. *glaciale* od. herbe à glace, e. ice-plant, *pomeridianum* L., „Nachmittagsbl.“, Topf *M. caninum*, *tigrinum* Haw., *capitatum* Haw., Ampel *M. tricolor* W. etc. — *Mesembryanthemëae* Seub. Eiskräuter.
- Mespilus** L. (Rosaceen Pomaceen, XII. 4) „Mispelstrauch“, fr. *mèle* od. *meslier* (-lis) u. *néflier*, e. medlar-tree u. quirk (gr. *μέσπιλον* Mispel v. *μέσος* mitten u. *πίλος* Fleck u. Stein, Fels), wild u. Gärt. *M. germanica* L. s. *vulgaris* Rehb. m. v. v.

- Mesüa** L. (Guttiferen Clusiaceen, XVI. 8) ceylan'sches Eisenholz od. Nagasbaum (n. Mesuah, d. Leibarzt Harun Alraschid's, † 809 in Damascus), *M. ferrëa* s. *speciosa* Choisy (Calophyllum nagassaricum Burm.), *M. bracteata* Spr. (Camellia drupifera Lour.).
- Metel** (sc. Datüra) L. (Solaneen, V. 1) weisser Stechapfel *M.-Rchb.*, Stachelnuss Wolff, fr. noix-métel (méthel) (arab. methel, latinis. mixtale, Mischkorn od. Igelskolbe).
- Methonica** Herm. (Liliaceen, VI. 1) Rankenblatt- od. Prachtlilie (v. Methone, macedon. Stadt am thermäischen Busen, Wtst. st. mendoni malabarisch = Mendoni Rumph.), Zier. *M. superba* Lam. s. *malabarorum* Herm., s. *Gloriosa superba* L. (foliis cirrhiferis L., Pers.).
- Metrodorëa** St. Hil. (Rutaceen, V. 1) „Metrodoree“ (n. Metrodorus, Pflanzenmaler u. Philos. d. 2. Jahrh.'s v. Chr.), Zier. *M. atro-purpurëa* Van Houutt., *nigra* St. Hil. (Str. Bras.) etc.
- Metrosidëros** G., R. Br. (Myrtaceen, XII. 1) echtes od. „Kerneisenholz“ (v. *μύτιρα* Mark, Kern, *σιδηρός* Eisen — hart. Kernholz!), *M. vera* L.; ferner *M. corifolius* Vent. u. *amboinensis* G., s. g. Schönmütze, Nanibaum d. Molukken, „Eisenmass“ Rmpl., Gewächsh. *M. buxifolia* Cunn. (Neuseel.), *florida* Sm. (Leptospermum scandens Forst.) etc., s. *Lepto-* u. *Stenospermum* Forst., Sweet.
- Metroxylon** Rottb., Kön., Mart. (Palmen, XXI. 7) „Markholz“-P. (s. eb. u. *ξύλον* Holz — viel Mark im Stamm!), s. *Lepidocaryon* Mart., *Sagus* G. u. *Raphia* P.-B.
- Mëum** T., Jacq. (Umbelliferen, V. 2) Bärendolde, -fenchel, Mutterwurz O. W., fr. mëum (méon), e. mew od. set-wort (gr. *μῆον* Saufenchel st. *μείον* geringer — nämll. als Athamanta), Zier. *M. athamanticum* Jacq., s. *Aethusa* Mëum L.
- 1) **Meyenia** Benth., Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Meyen's“-Bärenklau (n. d. Bot. Prof. Meyen in Berlin), *M. erecta* Benth., s. *Thunbergia* L.
- 2) **Meyenia** Schldl. (Solaneen, V. 1) „Meyenie“. 3) **Meynia** Lk. (-na Roxb.) (Sapotac. Mimusoepen, V. 1) Meyen's Eisenholz, *M. spinosa* Lk., s. *Sideroxylon* spin. var.
- 1) **Mezerëum** (sc. Daphne) L. (Thymeläaceen, VIII. 1) Seidelbast, Kellerhals, wilder Pfefferstrauch, fr. mezëréon, bois gentil od. joli, chamêlée u. garou, lauréole femelle, e. mezereon, neck of a cellar, spurge-olive od. -laurel (v. d. pers. mazeryin, ital. ammazare töten — giftig!), Zier. v. v. fl. albo u. autumnale Hort. 2) **Mezereum** C. A. Mey. subg. v. *Daphne*, z. B. noch *D. altaïca* u. *caucasica* Pall.
- Miböra** P.-B. (Gräser, III. 2) Zwerggras (wahrsch. für *μυζοῦ βορῶν* kleiner Frass!), *M. verna* P.-B., s. *Chamagrostis minima* Borkh. (Sturmia min. Hoppe, *Knappia agrostidëa* Sm.).
- 1) **Michauxia** l'Hér. (Campanulaceen, VIII. 1) „Michaux'“-Glockenblume (n. d. franz. Bot. Andr. Michaux unter Louis XVI., Reis. in Persien u. Nordamer.), Zier. *M. campanuloides* Juss. (Mindium Juss., Medium Dioscoridis Rauw.), fr. Michauxie à fleur de Campanule, e. bellflower-like M. 2) **Mich.** Neck. (Compos.).
- Michelaria** Dumort. (Gräser, III. 2) „Michel's“-Gras (n. Michel, Entdeck. d. Pfl. in d. Ardennen), *M. bromoidea* Dumort., s. *Bromus arduennis* Kth. (*Libertia* ard. Lej.).
- Michelia** L. (Magnoliaceen, XIII. 7) „Micheli's“-Magnolie (n. d. Florentiner Bot. Pietr. Ant. Micheli, † 1737), *M. Champacca* L., *M. Tsiam-paca* L. (evonymoides Burm.), *M. Doltsopa* Buchan. (*Manglietia glauca* Blum.).
- Microcarpae** Lauch. (sect. v. *Crataegus* L.) (Pomaceen, XII. 2) „Kleinfrüchte“, Beeren-Mispeln (*μυζός* klein, *καρτός* Frucht), z. B. *acerifolia* Mneh.

- Microcarpium** Spach (sect. v. *Cornus* L.) (Cornaceen, IV. 1) echte Hartriegelstr. (s. eb.), z. B. *C. sanguinea* L., *sibirica* Lodd., etc.
- Micropus** L. (Compos. Tarchonantheen, XIX. 4) „Kleinfuss“, kleiner Löwenfuss, Falzblume Koch (s. v., *ποῖς* Fuss — ähnl. *Leontopodium*), z. B. *supinus* L. liegend. u. *erectus* L. aufrecht., *pygmaeus* Desf. (*Evax pygmaea* DC.).
- Microptelea** Spach (subg. v. *Ulmus* L.) (Ulmaceen, V. 2) Kleinblatt-Ulme (s. v. u. *πτελέα* Ulme), z. B. *U. parvifolia* Jacq.
- Microsperma** Hook. (Loasaceen, XIII. 1 od. XVIII. 2) „Kleinsamen“-Brennwinde (s. v., *σπέρμα* Samen — Kaps. m. zahllos. kl. Samen), z. B. *bartonioides* Van Houtt. (*Eucnide bart.* Zucc.), s. *Mentzelia* L.
- Microstylis** Nutt. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Kleingriffel“, Einblatt, *M. monophylla* (-los) Lindl. (Tyrol etc.) (s. v. u. *στύλις* Griffel — *Columna* äuss. klein), s. *Ophrys* s. *Malaxis* mon. Sw., *M. ophioglossoides* Nutt. (*Prescottia* oph. Spr.).
- Micrōtis** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Kleinohr“ (s. v. u. *ὄτις* *ὄτος* Ohr — kleine Blume m. gehört. *Columna*), z. B. *porrifolia* (*Epipactis* p. Sw.) etc. (Neuholl.).
- Mikania** W. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Mikanie“, s. g. Sommerod. Schnell-Epheu (n. d. Prof. Mikan in Prag), *Stuben* *M. scandens* Lem. (*Senecio mikanoides* Otto, *Delairea mik.* Lem.), *acuminata* u. *vitifolia* DC. etc.
- Milium** L. (Gräser, III. 2) Hirsen- od. Flattergras, Waldhirse Seub., Millgras O. W., fr. mil u. grémil, fr. u. e. millet (schwerl. n. Paxton v. mille tausend, wahrsch. *μῖλος* od. *μύλος* u. *-λίη* Schneide, Schmiele, lat. *milium* Hirse, Wst.: v. d. celt. mil Stein — harte, glänzende Samen!), z. B. *M. effusum* L., fr. grémil.
- Millea** Cav. (nicht *Milla*!) (Liliaceen, VI. 1) „Milla“- od. unechter Lauch (n. d. Ober-Gärtin. Julian Milla im k. Gart. z. Madrid!), *M. biflora* Cav. (Mex.), *uniflora* Grah. (Buen.-Ayr.), *borbonica* Bak. (*Nothoscorum* b. Kth.).
- 1) **Millefolium** (sc. *Achillaea*) L. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Tausendblatt“, Schafgarbe, fr. millefeuille, herbe au cocher „Kutscherkr.“, *soureils de Venus*, e. milfoil (v. mille tausend, folium Blatt). 2) **Millefolium palustre** Pluk. (Lentibularien, II. 1) „Sumpf-Tausendblatt“, *M. aquaticum* Pluk., s. *Utricularia minor* u. *vulgaris* L. (— stark zerschlitzte, vielteilige Bl.!).
- Millegrana** Surian (Portulacaceen Illecebreen, V. 3) „Tausendkorn“, fr. mille-grains (mille u. granum Korn — unzählige kleine kugelige Blätter! Wst. in d. Kaps. unzähl. kl. Samen!), s. *Herniaria* L.
- Millieria** L. (Compos. Millerieen, XIX. 4) „Millersblume“ (n. Phil. Miller 1691—1771), z. B. *angustifolia* Cav. (*Flaveria* ang. Juss.), *quinqueflora* L. (*dichotoma* Cav.) u. *biflora* G. (*Delilia Broterii* Spr.).
- Milletia** Wight u. Arn. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) Madagascar-Ebenholz (n. d. franz. Bot. Millet d'Aubenton, schr. Notice sur la cult. des oseraies du Dép. de l'Aisne, Lyon 1837), *M. leucantha* Krz., s. *Galedupa elliptica* Lam.
- 1) **Millingtonia** Roxb. (**Mallingt.** W.) (Bignoniaceen, II. 1 od. XIV. 2) „Millingtonie“ (n. d. Prof. Sir T. Millington in Oxford, schr. 1776 üb. Physiologie etc.), *M. (Mall.) hortensis* W., *suberosa* Roxb. (*Bignonia* sub. Roxb.), *ferruginea* Nees (*Meliosma ferr.* Blum.). 2) **Millingtonia** Ham. (Legumin. Onobrychideen, XVII. 4) „Mill's“-Esparsette, z. B. *semi-alata* Ham., s. *Flemingia* Roxb.
- Miltonia** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Milton's“-O. (n. John Milton. † 1674, d. Dicht. d. verlorn. Paradieses Rmpl., nicht n. Milton Earl Fitz-William, Gönn. d. Bot., Paxton), z. B. *M. spectabilis* Ldl. (Braç.),

- Karwinskii Hort. etc. (Mex., Centralamer.), s. *Macrochilus Fryanus* Westc.
- Mimētes** Salisb., R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Gauklerblumen“-Strauch (gr. *μυμητής*); Nachahmer — gleicht versch. andern Gattungen!), z. B. *capitulata* u. *cucullata* R. Br. (Südafr.), s. *Protēa* L. etc.
- Mimosa** Ad., L. (Mimoseen, XXIII. 1) Sinnpflanze, fr. mimose (-meuse) (v. *μυμέω* mache eine Bewegung), Zier. *M. pudica* L. „empfindl. M.“, Sensitive od. Schaupfl. Vilm., fr. sensitive (sensible), e. sensitive plant od. chaste Mimosa. — *Mimosæae* Endl. (-sacæe Rchb.).
- Mimulus** G., L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Gaukler“- od. Affenblume Rmpl., Maskenbl. Vilm., fr. mimule, e. monkey-flower (dem. *mimus* „Mime“ od. Schauspieler od. *μυμῶ*, -οῦ; Affe — sonderb. Blüten!), Topf. *M. moschatus* L. „Moschuspfl.“, *cardinalis* L. m. v. v. Scharlach-G., *cuprēus* Hook. v. Brillant Hort., *hybridus* Hort. m. v. v. (z. B. *tigrinus* u. *fl. pleno* Hort.), *M. variegatus* Hort., s. g. Arlequin etc.
- Mimusops** L. (Sapotac. Mimosopeen od. Lucumeen, VIII. 1) „Affengesicht“, Spitzblume D. (v. *μυμῶ*, -οῦ; Affe, ὄψ Gesicht — wie ein Affenkopf), z. B. *M. Elengi* Rumph. s. *lucida* Poir., *M. Imbricaria* W. (*Imbricaria* Pers., *Escallonia* Kth.), *M. dissecta* (Achras d. Forst.) etc. — *Mimusopæae* Rchb.
- Mirabilis** L. (Nyctagineen, V. 1) „Wunderblume“, Jalape Dietr., fr. fleur admirable (- de nuit), e. nyctage od. jalap, s. *Nyctago* Juss., DC. (*mirabilis* wunderbar — weg. d. Farbenmannigfalt. d. Blumen desselben Stocks!), Zier. *M. Jalapa* L., fr. belle de nuit (-de quatre heures), belle mexicaine, merveille du Pérou, e. jalap-flower, s. g. Schweizerhose, *longiflora* DC.
- Mirbelia** Sm. (Cassieen Cäsalpinieneen, X. 1) „Mirbelie“ (n. Brisseau-Mirbel, s. d. Aut. unt. Mirbel!), z. B. Gewächsh. *Baxteri*, *grandiflora*, *ilicifolia* etc., *reticulata* Sm., s. *Pultenaea rubiaefolia* Andr. (Str. Neuholl.).
- Mitella** T., L. (Saxifrageen, X. 2) „Bischofshut“, fr. mitelle, e. barrenwort? (dem. *mitra* Pabsthut — weg. d. Frucht!), z. B. *M. diphylla* L. (*Cortusa americ. altera* Mentz.), *M. foliis ternatis* L. (*Tiarella trifoliata* L.).
- 1) **Mithridatēa** Wilde, Comm. (Urticaceen Monimieen, XXI. 8) Trommelbaum v. Madagascar, fr. bois-tambour, e. drum-tree (n. *Mithridates* Eupator, Kön. v. Pontus, † 64 v. Chr.), *M. quadrifida* W. (*Tambourissa* q. Bak.), s. *Ambōra sempervirens* Juss., *M. toxicaria* D. (*Ipo tox.* Pers., *Antiāris* t. Leschen. *Bon-hupas* Ostind.). 2) **Mithr.** *Cratev.* (Liliac., VI. 1) = *Erythronium dens canis* L.
- Mitraria** Cav. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Mitrastrauch“ (v. *mitra* Pabsthut — viereck. Frucht), z. B. *M. coccinea* Cav. (Kletterstr. Chilö.).
- Mitrula** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Haubenpilz“ Kumm. (dem. v. *mitra* Kopfbinde etc. — Form d. Schlauchlagers auf dem Stiel mützenförm.), z. B. *cucullata* u. *paludosa* Fr.
- Mnesithēon** Raf. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Gottgedenk“ (*μνησθεός* Gottes eingedenk, Wtst. nach d. alt. Arzt *Mnesitheos* ben. F. W. Riemer: Benennung des *Juniperus* bei *Dioscorides*!), z. B. *album* Raf. (*Bupthalmum angustifol.* Pers.), *luteum* Raf. (*Louisiana*) etc.
- Mnium** Dill. (Moose, XXIV. 2) Sternmoos, fr. muie (*μνίον* v. *μνίω* zerstöre = *βόλον* Moos), z. B. *hornum* u. *ligulatum* (Waldböden).
- Modecca** Jacq. (Passifloreen, XXII. 5 od. XVI. 2) „Modecca“-Passionsblume (ostind. Name d. Pfl.), z. B. *integrifolia* Jacq., *trilobata* Roxb., etc.

- Moehringia** L. (Alsineen, VIII. 2) „Moehringie“, Dreinerv-Sandkraut, Spelle O. W. (n. d. Arzt H. Möhring z. Jever, † 1792), *M. trinervis* L.
- 1) **Moenchia** Ehrh. (Alsineen, IV. 4) „Mönchie“, aufrecht. Mastkraut, Vierling O. W. (n. d. Prof. Conr. Mönch z. Marburg, † 1805), *M. s. Sagina erecta* Fl. Wett. 2) **Moenchia** Roth (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Weisssteinkraut, Sandkresse, *M. incana* Roth, s. *Alyssum inc.* L. (*Berberoa inc.* DC., *Farsetia inc.* R. Br.), *M. sativa* Roth = *Camelina sat.* Crantz. 3) **Moenchia** Med. (Liliaceen, VI. 1).
- Mogorium** Juss. (Contorten Jasmineen, II. 1) arab. Jasmin, fr. mogori (ostind. Name d. Str.'s), s. *Jasminum Sambac* Ait. (*Nyctanthes Samb.* L., Thb.).
- Mohria** Sw. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) Weihrauch-F. (n. d. Univ.-Adjunct. zu Kiel D. M. H. Mohr, † 1808), *M. thurifräga* (-fëra) Sw. s. *crenata* Desv., s. *Polypodium* s. *Adiantum Caffrorum* autt.
- 1) **Moldenhauera** DC. (-hawera Schrad.) (Cassieen, X. 1) „Moldenhauer's“-Hülse (n. d. Pfl.-Physiol. Joh. Jak. Moldenhauer in Kiel, † 1827), *M. floribunda* Schrad., s. *Bowdichia speciosa* Spr. (*Dolichonema spec.* Nees „Langfaden“, *M. scandens* Spr. (*Cavanillea scand.* Thb. 2) **Mold.** Spr. (Urticaceen, XXI. 4).
- 1) **Molinaea** Juss. (Sapindaceen, VIII. 1) „Molinabaum“ (n. d. span. Reis. in Chili 1782, Molina), *M. alternifolia* u. *canescens* Roxb., etc., s. *Cupania* Pers. 2) **Molinaea** Comm. (Rhamnaceen, V. 1), s. *Retanilla* DC. 3) **Molinaea** Mart., Bert. (Palmen, XXI. 6) „Molina“-P., s. *Jubaea spectabilis* Hb., Kth. (*Cocos chilensis* Mol.).
- Molinia** Mch., Schrk. (Gräser, III. 2) Blauschmiele, Steifhalm, Pfeifenschmiele, Schmelche O. W. (n. Molina ben., s. eb.), *M. coerulea* Mch. Pfeifengras Seub., Vilm., -binse, Zier. v. fol. varieg. Hort. (*Festuca coerulea* Hort., *Aira c. L. f.*, *Melica c. L. Mant.*) bunte Blaugras od. blaue Schmiele.
- Molle** T., Clus. (sc. Schinus) L. (Terebinthac. Pistazieen, XXII. 5) Mastix-Nierenbaum, peruv. Pfefferbaum, fr. mastic des Indes (peruan. nulli).
- 1) **Mollügo** Kth. (sc. Pharmacœum) L. (Paronychieen, III. 3) „Weichkraut“, Weichling D. (v. mollis weich), *M. arenaria* Kth. etc., s. *Alsine* Pluk., *Spergula* Burm. 2) **Mollügo** (sc. Galium) L. (Rubiaceen, IV. 1) weiches Labkraut.
- Molospermum** (bess. **Moloposp.**) Koch (Umbellifer., V. 2) „Striemen-samen“, fr. livèche, e. bladder-seed (v. *μῶλωψ*, -τος Strieme, *σπέρμα* Samen — Früchte n. breit. braun. Ölstriemen), Zier. *M. cicutarium* DC. (*Ligusticum peloponnesiacum* L.), fr. livèche du Pelopon-nèse, e. water-hemlock-like bl.-s.
- Moluccella** L. (Labiaten, XIV. 1) Trichterkelch (n. d. Molukken-Ins. ben.), *M. laevis* L. etc.
- Moly** Clus., Mch. (sc. Allium) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Blumen-od. Zauberlauch Vilm. (gr. *μῶλυ* Zauberkr. od. Knoblauch, Wst. v. *μολίω* entferne — näml. Krankh.!), fr. u. e. moly, fr. auch ail doré, e. golden-garlick, s. *M. Dioscoridis* Clus.; *M. atro-purpureum* Rudd. = *Allium subhirsutum* u. *descendens* L.
- Mombin** Plum., DC. (sc. Spondias) L. (Terebinthaceen, X. 4) Balsampflaume, fr. mombin (Name des B.'s in Amerika), s. *Myrobalanus* s. *Prunus americana* Pluk.
- Momordica** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Beissgurke“, Springkürbis Dietr., Balsam- od. Wunderapfel, fr. momordique, balsamine mâle (-rampante), e. balsam-apple (v. mordeo, momordi etc., beisse — Samen wie angebissen! Paxton, Wst., ätzend. Saft d. Frucht, Leun., Wst.), Zier. *M. Charantia* L. (*muricata* W.) indisch. Gurkenapfel, rebenblättr. B., *M. Balsamina* L. Balsam- od. Wunderapfel, fr. mo-



- mordique pomme de merveille, e. balsam-apple (balm-Momordica), M. Elaterium L. Spritzgurke (vgl. Elaterium Mnch.!).
- Monadelphia** L., XVI. Kl. „Einbrüderige“ (*μονός* einzeln, *ἀδελφός* Bruder — in einen Haufen verwachs. Staubfäden!).
- Monandria** L., I. Kl. „Einmännige“ (s. eb. u. *ἀνῆρ*, -*δός* Mann, in d. Bot. Staubgefäß!).
- Monanthes** Haw. (Crassulaceen, XI. 7) „Einblumen“-Dachwurz, s. *Sempervivum monanthos* autt. (s. v., *ἀνθή* Blüte).
- Monarda** L. (Labiaten, XIV. 1) „Monarde“, fr. monarde (n. d. Arzte Nic. Monardus, † 1578 zu Sevilla), Gartenbl. M. didyma L. „Zwillings“-M., fr. m. écarlate od. Thé d'Oswego, e. Twin-Mon. od. Oswego-tea, M. fistulosa L. m. v. v. (z. B. affinis Lam., altissima W., Clinopodia L., violacæa Desf. etc.), fr. m. fistuleuse od. velue, e. tubular-Mon.
- Monas** Ehrbg. (Vibronen, XXIV. 4) „Monade“, Kugelbakterie, z. B. M. prodigiosa Ehrbg. Wunder-M., blutende Hostie, s. Micrococcus Cohn (*μονάς* Einheit, „Monade“ Leibnitz).
- Moneses** Salisb., G. Don (-sis Walp.) (Ericac. Pyroleen, X. 1) „Einzelblum“-Wintergrün (s. v. u. *ἕσσις* Wesen — einblum. Schaft!), M. grandiflora Salisb., s. Pyrola s. Chimatobia uniflora L. u. Mey.
- Monimia** P.-Thou. (Urticaceen Monimieen, XXI. 4) „Monimie“ (n. Monime, Gemahlin d. pontisch. Königs Mithridates Eupator, † 64 v. Chr.), M. rotundifolia P.-Thou. (Ambora tomentosa Bory St. Vinc.) (Str. Ins. Bourbon), ovalifolia P.-Thou. (Str. Martinique) etc. — Monimiæae Juss., DC.
- 1) **Monnieria** L. (-ra Aubl.) (Terebinthac. od. Rutac. Diosmeen, XVII. 1) „Lemonnier's“ Schlangengiftkraut (n. d. Bot. Guill. Lemonnier, Prof. am k. Gart. zu Paris, † 1800), M. trifolia Loeffl. 2) **Monnieria** Pers., P. Br. (Scrophularineen, II. 1) „Lemonnier's“-Kriechkraut, z. B. africana Pers., s. Herpestes cuneifolia Pursh.
- Monochaetum** DC. (Melastomaceen od. Lythrarieen, VIII. 1) „Einzelborste“ (s. v. u. *χαίτη* loses Haar, Borste — d. Antheren-Connectiv läuft in eine Borste aus), z. B. umbellatum DC., s. Arthrostemma Pav.
- Monochlamydæae** DC. „Einhüllige“, Perigonblütige Leun. (s. v. u. *χλαμύς*, -*δος* Kleid, Mantel — nur einerlei Hüllblätter, nicht besond. Krone u. Kelch!).
- Monoclinia** L. „Einlagerige“, Zwitterblumen (s. v. u. *κλίση* Bett — beide Geschlechter in einer Blüte beisammen!).
- Monocotylæae** Grck. (-ledonæae Juss.) „Einsamenlappige“ od. „Monocotylen“ (s. v. u. *μονοκλήδων*, -*όρος* eig. Gelenkpfanne, Saugwarze, Bot. Samenlappen, s. g. Keimblatt!).
- Monodora** Don, Dumont (Ranunculac. Annonaceen, XIII. 7) „Einzelfell“-Flaschenbaum, westind. od. Kalabassen-Muskatnuss (s. v. u. *δορά* Haut, Fell — einzellige Frucht!), M. Myristica Don (Annona Myr. G.). — Monodoræae (zu Annonacæae) Rchb.
- Monocæia** L., XXI. Kl. „Einhäusige“ (s. v. u. *οἶκος* Haus — beiderlei Blüten auf einem Stock).
- Monœpigynia** Juss. „Oberweibige“ Monocotylen (s. v., *ἐπί* auf, über, *γυνή* Weib, Bot. Stempel — mit einem oberständigen Stempel).
- Monogynia** L. „Einweibige“ (*μονός* u. *γυνή* — mit einem Stempel!).
- Monohypogynia** Juss. „Unterweibige“ Monocotylen (s. v., *ὑπό* unter, *γυνή* — mit einem unterständigen Stempel od. Fruchtknoten!).
- Monolopia** DC. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Einschuppenblume“ (gr. *μονολόπος* mit einfacher Schale — nur ein Schuppenkreis am Anthodium), Zier. M. californica Hort. s. major DC. (Lasthenia glabrata Hort. non Lindl.).

- Monoperigynia** Juss. „Umweibige Monocotylen“ (s. v., *περὶ* herum, *γύρῃ* — mit umständigen, d. i. gleichhoch mit den Staubfäden gestellten Stempeln).
- Monorchis** L., Mentz. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Einknolle“ (s. v. u. *ὄρχις* Hode — nur eine Wurzelknolle!), s. Ophrys *Monorchis* Hall. (Herminium R. Br., Satyrium Pers., Arachnites Hoffm. *Monorchis*).
- Monotröpa** L. (Ericaceen, X. 1) Ohnblatt, Schmeerwurz, Fichtenspargel (gr. *μονότροπος* einsam — Standort! oder auch sonderbar! Wtst.), *M. Hypopithys* L., fr. suce-pin (-racine). — *Monotropæae* Nutt. DC.
- Monsonia** L. (Geraniaceen, XVI. 7) „Monsonie“, fr. monsonie (n. Lady Anna Monson, Assistentin von Lee, schr. *Introduct. to Botany*), z. B. *grandiflora* Burm. s. *speciosa* L., *Heritieri* DC. s. *spinosa* l'Hér., *Burmanni* DC. (*Geranium spinosum* L.).
- Monstera** Adans., Schott (Aroideen, VII. 3) „Monster“-Aron od. Baumwürger (v. *monstrum*, fr. *monstre* ungeheuerliche Gestalt), Gewächsh. *M. Lennea* C. Koch s. *deliciosa* Liebm., s. *Philodendron pertusum* Kth.
- Montanöa** La Llave u. Lex. (*Montagnæa* od. -nia Spr.) (Compositen, XIX. 4) „Montanoablume“, „Montagnebl.“ (n. C. Montagne, schr. üb. *Phykologie*, übers. v. K. Müller, Halle 1851, od. n. d. *Naturphilos. Montaigne*, Vertheid. v. Raymund's Theol. natur. um 1430? od. n. d. mexik. *Patrioten Montanoa*?), z. B. *Gartenbl. M. heracleifolia* Brongn., *pubescens* Spr. etc.
- Montbretia** Red., DC. (Irideen, III. 1) „Montbret's“-Schwertel (n. G. Coquebert de Mombret, Reis. im Orient, † 1836), z. B. *capensis* Bak. (*Tritöma* Ker s. *Houttuynia cap.* Thb.), *M. securigera* Red. (*Gladiolus* s. *Tapinia* sec. Dietr.).
- Montezuma** (bess. -*zumia*) Moç., Sess. (Bombaceen, XVI. 7) „Montezumabaum“ (n. d. mexik. Kaiser Montezuma, 15. Jahrh.), *M. speciosissima* Sess.
- 1) **Montia** Mich., L. (Portulaceen *Samoleen*, III. 3) Bach- od. Flutquendel, Greusel O. W. (n. Gius. Monti, Prof. zu Bologna), *M. fontana* L. „Quell-Montie“ *M.-Rehb.* 2) **Montia** Houst. (Tiliaceen).
- Montinia** L. (*Samoleen* od. *Onagrarien*, XXII. 4) „Montinie“ (n. d. schwed. Bot. Lorenz Montin, schr. üb. *Splachnum*, † 1785), z. B. *M. acris* L. (*caryophyllacea* Thb.) (Cap).
- 1) **Moquinia** DC. (Compositen) „Moquinie“ (n. d. franz. Bot. Moquintandon), z. B. *Bojeri* DC., s. *Spadonisma* DC. 2) **Moquinia** Grissel. (*Loranthaceen*, VI. 1), z. B. *glabra* Griss. 3) **Moq.** A. Spr. (*Campanulac.*, V. 1), z. B. *rubra* A. Spr. (Capstr.).
- Moracæe** Endl., Grck. „Maulbeerbäume“, s. *Morus* T.
- Moræa** L. (Irideen, III. 1) „Moræus“-Schwertlilie, Panther- od. Rollschwertel (n. Joh. Moræus, Arzt zu Fahlun in Schweden, Linné's Schwiegervater), Zier. *M. chinensis* Thb. *chines.* Pantherblume *Vilm.*, fr. *Morée de Chine*, e. *Chinese M.*, s. *Pardanthes chin.* Ker, *M. fimbriata* Hort. (*Iris chinens.* Bot. Mag.), *M. diandra* Vahl (*Diplarrhæna Moræa* Dietr.).
- Morchella** Dill. (Pilze, XXIV. 4) „Morchel“, Spitzmorchel, fr. *morille*, e. *moril* u. *trub* (ob v. *mor* niedersächs. für mürb? Wtst., *Helm-Rabst.*), z. B. *M. conica* Pers., *esculenta* L. *Speisemorchel*, u. *deliciosa* Fr. — *Morchellini* Rehb.
- Morææ** (sc. *Artocarpæae*) Bartl. *Maulbeergew.*, s. *Morus* T.
- Moricandia** DC. (*Cruciferen Siliquos.*, XV. 2) „Moricandi“- od. *Ackerkohl* (n. Steph. *Moricandi*, ital. Bot., schr. *Fl. Veneta*, *Genuæ* 1820 u. a.), wild u. Zier. *M. arvensis* DC. (*Brassica arv.* L. s. *pur-*

purĕa Mill.), fr. Moricandie des champs, e. cabbage-flowered M., s. Turrĭtis arv. R. Br. s. Crantzia frutescens Lag.

- 1) **Morina** T., L. (Labiāt. Nepeteen, II. 1) „Moringe“, fr. morine (n. d. franz. Bot. L. Morin, † 1715), Zier. *M. longifolia* Wall. u. *M. persica* Don (*Asaphes nepalensis* Spr.). 2) **Morina** Don (Verbenaceen).
- Morinda** Vaill., L. (Rubiaceae. Cinchonaceen, V. 1) „indische Maulbeere“, fr. morinde, m. royoc, fausse rhubarbe Tintenwurzel (aus *Morus indica* — Ähnlichk. d. Frucht m. d. Maulbeere!), z. B. *M. tinctoria* Roxb. (Str. Ostind.), phillyreoides Lab. (Str. Neucealed.), muscosa Jacq. (*Cephaelis m. Sw.*) etc.
- Moringa** G. (sc. Guilandina) L. (Cassieen Cäsalpinieen od. Rutaceen, X. 1) „Moringabaum“ (vaterl. Name!), *M. Pterygosperma* G., s. Guil. Mor. L.; *M. zeylanica* Lam., s. *Hyperanthera* Mor. Vahl (Guiland. Mor. Jacq.). — Moringeae Wight (zu Rutaceae).
- Morio** (sc. Orchis) L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) gem. od. Salep-Orchis, Wiesen-Knabenkraut, Kukuksblume, eig. „Schalksnarr“ (lat. morio, -onis, gr. *μοῦρος* Narr — Blüte einer Narrenkappe ähnlich!), fr. folle-femelle.
- Morisonia** Plum., L. (Capparideen, XVI. 8) „Morison's“-Kaperbaum, Teufelsb. Wolff, fr. mabouia (-bouier), masse des sauvages (n. d. schott. Bot. Rob. Morison), *M. americana* Jacq., s. *Capparis Morisonia* Sw.
- Morna** Lindl. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Mornablume“ (n. Morna, Heldin nordischer Romane, Wtst.: neuholl. Name!), Zier. *M. nitida* Lindl. s. *elegans* Hort. (*Helichrysum el. Hort.*, *Leptorrhynchus aureus* Benth., *Waitzia aur. Steetz*), *M. nivea* Lindl. (*Helichr. decumbens* Portenschl., *Leptorrh. suaveolens* Benth., *Waitzia corymbosa* Wendl., v. *Benthamiana* Walp.).
- Morocarpus** Scop., Ad. (Chenopodiaceen, V. 2) Maulbeerspinat, -frucht, Erdbeerspinat (*morus* Maulbeere, *μαρούς* Frucht — rote Beerenfrüchte), s. *Blitum capitatum* L.
- Morsus ranae** T. (sc. Hydrochäris) L. (Hydrocharideen, XXII. 8) „Froschbiss“ (*morsus* d. Biss, *rana* Frosch — d. mürben Blätter u. weichen Wurzelfasern v. Froschquappen verschluckt!).
- Morus** T., L. (Artocarpeen od. Urticac. Moreen, XXI. 4) Maulbeerbaum, fr. mürrier, e. mulberry (-tree), hirtle-berry (gr. *μόρον* n. d. celt. *mor* gr. *μαύρος* schwarz), Gärt. *M. nigra* L., fr. mürrier noir, e. black-fruited m.-b.-tr., *M. alba* L., fr. m. blanc, e. white-fruited m.-tr. m. v. v., *M. rubra* L. m. v. *scabra* Loud.
- 1) **Moscharia** Rz. Pv. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Moschuskraut“ (*μόσχος* Moschus, Räucherwerk — riecht wie Moschus!), *M. pinnatifida* R. P. (*Mosigia p. Spr.*), s. *Moschifera* Mol. 2) **Moscharia** Forsk. (Labiaten, XIV. 1). 3) **Moscaria** Pers., s. *Moscharia* Rz. Pv.
- Moschatellina** T. (sc. Adoxa) L. (Araliaceen, VIII. 4) Moschus- od. Bisamkraut, fr. moscatelline, fleur od. herbe musquée, e. moschatel (s. eb.).
- Moschosma** Rehb. (Labiaten Ocimoideen, XIV. 1) „Moschusduft“-Kraut (s. v., *ὄσμη* Duft), s. *Ocimum* L.
- Moussonia** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Moussonie“, z. B. *elegans* Decsn. (schwerl. n. Mousson = Passatwind, sond. N. pr.).
- Moutabēa** (*Moutoubēa*) Aubl. (Cinchonaceen od. Lucumeen, V. 1) Kappenblume D. (Str. Treibh.), s. *Cryptostomum laurifolium* W. (v. ay-moutabou, Nam. d. Pfl. in Guiana).
- Moutan** Sims, DC. (sc. Paeonia) L. (Ranunculaceen, XIII. 2) Baum-Päonie, fr. Pivoine Moutan (- en arbre), e. tree-Paeony (chines. Name d. Pfl.) m. v. v., s. *Paeonia arborēa* Don (*suffruticosa* Andr., *fruticosa* Dumort.).

- Moxa** W. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Moxa“- od. Brennwohlen-Beifuss, s. g. indisch. Moos, fr. u. e. moxa, s. *Artemisia chinensis* L. (Moxa d. i. Brennwohle, näml. bei Hüftweh auf d. Haut abgebrannt, auch aus zerrieb. Blumen d. *Artemisia vulgaris*, Willdenow).
- Mucor** L., Mchx. (Pilze, XXIV. 4) Schimmel, Kopfschimmel, Kahlm (lat. mucor, -ōris n. d. celt. mucr feucht — Schimmel etc.), M. Mucēdo, fr. fleur d'humidité. — Mucorinēae Fr.
- Mucūna** Ad. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Brennbohne, Kuhkrätze (n. d. brasil. Namen mucuna-guaca — brennborst. Hülse!), Zierschlingpfl. M. urens u. pruriens Ad., s. *Strizolobium* P. Br., *Carpopogon* Roxb. u. *Dolichos* G.
- Muelleria** (Müllera) L. f. (Cassien Cäsalpinieen, X. 1) „Müller's“-Sophore (n. d. dän. Bot. O. Müller), M. moniliformis L. f. „Rosenkranz“-S., M. verrucosa Pers. (Ormocarpum verr. P. Br.).
- Muenchhausia** L. (sc. Lagerstroemia) W. (Malastomac. od. Lythrarieen, XIII. 1) „Münchhausensbaum“ (n. O. v. Münchhausen), M. speciosa L. (Lagerstr. spec. W.), s. *Banava* Camell.
- 1) **Mungo** (sc. Phaseolus) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Rauhkopf- od. Ichneumonbohne (mungo d. portug. Wort für den ind. Schlangenchneumon). 2) **Mungos** (sc. Ophiorrhiza) L. (Cinchonaceen, V. 1) ostindische od. Ichneumon-Schlangenzwur.
- Murex** Burm. (sc. Pedalium) L. (Scrophularieen od. Sesameen, XIV. 2) „Stachelschnecken-Ruderfrucht“ s. g. Fussangel D. (murex Stachelschnecke), s. *Hyoscyamus maritimus* Herm.
- Murraya** L., Kön. (Aurantaceen, X. 1) „Murray's“-Orange (n. d. Prof. Joh. Adam Murray in Göttingen), Warmh. M. exotica L. (Chalcas japonens. Lour.), Burmanni Spr. (*Glaucena excavata* Burm., Str. Java), *Koenigii* Spr. (Bergera K. L.) (Bstr. Ostind.).
- Murueuia** (-cuja) T. (Asclepiadeen Passifloreen, XVI. 2) „Murucuya“-Passionsblume (brasil. Name!), M. speciosa Spr. (*Tacsonia* sp. Kth.), aurantiaca Pers. (Str. Neucealed.).
- Musa** L. (Scitamineen Musaceen, V. 1) Pisang, Banane, Paradiesfeige, fr. plantanier, pisang, fruit du père Adam (figuier d'Adam), bananier u. bacove, e. plantain u. banana (Paxton: v. d. ägypt. mauz, Linné: n. Ant. Musa, Leibarzt d. Kais.'s Augustus, schr. de Betonica, Gewächsh. M. vittata Hort. (chinensis Sweet var.), chinensis Sweet (Cavendishii Paxt.), Ensete Bruc. (Aethiop.), sapientum L. Braminen-Bauane Rmpl., paradisiaca L. (Gespinnstpfl. Indiens) etc. — Musae Juss., -saccae DC., Endl. (zu Ord. Scitamineae Bartl.).
- Muscari** T., Desf. (Liliaceen, VI. 1) „Muskat“- od. Bisamhyacinthe Grck., Moschus- od. Perl-Hyaz., fr. mousse-grecque, e. muscary (d. Blüt. riech. nach Muskatnuss), Gärt.: M. botryoides Mill. Trauben-Hyaz., Träubel O. W., fr. lilas-de-terre, e. grape-flower (-hyacinth), moschatum W., monstruosum Mill. u. comosum L. Feder- od. Corallen-Hyaz. m. v. plumosum Hort.
- 1) **Muscipula** (sc. Dionaea) L. (Cistineen Droseraceen, X. 1) „Fliegenfalle“, fr. Dionée attrape-mouches, e. fly-trap. 2) **Muscip.** (sc. Silene) L. (Sileneen, X. 3) Fliegen-Leimkraut, e. fly-wort (v. musca Fliege u. capio fange, nicht Wtst.: „Mausfalle“, mus u. capio!).
- Musci** L., Juss., -cinēae Bisch., DC., Kl. d. Moose (Laubmoose, fr. mousses frondoses, Musci frondosi Hedw.), s. *Bryinae* Schimp. (muscus Moos).
- Mussaenda** L. (Rubiaceen Cinchonaceen, V. 1) Langschiene (ceylan'scher Name einer Art, M. frondosa L.), z. B. coccinea u. candida Poir. (*Macrocnemum* cocc. u. candidissimum R. Br.), lanceolata Spr. (*Manettia* l. Vahl) etc., s. auch *Rondeletia* u. *Gardenia*!
- Musschia** Don (Campanulaceen, V. 1) „Muschia“-Glockenblume (n. Jean Henri Mussche, schr. Catal. d. pl. du jard. bot. de la ville de Gand,

- 1810 u. Hort. Gandavensis 1817), Gewächsh. M. Wollastoni Lowe, s. Chrysangia Lk.
- 1) **Mutellina** G. (sc. Mēum) (Umbelliferen, V. 2) Alpen-Bärwurz, Köpernikel Grck., s. g. Muttern Diatr., fr. méon des Alpes, s. Phellandrium u. Ligusticum Crantz. 2) **Mutellina** (sc. Artemisia) (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Gletscher-Beifuss, s. Artemisia glacialis Jacq. (dem. Mutina Modena? — Mutellinae radix Offiz.).
- Mutisia** L. f. (Compos. Perdicieen od. Mutisieen, XIX. 2) „Mutisblume“ (n. d. südamer. Bot. Cölest. Mutis), z. B. Clematitis L. f., grandiflora Hb., Bpl., speciosa Ait. (Bras.), latifolia Don (Schlingstr. Chili) etc. — Mutisiaceae Less., DC., -siæae ds.
- Myagram** T., L. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) Hohldotter (μύαρος eig. Fliegenfänger v. μύα (-μία) Fliege u. ἄγροα Jagd, Fang).
- Myanthus** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Fliegenblume“ (s. eb. u. ἄρθο; Blume — d. Blüt. nach d. Verblühen wie plattgedr. Fliegen), M. cernuus Lindl. (Catasetum trifidum Hook.).
- Mycelis** Cass., DC. (zu Prenanthes Rchb.) (Compos. Cichorieen, XIX. 1) „Fliegenschmutz“-Salat (μύα Fliege u. πηλίζ Fleck, Schmutz — Bezieh. unklar!), z. B. ambigua Cass., muralis Rchb. s. angulosa Cass., s. Chondrilla mur. Wallr. (Cicerbita m.).
- Myceña** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Helmpilz Kumm. (v. μύκη; Pilz), z. B. pura, alliacea etc. (winzige Pilzchen) (zu Agaricus L.).
- Mycetes** Spr., Kl. d. Pilze (gr. μύκη; -ητος od. -ου Pilz, Schwamm).
- Mycophycæe** Ktzz., Endl. Ord. d. „Schimmel“- od. „Pilzalgen“, Algenpilze Seub., Schleimflocken, s. Phycomycetes de By. (μύκη; -ου u. φύχο; lat. fucus Alge).
- Mygalurus** Lk. (Gräser, III. 2) „Mäuseschwanz“ (v. μυγαλή Spitzmaus, οὐρά Schwanz), s. Festuca bromoides L. u. uniglumis Soland.
- Myginda** Jacq. (Sapotaceen od. Rhamneen, IV. 3) „Myginda“, Myrrhen-Stechpalme (n. d. Bot. Franz v. Mygind), M. uragoga L., Jacq. Zipfel-M. (Str. Südamer.) (v. οὐρά u. ἄγωγός Führer), s. Plex Myrsinitis s. myrsinoides Pursh.
- Myoetönium** (sc. Aconitum) Rchb. (Ranunculaceen, XIII. 3 od. 7) „Mäusetod“-Sturmhut (μύς; -νός Maus, κτόνος Mord).
- Myogalum** Lk. (Liliaceen, VI. 1) „Mäusemilch“, Stifflume (s. eb., γάλα Milch), s. Albuca Rchb. u. Ornithogalum (zu Gagea Ker).
- Myopörum** Sol., Banks (Polygalaceen od. Myoporineen, II. 1) „Mäuseweg“, -frass Leun. (s. eb. u. πόρος Durchgang — d. Blätt. durchsicht. punkt.!), z. B. Ampeln M. parvifolium, s. Pogonia glabra Andrz.
- Myosëris** Lk., Rchb. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Mäusesalat“ (s. v., σέρι; Salat), s. Borkhausia purpurea Böhm. u. Lagosëris taurica M. B.
- Myosotidium** Van Houtt. (Boragineen, V. 1) „Mäuseohrgleiche“ (Myosötis u. εἰδομαί gleiche), z. B. noble Van Houtt.
- 1) **Myosötis** Dill., L. (Boragineen, V. 1) „Mäuseohr“, Vergissmeinnicht, fr. gremillet, oreille de souris, e. mouse-ear (μύς; -νός u. οὐς, ὄτιος Ohr — Form u. Behaar. d. Blätt.!), z. B. Sumpfwies. M. scorpioides L. s. palustris With., fr. scorpione, aimez-moi, grémillet, ne m'oubliez pas, petit-bleu, oeil de perdrix etc., e. marsh-forget-me-not, mouse-od. scorpion-grass echtes Verg., Gärten: M. azorica Wats., Blendl. Impératrice Elisabeth (Hybr. v. azorica Wats. u. alpestris Schmidt), Rabatten M. sylvatica L. u. alpestris Schm. m. v. fl. albo (lithospermifolia Hornem.), e. alpine-forget-me-not. 2) **Myosötis** (sc. Agaricus s. Naucoria) Fr. (Pilze, XXIV. 4) Vergissmeinnicht- od. Schnitzel-Pilz, Rabhst. 3) **Myosötis** arvensis hirsuta Vaill. (Alsineen, X. 5), s. Cerastium vulgatum L. s. glomeratum Thuill.
- Myosürus** Dill., L. (Ranunculaceen, V. 6) „Mäuseschwanz“, fr. queue

- de souris, e. mouse-tail (s. v. u. οἰζὰ Schwanz — Form d. Fruchtbodens!), *M. minimus* L.
- Myriandra** Spach (subg. v. *Hypericum* L.) (Hypericaceen, XVIII. 2) „Tausendmann“-Hartheu (v. *μυρίοι* zehntausend, *ἀνὴρ*, -*δός* Mann — tausend Staubgef.!), z. B. *H. Kalmianum* u. *prolificum* L.
- Myrica** L. (Myricaceen, IV. 2 od. XXII. 4) Gagelstrauch, „Wachsbaum“, fr. myrique, e. gale od. dutch myrtle (gr. *μυρίκη* v. *μύρον* ausfliess. Balsamharz), Zier. *M. Gale* L., fr. mirte Galé od. -bâtard Ömyrte Wolff, pimento royal, e. candleberry-myrtle od. sweet-Gale, *M. cerifera* L. brabantier Myrte Viim., fr. Cérrier de la Louisiane, e. american candle-berry-Myrte, m. v. *latifolia* Ait. (*M. carolinensis* Mill.). — Myricaceae Rich., Grck., -ricæae Rich., Rchb. Gagelgew. Grck., Wachsbeeren Leun.
- Myricaria** Desv. (Tamaricaceen, XVI. 5) „Myricarie“, Wachsbaum, Tamariske, Kerzenbeerenstr., fr. cirier u. laurier sauvage (*μυρίκη* s. eb. = *Tamarix* der Alten!), z. B. Zier. *M. germanica* Desv. (*Tamarix* germ. L. s. *decandra* Mch.) gem. od. deutsche Tamariske, fr. *Tamaris d'Allemagne*, e. german Tamarisk, *M. dahurica* DC. sibir. Tamar. (*Tamarix* dah. W.), fr. *Tamaris de Sibérie*, e. dahurian myrtle.
- Myriophyllum** L. (Halorageen, XXI. 9) „Tausendblatt“, fr. mille-feuille aquatique (*μυρίοι* zehntausend, *πέλλος* Laub — Blätt. haarfein zerschlitzt!).
- Myristica** L. (Myristiceen, XXII. 13) Muskatnussbaum, fr. muscadier (noix-muscade), e. nut-meg (gr. *μυριστικὸς* wohlriechend, wie parfumierte Salbe riechend!), *M. officinalis* L. echte, gebräuchl. — Myristicæe R. Br.
- Myrobalana** (sc. *Prunus*) Lois. (Drupaceen od. Amygdaleen, XII. 1) Balsam- od. Kirschpflaume, fr. prunier Myrobalan od. Cerisette, e. myrobalan plum (v. *μύρον* Duftöl, *βύλαρος* Nuss etc.), s. *Prunus cerasifera* Ehrh., s. g. amerik. Kirsche.
- Myrobalanus** G., Lam., DC. (sc. *Spondias*) L. (Terebinthaceen, X. 5) „Balsam“- od. Purgierpflaume, Behennuss, fr. myrobalanier (s. eb.), s. *Spondias Mombin* Jacq. (non L.). — Myrobalanæe (sc. *Onagraceae*) Rchb.
- Myrodendron** Schreb. (Tiliaceen od. Humiriaceen, XIII. 1) „Balsambaum“ (s. v. u. *δέρδρον* B.), z. B. *amplexicaule* W., s. *Houmيريا* Juss.
- Myrosma** L., W. (Scitamineen, I. 1) „Balsam“-Gewürzlilie (s. v., *ὄσμη*) Duft — wohlriechend!), z. B. *cannaeformis* W. (*cannaefolia* Spr.), s. *Maranta Myrosma* A. Dietr.
- Myrospermum** Jacq. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Myrrhenkern“-Baum, Tolu-Balsam, „Balsamsamenbaum“ (s. v., *σπέρμα* Samen, Fruchtkern — haupts. im Stamm Balsam), *M. toluiferum* Spr., s. *Toluifera Balsamum* L. (*Myroxylon* tol. Rich.).
- Myroxylon** L. f. (-um Kth.) (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Balsamholz“ (s. v. u. *ξύλον* Holz — dies. von balsam. Geruch!), *M. toluiferum* Spr. (*M. Toluifera* Kth.) s. *peruiferum* L. f. peruvianischer Balsamb., s. *Myrospermum* tol. Spr. (s. eb.), *M. orbiculatum* Forst. u. *suaveolens* Forst., s. *Xylosma* Schreb. (XXII. 11).
- Myrrhis** Scop., Moris. (Umbellifer., V. 2) Süssdolge, Aniskerbel, fr. cicutaire odorante, cerfeuil musqué (*μυρρῆς* Myrrhe, würzig. Kraut), *M. odorata* Scop., Zier. *M. rosea* Spr.
- Myrsine** L. (Myrsineen od. Solaneen Ardisiaceen, V. 1) Myrrhen, Myrtenblume, e. myrrh (gr. *μυρσίνη* Myrte — ähnl. Belaubung), *M. africana* Berg. L., *M. Manglilla* W., s. *Bumelia* Sw. — Myrsinæe Bartl. i. q. Solanaceae Ardisiaceae Rchb.

**Myrsiphyllum** s. Myrtiphyllum!

**Myrtaceae** DC., Rchb., -tēae Rchb., -ti Juss., -tiflōrae Endl., Rchb., -tīnae Bartl., s. Myrtus.

**Myrtillus** (sc. Vaccinium) L. (Ericaceen od. Siphonandraceen Vacciniēen, VIII. 1) gem. Heidelbeere, Schwarzbeere O. W., eig. „Myrtchen“, fr. myrtille, brimbelle, maceret, bleuet, e. bilberry, hurtleberry (dem. v. Myrtus Myrte — Ähnl. d. Belaubung!).

**Myrtiphyllum** P. Br. (Myrsiph.-W.) (Melanthaceen od. Smilacaceen, VI. 3) „Myrtenlaub“ (μύρτος u. γρίλλος Laubblatt!), Zier. M. asparagoides W. (Spalier u. Ampel), s. Medeōla asp. L.

**Myrtus** L. (Myrtaceen, XII. 1) „Myrte“, fr. myrte, e. myrtle (mirtle) (gr. μύρτος v. μύρον ausfließ. wohlriech. Saft), Zier. M. communis L. m. v. v. (z. B. italica Mill., romana, baetica, tarentina etc. Mill.), M. leucocarpa Sm. (Griechenl.).

**Myūrus** Ehrh. (sc. Festuca) L. (Gräser, III. 2) „Mäuseschwanz“-Schwingel (μῦς, -νός Maus, οῦρά Schw.).

**Myxa** Blackw., Endl. (sc. Cordia) L. (Asperifolien od. Convolvulaceen, V. 1) schwarze Sebeste oder Brustbeere, ägypt. od. arab. Pflaume, e. assyrian plum (μύξα, -τα Pflaume od. Sebesten), s. Sebestēna offic. Blackw. „Sebestenbaum“.

**Myxaciūm** DC., Fr. (Pilze, XXIV. 4) Schleim-Hutpilz Kumm. (v. μύξα Schleim u. ἀκμή Spitze — Manschette klebrig! Wst.), z. B. muscosum, croceo-coerulēum etc., s. Agaricūm L.

**Myxogastēres** Fr. „Schleimbalgpilze“ (zu Ord. Myxomycētes Wallr.) (μύξα v. γαστήρ, -έως Bauch).

**Myxomycētes** Wallr. „Schleimpilze“ (s. v. u. μύζης, -ητος od. -ου Pilz).

1) **Naegelia** DC., Reg. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Nägeli“ (n. d. Prof. Nägeli in München), Stuben u. Sommergart. N. zebraīna Hort., cinabarina Lindl., amabilis Deesn. m. v. Cērise d'or. 2) **Naeg.** Lindl. (Pomaceen, XII. 4), s. Cotoneaster Med.

**Naematelia** (bess. Nemat.-) Fr. (Pilze, XXIV. 4) Zitterpilz, eig. „Gespinntverfertiger“ (νήμα Gespinnt, τέλειω vollende — Schlauchlager enth. ausser d. Spordien noch einen festen Körper), z. B. encephala etc., s. Tremella Dill.

**Nagassarium** Rumph. (Guttiferen, XVI. 8) „Nagasbaum“ (v. nagassaran Flöten der Bajaderen — d. Holz dazu lief. B.!), s. Mesua ferrea L.

**Nageia** (-ja) G. (Coniferen Taxaceen od. Myricaceen, XXII. 4) „Nagi“-Gagel (v. nagi, Name d. Str.'s in Japan, naga Beere), z. B. N. bracteata Krz. (Podocarpus br. Blum.).

**Najadēae** A. Rich., Rchb., -jādes Juss., LC. (zu Helobiae Endl.) Najaden od. Wassernymphen, s. sogl.

**Najas** L., W. (Fluvialen od. Helobien Najadeen, XXI. 1) „Najade“, Wassernymphe (gr. ναιῖς, Pl. ναιῖδες v. νάω od. νάω (ρέω) schwanke, schwimme), s. Fluviales Vaill., Mchx. u. Potamogēton Pluk.

**Napaea** L. (Malvaceen, XXII. 13) Sammetmalve, eig. „Waldthal“-M. (ναπαιοί in Waldthälern etc., Ναπαῖαι Waldthal-Nymphen, Wst.: zus. aus νῆ nicht u. παός hell!), z. B. N. laevis L. s. hermaphrodita L., s. Sida Nap. autt.

**Napellus** Riv., Dod. (sc. Aconitum) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) „Napell“-Eisenhut M.-Rchb., fr. napel, e. lark's-heel „Lerchensporn“, morion, casque, monk's-hood „Mönchskappe“ (dem. v. νάπη Nachen, nicht Wst. v. νάριος Rübe — weg. d. Wurzel!).

1) **Napoleōna** P.-B. (Belvisiaceen od. Olacineen, XIII. 1) „Napoleons“-

- Belvisie od. Passiflore (n. Napoleon I., Kais. v. Frankr.), z. B. N. imperialis P.-B. — Napoleonæae DC. 2) **Napoleōna** R. P. (Cyclantheen od. Pandaneen, XXII. 12), s. Phytelēphas R. P.
- Napus** T. (sc. Brassica) L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Reps (Raps) od. Kohlrübe, Kohlsaak,, fr. chou-navet, navette od. rabette, e. cole-rappe, navew (lat. napus, -i Steckrübe, gr. *νάπυ* od. *νάπλειον* Senf).
- Narcissus** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Narzisse“, Sternblume Seub., fr. narcisse, e. lily-daffodil, star-flower (-hyacinth) (n. Narcissus, dem in sich verliebten Jüngling, Myth. — blickte unt. sich in d. Quellspiegel, — nick. Blume!), Zier: N. poëticus L. Garten-Sternbl., fr. n. des poëtes, Cladinette, oeil de faisan etc., e. poët's-Narcissus, Pseudo-Narcissus L., s. g. Märzbecher u. Osterblume m. v. fl. pleno, Stuben: N. Tazetta L. Dolden-, Bouquet- od. Tross-N. m. v. v., incomparabilis Mill., odorus W., Jonquilla L. Jonquille od. Binsen-N. (Hermione Jongq. Haw. s. juncifolia Salisb. — v. jone, lat. juncus) m. v. fl. pl., N. minor L., fr. N. petit, e. smaller-N., calathinus L. s. reflexus Lois. etc. — Narcissæae Rehb. (-si Juss.) i. q. Amaryllidæae DC.
- Nardosmia** Cass. (zu Tussilago Rehb.) (Compos. Tussilagineen, XIX. 2) „Narden“ od. wohlriech. Hufblattich (*νάδος*; wohlriech. Narde, *ῥοσμή*) Duft — riecht der Valeriane Nardus ähnl.!), Zier. N. fragrans Rehb., s. g. Winter-Heliotrop d. Orangerien, s. Tuss. fragr. Vill.
- Nardurus** Rehb. (Gräser, III. 2) „Nardenschwanz“ (s. Nardus u. *οὐροὶ* Schwanz), s. Festuca tenuiflora Schreb. u. Micropyrum Gaud. „Kleinweizen“.
- 1) **Nardus** Moris. (Valerianeen, III. 1) Narde (gr. *νάδος*, indisch nard — besond. Geruch!), N. celtica Mor., s. Valeriana celt. L. 2) **Nardus** L. (Gräser, III. 1) „Narden“ od. Borstengras Seub., fr. nard, z. B. N. stricta L. „straffes“, indica L., fr. spicanard od. espicanardy, e. nard-spike. 3) **Nard.** Lob. (sc. Andropogon) L. (Gräser, XXIII. 1) Narden-Bartgras, N. Gangitis Lob. sc. scorpioides Lam., s. Monerma Gang., P.-B.
- Nartheçum** Möhring (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Beinheil, Sumpf- od. Ährenlilie Leun. (Anagramm v. Anthericum, Wtst.: v. *νάθηξ* Schaft — nackt. Schaft d. Blum.!), z. B. calyculatum Huds. (Tofieldia palustris Huds.) u. ossifragum Huds., s. Anthericum etc. L.
- Narthex** Falconer (Umbelliferen, V. 2), Stinkasant, s. g. Teufelsdreck *νάθηξ*. -zos Doldenpfl. Ferula, Rute od. Schlagstock!), N. Asa foetida Falc., s. Ferula Asa foet. L.
- Nasturtium** R. Br. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) Sumpf- od. Brunnenkresse, fr. laberte, cresson de ruisseau (- de fontaine), e. water-cresses (-parsley), balsamite, lady's-smock, nose-smart (st. nasitortium „Nasenprickler“), z. B. officinale R. Br. (Sisymbrium Nast. L.) „gebräuchl.“ od. Salat-Br.
- Natrix** Mnch. (sc. Ononis) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) gelbe od. „Ringelnatter“-Hauhechel (Natrix Zoologie = Ringelnatter, eig. „Schwimmerin“ — angebl. Wirk. geg. Schlangen).
- Naulea** L. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1) ostind. Gambirstrauch, Kino od. Bastard-Catechu (st. navicula od. naucella Napf, dem. v. navis Schiff — Kaps. nachen- od. napfförm.!), N. Gambir s. orientalis L., africana W. (Uncaria inermis W.) etc.
- Naucoria** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Schnitzelpilz Kumm. (v. naucus gering, Wtst. naucum Nusschale? vielm. nauci indeclin. Sattel inmitt. d. Nuss, nichts nütze! u. *δοάω* sehe — Wtst.: Manschette mit d. schupp. Hut verwachsen!), z. B. graminicola etc., s. Agaricus L.
- Nauenburgia** W. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Nauenburgsblume“ (n. d. bot. Autoren Joh. Sam. Nauenburg, schr. Lehrb. d. reinen Bot.,



- Hamb. 1798), *N. trinervata* W., s. *Brotēra Contrayerva* Spr. (*Flaveria repanda* Lag.).
- 1) **Naumburgia** Mch. (Primulaceen, V. 1) „Naumburgie“ (n. d. bot. Aut. Naumburg od. Nauenburg, s. eb.), *N. thyrsoflora* Mch. (*Lysimachia* th. L.). 2) **Naumburgia** W. = **Nauenburgia** W. (s. eb.).
- Nauplius** Cass. (zu *Bupthalmum* Rchb.) (Compos. Inuleen, XIX. 2) Gestirnblume, Wasser-Rindsauge (n. Nauplius, d. sternkund. Argonauten, v. *ναύς* Schiff u. *πλεῖω* fahre zu Schiff), *N. aquaticus* Cass., s. *Asteriscus* Mch.
- Navaretia** Rz. Pv. (Convulvaceen, V. 1) „Navarettie“ (n. Fr. Ferd. Navarette, k. span. Leibarzt, schr. üb. d. Natg. v. Granada), *Zier. N. cotulaefolia* Van Houtt., pubescens, involucrata Rz. Pv. (Chili) etc.
- Necessaria** L. (sc. Polygamia, XIX. Kl. 4. Ord.) „Notwendige“, d. i. Randblütchen fruchtbar, daher notwendig!
- 1) **Neckēra** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Necker's“-Astmoos (n. d. Bot. N. J. Necker in Mannheim), z. B. *N. heteromalla* Hedw. (*Daltonia* het. Spr.). 2) **Neckeria** Gm. (Paronychieen, I. 1) Necker's od. Pollich's-Feldknaul, *N. campestris* Gm., s. *Pollichia* c. L., Schreb. 3) **Neckeria** Scop. (Fumariaceen, XVII. 2) Necker's-Erdrauch.
- 1) **Nectandra** Berg., Roxb. (Gnidia L.) (Thymeläaceen, VIII. 1) „Honigbeutel“-Strauch (*νέκταο* u. *ἀνῆο*, -*δρόος* Mann, Bot. Staubgefäß), z. B. *N. Puchury* Nees u. Mart. Pichurimbohne, s. *Ocotea Pichurim* Kth. 2) **Nectandra** Rottb. (Laurineen, IX. 1) „Honigdrüsen“-Strauch (— 3 der Staubfäd. mit Honigdrüsen, Leun.), *N. sanguinea* Rottb., s. *Laurus* sang. Sw.
- Nectris** Pursh, Schreb. (Hydrocharideen, VI. 2) „Schwimmerin“ (*νέκτρις* — schwimmt auf d. Wass.!), z. B. *peltata* F. Müll. u. *aquatica* W. (Cabomba p. F. Müll. u. aq. Aubl.) schildblättr. u. Wasser-Haarnixe, *N. pinnata* Pursh, s. *Floerkia palustris* Nutt.
- 1) **Negundo** Mch. (sc. Acer) L. (Sapindac. Paullinieen, XXIII. 1) Eschenahorn (malabar. Name!), *Zierb. N. aceroides* Mch. s. *fraxinifolia* Nutt. = *Acer Negundo* L. m. v. v. (folio albo u. aureo-varieg. Hort.). 2) **Negundo** (sc. Vitex) L. (Verbenaceen, XIV. 2) „Negundo“-Müllen (*Legondium litoræum* Rumph.).
- Neillia** D. Don (Rosac. Spiräaceen od. Homalineen, XII. 4) (Gruppe v. Spiräa Lauché) „Neill's“-Spiräe (n. d. schott. Bot. Neill, schr. fruit-, flower- and kitchengarden, Edinb. 1840), *Zier. N. thyrsoflora* Don (Himal.) etc.
- Nelsonia** R. Br. (Scrophularineen, II. 1) „Nelson's“-*Acanthus* (n. d. Bot. Dav. Nelson, Cook's Begleiter, nicht Admiral Nelson Dietr.), z. B. *campestris* R. Br. (Neuholl.), *hirsuta* Röm. (*Justicia brunelloides* Lam.) etc. — *Nelsoniæ* (zu *Acanthaceæ*) Nees.
- Nelumbium** W., Juss. (Nymphaeaceen, XIII. 6) heilige Padma, prächt. *Nelumbo* od. *Lotusblume* Rmpl. (*nelumbo* d. Namen in Ceylon), *N. speciosum* W. — *Nelumbiæ* Endl., Kl. d. Lotusgewächse, -*bonææ* DC. *Nelumbien* Bartl.
- Nelumbo** T., G. (sc. Nymphaea) L. (Nymphaeaceen, XIII. 1) rosenfarb. Seerose, *N. nucifera* G., s. *Nymphaea Nelumbo* L., fr. *fève d'Egypte* (vaterl. Name in Ceylon!), s. *Nelumbium speciosum* W. (*Colocasia* der Römer, Ind. u. Ägypt.). — *Nelumbonææ* DC. *Nelumbien* Bartl.
- 1) **Nematanthus** Schrad., DC. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Fadenblume“ (*νημα*, -*ατος* Faden u. *ἀνθος* — d. Blume einzeln auf fadendünn. Stielen), *Treibh. N. chloronema* u. *ionema* Mart., s. *Columnea splendens* Hort. 2) **Nematanthus** Nees (Restiaceen od. Commelyneen, XXII. 3) Fadenblüten-Strickgras, s. *Restio viminalis* L. (— Blütendecke aus 6 Fäden).

- Nematophycæe** Rabhst. „Fadenalgen“ i. q. Confervæe Ag. (s. v. u. *φύκος* Tang od. Alge).
- Nemachonæe** Cass. (st. **Nematauch.**) (zu *Barkhausia* Rehb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Fadenhalsblume“ (s. v. u. *ἀβήνη*, *-έρος* Hals od. Nacken — Pappus haardünn), z. B. *aculeata* Cass. (Barkh. *aspéra* Rehb.), s. *Endoptëra* DC. u. *Crepis* L.
- Nemesia** Vent. (Scrophularineen, XIV. 2) Grossfrucht-Löwenmaul (gr. *Νεμέσια* v. *Νέμεσις*; Rachegöttin, Dioscor. Namen eines Löwenmauls!), *N. macrocarpa* Vent. (*Antirrhinum macroc.*), *bicornis* Pers. (*Antirrh. bic.* L.), *Zier. floribunda* Lehm. (affinis var. Benth.), *versicolör* E. Mey. m. v. *compacta elegans* Hort., v. *coerulea* u. *alba* Hort.
- Nemolapathum** Ehrh. (sc. *Rumex*) L. (Polygoneen, VI. 3) „Hain“- od. knäublüt. Ampfer M.-Rehb., s. *Rumex glomeratus* Schreb. (*ρέμος* Hain, Wiese, *λάταρον* Ampfer).
- Nemopanthes** Raf. (Aquifoliaceen, IV. 4) „Fadenblüte“, Berghülsen Lauch. (v. *νήμα* Faden, *άνθος* Ansehen, *άνθη* Blüte — Blüten auf fadendünn. Stielen), *N. fascicularis* Raf. s. *canadensis* DC. (*Prinos lucida* Ait.) etc., s. *Ilex canad.* s. *prunifolia* Mühlb.
- Nemophila** Benth., Bartl. (Boragineen Hydrophyllæen, V. 1) „Waldlieb“, Hainschönchen Leun., Triften- od. Hainblume Vilm. (v. *ρέμος* Hain u. *φιλος* Liebhaber — Standorte), *Zier.*: *N. insignis* Benth. m. v. v., *atomaria* Fisch., Mey. m. v. v. (*crambeoides* Hort. u. *cramb. maculata* Hort., *maculata* Benth., *discoïdalis* Hort. etc.), s. *Hydrophyllum* L., *Phacelia* Juss. u. *Eutöca* R. Br.
- Nenuphar** Hayne (Nymphæaceen, XIII. 1) Höllenkraut, Mummel, Nixblume, fr. *nénuphar* od. herbe d'enfer, e. *neneuhare* od. *nénuphar* (*nénuphar* persisch = nicht essbar!), *N. lutëum* Hayne, s. *Nuphar lutëum* Sm. (*Nymphaea* lut. L.).
- Neottia** L. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Nestwurz“ (*νεοττία* Nest — Wurzelfasern wie ein solches!), *N. nidus avis* Rich. „Vogelnest“, s. *Ophrys* L. u. *Spiranthes* Rich. — *Neottieæ* Lindl.: *Neottia*, *Listera*, *Epipactis* etc.
- Neottidium** R. Br., Schldl. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Nestähnliche“, Nestwurz (s. eb. u. *είδομαι* gleiche), *N. nidus avis* R. Br., s. *Neottia* nid. av. Rich. (*Ophrys* nid. av. L.).
- Nepenthæe** Lindl., DC. Kannenträger, Schlauch- od. Kannenpfl. Rmpl., s. sogl.
- Nepenthes** L. (Aroideen od. Nepentheen, XX. 3 od. XXII. 13) Kannentrauch, fr. *népente* od. plante distillante (gr. *νηπενθής* i. q. *νηπαθής* Leid verscheuchend), *Zier.* *N. destillatoria* L. (*Bandura zeylanica* Burm.), fr. *bandure*, *N. Phyllamphōra* W. „Blattkrug“ (— Form d. Blüte!), *N. Rafflesiana* Jack, *ampullaria* Jack (Singapore), *villosa* Hook. f. (Borneo) etc.
- 1) **Nepeta** L. (Labiaten, XIV. 1) Katzenminze, -kraut Vilm., „Nepte“ O. W., fr. *menthe de chat*, e. *cat-mint* od. *nep* (*nip*), z. B. *N. Cataria* L., *Zier.* *N. macrantha* Fisch., *Meyeri* Benth. (*micrantha* Nees) (v. *Nepete* jetzt *Nepi*, Stadt in Etrurien, wo häufig wild! Wtst.), s. *Melissa*, *Thymus* u. *Teucrium*. — *Nepetæe* Rehb. 2) **Nepeta** (sc. *Melissa*) L. (Labiaten, XIV. 1) katzenminzart. Schönminze, s. *Calamintha Nepeta* Sm.
- Nephelium** L. (Sapindac. od. Urticac. Gunneraceen, XXI. 5) „Kletten“-Seifenbeere (*νεφέλιον* dem. v. *νεφέλη*; Wolke, alt. Namen der *Bardana* — Frucht hakig, wie Klette), *N. lappacëum* L. *Litschibaum* od. *Zwillingspflaume*, s. *Euphoria Nephelium* DC.
- Nephrodium** Rich., Mchx. (Farne, XXIV. 1) „Nieren“-F. (*νεφροδής*; nierenartig — Form d. Fruchthaufen), z. B. *articulatum* Hort.

- Nephrolépis** Schott (Farne, XXIV. 1) „Nierenschuppen“-F. (*νεφροδῆς* Niere, *λεπίς* Schuppe — d. Indusium nierenf.), z. B. *exaltata* Schott, *tuberosa* Presl, etc.
- Neptunéa (-nia)** Lour. (Mimoseen, XXIII. 1) „Neptun's“- od. Wasser-Mimose (n. d. Gott d. Meeres Neptun — d. Pfl. wächst im Wasser), *N. oleracea* Lour., s. *Mimosa* s. *Desmanthus natans* W.
- Nerine** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Nerine“-Narzisse (n. d. Nereide Nerine od. v. *νηρόδης* wasserliebend), Zier. *N. undulata* Herb. (*Amaryllis crispata* Hort.), *sarniensis* Herb. (*Amar. sarn. L.*) „Guernsey“-Lilie (Stubenbl. d. Vorwinters).
- Nerium** L. (Apocynen, V. 1) Oleander, Lorbeerweide, Rosenlorbeer (Lorbeer-Rose), fr. fleur de St. Joseph, oléandre, rosage, e. oleander, rose-bay (gr. *νηρίον* v. *νηρόδης* wasserliebend!), Zier. *N. Oleander* L. m. v. v. (z. B. fl. pleno u. fl. albo, splendens fl. pl.) etc.
- Nertéra** Sol., Banks (-ia G., Sm.) (Rubiace. od. Alsineen, IV. 2) „Nertere“ od. Gomozie, Sumpfranke D. (v. Eigennamen? od. *νεοτεροδῆς* unten — nied. Wuchses, steckt m. d. Stengeln in Sumpf), Zier. *N. depressa* G. (*Gomozia granadensis* L. Granadabeeren-Sträuchlein), *N. tetrasperma* H. B. K. s. *assurgens* P.-Thou., s. *Erythrodanum alsineforme*.
- Nesléa (-lia)** Desv. (Cruciferen Nucamentac., XV. 1) Rispen- od. Hohl-dotter Leun., Dötterlein Ö. W., Finkensame (n. d. franz. Bot. J. A. N. de Nesle, schr. *Introd. à la Bot. Poitiers*), z. B. *N. paniculata* Desv., s. *Myagrum* T.
- 1) **Nectouxia** H. B. K. (Solaneen, V. 1) „Nectouxie“ (n. d. Bot. Aut. Hipp. Nectoux, schr. *Diss. de Cassiis aegypt. u. Voyage dans la haute Egypte, 1808*), *N. formosa* Kth., s. *Atropa arenaria* W. 2) **Nectouxia** DC. (Cruciferen).
- Neuendorffia** Adans. (Solaneen, V. 1) peruvian. Schellenblume (n. Neuendorff, von dem Adanson nichts Näheres mitteilt), *N. peruviana repens* Ad., s. *Nolana prostrata* L.
- 1) **Neumannia** Brongn. (Bromeliaceen, VI. 1) „Neumann's“-Ananaspl. (n. K. Fr. Neumann, Herausg. v. Marco Polo's Reisen, 1845, Wtst.: n. d. Obergärtn. Neumann in Paris), s. *Pitcairnea l'Hér.* 2) **Neum.** Rich. (Bixaceen).
- Neurocarpum (-us)** Desv. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Nerven-hülse“ (v. *νευρά* Nerv etc., *καρπός* Frucht — jed. Hülsenklappe mit einem Längsnerv), *N. guianens.* Desv., s. *Crotalaria* g. autt.
- Neuroptëris** Brongn. (foss. Farne, XXIV. 1) „Nerven“-F. (s. eb. u. *πτερίδης* Farn).
- Nicandra** Ad., Juss., G. (Solaneen, V. 1) „Nicanderblume“, „Männersieg“, Gift-Blausaum, -beere Grck. (n. d. griech. Arzt Nicander in Colophon, 16) v. Chr., od. v. *νικάνω* besiege, *ἀνήρ*, -*δός* Mann — als Gift!), Zier. *N. physaloides* G., e. winter-cherry-like *N.*, s. *Atröpa phys. G.* u. *Calydermos* R. P. (nicht Lag.).
- 1) **Nicotiana** T., L. (Solaneen, V. 1) Tabakpflanze, fr. tabac od. herbe au Grand-Prieur (- à l'ambassadeur, - à la reine), e. tobacco, nictotian (n. d. franz. Gesandt. am portug. Hof Jean Nicot aus Nimes um's J. 1585), Gärt. *N. rustica* L. Bauern-T., fr. tabac rustique od. faux-tabac, *N. havanensis* Lag. (*virginica* Hort.) s. *Tabacum* L., m. v. v., gem. od. Havanna-T., e. true-tabacco, *N. latissima* Mill. s. *macrophylla* Spr. (*Tabacum* L. v. *macroph.* Schrk.) u. *gigantëa* Hort. „Riesen“-T., Maryland-T., Baumkanaster, *N. glauca* Grah., *N. longiflora* Cav. (*angustifolia* R. P.), sehr dekorativ *N. Wigandioides* Hort. 2) **Nicot.** Schreb. (Gentianeen, V. 1).
- Nidularia** Bull. (Lycoperdac.-Pilze, XXIV. 4) „Nestchen“, Teuerling Kumm. (dem. v. *nidus* Nest — nach d. Öffnen gleicht d. Pilzchen

- einem Nestchen mit Eiern darin, näml. m. den Peridiolen! Kumm.), z. B. Olla u. crucibulum Topf- u. Tiegel-N.
- Nidularium** Sm. (Bromeliaceen, VI. 1) „Vogelnest“-Bromelie, Blütennest-Perring (v. nidulum Nestchen — Blütenform!), Stuben: N. fulgens Lem. (Guzmania picta Rz. Pv.), Scheremetiewii Reg. etc.
- Nidus avis** (sc. Ophrys) L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Nestwurz od. „Vogelnest“, fr. nid d'oiseau (nidus Nest, avis Vogel), s. Neottia n. av. Rich.
- Nierembergia** Rz. Pv. (Solaneen, V. 1) „Nierembergie“ (n. d. span. Jesuiten u. Prof. Joh. Euseb. Nieremberg, † 1663), Zier. N. gracilis Hook. (Buen-Ayres), calycina, frutescens Dur., N. punicea Hort. (Petunia violacea Lindl.) m. v. v. etc., s. Leptoglossis Benth., Salpiglossis R. P. u. Petunia Juss.
- Nigella** T., L. (Ranunculaceen, XIII. 5) „Schwarzkümmel“, fr. nielle u. nigelle, toute-épice, e. bishop-wort u. fennel-flower (nigella dem. v. nigra — schwarze Samen!), Acker: N. arvensis L., fr. nielle des champs, poivrette, Gartenzier. N. damascena L. m. v. nana Hort., s. g. Jungfer im Grünen od. Grethchen im Busch, fr. cheveu de Vénus etc., e. love in a mist, N. hispanica L. m. v. atro-purpurea Hort.
- Nigritella** Rich. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Schwarzstendel“ Seub., Braunelle (v. nigritia Schwärze — schwarzrote Blüt. einiger Arten), z. B. angustifolia Rich. (Satyrium nigrum L., Alpen), globosa Rchb. (Orchis gl. L., Traumsteinera gl. Rchb.).
- Nil** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulaceen, V. 1) arabische od. Nil-Winde, fr. liseron Nil, - de Michaux, étoile du matin (nil d. arab. Name, nicht Fluss Nil! Linné), s. Ipomoea Nil Roth (Pharbitis Nil Chois.) himmelblaue Trichterwinde.
- Nipa** Thb. (Palmen, XXI. 1) Molukken-Strauchpalme (Name auf den Molukken!), z. B. fruticans Thb.
- Niphaea** Lindl. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Schneeglume“ (v. νῖψ, -γοζ Schnee — schneew. Blütenhaufen), Treibh. N. albo-lineata Hook., rubida Hort. u. Roezlii Reg.
- Niphobolus** Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Schnee“-F., Sternhaar-F. (νιφόβολος m. Schnee beworfen — d. Wedel unten schupp. weissfilzig), Kalth. N. Lingua Spr. (Jap.), adnascens Kaulf. (Cyclophorus Desv.), s. Polypodium adn. Sw.
- 1) **Nissolia** T. (sc. Lathyrus) L. (Legumin. Viciaen, XVII. 4) „Nissolle's“-Blatterbse (n. Guill. Nissolle in Montpellier, † 1735). 2) **Nissolia** Jacq. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Amarant-Cayenneholz, blaues Eben- od. Luftholz, N. arboræa Jacq.
- Nitella** Ag. (zu Chara Rchb.) (Characeen, XXI. 1) „Armleuchter“ (nitella Leuchter v. nitēo leuchte), z. B. flexilis Ag., tenuissima Desv., gracilis Sm. etc., s. Chara L.
- Nitraria** L., Schreb. (Aizoideen Tetragoniaceen od. Tamariscineen, XI. 1) „Salpeterstrauch“ (gr. νίτρον, lat. nitrum Salpeter — wächst in salz. Wasser Sibiriens, z. B. tridentata Desf. (Casp. Steppe), Schoberi L. (Osýris Gm.).
- Nobla** (Nobula) Ad. (sc. Phyllis) L. (Cinchonaceen, V. 1) „Noblastrauch“, canarischer Baldrian (schwerl. fr. noble, lat. nobilis edel, sondern vaterl. Name!), s. Valerianella canariensis frutescens Pluk., simpla Nobla Dill.
- 1) **Noccaea** Rchb. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Nocca-Täschelkraut“ (n. Domenico Nocca, Prof. in Pavia geg. Ende d. 18. Jahrh.'s), s. Thlaspi. 2) **Nocca** Cav. (Noccaea Cass., Jacq.) (Compos. Rolandreen, XIX. 3), s. Lagascea W., z. B. helianthifolia Cass.

- Noisettia** H. B. K. (Violaceen, V. 1 od. XXI. 6) „Noisette's“-Veilchen (n. d. franz. Züchter Léon Claude Noisette, schr. u. a. Le jardin fruitier 1821, 1832/39), z. B. *frangulaefolia* Kth. (Kletterstr. Südamer.), *Roquefeuillana* St. Hil. (*Anchietea* Roq. St. Hil.) etc., s. *Ionidium* u. *Viola longifolia* Hort.
- Nolana** Sw., L. (Solaneen, V. 1) „Cymbelblume“ (v. nola Glöckchen etc. — Blütenform), Zier. N. *prostrata* L., fr. *Nolane couchée*, s. *Teganium procumbens* Schmid. (*Walkeria* Ehret., *Neuendorffia repens* Ad.), *paradoxa* Lindl., fr. N. *paradoxale*, Ampel N. *atriplicifolia* D. Don s. *grandiflora* Hort. m. v. fl. albo Hort., *lanceolata* Miers (*Sorema* l. Miers) etc.
- Nolanea** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Glockenpilz“ (s. eb.), z. B. *pascua*, *fumosa* etc., s. *Agaricus* L.
- Noli tangere** (sc. *Impatiens*) L. (Balsamineen, V. 1 od. XIX. 6) wilde Balsamine, Kräutchen „Rühr' nicht an“ (noli wolle nicht, tangere berühren — d. Samenkapseln springen bei Berühr. auf!).
- Nonnea** Med. (Boragineen, V. 1) „Nonne'sblume“, Brauntrichter, -blasenkelch, Ruzelnüsschen Leun., Näpflein O. W. (n. d. Bot. J. Ph. Nonne in Erfurt, schr. üb. *Secale* 1764), z. B. *arvensis* DC. etc., s. *Anchusa* u. *Lycopsis* L.
- Nopaléa** (Cactéae) DC. (Cacteen, XII. 1) Cactusgewächse, z. B. *Nopal sylvestre* Thierr.-Menonville *Cocheniellen-Cactus* od. „Wald-Nopal“, s. *Cactus coccinellifer* L. (d. mexik. Name d. Pfl. *nopal-nochotzli*).
- Norantëa** Aubl. (Guttifer. *Marcgraviaceen*, XIII. 1) „Norante“-Gummibaum (aus d. vaterl. Namen bei den Galibis *gonora-antegri* geb.), N. *guianensis* Aubl. — *Norantëa* Choisy.
- Nordmannia** Fisch., Mey. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Nordmann's“-Seidelbast (n. A. v. Nordmann). 2) **Nordmanniana** (sc. *Picea*) Loud. (Coniferen, XXI. 9) „Nordmann's“-Tanne od. *Kaukasus-Edeltanne*.
- Nostoc** Vaill., Vauch. (Algen od. Nostochineen, XXIV. 3) Gallertalge, Zittertang, Schleimling Leun., fr. *fleur du ciel*, e. *nostock* (v. *νοστις* od. *ροστις* Nässe), s. *Tremella Nostoc* Pers. (*Linckia Nostoc* Roth). — *Nostochaceae* Endl., Rabhst., -*chinae* Rehb.
- Notochlaena** R. Br. (bess. **Nothochlaena**) (Farne, XXIV. 1) „Bastardrock“, Trugfarn Rmpl. (v. *νόθος* unecht, *γλαίνα* Oberkleid — d. *Indusium* durch Borsten vertreten), z. B. *Terrarien* N. *candida* u. *rufa* Presl (*Acrostichon bonariense* W.).
- Notorrhizëa** DC. „Rückenwurzler“ (sc. *Cruciferae* — hinsichtl. d. Samenkeime!) (v. *νότος* Rücken u. *ρίζα* Wurzel).
- Notylia** Lindl. (Orchideen *Malaxideen*, XX. 1) „Rückenhöcker“-O. (s. eb. u. *τύλη* Höcker, Wtst. *ἕλη* Basis), z. B. *multiflora* Lindl. etc., s. *Pleurothallis* R. Br. „Seitenblüt“-O. (— nur 1 Stengelblatt, in dess. Achsel d. gehäuften Blüten).
- Nucamentacëa** DC. (sc. *Cruciferae*) Nusschötchenträger (*nucamentum* v. *nux*, -*cis* Nussfrüchtchen).
- Nuculiferae** Endl. „Nüsschenträger“, i. q. *Asperifoliae* (*nucula* dem. v. *nux*, -*cis* Nüsschen).
- Nuga** (sc. *Guilandina*) L. (Cassieen *Cäsalpinieen*, X. 1) „Stachelblatt“-*Cäsalpinie*, s. *Caesalpinia Nuga* R. Br. u. *Nugaria* DC. (v. *νύγω* steche — Stacheln an d. Blättern! Wtst.: v. *nugae* Kleinigkeiten, Rumpf beschr. d. Baum unter d. Namen *nugae sylvarum*; bei *Plinius* *Nuga* eine d. *Intybus* ähnl. Pfl.!).
- 1) **Nummularia** (sc. *Lysimachia*) L. (Primulaceen, V. 1) „Pfenningkraut“, „Münzkr.“ O. W., Nabelkr. u. Egel-Felberich O. W., fr. herbe aux deniers (- aux écus), monnoyère, e. money-word, buck-weed, pennywort (-rot), wild u. Ampeln (v. *nummus* Münze — runde Blätter!).
- 2) **Nummularia** Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Pfenningpilz“ (— weg. d. Form!).

- 3) *Nummularia lactea minor* Rumph. (Asclepiadeen, V. 2), s. *Dischidia nummularia* R. Br.
- Nuphar** Sibth., Sm. (Nymphäaceen, XIII. 1) Nixblume, Mummel O. W., Teichrose Seub. (n. Paxton v. naufar d. i. blau glänzend, arab. Wort für *Nymphaea*, n. Leunis: *nenuphar* v. ne nicht, *nuphar* essbar! od. aus *νυμφάειον* dem. *νύμφη* Nympe, Nixe!), Zier. N. album Hort. (*Nymphaea* s. *Castalia alba*), fr. blanc d'eau, *nénuphar blanc*, e. waterrose, N. luteum Sm. (*Nymph. lutca* L.) s. g. grosses Butterfass, gelbe Kannenblume — Form d. Frucht!
- 1) **Nuttallia** Dicks., Bart. (Malvaceen, XVI. 5) „Nuttall's“-Malve (n. d. nordamer. Prof. Thom. Nuttall), z. B. *digitata* Dicks. (*Sida dig. Spr.*), s. *Callirrhoe* Nutt. 2) **Nuttallia** DC. (Aquifoliaceen, IV. 4). 3) **Nutt.** Torr. u. Gray (Rosaceen, XII. 4).
- Nux vomica** (sc. *Strychnos*) L. (Apocynen, V. 1) „Brechuss“ (nux Nuss, vomicus brechenerregend, v. vomo breche mich).
- Nyctagineae** DC., Rchb., -gines Juss. „Nyctagineen“ (zu Ord. *Fagopyrinae* Bartl.), s. sogl.
- Nyctägo** Juss. (Fagopyrineen *Nyctagineen*, V. 1) „Nacht“- od. Wunderblume, fr. *nyctage*, belle de nuit (v. *νύξ* - *νίξ* Nacht — öffnet sich in d. Nacht, fr. belle de nuit!), Zier. N. *hortensis* Juss. (*Mirabilis Jalapa* L.) gem. Wunderbl., N. *longiflora* DC. (*Mirab. long.* DC.) m. v. *violacea* Hort.
- Nyctanthes** L. (Sapotac. Jasmineen, II. 1 od. XXII. 1) „Nachtblume“ (s. eb. u. *ἀνθή* Blüte — wie vorh.!), z. B. N. *arbor tristis* L. Trauerbaum (*Scabrita* od. -tes *scabra* L.), *pubescens* Retz. (*Jasminum* p. W.).
- Nycteria** D. Don, Benth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Nacht-Leberbalsam“ (nicht etwa v. *νυκτερινός* nächtlich, sond. *νύξ* - *νίξ* Nacht u. *ἐρινός* lat. *Erinus* — schwärzl. aussehend), Zier.: N. *selaginoides* Benth. (*Erinus* sel. Thb.) u. *capensis* Benth. (*Erinus cap.* L.) s. *lychnidea* L.), s. *Selago Lychnidea* L. f.
- Nymphaea** L., Neck. (Nymphäaceen, XIII. 1) Teich-, See- od. Wasserrose, -lilie, Kandel O. W., fr. lis d'eau, *nénuphar* u. plateau, e. waterrose (-lily) (*νυμφαία* od. *νύμφη* Nympe, Nixe), z. B. N. *alba* L. (*Castalia* a. Lk.) m. v. v., N. *lotus* L., N. *lutca* L. (*Nuphar lutcum* Sm.) gelbe Nixblume, Kellerwurz, gelbe Kannenblume, gross. Butterfass Vilm., N. *odorata* Ait. (N.-Amer.) u. *nitida* Sims (Sibir.), *versicolor* Roxb. (Ind.), *coerulea* Savigny (Afr.), *ampla* DC. (Amer.) etc. — *Nymphaeaceae* Bartl., DC. etc.
- Nymphoides** T., Fisch. (sc. *Menyanthes*) L. (Gentianeen, V. 1) Seekanne (*Nymphaea* u. *εἶδομαι* gleiche), s. *Limnanthemum peltatum* Gm. s. *nymphaeoides* Lk. seerosenart. Seekanne Grck. (*Villarsia* n. Vent., *Schweykerta Nymphoides* W., Gm.).
- 1) **Nyssa** L. (Santalaceen od. Hamamelideen, XXIII. 2) „Nyssa“- od. *Tupelobaum* Rümpl. (gr. *Νύσσα* Nam. einer Wassernympe), z. B. N. *aquatica* L. s. *denticulata* Catesb. (biflora Mchx., *integrifolia* Ait.), fr. *nyssa aquatique* „Wasserbaum“, e. water-Tupelo-tree (*Tupelo* d. amer. Name!). 2) **Nyssa** R. Br. (Combretaceen, VIII. 1) „Nyssa“-Langfaden, s. *Combretum* Loeffl.
- Nyssanthes** R. Br. (Amarantaceen, XXI. 5) „Stechamarant“ (v. *νύσσα* steche, *ἀνθή* Blüte — deren Abschnitte sind stachlig! Wtst.).
- Obaejaca** Cass. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) (zu *Senecio* L.) Wald-Greiskraut (-Kreuzkr.), z. B. O. *sylvatica* Cass., s. *Senecio silvaticus* L. (*Anagramm* v. *Jacobaea*!).
- Obeliscaria** Cass. (zu *Rudbeckia* Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Säulen“- od. „Obeliskblume“ (gr. *ὀβελίσκος* Spitzsäule, Obelisk

— ähnl. erhöhter Blumenboden!), z. B. pinnata Vent., triloba L. etc., Zier. O. pulcherrima DC. (Tex.) m. v. atro-sanguinea u. aurantiaca Hort.

**Oberonia** Lindl. (Orchideen Malaxideen, XX. 1) „Oberon's“-O. (n. d. Zaubergott Oberon!), z. B. longibracteata Ldl., anthropophora Ldl. (Ostind.), spathulata Ldl. (Malaxis equitans Blum.) etc., s. Cymbidium, Dendrobium etc.

**Obione** G. (Chenopodiaceen, XXI. 5) Keilmelde, Salme O. W. (aus Obi, sibir. Strom u. ὄνη Waare etc. geb. Wort!), z. B. portulacoide s Moq.-Tand. (Atriplex L. s. Halimus Wallr. port.), muricata G. (Atriplex sibiricum L.) etc., s. Diötis Schreb. „Zweiohr“-Melde.

**Obstruthium** s. Ostruthium!

**Ochna** Schreb. (Simarubeen od. Ochnaceen, XIII. 1) Nagelbeere, z. B. parvifolia Vahl (Evonymus inermis autt.) (Str. Arabiens) (v. ὄχνη wilde od. Wurgbirne — Ähnl. m. Birnblättern!). — Ochnaceae DC. (zu Rutaceae Simarubäe Rehb.).

**Ochrus** Pers. (Legumin. Vicien, XVII. 4) „Blass“- od. „Ocher“-Erbse, s. g. italienische E., fr. ocre (ochre), s. Pisum Ochrus L. (Lathyrus Ochr. DC.) (v. ὄχρος Blässe, bleiche Farbe — gelb. Mark ders.).

**Ocimum** (nicht **Oeynum**!) L. (Labiaten, XIV. 1) Basilienkraut, wohlriech. Basilikum, fr. basilic, e. basil (gr. ὄξισμον v. ὄζω rieche), O. gratissimum L., fr. marjolaine rouge, O. Basilicum L. m. v. violaceum Hort.

**Octandria** L., VIII. Kl. „Achtmännige“ (ὀκτώ acht, ἀνήρ, -δρός Mann, Staubgefäß).

**Octomeria** Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Achtstück“-O. (s. eb. u. μηρόν Hüfte etc. od. μηρός Lende — 8 Pollenmassen), s. Dendrobium Sw.

**Oculus Christi** (sc. Inula) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Christusauge“, Christaugen-Alant M.-Rehb.

**Oeynum** s. Ocimum!

**Odontia** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Zahnpilz“ (ὀδούς, -όντος Zahn — Stacheln d. Hutes!), z. B. fimbriata, barba Jovis etc., s. Hydnum L.

1) **Odontites** Spr. (sc. Bupleurum) L. (Umbellifer., V. 2) gelbhüll. Hasenohr M.-Rehb., O. luteola Spr. (Bupl. odont. L. s. aristatum Bartl.) (— Hüllblättchen spitz!). 2) **Odontites** Hall., Pers. (zu Euphrasia Rehb.) (Scrophularineen, XIV. 2) „Zahntrost“ Leun., roter Augentrost, z. B. O. rubra Pers., verna Bellard., lutea Rehb. etc., s. Euphrasia etc. u. Bartsia L. (v. ὀδούς, -όντος Zahn — geg. Zahnweh).

**Odontoglossum** H. B. K. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Zahnzunge“ (s. eb., γλώσσα Zunge — Labell genagelt u. an d. Bas. m. Kamm versehen), z. B. Hallii Lindl. u. Bictoniense Lindl. (Guatem., prächtig!).

**Oedera** Crantz, L. (-ia DC.) (Compos. Inuleen, XIX. 5) „Oeder's“-Rindsauge (n. d. Prof. Oeder in Kopenh.), O. prolifera L. (Buphthalmum capense L. f.), aliēna L., hirta Thb. (Str. Cap) etc.

**Oenanthe** Lam. (Umbelliferen, V. 2) (Rebdolde, Pferdesaat Grck., Würzlering O. W. (gr. οἶνος Wein, ἀνθή Blüte — weg. d. Geruchs!), O. pimpinelloides L., fr. méchon, etc., s. Phellandrium L.

**Oenocarpus** Mart. (Palmen, XXI. 11) „Weinfrucht“- od. Most-P., Wein-P. Rmpl. (s. eb. u. ζαφρός Frucht — aus dies. in Brasil. Wein bereitet, s. g. Batava), O. Bacaba Mart. u. Batava ds.

**Oenothēra** L. (Onagreen, VIII. 1) Nachtkerze, „Weinblume“ Seub., fr. énothère, e. evening-Primrose (gr. οἶνοθήριος Blume, deren Wurzel v. Weingeruch!), Zier u. verwild. O. biennis L. Garten-Rapunzel Vilm, fr. én. bisannuelle, Onagre commun, Jambon des Jardiniers etc., e. biennial ev. Pr., tree-Pr., O. taraxacifolia Sweet

- s. *acaulis* Cav. (*Lavauzia mutica* Spach), *tetraptëra* Cav. (*Hartmannia macrantha* Spach), *serotina* Sweet, fr. én. tardive od. d'automne, glauca Mchx. (Mississippi), *Fraseri* Pursh (N.-Amer.), *Drummondii* Hook. m. v. v., *versicolor* Hort. (*campylocarpa* Hort., -calyx Koch, Bouché), *grandiflora* W., *Lamarekiana* Ser. s. *grandiflora* Lam. (non W.), *Sellovii* Lk. Otto, *Bistorta Veitchiana* Hort. (*Holostigma Bottaë* Spach s. *Bistorta* Nutt., *Veitch*, *Sphaerostigma bistortum* Walp.) etc. — *Oenotheræae* (sc. *Onagræae*) Rchb.
- Oglifa** Cass., Less., DC. (zu *Gnaphalium* Rchb.) (Compos. Gnaphalieen, XIX. 4) Feld-Fadenkr. (eins d. Anagramme v. *Filago*! vgl. *Gifola*), s. *Filago arvensis* L.
- Ohlendorffia** Lehm. (Scrophularineen, XIV. 2) „Ohlendorff'strauch“ (n. Dr. Chr. Friedr. Ohlendorff aus Holstein, † auf St. Croix), *O. procumbens* Lehm. (Cap).
- Oidium** Lk. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Eischimmel“, Traubenpilz, *O. Tuckeri* Lk. (*ὄϊον* Ei u. *εἶδομαι*).
- Olacinéae** DC. (zu *Sapotacæae* *Styracæae*) Rchb. Stinkholzartige, s. *Olax*.
- Olax** L. (Olacineen od. Sapot. *Styracineen*, III. 1) Kot- od. „Stinkholz“ (*olax* v. *oleo* rieche, nicht n. *Paxton* v. *ὄλαξ* od. *αἰλαξ* Furche!), *O. zeylanica* L. (B.), *psittacorum* s. *Fissilia psitt.* Lam.
- Olbia** Med., DC. (zu *Lavatera* Rchb.) (Malvaceen, XVI. 6) „Olbia“-*Lavatera* (*Lav. Olbia* L.), fr. *Lavatière d'Hyères*, e. downy-leaved mallow (*Olbia* = *Hyères*, Inseln bei der Provence, wo vorkommend!).
- 1) **Oldenlandia** L. (*Saxifrageen* od. *Cinchonaceen*, IV. 1) „Oldenland'strauch“ (n. d. dän. Reisend. H. B. Oldenland, † 1700 in Südafr.). Garten: *O. Deppeana* DC., s. *Hedyotis* L., *O. biflora* L., s. *Antirrhinum humile* etc. *Burm.*, *O. paniculata* L., s. *Mollugo zeyl.* etc. *Burm.* 2) **Oldenlandia** Plum. (*Onagreen* *Jussieueen*, X. 1), *O. aquatica* P. Br., s. *Isnardia palustris* L.
- Oldfieldia** Benth. (*Euphorbiaceen*, XXI. 1) afrik. Teakbaum, afrik. Eichenholz (n. d. engl. Bot. Oldfield).
- Oleá** L. (*Sapotac. Oleaceen*, II. 1) Öl- od. Olivenbaum, fr. *olivier*, e. olive-tree (lat. *oleá* = gr. *ἐλαία*, celt. *olew* od. *eol* Ölbaum), cultiv. *O. europaea* L. gem. Ölbaum, Treibh. *O. fragrans* Thb. (*Osmanthus* fr. *Lour.*), *O. malabarica* autt. *Nimbobaum*, fr. *carabou*, *O. Oleaster* Lk. wild. Öl. (Griechenl., Paläst.). — *Oleacæae* Lindl., -*eïnæae* Lk., DC., -*eïnæae* Rchb. (zu *Ord. Ligustrinæ* Bartl.).
- Oleander** (sc. *Nerium*) L. (*Apocynen*, V. 1) *Oleander* etc., s. *Nerium*! (aus *Olea* u. *ὄριος* Strauch, *Wtst.* -*ander* bedeutet. *ἀνδροειος* männlich, kräftig).
- Oleaster** Hoffmg., Endl. (*Oleaceen*, II. 1), s. *Oleá*! (deter. *Oleá* Ölbaum), wilder Öl., fr. *olivier*, *olivier sauvage*, e. *oleaster*.
- Oleracæae** Endl., Kl. d. „Gemüsegewächse“ (*olus*, -*eris* Küchenkraut, Gemüse).
- Ollaria** (sc. *Lecythis*) L. (*Lecythideen*, XIII. 1) Topf- od. Topffruchtbaum (olla Topf — Ähnl. d. Frucht damit!), s. *Jacapucaya* *Marcgr.*
- Olyra** L. (Gräser, XXI. 3) *Einkorn*, *Amelkorn*, *Emmergras*, s. g. *Blicken* (gr. *ὄλυρα* Getreide, *Einkorn*, *Wtst.* v. *ὄλυω* gelte wenig, bei *Homer* *Gerste* für d. *Pferde*!), *O. latifolia* L. (*Jamaica*), *arundinacæa* Hb. (*Peru*) etc. — *Olyræae* *Nees*.
- 1) **Omphalëa (-ia)** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Nabelschwamm“ (*ὄμφαλός* Nabel), z. B. *ostreata* Fr. (*Agaricus ostr.* s. *dimidiatus* Bull.) *Austernschwamm*, *Buchen-*, *Drehling-*. 2) **Omphalëa** L. (*Euphorbiaceen*, XXI. 3) „Nabel“-*Wolfsmilch*, *Grübling* D. (— *Staubgef.* auf einem fleisch. Nabel), s. *Omphelandria* P. Br.
- Omphalobium** G. (*Terebinthac.* *Connareen*, XVI. 5) „Nabellappen“ (s. eb. u. *λοβόν* dem. v. *λοβός* Lappen etc. — d. Samen m. vom



Nabel ausgehend. Arillus), *O. Lambertii* G., s. g. Zebraholz, *O. indicum* G. (Connarus asiat. L.), african. DC. (Conn. afr.) etc.

**Omphalodes** T. (Boragineen, V. 1) „Nabelkraut“ od. -nüsschen Seub., Gedenkemein (Denkmein O. W.), Garten-Vergissmeinnicht (*δμφαλάδης* nabelrund — näml. d. Samen!), Zier. *O. verna* Mch., s. Cynoglossum *Omphalodes* L., *O. longiflora* A. DC. (*Lindelofia spectabilis* Lehm.), *O. Luciliae* Boiss. (Alpen) etc.

**Onagra** T., Scop. (Onagreen, VIII. 1) Nachtkerze (v. *ὄνος ἄγριος* wilder od. Waldesel — weg. d. Blätter wie Ohren), *O. biennis* Scop., fr. onagre, herbe aux ânes, s. *Oenothera biennis* L. — *Onagrae* Juss., -grariëae DC., -gracëae Grek., -grariae Rchb., -grëae ds.

1) **Oncidium** Lindl. (Orchid. Vandeën, XX. 1) „Wulst“- od. Schmetterlings-O. (v. *ὄγκος*, lat. uncus Haken, Höcker etc. — näml. auf d. Labellbasis, u. *εἶδος* Bild, Gestalt), *O. papilio* Lindl. vegetabilischer Schmetterling Leun. 2) **Oncidium** Fr. (Schimmelpilze, XXIV. 4) Schleimhaar od. Papierschimmel, *O. chartarum* Nees, s. *Myxotrichum* Kze.

**Oncosperma** Blum., Van Houtt. (Palmen, XXI. 8) „Bug“ od. Nierensamen-P. (s. v., *σπέρμα* Samen), s. *Nephrosperma* van Houtteana Balf. f., *O. fasciculatum* Blum., filamentosum ds. (*Areca* Nibung Mart. s. *tigillarum* Jacq.).

**Onobroma** G., DC. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Eselsfrass“ (*ὄνος* u. *βρώμα* Speise), *O. creticum*, coeruleum, lanatum u. minutissimum Hornem., s. *Carthamus* etc.

**Onobrychëae** (sc. *Hedysarëae*) Rchb., s. *Onobrychis*.

1) **Onobrychis** T. (sc. *Hedysarum*) L. (Legumin. *Onobrycheen*, XVII. 4) Esparsette, türkischer Klee (*ὀνόβουγης* „Eselsfutter“ von *ὄνος* u. *βούγω* beisse etc.), *O. sativa* Lam. gem. Esparsette, fr. sain foin, foin de Bourgogne, plante sacrée, e. cock's-head, esparcet u. sain-foin, auch medick-vetching. 2) **Onobr.** (sc. *Astragalus*) L. (Legumin. Loteen, XVII. 4), s. *Astrag. tenuifolius* L. f. (*Phaca caulescens* etc. Willich).

**Onoclea** L., Sw. (Farne, XXIV. 1) Schminkwurz- od. Roll-F. Dietr., fr. onoclée (n. Vilm.-Rümpl. d. veränd. *ὀνόκλιος* Eselsfutter, Wtst. st. *Onochilus* od. *Onochelis* = *Echium rubrum* bei Theophr., Dioscor., Nicander u. Plinius!), Zier. *O. sensibilis* L. „Fühl“- od. Rossfarn Rümpl.

**Ononis** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Hauhechel, Ochsenbruch, fr. bugrane, arrête-boeuf, e. cammock od. rest-harrow (gr. *ὄνωνις* v. *ὄνος* Esel u. *ὄνη* Kauf od. Waare — andere Lesart *Anonis* „Unnütze“ v. *ἀ* priv. u. *ὀνίνημι* nütze, Wtst.), Zier. *O. Natix* L. gelbe H., fr. bugr. gluante, *O. rotundifolia* L. (*Natrix* rot. Mch.), *O. frutescens* L., e. shrubby rest-harrow, *O. pinguis* L., fr. mêlitot de montagne, - des sables, etc., wild *O. spinosa*, repens L. etc.

**Onopordon** Vaill. (-um L.) (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Krebs- od. Eselsdistel, Klebe O. W., Kampf- od. Wolldistel, wilde Artischoke Vilm., fr. pédane (pet d'âne „Eselswind“), e. common spear-thistle (s. v. u. *προδή* F. od. Wind, v. *πέσθη* farze — angebl. Wirk. auf d. Esel! Wtst.), wild *O. Acanthium* L., Zier. *O. illyricum* s. elongatum Lam. (horridum Viv.) u. arabicum L.

**Onoseris** W., Cass., DC. (Compos. *Perdicicëen* od. *Mutisieen*, XIX. 2) „Eselslattich“, „-salat“ (s. v. u. *σείσις* Salat), Zier. *O. purpurata* W. u. *speciosa* Hb., Bpl. (Neugran.), *O. mexicana* W. (Str.), s. *Atractylis* L.

**Onosma** L. (Boragineen, V. 1) Lotwurz, Walzenglocke, Borstenstengel (gr. *ὄνοσμα* i. q. *ἐνόσειος* Eselslippe, v. *ὄνος* u. *ὄσμη* Geruch u. Geschmack), *O. arenarium* W.

- 1) **Onychium** Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Huf“- od. Nagel“-F. (v. ὄνυξ, -υγος, dem. ὄνυγιον Klaue etc. — d. Indusiengabel klauenf. gebogen), *O. auratum* Kaulf. (*Pteris filiculosa* Desv.), *lucidum* Spr. (*Leptostegia luc.* Don) etc. 2) **Onychium** Blum. (Orchideen Malaxid., XX. 1) (— d. äuss. Seitenblätt. d. Blume umgebogen), s. *Dendrobium* Sw.
- Opalus** Ait. (Sapindac. Acereen, VIII. 1 od. XXIII. 1) italienischer od. „Opal“-Ahorn, fr. érable Opale, e. Opal- od. Italian Maple (gr. ὀπίλλος Opal od. Hornkiesel — bez. d. Früchte?), s. *Acer italicum* Lauth. s. *rotundifolium* Lam.
- Opercularia** Rich., Schreb. (Rubiaceen. Cinchonaceen, IV. 1) „Deckelkelch“, -pflanze D., fr. operculaire (v. operculum Deckel — Kelch m. Deckel), *O. aspera* G. (Rubioides asp. Sol.), *paleata* Young (*Cryptospermum* Pers.) etc.
- Ophianthe** Hanst. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Schlangenblüte“, Runzelblatt (ὄφις, -ιος Schlange, ἄρθη Blüte), *O. libanensis* Hanst., s. *Rhytidophyllum floribundum* Van Houtt.
- Ophioearyon (-um)** Endl., Meisn. (nicht -earion!) (Terebinthac. Anacardiaceen, IX. 1) „Schlangennuss“ (s. eb. u. *záouon* Nuss — bez. d. Würzelchens und Schwänzchens), z. B. *paradoxum* Van Houtt.
- Ophioglossum** L. (Traubenfarne, XXIV. 1) „Natterzunge“, fr. ophioglosse, herbe sans couture „ohne Naht“, lance du Christ, e. adder's-tongue (s. v. u. *γλώσσα* Zunge — dünne, spitzzulauf. Ähre), *O. vulgatum* L. gem. N.
- Ophiopogon** Curt., Ker (Smilacaceen, VI. 1) „Schlangenbart“, e. adder's-beard (s. v. u. *πώγων* Bart), Zier. *O. spicatus* Ker (*Liriöpe* spic. Lour.), *O. japonicus* Curt. (*Convallaria jap.* L.), fr. O. du Japon, herbe aux turquoises, e. japanese adder's-b., *O. Jaburan* Lodd. (Stubenpfl.).
- Ophiorrhiza** Forsk. (Cinchonac. od. Contorten, V. 1) „Schlangenzwurzel“, e. snake-root, tarragon (s. v. u. ῥίζα Wurzel — diese geg. Schlangenzwischen), z. B. *O. Mungos* L. — *Ophiorrhizæ* (sc. Contortæ) Rchb.
- Ophioscorodon** Don, Wallr. (sc. Allium) L. (Liliaceen, VI. 1) „Schlangenschlauch“, Perlzwiebel, Rockenbolle Grck., fr. rocambolle (-quembole), s. *Allium sativum* L. v. *Ophiosc.* Hort. Knoblauch (Perlzwiebel-Kn.) (s. v. u. *σκόροδο*n Knoblauch — Staubfäd. wie Schlangenzungen).
- Ophioxylon** Burm. (-um L.) (Apocynaceen, XXIII. 2) „Schlangenhholz“, fr. serpentine (s. v. u. *ξύλον* Holz — dies. geg. Schlangenzwischen angew.), Treibh. *O. serpentinum* L. (Str. Ind.).
- Ophrys** L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Ragwurz, Fliegenkraut, Insekten-O. Leun., fr. fleur-aillée (gr. ὀφρὺς Augenbraue — weg. d. gebog. Form d. Kelchblätt.!), z. B. *apifera* Huds., *muscifera* ds. etc. — *Ophrydæe* Lindl.
- Oplismenus** Kth. (**Hoplis.**- P.-B., Woods) (Gräser, III. 1) „Waffen“- od. Stachelgras, Kraftklaue Perring (gr. ὀπλισμένος bewaffnet — Stachelgrannen!), *O. crus galli* Kth. (*Panicum cr. g.* L.) s. g. Hühnerhirse, Zier. *O. imbecillis* Kth. (*Panic. imb. Trin.*) etc., s. *Orthopogon* R. Br. u. *Echinochloa* P.-B.
- Opobalsamum** (sc. *Amyris*) L. (Terebinthac. Amyrideen, VIII. 1) „Balsamsaft“, Mekkabalsam M.-Rchb., fr. xylobalsamum, e. opobalsam (gr. ὀπὸς Saft etc.), s. *Balsamea meccanensis* Gled.
- Opopanax** Koch (nicht -ponax L., Pers.) (sc. *Pastinaca*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Heilwurz“ (gr. ὀπὸς τοῦ Παναξοῦς Saft der „Allesheilpfl.“, v. *πάς* od. *πᾶν* alles u. *ἀκτέω* od. *ἀκτέομαι* heile).
- Oporanthus** Herb., Röm. (Amaryllideen, VI. 1) „Herbstblume“ (ὀπώρα Herbst, ἄρθος — blüht wie *Colchicum* im Herbst!), s. *Amaryllis Hippeastrum* Herb. u. *Sternbergia* sect. *Oporanthus* Röm.

- Oporina** Less. (-nia Don) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Herbst“-Apargie, *O. autumnalis* Don = *Apargia autumnalis* W. s. *Leontodon* aut. L. (*ὀπωρινός* herbstlich).
- 1) **Opulus** T. (sc. *Viburnum*) L. (Caprifoliaceen, V. 3) Schneeball, Wasserschlinge, -holder, m. v. v., fr. *Viorne Obier* (Obier d'Europe), *boule de neige*, *pain-blanc*, *rose de Gueldre*, e. *ople-tree*, *snow-ball*, *Gelderröse* od. *marsh-elder* (lat. *Opulus* ursprüngl. *Feldahorn*, von *ὀπύλος* Saft? st. *populus* Pappel, Wtst. — unsicher!). 2) **Opulus** Mch. subg. v. *Viburnum* L., z. B. noch *V. Oxycoccus* Pursh, *acerifolium* L. u. *orientale* Pall.
- 1) **Opuntia** Endl. Kl. d. Cactusgewächse. 2) **Opuntia** T. (sect. v. *Cactus* Rchb.) (Cacteen, XII. 1) *Cochennillen-Cactus*, *Nopal*, *Feigendistel*, fr. *poirier piquant* (lat. *Opuntia opuntisch*, v. *Opus*, -untis Stadt in Lokris — d. Pfl. im östl. Griechenl. wild), *Topf*: *O. vulgaris* Mill. (*Cactus Opuntia* L.), fr. *Nopal vulgaire*, *Raquette* etc., e. *common indian fig*, *O. microdasys* Lehm. „pinselborstige“, *O. Rafinesquina* Engelm., *O. Ficus indica* Mill. etc.
- Orania** Mart., Blum. (Palmen, XXI. 6) „Oranien“-P. (n. d. holl. Dynastie Nassau-Oranien), *Zier. O. regalis* Blum. (*porphyro-carpa* Mart.) (*Java*), *arvensis* Becc.
- Orbēa** Haw. (Asclepiad., V. 2) „Kreiskronen“-*Asklepias* (*orbis* Kreis — d. Krone vor ihren Zipfeln m. gross. erhahn. Kreis!).
- Orchidacēae** Grck., -ides Juss., -idēae DC., Rchb. Orchideen, Stendeln od. Knabenkräuter, s. *Orchis*.
- Orchidinae** Bisch., DC. Kl. d. Orchideen<sup>1)</sup>, s. *Orchis*.
- Orchidocarpus** Mchx. (-um Rich.) (Ranunculaceen Annonaceen, XIII. 6) „Hodenfrucht“ (v. *ὄρχις*, -ιδος *Hode*, *καρπός* Frucht), z. B. *grandiflorus* Mchx. etc., s. *Asimīna* Spr. u. *Porcelia* R. P.
- Orchis** L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) *Knabenkraut*, *Stendel*, *Ragwurz*, *Kukuksblume* etc., fr. *couillon de chien*, „*Hundehode*“, e. *orchis*, *goat's-stones* „*Geissteine*“, *bee-* od. *gnat-flower*, *stander*, *addergrass* etc. (gr. *ὄρχις* *Hode* — solche Knollen an d. Wurzeln!), z. B. *O. morio* L. *Salep-O.* (s. *Morio*), *O. mascula* L., fr. *testicule de prêtre*, *O. militaris* L., fr. *capette*, *Gauchblume* Wolff, etc.
- Oreocallis** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „*Bergziederde*“ (v. *ὄρος*, -εος *Berg*, *καλλός*, τὸ d. *Schönheit* — auf Bergen in Peru!), *Treibh. grandiflora* R. Br. (*Embothrium* gr. *Lam.*) etc.
- Oreodaphne** Nees (Lauraceen, IX. 1) „*Berg*“- od. „*Felsenlorbeer*“ Rmpl. (s. eb. u. *Δάφνη* *Lorbeer* — berglieb. *Lorbeer*!), z. B. *californica* Nees (B.), *regalis* Reg. etc.
- Oreodoxa** W. (-xia Hb., Kth.) (Palmen, XXI. 8) „*Bergruhm*“, -palme (s. v., *δύξα* *Ruhm* etc. — *Zierde* d. Berge in Südamer.), z. B. *regia* Hb., Kth. (*Oenocarpus* reg. Spr.), *O. oleracea* Mart. *Kohlpalme* (*Arēca* ol. Jacq.), s. *Euterpe caribaea* Spr., etc.
- Oreopanax** Decsn. (Araliaceen, V. 5) „*Bergheil*“ (s. v. u. *πάναξ* od. *πανακίς* alles heilend) (zu *Aralia* L.), z. B. *O. peltatum* Lind.
- Oreoselinum** Hoffm. (zu *Peucedanum* Mch. od. *Athamanta* L.) (*Umbelliferen*, V. 2) „*Bergsilje*“, fr. *persil de montagne*, e. *parsley-pert* *Steineppich* (s. v. u. *σέλινον* *Silje*), *O. legitimum* M. B. (*Peuced.* *Oreoselinum* Mch., *Atham.* *Oreosel.* L., *Selinum* *Oreos.* Scop.).
- Origänum** T. (Labiaten, XIV. 1) *Dosten*, *Majoran*, eig. „*Bergschmuck*“ (st. *Oreogänum*!), fr. *origan*, e. *organy* (gr. *ὀρίγανον* v. *ὄρος*, -εος *Berg* u. *γάνος* *Schmuck* — *Stand* u. *Geruch*!).

1) Einteilung: a. *Malaxidēae*, b. *Epidendrēae*, c. *Vandēae*, d. *Ophrydeae*, e. *Neottiēae*, f. *Arethuseae*, g. *Cypripediēae*.

- Orlaya** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Orlaye“, Breitsame (n. Joh. Orlay, Arzt etc. in Moskau), *O. grandiflora* Hoffm. (Caucalis gr. L., *Platyspermum* Koch).
- Orleana** Hort. s. *Orellana* (sc. *Bixa*) L. (Bixaceen, XIII. 1) „Orleanbaum“ (Wst.: wächst an den Ufern des Orelhana = Marañon od. Amazonenstrom), s. *Arbor mexicana* Bauh.
- Ornēnis** Cass. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Schösslingblume“ (v. ὄρνειος Spross etc. — oben blattlose Stengel), z. B. *nobilis* J. Gay, s. g. römische Kamille, s. *Anthemis nob.* L.
- Ormiscus** DC. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Halsbandschote“ (gr. ὄρμιζος dem. v. ὄρμος Band — Schote schnurförmig).
- Ormosia** Jacks. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Rosenkranzbohne“ (v. ὄρμος Reihe, Kette — bez. d. Hülse!), *O. dasycarpa* Jacks., s. *Podaliria* Poir. s. *Robinia coccinea* Hort. u. *Sophora monosperma* Sw.
- Ornithocephalus** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Vogelkopf“ (ὄρνις, -ιθος Vogel, κεφαλή Kopf — langschnäbl. Columna).
- Ornithogalum** L. (Liliaceen, VI. 1) „Vogelmilch“ od. Milchstern, fr. ornithogale, lait d'oiseau, e. star of Bethlehem (s. eb. u. γάλα Milch — milchw. Blüten), z. B. wild u. Garten: *umbellatum* L. weisse Feldzwiebel od. gem. Hühnermilch Schmidl., fr. fleur od. dame d'onze heures, churle, e. unbelled star of Bethl., Winterbl. *O. arabicum* L. „Stern v. Arabien“, ferner Zier. *O. pyramidale* L., fr. épi de lait, *O. pyrenaicum* L. span. Bethlehemstern, etc.
- Ornithopus** L. (Leguminos. Hedysareen, XVII. 4) „Vogelfuss“, Klauenschote, Vogelklaue Seub., fr. ornithopode, pied d'oiseau, bois de merle (s. v. u. πους Fuss), z. B. *perpusillus* L. (*Ornithopodium* Bauh.), gebaut *O. sativus* Brot. s. g. *Serradella*.
- Ornitröphe** Comm., Juss. (Sapindaceen, VIII. 1) Vogelfutter, -pfeffer D. (v. ὄρνις den Vogel betr. u. τροφή Nahrung — Fr. von d. Amsel begier. aufgesucht! Wst.), s. *Schmidelia* L.
- Ornus** Scop., Pers. (sc. *Fraxinus*) L. (Sapotaceen Oleaceen od. Fraxineen, II. 1) Manna- od. Blüten-Esche, Blumen- u. Zwerg-Esche Vilm., fr. orne (-nier), frêne à la manne, e. manna-ash (*ornus* gr. ὄρεινός Berg-Esche v. ὄρος Berg), Zier. *O. europaea* Pers. (*Fraxinus* *Ornus* L. s. *florifera* Scop.), fr. ornier commun, Buch- od. Wald-Esche, e. european flowering ash, m. v. v., *O. mannifera* Hort. s. *rotundifolia* Pers. (*Frax. rot. Ait.*), fr. Frêne à la manne, e. oriental manna ash, eigentl. Manna-Esche, *O. floribunda* G. Don (*Frax. flor. D. Don*), fr. Frêne du Népaul, e. abundant-flowering-ash, *O. americana* Pursh (*Frax. am. L.*, *Frax. Orn. am. Lodd.*), fr. Fr. à fleurs d'Amérique, e. american Flowering-Ash.
- Orobanche** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Ervenwürger“, Sommer- od. Sonnenwurz, Braunschupper Leun., Hanfwürger u. Kleeteufel, fr. herbe aux taureaux (- du lion), e. broom-rape (v. ὄροβος Erve od. Erbse, ἄγγω erwürge — Hülsenfr. umwindend).
- Oröbus** T., L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Kicher- od. Walderbse, fr. orobe, e. bitter-vetch (gr. ὄροβος Erbse etc. v. ὄρω errege u. βούς Ochse — gut. Rindviehfutter), Topf: *O. aureus* Stev., ferner Zier. *O. vernus* L. (*Lathyrus vern.* Wimm.), s. g. Waldkicher, m. v. v., *atro-purpureus* Desf. (Algerien), *flaccidus* Wald Kit., *lutens* L. s. *montanus* Scop. (*Lath. mont. Godr. Gren.*), *niger* L. (*Lath. niger* Wimm.) etc.
- 1) **Orontium** L. (Araceen, VI. 1) Kalmus, Wasserähre D. (v. ὄρω errege? od. v. Fluss Orontes in Syrien? — wächst im Wasser), z. B. *aquaticum* L., *japonicum* L. (*Rhodia jap. Endl.*). 2) **Orontium** Pers. (sc. *Antirrhinum*) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Orant“ od. Feld-

Löwenmaul, fr. orange od. tête de cochon (v. ὄρος Berg? Wtst.), s. Orontium arvense Pers. — Orontiaceae DC., Bartl.

- Orphium** E. Mey. (Gentianeen, V. 1) „Rot-Enzian“ (v. ὄρφος, lat. furvus braunrot? od. ὄρφιον dem. v. ὄρφος, lat. orphus Orfe, ein Fisch? Wtst.: n. Orpheus, der wie Chiron in d. Heilkunde erfahren! — unsicher!), Zier. O. frutescens E. Mey. (Str. Cap), s. Chironia decussata Vent.
- Orthoceras** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Geradhorn“ (ὄρθος gerade, κέρα Horn — d. äuss. Blumenblätt. aufrecht linienförm!), z. B. strictum R. Br. (ähnl. Diuris Sm.).
- Orthosanthus** Sw. (Irideen, III. 1) „Geradblumen“-Schwertel (s. eb. u. ἄρθος — d. Blum. nicht gebückt, wie Gladiolus!), z. B. chimboracensis Bak. (Moraea gladioloides s. chimb. H. B. K.).
- Orthospermum** R. Br. i. q. Orthosporum Ness., P. M. E. s. sogl.
- Orthosporum** Ness., P. M. E. (Chenopodiaceen, V. 2) „Geradsamen“ s. v. u. σπορά i. q. σπέρμα Sam. — d. Samen steif vertikal, z. B. glaucum u. rubrum P. M. E., s. Chenopodium etc.
- Orthostachys** R. Br. (Boragineen, V. 1) (zu Heliotropium T.) „Geradähren“-Heliotrop (s. v. u. σταχὺς Ähre — diese in d. Jugend nicht spiralg), z. B. H. fruticosum L.
- Orthostemon** R. Br. (Gentianeen, V. 1) „Geradfaden“-Enzian (s. v. u. στήμων, lat. stamen — d. Staubfäd. gleich lang, d. verblüht. Antheren gerad, nicht verdreht, wie Erythraea).
- Orthothecium** Schott., Endl. (Sterculiaceen, XI. 1 od. XVI. 7) „Geradkapsel“-Sterkulie (s. v. u. ἑρμηχὴ Behälter — d. Kapsel nicht gedreht, wie Helicteres).
- Orthotrichum** Hedw. (Moose, XXIV. 2) Haarmoose, Goldhaar, eig. „Geradhaar“ (s. v. u. ῥοιξ, ῥοίχος Haar — d. Zähne d. Peristoms gerade), z. B. crispulum u. affine (an Waldbäum.). — Orthotrichaceae Schimp. Goldhaarmoose Leun.
- Orvala** L., DC. (Labiaten, XIV. 1) „Orvelkraut“ Vilm., grossblum. Taubnessel (franz. orvale, was aber eig. Salvia Horminum), Zier. O. lamioide DC., fr. lamier orvale, e. large-flowered dead-needle (Lamium Orvala L.), O. garganica L. f. (Papia g. Mnch.).
- Oryza** L. (Gräser, VI. 2) „Reis“, fr. rizon, e. rice (v. d. arab. eruz). — Oryzæae Kth.
- Osbeckia** L. (Myrtac. Melastomaceen, VIII. 1) „Osbeck's“-Myrte (n. d. schwed. Bot. P. Osbeck), Treibh. O. chinensis L., aspera Wight u. Arn., stellata Don (kl. Str.), ornata Sw. (Melastoma orn. Hort.) etc. — Osbeckiæae DC.
- Oscillaria** Bosc (Fadenalgen, XXIV. 3) „Schwingfaden“, fr. oscillaire (v. oscillo „oscilliere“ od. schwinde hin u. her), s. Oscillatoria Vauch. — Oscillariaceae Rabht. „Schwingfadenalgen“.
- Osmanthus** Lour. (Oleaceen, II. 1) „Duftblume“ (ὄσμη Duft, ἄρθος Bl.), O. fragrans Lour. = Olea fragr. Thb. (jap. Thee-Parfum).
- Osmites** L., Cass. (Compos. Anthemid., XIX. 3) „Duft“- od. Kampherblume (v. ὄσμη Duft — riecht stark nach Kampher), O. camphorina L. (Bellis camphorifera Seb.), calycina L. (Lapeirusia c. Thb.) etc.
- Osmunda** L. (Farne, XXIV. 1) Rispen- od. Trauben-F., Mondraute, fr. osmonde, e. osmund, moonfern (-wort), Zier. O. regalis L., s. g. Walpurgiskr., spectabilis W. etc. (n. d. sächs. Gott Osmund, Wtst. d. skandinav. Gott Osmunder, Beinamen d. Thor!). — Osmundaceae R. Br., Rchb. Traubenfarne Seub.
- Osteospermum** L. (Compos. Calendulaceen, XIX. 4) „Knochen“- oder „Beinsamen“ Rmpl., fr. porte-collier (ὀστέον Knochen, σπέρμα Samen — d. Achenen knochenhart!), O. moniliferum L. „Paternosterstrauch“ Rmpl., s. Bidens calendulacea Thb.

- Ostericum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Osterick“ O. W., Mutterwurz (st. ἰσπεριζὼν v. ἰστέρα Gebärmutter, Leun.; d. veränderte Ostruthium! Wtst.), früher zu Imperatoria T.
- Ostruthium** (sc. Imperatoria) L. (Umbelliferen, V. 2) Meisterwurz (v. ὄστροια Auster, lat. ostrum Purpursaft? Wtst. v. στρογγύος Sperling — Gestalt d. Blüten, wie ein flieg. Vogel!), s. Selinum Imperatoria Crantz.
- Ostrýa** L., Mich. (Amentac. od. Cupuliferen, XXI. 8) Hopfenbuche, Hartholzbaum (ὄστροία od. ὄστροέον Muschel — weg. d. Kätzchenschalen!), O. vulgaris W. (carpinifolia Scop. s. italica Spach), s. Carpinus Ostrýa L., fr. Ostryer commun, e. hop-hornbeam, m. v. quercifolia Hort., O. virginica W. (Carp. virg. Abbot s. triflora Mnch. etc.), fr. charme de Virginie, e. virginian horn-beam.
- 1) **Osýris** L. (Santalaceen, XXII. 3) Harn- od. Weissstrauch, Sanddorn (gr. ὄσυρις od. ἄζυρις i. q. Chenopodium Gänsefuß, Wtst.: viell. Gott Osiris d. Ägypter!?), z. B. O. alba L. (Littorale), O. rhamnoides Scop. (Hippophaë rhamn. L.), fr. rouvet, s. g. Poeten-Cassie, Wolff. 2) **Osýris** Gmel. (Aizoideen Tetragoniaceen, XI. 1) Salpeterstrauch, s. Nitraria Schoberi L.
- Otacanthus** Lindl. (Acanthaceen, XIV. 2) „Ohr-Acanthus“ (v. οὶς, ἄτος Ohr u. Acanthus Bärenklau), Warmh. O. caeruleus Lindl.
- Othonna** L. (Compos. Senecionideen, XIX. 4) „Schleierblume“, Linnenbl. (gr. ὄθοννα v. ὀθόνη Linnen, Schleier — poröse Blätt.! Wtst.), z. B. crassifolia L. (Hertia Less.), abrotanifolia L. (Cineraria abr. Berg. etc.).
- 1) **Otidëa** (-dia s. -dium Lindl.) (zu Pelargonium P'Her.) (Geraniaceen, XVI. 5) „Trappenschnabel“ (v. ὠτίς, -ίδος Trappe v. οὶς, ἄτος Ohr — Ohrfedern!), z. B. Treibh. O. carnosa Sweet (Str. Cap), dasycaulon Sweet, etc., s. Pelargonium P'Hér. 2) **Otidea** (-dia) Fock. (Becherpilze, XXIV. 4) „Ohrenbecher“ (s. eb. u. εἶδομαι gleiche).
- 1) **Otites** Sm., Otth. (sc. Silëne) L. (Sileneen, X. 3) „Ohrlöffel“-Leimkraut (gr. ὠτίτης ohrähnlich), s. Cucubalus Ot. L., Lychnis Ot. Scop. 2) **Otites** (sc. Polypodium) L. (Farne, XXIV. 4) „Ohrenwedel“-F.
- Ourisia** Juss., Comm., Pers. (Scrophularineen, XIV. 2) „Ourisie“ (nicht οὐρία Schwanz, ἰσὺς gleich, sond. Wtst.: n. Ouris, Gouv. d. Falklandsins., von dem Commerson d. Pfl. erhielt!), Zier. O. coccinea Pers. (Dichrōma cocc. Cav.) (Anden).
- Ouvirandra** P.-Thou. (Najadeen od. Alismaceen, XXI. 1) Spitzenblatt, O. s. Hydrogëton fenestralis Pers. madagassische Gitterpfl. oder Wasser-Yam (v. ouvi Yam u. rano Wasser, Wtst.: auf Madagask. ouvirandu!).
- 1) **Oviëda** L. (-dia DC.) (Verbenac. od. Caprifoliaceen, XIV. 2) „Oviëdie“ (n. Oviedo y Valdes, Gonçalo Fernandez de, schr. Sumario . . . de las Indas, Toledo 1526), z. B. O. mitis L. (Clerodendron siphonanthus R. Br.). 2) **Oviëda** Spr. (Irideen, III. 1) „Oviedo's“-Schwertlilie, z. B. anceps Spr., falcata Spr., bracteata ds. etc., s. Meristostigma A. Dietr. u. Lapeyrousia Gawl.
- Oxälëae** Rehb., -lidëae DC., Rehb., -lidacëae Grck. Sauerkleartige, s. Oxälis.
- Oxälis** L. (Oxalideen, X. 4) Sauerklee, Sauer O. W., fr. oxalide u. surelle, pain du coucou, oseille des bois (- des pâques), e. wood-sorrel, cuckoe's-sorrel (v. ὄξυς scharf, sauer, ἄλις, -λις Salz — weg. d. Kleesalzgehalts), wild O. Acetosella L., Zier. O. floribunda Lehm., rosëa Jacq., Valdiviensis Barnéoud, tropaeoloides Hook., versicolor (Cap), Deppei Sw. (Mex.), Bowiei Lind. (Cap), corniculata L. v. fol. atro-purp. Hort., etc.

- Oxyacantha** (sc. Crataegus) L. (Rosac. Pomaceen, XII. 2) gem. Weissdorn, eig. „Scharf“- od. „Spitzdorn“ (nicht „Sauerdorn“, was Berberis!), fr. mai, oxyacanthé u. épine-blanche (aubépin), e. white-thorn, haw-thorn „Hagedorn“ (ὄξυς spitz etc., ἄκανθα Dorn), Zier. v. v. fl. puniceo, fl. albo pleno u. fl. rubro-pleno Hort.
- Oxyandra** DC. (Tiliaceen, XIII. 1) (zu Sloanea L.) „Spitzantheren“-Sloanebaum (s. v. u. ἄνθη, -θους Mann, Staubbeutel — diese lang zugespitzt).
- Oxyanthus** DC. (Rubiaceen, Cinchonaceen, V. 1) „Spitzblume“ (s. v. u. ἄνθος — spitzlaufende Kronzipfel!), Treibh. O. speciosus DC. s. tubiflorus, versicolor Van Houtt. etc., s. Gardenia tubiflora Andr. (Str. Afr.) etc.
- Oxybaphus (-os)** l'Hér. (Nyctagineen, V. 1) „Farbspitzen“-Nachtblume (s. v., βαφή Färben v. βάγω od. βύλλω tauche ein etc. — d. Blüt. an d. Zweigspitzen m. gefärbt. Perigon!).
- Oxycarpus** Lour. (Guttiferen, XI. 1) „Scharf“- od. „Sauerfruchtbaum“ (s. v., καρπός Fr. — Frucht u. Blätter von sehr saurem Geschmack).
- Oxycedrus** (sc. Juniperus) L. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) span. od. Cedern-Wachholder Rmpl., fr. Cade, Cèdre piquant, e. sharp-Cedar od. brown-berried Juniper (— spitze Cederblätter!).
- Oxyceros** Lour. (Rubiaceen, IV. 1) „Spitzhornpfl.“ (s. v. u. κέρας Horn — m. spitz. hornförm. Stacheln bes.).
- Oxycoccus (-us)** T., Rich. (Ericaceen Vaccinieen, VIII. 1) „Scharf“- od. „Sauerbeere“, Kranich- od. Moosbeere, fr. canneberge, e. moss-, fen- od. cran-berry (s. v. u. κόκκος Beere etc. — sehr saure Beeren!), O. macrocarpa Rich., s. Vaccinium Oxycoccus L. (Schöllera Ox. Roth).
- Oxydendron** DC. (Ericaceen Andromedeen, X. 1) „Sauerbaum“ (s. v. u. ἄνθος B. — saure Blätter!), O. arboréum DC., s. Andromeda arb. L.
- Oxylobium** Andr. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Spitzhülsen“-Str. (s. v., ἄβιον dem. v. λοβός Hülse — diese spitz!), O. capitatum Benth., cordifolium Andr. (Str. Neuholl.), retusum R. Br. (Podolobium cori-acéum DC.) etc., s. Gompholobium Sm., Pultenaea Sm. u. Chorzema Lab.
- Oxyptalum** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) Spitzblume, „Spitzenkrönchen“ Vilm., Rmpl. (s. v. u. πέταλον Kronblatt — Kronzipfel spitz!), Zier. O. coerulæum Decsn. (Tweedia coer. Don s. versicolor Bot. Mag.).
- Oxytrypis** DC. (Leguminos. Astragaleen, XVII. 4) „Spitzkiel“, -fahne, Fahnwicke, Wirbelkraut (s. v. u. τρύπις Schiffskiel — d. Carina läuft in eine Spitze aus!), s. Astragalus L.
- Oxyura** DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Spitzschwanz“ (s. v., οὐρά Schwanz — d. Blüten am Ende d. ob. blattlosen, rauhen Zweige), Zier. O. chrysanthemoides Lindl. (Californ.), s. Callichróa Douglasii Torr. u. Gray.
- Ozodia** Wight (Ümbelliferen, V. 2) „Wohlgeruchdolde“ (gr. ὄζωδης aromatisch riechend).
- Ozölis** Spr. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Übelgeruch“-Sammetblume, „Stinkblume“ (gr. ὄζολις d. Stinkende, Übelriechende), s. Tagetes multiflora Hb., Bpl.
- Ozophyllum** Schreb. (Diosmeen, V. 1) „Stinkblatt“ (v. ὄζω rieche, φύλλον Laub — stinkende Blätter!).
- Pachira** Aubl. (Oxalideen Bombaceen, XVI. 8) weisser Prachtwollenbaum, „Dickwollenbaum“ (v. παχίς dick, ἄριον Wolle, Wtst. Name d. B.'s in Guiana!), P. alba Aubl. (Carolinäa a. Lodd.), aquatica Aubl. (Carol. princeps L.), s. g. Cacao sauvage.

- Pachites** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Dickähren“-O. (s. eb. — d. Blüt. in dicken, steifen Ähren!).
- Pachycarpus** E. Mey. (Asclepiadeen, V. 2) „Dick“- od. „Feistbalg“ (s. v., *καρπός* Frucht — d. Balgkapsel bauchig aufgeschwollen m. schwammigen Wänden!).
- Pachydendron** Haw., W. (Liliaceen, VI. 1) „Dickbaum“-Aloë (zu Aloë L.) (s. v., *δένδρον* B. — gedrängte Gipfelblätter!).
- Pachyphytum** Lk., Ott., Kl. (Crassulaceen, V. 1) „Dickpflanze“ (s. v., *φυτὸν* Gewächs — fleisch. Staude!), Zier. P. *bracteosum* Klotzsch (Echeveria br. Lindl.) (Hstr., Mex.).
- Pachyrrhizus** Rich. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Dickwurzel“- od. Knollenbohne (s. v. u. *ρίζα* Wurzel — diese dickknollig u. essbar!), P. *tuberosus* Spr. (*Dolichos bulbosus* L. s. *tuberos.* Lam., *Strizolobium tub.* Spr.).
- 1) **Padus** Mill. (sc. *Prunus*) L. (Amygdaleen, XII. 1) Ahl- od. Traubenkirsche, Vogelkirsche, Ölbeerbaum Wolff, Silberregen Vilm., fr. *cerisier à grappes*, laurier-putier „Stinklorbeer“, e. *fowl-cherry-tree* m. v. v. (Theophr. *πάδος* urspr. = *Prunus Mahaleb*, viell. *Padus* = Fluss Po, Wtst.). 2) **Padus** Lauch. (sect. v. *Prunus*) Traubenkirschen, z. B. noch Pr. *Lauchiana* Bolle, *virginiana* L., *serotina* Ehrh. etc.
- 1) **Paederia** L. (Apocynen od. Contorten Carisseen, V. 1) „Stinkwinde“, Knackbeere, fr. *danaide* (v. *paedor* Gestank — sehr übl. Geruch d. Pfl.), z. B. *foetida* L. (*Lygodysodea foet.* R. P., *Convolvulus foet.* Rumph.), *fragrans* Lam. (*Danais fr. Balf. f.*) (Ins. Maurit.). 2) **Paederia** Wight (Rubiaceen, IV. 1).
- Paederota** L. (Scrophularineen, II. 1) „Päderastenblume“, „Knabenliebe“ (gr. *παιδέωος*, -ωτος i. q. *παιδεραστής* Knabenschänder), z. B. P. *Ageria* s. *lutca* L. (*Wulfenia Ageria* Vahl).
- Paeonia** T., L. (Ranunculaceen, XIII. 2) Pfingst-, Königs- od. Bauernrose, fr. *péone* od. *pivoine*, *fleur royale*, - de *mallet* „Felleisen“-Bl., e. *peony* (*paemony*) (n. Plin. v. *Paeon* Gott d. Ärzte, od. n. Päonien ben., wo wild wachsend, Wtst.), Zier. P. *officinalis* L. *Putennie* od. *Gichtrose* etc., fr. *Pivoine des jardins*, e. *shop-Paeony*, m. v. v. (P. *femina* L.), P. *tenuifolia* L. (offic. var.) (Sibir.), P. *paradoxa* Andr. s. *peregrina* Mill., P. *albiflora* Pall. (*sinensis* Poit.), P. *corallina* Retz. s. *mascula* L., fr. *piv. mâle* od. *corail*, P. *Witmanniana* Bot. Reg., P. *arborescens* Don (P. *Moutan* Sims) etc. — *Paeoniaceae* Rchb., Bartl.
- Palafoxia** L., Lag. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Palafoxblume“ (n. d. span. General u. Vert. v. *Saragossa*, *Palafox*), Zier. P. *texana* DC., *Hookeriana*.
- Palava** Rz. Pv. (-*via* Cav.) (Malvaceen, XVI. 8) „Palavie“ od. „Palau“-Malve (n. A. *Palau y Verdera*, Prof. z. Madrid im 18. Jahrh.), Zier. P. *flexuosa* Masters „bogenstenglige“, *malvifolia* L. (*Malope parviflora* l'Hér.) etc.
- Paliurus** T., G. (Rhamnaceen, V. 1) Stech-, Christus- od. Judendorn, fr. *nerprum paliure*, *porte-chapeau* (gr. *παλιούρου* urintreibend v. *πάλλω* treibe, *οἶον* Harn — soll harntreibend wirken), P. *australis* G., s. *Zizyphus Paliurus* W. s. *aculeata* Lam. u. *Rhamnus Paliurus* L.
- 1) **Pallasia** L. (sc. *Calligonum*) l'Hér. (Polygonaceen, VIII. 2) „Pallas“-Knöterich (n. d. russ. Nat. u. Reis. *Pallas*), z. B. *caspica* L. (*Pterococcus aphyllus* Pall.). 2) **Pallasia** Ait. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) *Schönauge*, z. B. *procumbens* Spr. (*Encelia proc.* Kth.), *halimifolia* l'Hér., s. *Coreopsis limensis* Jacq. *Schönauge* von Lima (Peru). 3) **Pallasia** Scop. (Gräser, III. 2) „Pallasgras“. 4) **Pallasia** Van Houtt. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Pallas“-Duftraute.



- Palmacëae** Bartl., DC., Rchb., -mae Juss., Kl. od. Ord. d. Palmen (gr. *πάμμα* das Geschwungene od. *πάμμα* Schild, lat. *parma*, lat. *palma* Palme).
- Palmella** Lyngb. (Nostochineen, XXIV. 3) Schleim- od. „Zitteralge“ (v. *παλμός* das Zittern), s. *Coccochloris*. — *Palmellacëae* Näg., -melleae Ktzig. Zitter- od. Gallertalgen.
- 1) **Panāces** (sc. *Heraclëum*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Allheil“-Bärenklau (*πάναιες* allesheil. Kraut, „Panacee“, *πᾶς* od. *πάν* u. *ἀζέρμαι* heile), s. *Heraclëum aspërum* M. B. s. pubescens Vilm. (grosse Gartenzierdölde!). 2) **Panāces** *carpimón* Cold. (Araliac., V. 5 od. XXIII. 2) canad. Aralie, s. *Aralia racemosa* L. (*Christophoriana canadensis* Moris.) (*ζάρπιμος* Früchte tragend).
- 1) **Panax** L. (Araliaceen, XXIII. 2) „Allheilpflanze“, Kraftwurzel D. (gr. *πάναξ*, -*αζος* i. q. *παναχής* Alles heilend; Plinius führt 4 *παναχες* an: asclepische, heraklische, chironische u. centaurische), z. B. P. Schin-seng Nees, e. ginseng, echte Kraftwurz od. Ginseng Leun., fr. mandragore de la Chine, P. *crassifolius* Decsn. (*Aralia trifoliata* Hort.). 2) **Panax** *aculeatus* Ait. (*Terebinthac. Zanthoxylen*, XXIII. 2) Stachel-Kraftw., s. *Zanthoxylon trifoliatum* L. (d. vorigen identisch?).
- Paneratium** Herb., L. (Amaryllideen, VI. 1) Trichter- od. Narzissenlilie, Gilgen od. Kraftblume, fr. *pancras* (-cratier) (v. *πανκρατής* Alles beherrschend — stärkende Heilkr.), Zier. P. *ilyricum* L., *maritimum* L. Meerstrands-Narzisse od. Meerlilie, fr. *lis-narcisse* (-Matthiole), *caribaeum* L., *speciosum* Salisb. (*Hymenocallis spec.* Herb.).
- Pandānus** L. f. (Pandaneen, XXI. 1) Palmkolbe, Schraubenbaum, fr. *pandanus*, e. screw-tree (v. d. malayisch. *pandang* = ansehnlich), z. B. *Candelabrum P.-B.* „Leuchterbaum“, P. *utilis* Bory (Madag.), Treibh. *graminifolius*, *odoratissimus* L. f. (*Atroductylis* Forst.), *javanicus* m. v. *variegatus* Hort. etc. — *Pandanëae* R. Br., DC. (zu Ord. *Aröidëae* Bartl., DC. Palmkolben).
- Panīcum** L. (Gräser, III. 2) Fennich, Hirsegras, Hirse, fr. *panic*, *pié de coq*, e. french-wheat, *panic-grass* (v. *panis* Brot? wahrsch. v. *panīca* Risse, Wtst.: *πανική* Perücke v. *πανικός* panisch, den Pan betr.), geb. P. *miliacëum* L. gem. Hirse, Zier. *virgatum* L. „rutenhalm“, fr. *panic effilé*, *plicatum* Lam. m. v. v. (fol. *niveo-vittatis*, fol. *varieg.*, P. *capillare* Gron. (*Eragrostis elegans* Hort., non Nees), P. *altissimum* Desf. Guineagrass, s. g. Mohar od. Riesenschwaden (*maximum* Jacq.).
- Papāver** T., L. (Papaveraceen, XIII. 1) Mohn, (verdorb.) Pfaffen, fr. *pavot*, e. poppy (v. *papa* Papp, d. i. verdickte Milch, u. *verum* wahr — früher z. Einschläfl. d. Kinder), geb. P. *somniferum* L. m. v. v. Gartenmohn (z. B. *monstruosum* Hort. s. *polycephalum* Hort. u. *Mursellii* Hort. (chines. Gart.-M.) — s. g. Päonienmohne), P. *Rhoeas* L. Klatschrose m. v. v. (z. B. fl. *pleno*, s. g. Ranunkelmohn), P. *bracteatum* Lindl., P. *orientale* L. (Kaukas.), fr. P. *d'Orient* od. du Levant, e. eastern Poppy, P. *cambricum* L. engl. M., P. *nudicaule* L. (Sibir.), *crocëum* Ledeb. etc. — *Papaveracëae* DC., Rchb. (-rëae Rchb.).
- 1) **Papaya** T., Juss. (sc. *Carīca*) B. (Peponiferen, XXII. 9) Melonenbaum, fr. *papayer*, melonifere u. lolotier, e. papaw od. melon-tree (malayisch. Name *papaia-maram*), P. *vulgaris* Lam. (Caric. Pap. L.), *sylvestris* Rumph., fr. *champada*, s. *Bergera Koenigii* L. f. (B. Ostind.). — *Papayacëae* Mart. (zu *Peponifëræ* Bartl.).
- Paphinia** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Paphinie“, d. i. Paphia-od. Venus-O. (v. *Paphia* Zuname d. Venus n. d. Stadt Paphos auf Cypern), T. *cristata* Lindl. (Guyana), s. *Maxillaria*.

- Papilionacéae** L., Rchb. „Schmetterlingsblütige“, fr. papilionacées (v. papilio Tagfalter — Gestalt der Leguminosen-Blüten!).
- Papiria** (-**pyria**) Thunb. (Amaryllideen, VI. 1) Lustlilie, Papierlilie D. (v. papȳrus Papierstaude — Blätt. wie Papierrollen u. m. trockner Hautscheide), s. Gethyllis L.
- Pappophorum** Schreb. (Gräser, III. 2) „Dunenträger“, Federgras D. (gr. *πάππος* Grossvater, davon lat. pappus Greisenhaar od. Federkronen — Ähre ein seidenglänzend. Büschel!), z. B. gracile R. Br. (Enneapogon gr. Desv. „Neunbart“), alopecuroides Vahl (Südamer.).
- Papyrifera** Vent., s. Broussonetia papyrif. Vent. (Moreen, XXII. 4) Papier-Maulbeerbaum, „Papiertägerin“ (papȳrus u. fēro — Bast zu Papier benutzt!).
- 1) **Papȳrus** Bruce, W. (Cyperaceen, III. 1) „Papierstaude“, fr. jonc papyracé (gr. *πάπυρος* i. q. *βίβλος* od. *βύβλος* Papierbinse), P. antiquorum W. = *Cyperus Papȳrus* L. 2) **Papȳrus japonica** Lam., s. Morus s. Broussonetia papyrifera Vent. Papier-Maulbeerbaum (s. eb.).
- Paradisia** Mazzucati (Liliaceen, VI. 1) „Paradies“ (Eigenname Paradiis! schwerl. *παράδεισος* Baum- od. Paradiesgarten!), Zier. P. Liliastrum Bertol. unechte Zaunlilie, s. Czackia s. Anthericum Liliastrum L.
- Parallosa** Alfd. (Leguminos. Viciaen, XVII. 4) einblüt. Erve, P. monanthos Alfd. (Ervum m. L.), s. Vicia monantha Koch (Cracca monanthos Godr. Gren. (gr. *πάρυλος* v. *παρά* bei u. *ἄλος*, -ος See, Eilschiff — weg. d. Schiffchens d. Blüte? — unklar!).
- Pardalianches** (sc. Doronicum) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Genswurz, „Leopardenwürger“, Schwindelkraut, fr. doronic, herbe aux panthères, e. leopard's-bane od. panther-strangler (gr. *παρδαλιανγέ;* sc. *φάρμακον* Arznei, woran d. Panther erstickt), s. Doronicum austriacum Jacq.
- Pardanthus** Ker (Irideen, III. 1) „Pantherblume“ (*παρόδος* Panther, *ἄνθος*; Bl. — pantherfleckige Bl.!), P. chinensis Ker (Moraea chin. Thb.).
- Pareira** (sc. Cissampelos) L. (Menispermeen, XXII. 13) gebräuchl. Grieswurz, portug. u. fr. Pareira brava d. i. wilder Weinstock, fr. auch vigne sauvage, liane en coeur (- tête de serpent).
- Parellus** (sc. Lichen) L. (Flechten, XXIV. 3) „Wandflechte“ (fehl. st. parietellus v. paries, -ētis Wand!).
- Pariāna** Aubl., Schreb. (Gräser, XXI. 7) „Guianagras“ (guian. Name dess.!), z. B. glauca Nees, campestre Aubl.
- Parietales** Endl. „Wandfrüchtige“ (v. paries, -ētis Wand — an d. Fruchtwänden befest. Samen!).
- Parietaria** T., L. (Urticaceen, XXIII. 1) „Wand“- od. Mauerkraut, Glas-, Peterskr. etc., fr. casse-pierre, perce-muraille, herbe de Nôtre-Dame, e. pellitory of the walls, parietary, Peterswort (s. eb.), s. Perdicium G. Frank.
- Paris** L. (Melanthaceen, VIII. 4) Einbeere, Wolfs- od. Fuchsbeere, fr. raisin de rénard od. herbe paris, e. herb-Paris od. true love (v. par, -is Paar — gleiche Vierzahl aller Teile), P. quadrifolia L. gift. Einbeere (Wald).
- Parkia** R. Br. (Mimoseen, XXIII. 1) „Mungo-Park's“-Mimosa (n. d. ber. schott. Reis. Mungo-Park, † 1805 in Afrika), P. africana R. Br., s. Inga biglobosa s. senegalensis u. Mimosa taxifolia Pers.
- Parmelia** Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Schild“- od. Schüsselflechte (v. parma Fechtschild — Form d. Fruchtlagers!), z. B. conspersa Ach., usneoides ds. etc.
- Parnassia** T. (Saxifragaceen, V. 3) Ein- od. Herzblatt, Leberblume, fr. fleur du Parnasse, Parnassie, fleur hépatique, hép. blanche noble

(n. d. Berg Parnassus bei Delphi, d. Sitz d. Musen). — Parnasiæa Rechb. (zu Cistifloræ Bartl.).

**Parochëtus** Hamilt. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Grabenbohne“ (παρά bei, ὄχρητος Graben, Canal — kriechende Uferkräuter!) Ampel *P. communis* Ham. (Westind.).

**Paronychia** T., Juss. (Portulacæen Illecebreen od. Paronychieen, V. 1) „Nagelkraut“ (gr. παρωνυχία Nietnagel — Aussehen d. Deckblätt. u. geg. Fingerkrankh.), z. B. *serpyllifolia* Lam. (Illecëbrum s. Vill.). — Paronychiacæa St. Hil., -iæa DC.

**Parrotia** C. A. Mey. (Hamamelideen, IV. 2) „Parrotie“ (n. F. Parrot, Arzt z. Heilbronn, † 1841, Prof. z. Dorpat), z. B. *P. persica* C. A. Mey. (Hamamelis p. Fisch.).

**Parthenium** (sc. Pyrëthrum) Pers. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Jungfernkraut“, Mutterkraut, fr. parthénie, espargoutte, petit-muguet (v. παρθένος Jungfrau — gegen Frauenkrankheiten gebr.; Παρθένιον bei d. Alten noch andere, z. B. *Parietaria*, *Chrysocöma* etc. Wtst.), s. *Matricaria Parthenium* L., Zier: v. v. (z. B. Teppichg. aurëa, e. golden-feather). 2) **Parthenium** L. (Ambrosiaceen, XXI. 5) „Jungfernbrume“, z. B. *P. Hysterophorus* Vaill. „Gebärmutter-träger“, *integrifolium* L., s. *Villanova* Lag. Spr.

**Paspalum** L. (-lus Mch., Flüge) (Gräser, III. 2) Pflannengras, fr. pas-pale, cérésie (gr. πάσπαλος Hirse aus πάσ ganz u. πάλη Mehl), z. B. *digitatus* Mch., s. *Digitaria pilosa*.

1) **Passerina** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Spatzenstrauch“, „Sperlingskraut“, Vogelkopf D., Spatzenzunge, fr. passerine (v. passer Sperling — Samen wie ein Vogelskopf), Zier. *P. filiformis* L. u. *grandiflora* L. f. (Cap), *hirsuta* L. (Metnam Forsk., Sanamunda Brey) (Str. Südfrankr.). 2) **Pass.** Wickstr. (sc. *Stellera*) L. (Thymeläac., VIII. 1) Spatzenkraut, fr. le grémil d'Allemagne, s. *Passerina annua* Wickstr. 3) **Pass.** (sc. *Erica*) L., „Sperlingsheide“.

**Passiflora** Juss., L. (Asclepiad. Passifloreen, XVI. 2) „Passionsblume“, fr. fleur de la passion, grénadille, e. passion-flower, granadille, virginian-climber (v. passio Passion od. Leiden Christi — n. Ferrari in d. Blume d. Zeichen der Leiden Christi od. Marterwerkzeuge zu finden), Balkon: *P. coerulea* L., *hermesina* Lk., Ott. (Rio Janeiro), *edulis* Sims (Bras.), fr. grénadille, e. water-lemon, *racemosa* Brot., *quadrangularis* L. (Peru) etc. — Passifloræ Juss. (zu Asclepiadæa Rechb. od. Peponiferae DC.).

**Pastinaca** T. (Umbelliferen, V. 2) „Pastinak“, Zuckerwurzel, fr. panais, e. parsnep (-nip) (v. *pastinum* Hacke — womit d. essb. Wurzeln ausgemacht wurden, Wtst. v. *pastus* Nahrung!), *P. sativa* L. m. v. *urens* Requien.

**Patientia** (sc. *Rumex*) L. (Polygoneen, VI. 3) Garten-Ampfer, s. g. englisch. Spinat, fr. patience u. pabelle, e. engl. spinage (v. *patientia* Geduld — lässt sich immer wieder schneiden! Wtst.: von langsam. medicin. Wirkung!).

**Pattersonia** R. Br. (Irideen, III. 1) „Patterson's“ -Schwertel (n. W. Patterson, engl. Cap-Reis., schr. *Narrative of four journeys etc.* London 1789).

**Paulinia** Schum., L. (Sapindaceen, VIII. 3) „Paullinie“, fr. liane, Paulinie (n. d. Bot. Paullini), z. B. *P. asiatica* L., fr. liane épineuse, *P. australis*, *barbadensis*, *caribaea*, *multiflora*, fr. liane à persil, etc., s. *Seriana* Schum., *Scopolia* Sm. etc. — Paulliniæa Rechb.

**Paulownia** Sieb. u. Zucc. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Paulownienbaum“, Blauglockenb., Zierb. *P. imperialis* S. Z., fr. Paulownie imperiale, e. imperial P. (n. Anna Paulowna, russ. Grossf. u. Gemahlin d.

- Prinz. Friedrich d. Niederlande), s. *Bignonia tomentosa* Thb. u. *Incarvillea tom.* Spr.
- Pavetta** Rheed., L. (Rubiaceae, Cinchonaceae, IV. 1) „Pavetta-Baum“, Scheel- od. Schellkorn D. (malabar. Name d. B.'s!), z. B. *P. indica* L., *australis* Hook., *pentandra* Sw. (*Psychotria Pavetta* Sw., Bstr. Ostindiens) etc.
- Pavia** Boerh. (zu *Aesculus* L.) Rchb. (Sapindaceae, Hippocastaneen, VII. 1) „Paw's“-Rosskastanie (n. Pet. Paw, im 16. Jahrh. Prof. in Leyden), Zierb. *P. rubra* Lam. (*Aesculus Pavia* L.), e. american small buck-eye, *P. lutæa* Poir. Wangenh. (*Aesc. flava* DC.), fr. pavier jaune, e. amer. sweet buck-eye, *P. humilis* G. Don, Lodd. (*Aesc. Pavia* var. *humilis* Hort. u. v. *atro-sanguinea* Hort.), *P. alba* Poir. s. *edulis* Hort., *P. discolor* Pursh (*Macrothyrsus discolor* Spach), *P. s. Aesc. glabra* W., *P. s. Aesc. rosæa* Arb. Musc. etc.
- Pecten** DC. i. q. *Pecten-Veneris* (sc. *Scandix*) L. (Umbellifere, V. 2) „Kamm-Kerbel“, „Venuskamm“ (*pecten*, -inis Kamm — zweireihig bebart. Fruchtschnabel).
- Pedicularis** T., L. (Scrophulariaceae, XIV. 2) „Läusekraut“, Rodel O. W., fr. *pédiculaire*, *crête de coq*, e. lice-bane, louse-wort (v. *peditulus* Laus — früh. Anwend. geg. d. Läuse u. Samenform).
- Pegänium** L. (Rutaceae, XI. 1) „Feistraute“ (*πήγανον* Raute, Wtst.: v. *πήγνυω* erhitze? — Geschmack u. Wirkung!?) vielmehr *πήγω* od. *πήγνυμι* schlage, befestige, *πήγος* feist etc. — angebl. weg. d. fleisch. Blätter, F. W. Riemer), z. B. *P. Harmala* L. = *Πήγανον ἀγριόν* Diosc.
- 1) **Peireskia** Spr. (auch -quia u. **Pereskia** Plum., Pers.) (zu *Cactus*) Rchb. (Cacteen, XII. 1) „Peiresce's“-*Cactus*, Baum-C. (n. Nic. Fabrice de Peiresce, lat. *Peireskios*, in Aix, † 1637, schr. üb. Pflanzenkultur), z. B. *P. aculeata* Plum. u. *portulacaefolia* (Cact. *Pefreskia* Pers. u. port. L.). 2) **Pereskia** Fl. Flum. (Theaceae, XIII. 1) (zu *Hippocrateä* L.).
- Pelargonium** l'Hér. (Geraniaceae, XVI. 5) Kranich- od. „Storchschnabel“ (v. *πέλαργος* Storch, aus *πέλος* schwarz u. *ἀργός* weiss — schnabl. Frucht!), Zier. *P. peltatum* Ait. (Epheu-Geranium d. Ampeln), zonale W. m. v. v. u. *inquans* Ait. m. v. v. (— Scharlach-Geraniën d. Gärt. u. Stuben) u. daraus Blendlinge od. Hybriden, *P. grandiflorum* W. s. g. Blumisten-P. m. v. v. u. Hybriden, e. fancy-Pel. d. i. „Phantasie“-P.; *P. capitatum* Ait. d. d. St. Stuben-P., *P. odoratissimum* Ait. s. g. Citronen-Ger., *P. roseum* Hort. (rosendörum Hort., *radula roseum* W.) Rosen-Ger., *quercifolium* Ait. etc.
- Pelecyphora** Ehrbg. (Cacteen, XII. 1) „Beilträger“ (*πέλεκτος* Beil, *φορός* tragend — Rutenbündel d. röm. Consuln!), *P. aselliformis* Ehrbg. „Rutenbündel“-C. (*Fasces-C.*), s. *Melocactus* C. Bauh.
- Pelegrina** (sc. *Alstroemeria*) L. (Liliaceae, VI. 1) bunte *Alstroemerie* M.-Rchb., „Pilgerin“ (*pelegrinus* st. *peregrinus*, fr. *pelerin* Pilger, Fremdling).
- Peloria** pentandra L. (Scrophulariaceae, V. 1 od. XIV. 2) Frauenflachs, Fünffaden-Leinkraut, s. *Linaria vulgaris* Mill. Abnormität (gr. *πέλωρ*, -ος Ungetüm, Monstrosität — ausgeart. Form!).
- Peltandra** Raf. (Araceae, XXI. 1) „Scheiben“- od. „Schildbeutel“-Aron (*πέλιτη* Rundschild, *ἀνήρ*, -δρός Mann, Staubbeutel — dies. schildförm.), *P. virginica* Raf., s. *Arum* L.
- Peltanthëra** Roth (Apocynaceae, V. 1) „Schildanthere“ (s. eb. u. *ἀνθηρά* — d. Antheren hängen m. d. Mitte wie Schildchen an d. Narbe).
- Penicillaria** W., Sw. (Gräser, III. 1 od. XXIII. 1) „Pinselgras“, s. g. Duhn (v. *penicillum* Pinsel — Ährchen in Grannen gehüllt), z. B. *spicata* W. (*Holcus spic. L.*), s. *Pennisetum typhoideum* Pers. (Ostind.).

- Penicillium** Lk., Pers. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Pinselschimmel“ (s. eb.), z. B. *glaucum* Pers., *candidum* Grev., s. *Botrytis sparsa* Spr.
- Pennisetum** Rich., P.-B. (Gräser, III. 1) „Federborstengras“ (penna Feder, seta Borste — Ährchen in gezähnte Borsten gehüllt), Zier. *longistylum* Hochst. (Abyss.) s. *villosum* u. *angustifolium* Hort., s. *Gymnothrix* Hb. „Nackthaar“.
- Penstemon** Ait. (Pentst.-l'Hér., **Pentastemon** l'Hér., Hort.) (Scrophularineen, XIV. 2 od. V. 1) „Fünffaden“, Bartfaden Rmpl. (*πέντε* in compos. *πέντα* fünf, *στήμων* ò d. Staubfaden — deren hier 5 st. 4!), Zier. *gentianoides* G. Don m. v. v. (Chelone g. Hb. Bpl. Kth.), *pubescens* Ait. s. *hirsutus* W., s. *Chelone Penstemon* L. (Cynorrhinchium nov-anglicum Pluk.), *heterophyllus* Hort., *hybridus* Hort., *P. Digitalis* Nutt. (Chel. Dig. Sweet) etc.
- Pentadesma** Don, R. Br. (Guttiferen Garcinieen, XVIII. 2) „Fünfbündel“, Butterbaum, *P. butyracea* Don (s. eb. u. *δέσμη* Bündel — d. Staubfäden in fünf Haufen).
- Pentandria** L., V. Kl. „Fünfmännige“ (s. v., *ἀνήρ*, -*δρός* Mann, Bot. Staubgefäß!).
- Pentapetes** L. (Sterculiac. od. Büttneriaceen, XVI. 7) „Fünfblatt“- od. Scharlach-Malve (*πενταπειτές* i. q. *πεντάφυλλον* Fünfblatt — fünfteil. Laub, Kelch u. Kapsel), *P. phoenicea* L., s. *Cavanillea phoen.* Gm. (Dombeya ph. Cav.).
- Pentapterigium** flavum s. *Pentapteris*! sogl.
- Pentapteris** Hall., DC. (Onagreen Halorageen, XXI. 8) „Fünfflügel“-Tausendblatt (s. v. u. *πτεροίς* od. *πτερον* Flügel), s. *Myriophyllum* L. u. *Pentapterophyllum* Dill.
- Pentapterophyllum** Dill. (Onagreen Halorageen, XXI. 8) „Fünfflügelstengel“ (s. v. u. *φύλλον* Laub — Blätt. zu fünf in Quirlen), s. *Pentapteris* Hall.
- Pentaria** DC. (Asclepiad. Passifloreen, XVI. 2) „Fünfblatt“-Passiflora (zu *Murucua* T., Aubl.) (v. *πεντάς* Fünffzahl — Perigon aus 10 Teilen).
- Pentarrhaphia** Lindl. (schlecht **Pentarraphia**!) (Bignoniaceen, XIV. 2) „Fünfnacht“, bauchige Gesnerie (s. v. u. *δραφή* Nacht — Kelchröhre fünfrüppig), *P. cubensis* Decsn., s. *Gesneria ventricosa* Hort.
- Pentas** Benth. (Cinchonaceen Hedyotideen, V. 1) „Fünfappenblume“ (*πεντάς* Fünffzahl — je 5 Teile!), Treibh. *P. carnea* Benth. (Sipanča Hort.), *carnea rosea* Van Houtt.
- Pentastemon** s. *Penstemon*!
- Peperomia** Rz. Pv. (Piperaceen, II. 3) (zu *Piper* L.) „Pfeffergewächs“ Rmpl. (v. *πέπερι* Pfeffer u. *όμός* gleich), z. B. Stuben-Blattpfl. *P. arifolia* Miq. v. *argyrea* Hort. (marmorata Hook.), Warmh. u. Stub. resediflora Lind., Verschaffelti Lem.
- 1) **Peplis** (sc. *Euphorbia*) L. (Euphorbiaceen, XI. 3) Meerstrands-Wolfsmilch (*πεπλίδς* od. -*ος* Kleid — bedeckt d. Erde nach all. Seiten, Wtst.? wohl weg. d. Deckblätter!). 2) **Peplis** L. (Lytharieen, VI. 1) Bachbucgel, Sumpfwendel Seub. (Peplis bei Plinius das Kraut *Portulak*). 3) **Peplus** (sc. *Euphorbia*) L. (Euphorbiaceen, XI. 3) Garten-Wolfsmilch, „Gewand“-W. (v. *πέπλος* Gewand — weg. d. Hüllblatt.!).
- Pepo** T. (sc. *Cucurbita*) DC. (Cucurbitaceen, XXI. 10) gem. Kürbis, „Phebe“ od. „Pfebe“, fr. *pepon* od. *potiron*, e. *pompion* (*pumpion*) od. *pumkin* (gr. *πέπων*, lat. *pepo* Melone, Pfebe, v. *πέπων* reif), Zier. u. geb. *C. Pepo* v. *aurantiformis* Hort. „Apfelsinen“-K., v. *verrucosa* Hort. „Warzen“-K., v. *piriformis* alba, *striata* u. *annulata* Hort., v. *maliformis* u. *malif. praecox* Hort.
- Peponiferae** Endl., Bartl. Kürbisfrüchtige od. „Pfebenträger“ (s. eb. u. *fēro* trage).

- 1) **Perdicium** L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Rebhuhn“-Lattich (v. perdx, -ïcis Rebhuhn — soll v. Rebhühn. ausgescharrt werden), P. lactucoides Vahl (Aster magellanicus Lam.), brasiliense L., chilense W. etc., s. Tussilago. 2) **Perdicium** DC. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1), P. Taraxaci Vahl (semiflosculare Thb., Cap). 3) **Perdicium** G. Frank (Urticaceen, XXIII. 1), s. Parietaria T.
- Pereskia** s. Peireskia!
- Peretta** Risso (Aurantiaceen, XVIII. 2) „Perette“, Limette, Bergamotte (ital. peretta Birnchen, dem. v. pera Birne), s. Citrus Limetta Risso.
- Perfoliata** Burm. (-tum G. Fr.) (Umbelliferen, V. 2) „Durchwachs“-Hasenohr (per dum, folium Blatt — d. Stengel scheint durch dass. hindurchgewachsen!), s. Bupleurum longifolium, rotundifolium etc. L., Bruchwurz: z. B. montana u. alpina Bauh. etc.
- Perforaria** Chois. (Hypericineen, XVIII. 2) durchstochenes Johanniskr., s. Hypericum perforatum L. (perforo durchbohre — durchsichtige Punkte in d. Blätt.).
- Pergularia** L. (Asclepiadeen, V. 2) „Laubenstrauch“ D., fr. pergulaire (v. pergūla Durchgang, Rebengeländer — wozu d. windende Str. geeignet), z. B. edulis Thb., purpurea Vahl (Asclepias cordata Burm.) etc.
- Periclymenum** Mill. (sc. Lonicera) L. (Caprifoliaceen, V. 1) deutsches od. Wald-Geisblatt, Specklilie, fr. chèvre-feuille des bois, e. woodbine, common honey-suckle (gr. περιζύμενον rankend. Strauch!), P. vulgare Mill. (Lonic. Pericl. L.), s. Lonicera germanica Dietr. (Caprifolium Per. R. Sch.).
- Perigynia** Juss. (Mono-Perigynia, sc. Monocotyledones) „Umweibige“ (περὶ herum, γυνή Weib, Stempel — diese um- d. i. nicht ober- noch unterständig!).
- Perilla** L. (Labiaten, XIV. 1) „Perille“, Grossmelisse (indisch. Name d. Pfl.!), P. ocimoides L. (Melissa maxima Arduino), Zier. P. nankinensis Decsn. m. v. atro-purpur. fol. laciniatis Hort. (Blattpfl.).
- Peripetalia** Juss. „Umkronblättrige“ (περὶ herum, πέταλον Kronblatt — letztere stehen um die Stempel herum, nicht höher oder tiefer!).
- Periplœca** L. (Asclepiadeen, V. 2) Baumschlinge, fr. périploque (gr. περιπλοκή Umschlingung — Schlingstrauch), Zier. P. graeca L. griech. Seidenrebe od. Hundsschlinge, s. g. Maltheserkreuz Rmpl., fr. Pér. de la Grèce, e. greek P., -silk-tree.
- Peristaminia** Juss. mit „umständigen“ (nicht ober- noch unterständig.) Staubfäden (s. v. stamen, -ïnis).
- 1) **Peristëra (-ia)** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Tauben“-O. (περιστέρα Taube — schnablige Frucht), z. B. P. elata Hook. 2) **Peristëra** DC. (Geraniaceen, XVI. 4) Tauben-Ger., s. Pelargonium l'Hér.
- Peristylus** Lindl. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Umgriffel“-O. (s. v., στύλος Säule, Griffel), z. B. albidus Lindl. (Habenaria Sw., Gymnadenia R. Br., Orchis albida Scop.).
- 1) **Peronia** Rêd., DC. (Cannaceen, I. 1) „Peron's“-Bl. (Wtst.: n. Fr. Peron, unter Baudin Reis. in d. Südsee, † 1810), z. B. stricta Rêd. (Thalia dealbata Fras. Sow.). 2) **Perona** Pers. (Zitterpilze, XXIV. 4) „Peron's“-Zitterpilz.
- Peronospora** Tul., DC. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Bohrschimmelpilz“ (v. περιόρω durchbohre, σπορά Spore, Helm.-Rabht.: v. περιόρη Spitze — d. Spore sitzt an den stachelspitz. Enden d. Seitenzweige), P. infestans Casp. s. effusa Rabht. Kartoffelpilz (— Trockenfäule der Kartoffel).
- Perōtis** Ait., Schreb. (Gräser, III. 2) „Stummelgras“ (περότης od. πηρός verstümmelt — äuss. kleine, wehrlöse Kronspelzen), z. B. latifolia Ait. (Saccharum spicatum L., Alopecurus malabaricus Scheuchz.).

- 1) **Persēa** G. (sc. *Laurus*) L. (Lauraceen, IX. 1) „Perseus“-Lorbeer, Gärtner's heiliger Baum Ägyptens (n. d. Halbgott Perseus, nicht: von Persien), *P. caryophyllacēa* G. Nelkenzimmetbaum, *P. gratissima* G. vegetab. Schmalz (pericarpio butyracēo), echter Abacate- od. Advokatenbaum Leun., *P. indicā* G. Madera- od. falsches Mahagoniholz. 2) **Persēa** (*Laurus* sect. *Rchb.*), z. B. *Laurus* s. *Persea* *Cinnamomum*, *Camphōra* u. *Cassia* L.
- Persīca** T. (Amygdalaceen, XII. 1) „Pfersichbaum“, fr. pécher, e. peach-tree, melicotony (gr. *πεσσιζή*) die Persische — stammt aus Persien), Zier. *P. vulgaris* Mill. fl. pleno Rosen-Pf., v. *coccinēa*, v. v. *versicolōr*, *camelliaeflōra* u. *dianthiflōra* Hort., Gartenobst: *P. vulgaris* Mill. (*Amygdalus* *Persīca* L. u. *sibirīca* Pall.) m. v. v., z. B. fr. grosse Mignonne.
- 1) **Persicaria** (sc. *Polygonum*) L. (Polygonaceen, VIII. 1) Flöhkraut-Knöterich, fr. persicaire (v. *Persica* s. eb. — weg. d. Ähnl. d. Blätter!). 2) **Persicaria** T. (*Polygonum* sect. *Rchb.*), z. B. Zier. *Persic. orientalis* T. m. v. v. tabakblättr. Knöterich, wild *Hydropiper* L., laxiflōrum Weihe, *amphibium* L. etc.
- Personatae** Endl., *Rchb.* Maskenblumige, fr. personnées (v. *persona* Maske) i. q. *Scrophulariacēae* R. Br.
- 1) **Persoonia** Sm. (Proteaceen, IV. 1) „Persoon's“-Silberfichte (n. d. Bot. u. Arzt Persoon). 2) **Persoonia** Mchx. (Compositen). 3) **Persoonia** W. (Hesperideen).
- Pervīca** T., Scop., Lam. (Apocynen, V. 1) Sinn- od. Immergrün, fr. pervenche, e. periwinkle (v. *pervinco* überwinde — näml. d. Winter), s. *Vinca* L., z. B. *latifolia* Garid. s. *major* Lam. (*Vinca* *maj.* L.) u. *minor* Lam. (*Vinca* *min.* L.).
- Petalanthae** Endl. „Kronblütige“, Primelblütige (*πέταλον* Kronblatt, *άνθη* Blüte — diese aus einem Kronblatt bestehend od. ganz!).
- Petalostēmon** DC. (-mum *Rich.*, Mchx.) (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Kronenfaden“ Perring, „Kronblattfaden“ (*πέταλον* Kronblatt, *ὁ στήμων* d. Faden, lat. *stamen* — d. Kronblätt. m. fadenf. Stielen), z. B. *candidus* u. *violacēus* DC., s. *Dalča* L.
- Petasites** T., G. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) Pestilenzwurz, fr. pétasite, chaperonière, e. butterbur od. lag-wort (pestilence-) (gr. *πετασίτης* v. *πέτασος* Sonnenhut, eine schirmblättr. Pfl.), wild *P. officinalis* Fl. Wett. (*Tussilago* *Petasites* L.) u. v. *hybridus* (*Tuss. hybrida* L.), Zier. *P. nivēus* Baumg.
- 1) **Petasostylis** Griseb. (Stypheliaceen, V. 1) „Hutgriffel“ (*πέτασος* Krempehut, *στυλίς* Griffel), z. B. *nigrescens* Van Houtt., s. *Lisianthe* R. Br., *Dietr.* 2) **Petasost.** (fehlerh. *Petalost.*) Lindl. (Gentianeen, V. 2), s. *Omphalostigma* Griseb.
- Petesia** L., Bartl. (Rubiace. Cinchonaceen, IV. 1) „Flügel“-China, Kratz- od. Kranzbeere, fr. pétésie (*Ptesia* Sw.) (v. *πέταμαι* u. *πτάμαι* od. *πτῆμι* fliege), z. B. *P. Lygistum* L. (*Manettia* *Lyg.*), *carnea* Forst. (B.) etc.
- Petīlium** L. (Liliaceen, VI. 1) Kaiserkrone (*πετάλιον* od. *-ήλιον* Blattschirm — Blattschopf üb. d. Blume!), *P. imperiale* L. = *Fritillaria* *imp.* L.
- 1) **Petroselinum** Hoffm. (Umbellifer., V. 2) „Petersilje“, fr. persil, e. parsley (v. *πέτρος* Fels u. *σέλινον* Silje), geb. *P. sativum* Hoffm. (*Apium* *Petrosel.* L.). 2) **Petros.** (*Peucedanum* sect. *Rchb.*), z. B. *Chabraei* *Rchb.*, *austriacum* Koch etc., s. *Oreoselinum* Hoffm., e. *mountain-parsley*.
- Petunia** Juss. (Solaneen, V. 1) „Petunie“, Tabaksblume Rmpl. (n. d. brasil. *petun* „Tabak“), Zier. *P. violacēa* Lindl. m. v. v. (*Nierembergia* *punicēa* Hort., *Pet. mirabilis* *Rchb.* s. *phocnicēa* Lindl.), *P.*

- nyctaginiflora Juss., fr. P. blanche, - à fleurs odorantes, P. hybrida Hort. m. v. v. Bastard-P., hybr. superbissima Hort., s. Nierembergia R. P., Salpiglossis integrifolia u. Nicotiana nyctaginiflora autt.
- Peucedänum** Koch (Umbellifer., V. 2) Haarstrang, Sau- od. Rossfenchel, fr. peucedane, e. sow-fennel (hog's-), hair-strong (hare's-), sulphurwort, hog's-root (gr. *πεικεδανός* i. q. *πιζοός* bitter, Wst.: *πειζνη* Fichte, *δανός* niedrig (?), vielm. ausgetrocknet!), Wies. P. officinale L. etc., s. Selinum, Cnidium etc. — Peucedanaceae Rchb.
- Peziza** Dillw. (Pilze, XXIV. 4) Becherpilz, Napfmorchel, fr. pezize (v. *πέζις* Stiel od. *πέζις* ein gestielt. Pilz, Plinius Pezicae = Lycoperdon Bovista), z. B. lentifera, fr. porte-lentille, etc.
- Phäca** L. (Leguminos. Astragaleen, XVII. 4) Berglinse, Knollenkraut (*φακή* Linsenfrucht), P. floridana W. (Robinia vesicaria Jacq.) etc., s. Astragalus leontinus, oroboides etc.
- Phacelia** Juss. (Boragineen Hydrophyllen, V. 1) „Wasserbündel“, fr. Phacélie (gr. *φάκελος*, lat. fasciculus Bündel — d. Blüt. stehen in Bündeln, Wst.), Zier. P. congesta Hook. (Hydrophyllum bipinnatifidum Mchx.), tanacetifolia Benth. m. v. fl. albo Hort., fr. ph. à feuilles de Tanaise, e. tansy-leaved Ph.
- Phaeacium** Cass. (zu Crepis Rchb.) (Compos. Cichoriac. XIX. 1) Habichtskraut-Pippau M.-Rchb. (*φαιάσιον* schöne weisse Schuhe d. Gymnasiarchen in Athen, F. W. Riemer, *ζοηλῆς*, lat. Crepis = Schuh), s. Crepis pulchra L. s. Prenanthes hieracifolia W.
- Phaedranassa** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Glanzkönigin“, Schminke-lilie (v. *φαιδοός* glänzend, *άνασσα* Herrscherin), z. B. chloracea u. obtusa Herb. (Peru), s. Phycella Lindl. (*φύκος* Schminke).
- Phaius** (-ios, -jus) Lour. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Fahl“- od. „Dunkelorchide“ (*φαιός* schlummerig, dämmerig, fahl u. dunkel — Farbe d. Blüten), z. B. grandifolius Lour. (Pachyne spectabilis Salisb.) etc., s. Bletia R. P., Dendrobium Sw. etc.
- Phalacraea** DC. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Kahl“-Leberbalsam (*φαλακροός* kahlköpfig — d. Achenen ohne Pappus! Wst.), Zier. coelestina u. Wendlandii.
- Phalaenopsis** Blum. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Schmetterlings“-O. (*φάλαυνα*, lat. Phalaena Nachtfalter, *ὄψις* Aussehen — Gestalt d. gross w. Blüten! Wst.), Warmh. Schilleriana Rchb. f. (Philippin.), grandiflora Lindl. (Java) etc.
- Phalangium** T. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Spinnenlilie“, Zaunblume, fr. phalangère, e. spiderwort (gr. *φαλάγγιον* gift. Spinne u. Pfl. geg. deren Biss — weg. d. dünnen, langen Wurzelzweige! Wst.), Zier. P. Liliago Schreb. (Anthericum Lil. L.), P. Liliastrum Lam. (Anther., Czackia Andr., Paradisia Bertol. Hemerocallis Liliast. L.) unechte Affodil-Lilie, fr. lis des Allobroges od. Ph. faux-lis, P. ramosum Lam. (Anther. ram. L.) Erdspinnenkr., Sandgras- od. kleine Sand-Lilie, P. (s. Scilla) pomeridianum DC. californ. Seifenpfl. Leun., etc.
- Phaläris** L. (Gräser, III. 2) „Glanzgras“ (*φαλαρίς* Grasart, v. *φαλαός* glänzend — solche Samen! W.), Zier. P. arundinacea L. v. picta Hort., s. g. Bandgras, fr. roseau panaché, chiendent-ruban, ruban de bergère, geb. u. verwild. canariensis L. Canariengras (-hirse Grck.).
- Phalloidēi** DC. Giftmorcheln od. Eichelpilze (Phallus sogl. u. *είδομαι* gleiche).
- Phallus** L., Mch. (Pilze, XXIV. 4) „Eichel“- od. „Gliedpilz“, Giftmorchel, Giftschwamm Leun. (*φαλλός* Pfahl, männl. Glied, „Eichel“ — Ahnl. damit!), P. impudicus L., rubicundus Fr. (Satyrus rub. Bosc) (Carolina), conicus Müll. (Verpa c. Sw.) etc.



- Phanerogamae** L. „Deutlichblühende“ (*φανερὸς* sichtbar, *γάμος* Ehe, in d. Bot. Blüte).
- Pharbitis** Chois. (Convolvulaceen, V. 1) „Bart“- od. Prunkwinde Rmpl. (gräzisiertes barba Bart! Wtst.: v. *φαρβή* Farbe (!?) — elegante bl., violette od. rote Blüten!), P. barbata od. barbigerä Hort. s. limbata Lindl. (Ipomoea barb. Hort.) m. v. v. (z. B. grandiflora superba), P. Nil Chois. (Ipom. Nil Hort.) (Südam.), Learii Lindl. (Ostind.).
- Pharus** P. Br., L., Schreb. (Gräser, XXI. 6) „Lappen“- od. Nerven-gras D. (v. *φαρος* Lappen, Hülle — Neger zu Kleidungsst.), z. B. latifolius L., P. Br. (Jamaica, Guiana), aristatus Retz. (Zizania Retzii autt.) ostind. Wasserreis.
- Phascum** L., Dicks. (Moose, XXIV. 2) Glanz- od. Bartmoos, Ohnmund, fr. phasque (v. *φάσχω* glänze — bez. d. Kapseln! Rabst., Wtst.), z. B. nitidum s. axillare etc.
- Phaseolus** L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Bohne, „Fasel“ Rmpl., fr. fève, faséole, e. facele, phasel (gr. *φάσηλος* od. *-ήσολος* Bohne u. Kahn — Ähnl. d. Samens damit!), Gart.: P. multiflorus L. türk. od. Feuerbohne m. v. v. bicolor u. albiflorus Hort., e. scarlet-runner bean, fr. haricot d'Espagne od. écarlate „Scharlachb.“, geb. ausserdem P. vulgaris L. gem. Garten- od. Stangenbohne, fr. haricot (des haricots verts Bohnengemüse, - confits au sel eingemachte), P. nanus L. Busch- od. Zwerg-B., fr. féverole kleine Feldbohne.
- Phegoptëris** Fée (Farne, XXIV. 1) „Buchen“- od. Eichenfarn, Tüpfel-F. (*φηγός*, lat. fagus Buche, aber auch Eiche, *πτερός* Farn), z. B. polypodioides Fée (Polypodium Phegopt. L.), Dryopteris Fée „Eichenfarn Grck. (*δρὺς*, *-ίος* Eiche).
- Phelipaea** T. (Scrophularin. Orobanchen, XIV. 2) „Phelipaux“-Sommerwurz (n. d. beid. franz. Marine-Beamten Louis u. Jerome Phelipaux ben.), z. B. Ph. (s. Orobanche) lutea, coerulea C. A. Mey., coccinea etc.
- Phellandrium** T., L. (sc. Oenanthe) Lam. (Umbelliferen, V. 2) Wasserfenchel, Rosskümmel Grck., fr. phellandre (irrtüml. ciguë aquatique Wasserschierling, Cicuta virosa L.), P. aquaticum L. (Oenanthe aquat. Lam.) m. v. conioides Nolte, Grck. (v. *φελλός* Kork? od. *φελλώω* betrüge? *ἀνήρ*, *-δός* Mann? Krause: st. Philydron „Wasserliebhaber“, Wtst. — ungewiss!).
- Phellodendron** Rupr. (Terebinthac. Xanthophylleen, XXII. 5) „Korkbaum“ (*φελλός* Kork, *δένδρον* B.), Zierstr. P. amurense Rupr. (Bstr. v. Amurland).
- Phellos** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) „Kork“- od. Weiden-eiche, fr. chène saule, e. willow-oak (s. eb.).
- Philadelphus** L. (Philadelphéen, XII. 1) Pfeifenstrauch, deutscher Jasmin, fr. Séringa (-gat) (*φιλάδελφος* eig. Schwesterliebhaber, z. B. Ptolemaeus Philadelphus v. *φιλω* liebe, *ἀδελφῆ* Schw., *-ός* Bruder, — geschwisterlich sich umfass. Zweige, Wtst.), P. coronarius L. gem. „Kronen“-Jasmin, Antoniblüh Vilm. (Syringa suaveolens Mch.), fr. séringat commun, Séringa des jardins, e. garland Phil. od. mockorange „Orangenspott“, m. v. v. (z. B. grandiflorus speciosissimus Hort. für Balkone), P. latifolius Schrad. s. pubescens Lois., P. speciosus Schrad. (grandiflorus Hort.), grandiflorus W. (inodorus Hortulan.), P. inodorus L. (Syringa inod. Mch.), P. floribundus Schrad., fr. Sér. florifère etc. — Philadelphacéae Don, Grck., -ëae DC., Rchb.
- Philesia** Juss. (Liliac. Philesiaceen od. Smilaceen, XXII. 6) Lilienstrauch (v. *φιλησία* Dieberei od. *φίλησις* d. Lieben — Liebl. Anblick), Zier. buxifolia Lam. s. magellanica Rausch.
- Phillyrea** L. (Philyrea T.) (Sapotaceen Oleaceen, II. 1) Steinlinde,

- fr. phyllirée, tillot (-lau) (gr. *φιλύρα* od. *-ρη* Linde — ähnl. Blätter), z. B. *latifolia*, *media* etc. (Str. d. Mittelmeergeb.'s).
- Philodendron** Schott, Lindl. (Aroideen Callaceen, XXI. 3) „Baummörder“ (v. *φιλῶ* liebe, *umarme*, *δένδρον* B. — töten B. durch festes Umschlingen!), Stuben: *P. pertusum* Kth., Selloum C. Koch (Sellow'sum Hort.), *fenestratum* Hort. etc., s. *Monstera* Ad., *Caladium* Vent. u. *Arum* L.
- Philogyne** Haw. (Amaryllideen, VI. 1) „Weiberlieb“ (s. v. u. *γυνή* Weib), Zier. odöra Haw. (*Narcissus odorus* W.), e. sweet-scented *Narcissus*.
- 1) **Philonotis** Sw. (Moose, XXIV. 2) „Nassmoos“ (s. v. u. *ροτὶς* Nässe), *P. fontana* Sw. (*Bartramia* f. Sw.). 2) **Philonotis** (sc. *Ranunculus*) Ehrh. (*Ranunc.* XIII. 3 od. 7) blassgelber Hahnenfuss, s. *Ranunc. sardous* Crantz s. *hirsutus* Curt.
- Philydium** Banks (Philydreen od. Juncaceen, I. 1) „Wasserlieb“, Wollentilie D. (v. *ἕδω* in compos. *ἕδω*- [st. *ἰδατος*] Wasser u. *φιλῶ* liebe), Zimmeraquar. *P. lanuginosum* G. (*Garciana cochinchinensis* Dietr.). — *Philydræa* Endl.
- Philyra** Klotzsch (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) „Philyra“-Wolfsmilch (n. *Philyra*, *Oceanide* u. Mutt. d. Chiron, Myth.).
- Phlebodium** R. Br. (Farne, XXIV. 1) „Aderfarn“ (v. *φλεβῶδες* aderig — zahlr. veräst. Adern d. Wedel), z. B. *Decorat.* *P. aureum* R. Br. (*Polypodium* aur. L.).
- Phlegmacium** Fr. (-tium Wtst.) (Pilze, XXIV. 4) Schleimhautpilz (*φλέγμα* Brand u. Schleim, *ἀκμή* Spitze — klebr. Manschette), s. *Myxadium* DC.
- Phlegmaria** (sc. *Lycopodium*) L. (Bärlappe, XXIV. 1) „Brand“- od. „Zünd“-Bärlapp (*φλέγμα* Brand, wie bei Selago — weg. d. Blitzpulvers od. Hexenmehls aus Bärlapp).
- Phléum** L. (Gräser, III. 2) Lieschgras, fr. fléau (fléole) od. marsette (*φλέως* Theophr. Liesch, Wtst.: v. *φλέω* fliesse — geg. Ohrenfluss!), z. B. *P. pratense* L. etc.
- Phlomis** L. (Labiaten, XIV. 1) „Flammenlippe“, fr. phlomide, sauge en arbrisseau „Strauch-Salbei“ od. sauge de Bethléhem (- de Jerusalem), auch Filzkraut Leun., Löwenschwanz Rmpl. (gr. *φλομῖς* Wollkraut v. *φλόξ* Flamme — früher zu Lampendochten), Garten: *P. agraria* Ledeb., *Samia* L., *herba venti* L. etc., s. *Leucas* Burm.
- Phlox** L. (Polemoniaceen, V. 1) „Flammenblume“, fr. u. e. phlox (gr. *φλόξ*, *-γος* Flamme — einige Arten sehr feurig! etc.), Garten: *Drummondii* Hook. m. viel. v. v., *subulata* L. s. *frondosa* Hort., *setacea* L. *Rasen-Phl.*, *nivalis* Sw., *decussata* u. *hybrida* Hort. m. zahlr. v. v., *verna* Sweet, fr. *printanier*, *maculata* L. (*latifolia* Mchx., *pyramidalis* Sm. etc.) m. v. *alba* Hort. (*candida* Pers., *suaveolens* Ait.), *paniculata* L. (*scabra* Sw., *undulata* Ait. etc.).
- Phoenix** L. (Palmen, XXII. 3) Dattelpalme, fr. dattier (palmier d.), e. date-tree (gr. *φοίνιξ*, *-ιξος* Dattelp. u. Phönizier od. Purpur — im Lande Phönizien wachsend), Stub. u. Treibh. *P. reclinata* Jacq. (Cap), *farinifera* Roxb. ostind. *Sagopalme*, *silvestris* Roxb. (Ostind.), *dactylifera* L. (Afr. etc.).
- Phoenixopus** Koch, Cass. (zu *Prenanthes* Rchb. (Compos. *Cichoriac.*, XIX. 1) „Phönixfuss“, Steinsalat, Mauerlattich Seub. (v. *φοίνιξ* Phönix, fabelh. Vogel u. Purpur — Blütenstiele rot), z. B. *viminea* s. *decurrens* Cass., *ramosissima* Rchb. etc.
- Pholiota** Fr. (-dota!) (Pilze, XXIV. 4) „Schuppenpilz“ Kumm. (v. *φολις*, *-ιδος* Schuppe, *φολιδωτός* geschuppt — Manschette flockig, strahlig etc.!), z. B. *mutabilis* Fr., s. g. *Stockschwamm*.
- Phormium** Forst., Thb., L. (Liliac. *Asphodeleen*, VI. 1) Flachslilie, neuseeländ. Flachs (*φορμίον* dem. v. *φορμός* Schilfkorb, Matte —

wozu verwendet etc.!), Techn. u. Zier. P. tenax Forst. neuseel. od. Schifflachs, fr. lin de la Nouvelle Zélande, e. tough-flax-lily od. New-Zealand-flax, s. Chlamydeä tenacissima G.

**Phorolöbus** Desv. (Farne, XXIV. 1) Rollfarn (v. *φοοός* tragend, *λοφός* Lappen — d. Fruchthaufen trägt d. zurückgerollt. Wedelrand), z. B. *crispus* Desv., s. *Allosorus* cr. Bernh. (*Osmunda* cr. L., *Onoclea* cr. Hoffm.).

**Photinia** Lindl. (Pomaceen, XII. 2) „Glanzblatt“-Weissdorn (v.  *φωτεινός* glänzend — immergr. glänz. Bl.!), z. B. *serrulata* Ldl. (*Crataegus glabra* Thb. s. *Mespilus bengalensis* Hort.).

**Phragmidium** Kze., Lk. (Brand-Pilze, XXIV. 4) „Fächerbrand“, „Querwandspore“ (v. *φράγμα* Scheidewand, *είδουαι* gleiche — Sinn unklar!), z. B. *incrassatum* Lk. (auf Rosen u. Rubus), s. *Puccinia* Pers.

**Phragmites** Trin. (Gramineen, III. 2) Schilfrohr (*φραγμίτης* zu Zäunen od. zur Wand dienlich — Gebr. z. Berohrung d. Wände!), P. communis Trin., s. *Arundo Phragmites* L., fr. roseau u. jonc, e. kex (kecks), reed, rush, gem. Teichrohr.

**Phthora** Crantz (Thora L.) (sc. *Ranunculus*) L. (*Ranunculac.*, XIII. 7) Gift-Ranunkel (*φθορά* Verderben, Tod), s. *Ran. hybridus* Biria.

**Phu** DC. (sc. *Valeriana*) L. (*Valerianeen*, III. 1) grosser Baldrian (*Φοῦ* pontisch. Name d. Baldrian n. F. W. Riemer, arab. fu!).

**Phycæa** (-kæa) Wallr. i. q. Algae Roth, Algen od. Tange (gr. *φῖκος*; lat. *fuscus* Tang u. Schminke).

**Phycella** Lindl. (*Amaryllideen*, VI. 1) „Schminklilie“ (s. eb. — Blüt. wie geschminkt rot!), Zier. P. *corusca* Lindl., *Herbertiana* Ldl. u. *ignea* Ldl. (Chili), s. *Amaryllis*.

**Phycomycetes** de By., Ord. d. „Algenpilze“ od. Pilzalggen i. q. *Mycophycæa* Ktzg. (s. eb. u. *μύκης*, -ητός Pilz).

**Phygelius** E. Mey. (*Scrophularineen*, XIV. 2) „Sonnenflüchter“ (v. *φύγω* od. *φείγω* lat. *fugio* fliehe, *ἥλιος* Sonne — liebt schatt. Stand), P. *capensis* E. Mey. (Cap).

**Phylia** L. (*Rhamnaceen*, V. 1) Heidenmyrte (*φύλλα* Teophr. = *Rhamnus Alaternus* L. v. *φύλλον* Laub — immergrüne Blätter), Stuben: P. *ericoides* L. (Str. Cap), *paniculata* Wendl. etc., s. *Chamaelea* Burm. T.

**Phyllamphōra** Lour. (*Nepentheen* od. *Aroideen*, XXII. 13) „Blattkanne“, Kannenstrauch (*φύλλον* u. *ἀμφορεύς* lat. amphōra Kanne — krugförm. Blattbildg.), s. *Nepenthes* Phyll. W.

1) **Phyllanthus** L. (*Euphorbiac.*, XXI. 8) „Blattblume“, fr. *phyllanthe* (*φύλλον* Laub, *ἄνθος* Blüte — dies. unmittelbar. auf d. Blätt.), z. B. *Emblia* L. (*Myrobalanus*), *squamifolius* Spr. (*Nymphanthus* sq. Lour.).

2) **Phyllanthus** Miq. (sc. *Cactus* L. s. *Opuntia* Endl.) (*Cacteen*, XII. 1) „Blattstengel“-C., s. *Epiphyllum* Haw.

**Phyllis** L. (*Rubiaceen*, Cinchonaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Blatt“- od. „Laubdolde“, s. g. schöne „Phyllis“ (*Φυλλίς* Personennamen v. *φύλλον* Laub — besond. schönes Laub!), P. *Nobla* L. (Str. Canar. Ins.), fr. *phyllis*, s. *Bupleuroides* Mch. u. *Valerianella canariensis* frutescens, *simplica Nobla dicta* Dill.

**Phyllocactus** Lk. (*Cacteen*, XII. 1) „Flügelcactus“, s. *Cactus alatus* Hort. (*φύλλον* u. *Cactus*), Stuben: P. *Ackermanni* (Mex.), *grandis* Lem. (Antill., Guian.), *anguliger* Lem. (Mex.) etc., s. *Phyllanthus* Miq.

**Phyllocläduß** Rich., Spach (*Taxaceen*, XXII. 12) „Blattzweigbaum“, „Blattästler“ Perring (*φύλλον* u. *κλάδος* Ast od. Zweig — dieser platt, wie ein Laubblatt!), Zier. P. *stricta* Spach = *Thuja* s. *Biota orientalis* L., Don morgenländ. Lebensbaum, Treibh. P. *rhomboidalis* Rich., *trichomanoides* R. Br. s. *asplenifolius* Lab. (Neuholl.).

- Phylloëce** Salisb. (Ericaceen, X. 1) Blauheide Lauch. (*φύλλον* u. *δοξέω* halte dafür — Blätter linienf. wie bei Erica!), z. B. *taxifolia* Sal. (Andromeda coer. L., Erica c. W.), s. *Menziesia* Juss., Sm.
- Phyllostegia** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Blattdeckblume“ (s. v. u. *στέγη* Decke — d. Kelchlappen blattartig), z. B. *dentata* u. *grandiflora* Benth. (Sandwichs-Ins.), s. *Prasium* gr. Gaudich.
- Physalis** L. (Solaneen, V. 1) „Blasen“- od. Judenkirsche, Schlutte, fr. coquerette, cerise d'hiver, lanterne etc., e. winter-cherry, morel-berry (-cherry) (v. *φύσα* u. *φυσάλις* Blase — Beere in d. blasenart. aufgetr. Kelch!), z. B. wild u. Zier. P. *Alkekengi* L., cult. P. *edulis* s. *peruviana* W. (Atropa ed. Hort.), s. g. *Ananaskirsche*.
- Physocarpus** Camb., DC. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Blasenfrucht“, -spiräe (zu *Spiraea* Rchb., Rmpl.) (s. eb. u. *καρπός* Frucht — d. Kapsel häut. aufgeblasen!), z. B. *Sp. opulifolia* L. u. *amurensis* Rupr.
- Physostegia** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Blasenkelch“, fr. *physostegie* (s. v. u. *στέγη* Decke etc. — d. Kelch blasig aufgetrieb.), Zier. *virginiana* Benth. m. v. *speciosa* Bth. u. *nana* Hort., fr. *Cataleptique*, e. *virginian* Ph., *imbricata* Hook. (*Dracocephalum imbr.* Hort.) (Tex.).
- Physurus** C. Rich. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Blasenschweif“-O. (s. v. u. *οὐρά* Schwanz — Labell m. Hodensackspore), s. *Anoetochilus* Blum.
- Phytelèphas** Rz. Pv. (Calycantheen od. Pandaneen, XXII. 12) Elfenbeinnuss, s. g. vegetabil. Elfenbein, Elefanten-Palme (*φυτόν* Pflanze, *ἐλεφας* Elephant u. Elfenbein — d. harte w. Same als vegetab. Elfenbein!), P. *macrocarpa* R. P., s. *Elephantusia* m. Mart.
- 1) **Phyteuma** L. (Campanulaceen, V. 1) Waldrapunzel, Triftwurz O. W., Teufelskralle (gr. *φύτευμα* Dioscor. kräftigste Pflanze, als *Aphrodisiacum*), z. B. *spicata* L. (*spicatum* L. u. *nigrum* Schmidt s. *Rapunculus* L., Pers.). 2) **Phyteuma** (sc. *Reseda*) L. (Resedaceen, XI. 3) kleine Resede M.-Rchb. 3) **Phyt.** (sc. *Lobelia*) L. Rapunzel-Lobelia.
- Phytocrène** Wall. (Urticaceen od. Menispermeeen, III. 1?) „Quellentrauch“ (*φυτόν* Pfl., *ζοήγη* Quelle — lief. durch Anbohren milden Saft!), z. B. *gigantèa* u. *borneensis* Becc.
- Phytolacca** T., L. (Aizoideen Phytolacceen, X. 5) Kermesbeere, amerik. Scharlachbeere, eig. „Pflanzenlack“, fr. *phytolaque*, teinturier, raisin d'Amérique, e. scarlet-berry, kermes-, ten-stamened-Foxgloves (s. v. u. *lacca* Lack — d. Beere lief. rote Farbe!), P. *decandra* L., dioeca L. (B. Südam. — *bella* *sombra* span.). — *Phytolaccæe* Rchb.
- Picea** D. Don, Lk. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Tanne, „Pechtanne“, Edeltanne Rmpl., fr. *sapin*, e. *pitch-tree* od. *spruce-fir* (v. *pix*, -cis Pech), z. B. P. *alba* Lk. echte, deutsche Edel- od. Weisstanne, s. *Abies alba* Mill. (*Pinus Picea* Duroi, *Abies pectinata* Lam., DC.), fr. *sapin blanc* etc., e. *combe-like-leaved Silver-Fir*, Zier.: v. v. *Rinzii* s. *metensis*, *pendula* etc., P. *balsamèa* Loud. (Canad.) nebst v. *Fraseri* Loud., P. *Nordmanniana* Loud. (Kauk.), P. *Pinsapo* Loud. span. Tanne, P. *Pichta* Loud. sibir. Tanne, *cephalonica* Loud. (*Apolinis* Planch.), *Reginae Amaliae* Helder. (*peloponnesiaca* Hort.), *nobilis* Loud., *amabilis* Loud., *grandis* ds., *lasiocarpa* Lindl. (*grandis* s. *Parconsi* Hort.) (N.-W.-Amer.), *Pindrow* Royle, *Himalaya-Tanne*, P. *firma* Sieb. u. Zucc., *Webbiana* Lindl. (Japan).
- Pichta** (sc. *Picea* Loud., sc. *Abies* Forb.) sibirische Edeltanne, s. eb. (v. d. russ. *picht*. engl. *pitch* Pech).
- Pieris** Ness. (Cyperaceen, III. 1) „Bittersimse“ (*πιρρός* bitter), z. B. *nitens* Nees.
- Picris** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Bitterkraut“, fr. *picride* (*πιρρίς*, -ιδός v. *πιρρός* s. eb.), s. *Crepis* L.

- Pilĕa** Lindl. (Urticaceen, XXI. 4) „Hut“-Nessel, „Haarnessel“ Perring v. *πίλος* Filzhut, Kappe, nicht v. *pĭlus* ein Haar — d. weibl. Blüte m. ein. kappenf. Kelchklappe), z. B. *callitrichioides* Lindl., *muscosa* Ldl., *serpyllifolia* Wedd. (Urtica *serpyllacea* Kth.) etc.
- Pilocarpus** Vahl (Rutac. Diosmeen, V. 1) Schleuderfrucht D. (s. eb. u. *ζαοιός* — d. Endocarp löst sich ab u. springt elast. in zwei Lappen auf), z. B. *pinnatifolius* u. *racemosus* Vahl (Str. Westind.), s. *Evo-nymus latifolius* racem. Plum.
- Pilocerĕus** Lem. (Cacteen, XII. 1) Hut- od. Kugel-Kerzencactus Rmpl., „Haar“- od. „Vlies“-Kerzencactus (v. *πίλος* Filzhut od. auch v. d. lat. *pĭlus* Haar u. *Cerĕus* Säulen- od. Kerzencactus), z. B. *Houllertianus* Lem., *chrysomallus* Van Houtt., etc., s. *Cephalocerasus* Pfeiff.
- Pilogyne** Schrad. (Cucurbitaceen, XXI. 10 od. XXII. 3) Kugel- od. „Hutgriffel“, „Stempel“ (s. v. u. *γυρή* Weib, Bot. Stempel — kopf- od. hutförm. Narbenklappen!), z. B. *suavis* Eckl. (*Bryonia scabra* Thb.).
- Pilophōra** Jacq. (Palmen od. Pandaneen, XXI. 5—10) Mützen-, Muff- od. Netzpalme (s. v. u. *γοός* tragend), *P. saccifera* Jacq., s. *Manicaria* sacc. G. sacktrag. Netzpalme, auch vegetabil. Elfenbein (vgl. *Phytelĕphas*).
- Pilosella** Koch (zu *Hieracium* L.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Mäuse-ohrlein-Habichtskraut, fr. piloselle, oreille de rat (dem. v. *pilosus* haarig — Behaar. d. Blätt. u. Stiele!).
- Pilularia** L. (Marsiliaceen od. Wasserfarne, XXIV. 1) „Pillenfarn“, fr. pilulaire, mousse dorée (v. *pilula* Pille, dem. v. *pila* Ball — Sporangien wie Erbsen od. Pillen!), *P. globulifera* L.
- 1) **Pimelaea** Sm. (-lĕa Banks, -lia Forst., Sm.) (Thymeläaceen, II. 1 od. X. 1) „Fett“- od. „Schmeer“-Seidelbast, neuholl. Glanzstrauch Schmidl. (v. *πιελλή* Fett, Schmeer — fett- u. harzreich!), *P. decussata* R. Br., *rosea* ds., *laevigata* G. (*Passerina prostrata* L.), *P. Gnidia* Sm. (*Banksia* Gn. Forst.). 2) **Pimela** Lour. (Sapindac. od. Terebinthaceen, XXII. 5) Schmeer-Canarienbaum, Schmeer-Copal, *P. nigra* Lour., s. *Canarium Pimĕla* W. (*Cossinia borbonica* DC.).
- Pimenta** Lindl. (Myrtaceen, XII. 1) „Pimentpfeffer“-Strauch, fr. piment, poivre de la Jamaïque, e. cod-pepper, pimento (-ment) (v. d. span. pimento, indianischer Pfeffer), s. *Myrtus Pimenta* L.
- Pimpinella** L. (Umbelliferen, V. 2) Bibernelle, fr. pimprenelle, e. burnet od. pimperlenn (-pinell) (*pimpinella* st. *bipinnula* „doppeltiederige — bez. d. Blätter), z. B. *alba* s. *Saxifraga* L. Stein- od. Bockspeterlein, fr. persil de bouc, boucege, *P. Anisum* L. „Anis“, fr. l'anis, s. *Tragium Anisum* Lk.
- 1) **Pinardia** Cass. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Pinardie“ (n. Pinard, Vorst. d. bot. Gartens z. Rouen), z. B. *coronaria* Less. (Wallis, Veltlin). 2) **Pinarda** Fl. Flum. (Scrophularineen).
- Pinaster** Clus. (sc. *Pinus*) Sol., L. (Coniferen, XXI. 9) Sand-, Strand- od. Bordeauxkiefer, Terpentinkiefer Vilm., Büschelk., fr. pinastre, pin maritime od. de Bordeaux, e. cluster-pine, pinaster-pine, s. *Pinus maritima* Poir. s. *syrtica* Thore (deter. v. *pinus* Kiefer).
- Pincenectia** (-netia) DC. (Bromeliaceen, VI. 1) „Pincenetie“, Keulenlilie (n. d. franz. Eigennamen *Pincenect* od. -net, Wtst.: viell. st. *Freycinetia*), Warmh. *P. glauca* DC. (*Dasylirium* gl. R. Br.), *tuberculata* Hort., span. *Porra* d. i. Keule (— weg. d. unten keulig erweiterten Stammes!).
- Pinckneya** Rich., Ait. (-nĕa Pers.) (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Pinckney's“-Chinastrauch (n. d. nordamer. Bot. Pinckney), Treibh. *P. pubescens* Pers. (Südcarolina).

- Pinča** (sc. Pinus) L. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Pinie“, Nusskiefer, fr. pigmon, e. pinion (pinēus föhrenartig v. pinus Föhre, Kiefer).
- Pinguicūla** L. (Lentibularien, II. 1) „Fettkraut“, Butterschmeerwurz, s. g. Kiebitzfett G. Fr., fr. grassette, herbe grasse od. huileuse u. tue-brébis „Schaftod“, Wolff, auch langue d'oise u. sanicle à éperon (dem. v. pinguis fett).
- Pinites** Goepf. (foss. Conifer. Abietineen, XXI. 9) Bernsteinbaum, P. succinifer Goepf. (v. pinus u. succinium Bernstein).
- Pinsapo** (sc. Abies Boiss. od. Picča Lindl.) (Conifer. Abietineen, XXI. 9) spanische Edeltanne Rmpl., fr. sapin d'Espagne, e. mount-Atlas-Cedar (zusamm. aus Pinus u. Sapo, franz. sapin Tanne), s. Abies Luscombeana Hort.
- Pinus** L., Lk. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Tanne, Föhre, Kiefer, fr. pin u. sapin, e. pine-tree u. fir (gr. *πίνος* od. *πινος* Harz, Theophr. Tanne, lat. pinus, v. d. celt. pin Berg), P. sylvestris L. Föhre, Forle od. Kiefer, fr. pin sauvage od. sylvestre (- d'Ecosse etc.), e. fir-tree, scotch-fir, bull-trout etc., m. v. argentea Hort., P. Strombus L. Weymouthskiefer, fr. pin du lord Weymouth, P. virginiana, fr. pin de Jersey, P. austriaca Höss. s. nigra Lk., P. Taeda L., fr. pin d'encens Weihrauch- od. Terpentinkiefer, rigida Mill., excelsa Hamilt. Trauerkiefer od. Kiefernkönig, fr. grand Pin du Népal od. pleureur, e. lofty-pine, etc.
- Piper** L. (Piperaceen, II. 3) „Pfeffer“, fr. poivre (-vriar), e. pepper (gr. *πέπερι*, arab. babary, lat. piper), z. B. aggregatum Berg. (Lacistema myricoides W.), nigrum L., fr. caméade wilder od. Bergpf., longum orientale L., fr. pimpelin od. pipot, P. Cubeba L., Betle L., etc. — Piperacæe Rich., -itae DC., -inae DC.
- Piptanthus** Sweet (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Fallblüte“, indisch. Zirkelhülsenbaum (zu Anagyris T.), A. indica autt. (v. *πίπτω* lasse fallen, *άνθος* — lässt beim Aufgehen d. Blume fallen).
- Piraster** Wallr. (sc. Pirus) L., Borkh. (Pomaceen, XII. 4) Wild- od. Holzbirne, fr. poirier commun, s. Pirus Achras G. s. communis L., Zier. v. v., z. B. fl. pleno Hort. (deter. pirus Birnb.).
- Piröla** <sup>9</sup>T. (Pyröla L.) (Ericaceen Pirolaceen, X. 1) Wintergrün, fr. pirole, e. winter-green (dem. v. pirus Birnbaum — „Aussehen d. Blätter“), s. Limonium G. Fr. — Pirolacæe Lindl.
- Pirus** Græk. (bess. als Pÿrus L.) (Pomaceen, XII. 4) Birn- u. Apfelbaum (v. pirum, fr. poire Birne od. pirus, fr. poirier Birnbaum, nicht v. *πιρός* Weizen), P. communis L. u. P. Malus L. Holzbirn- u. Holzapfelbaum, fr. poirier u. pommier-sauvage, e. wild pear- u. crab- od. wild-apple-tree; Zierb. P. nivalis Jacq., fr. poire de neige, e. snowy-leaved-pear-tree, P. sinensis Lindl. (sinica Royle, communis Lois.), fr. poirier de la Chine, e. chinese p.-tr. m. v. v., P. baccata L. (Malus bacc. Desf.), fr. pomme baccifère od. - de Sibérie, e. siberian crab m. v. v., P. spectabilis L. Ait. Prachtapfelb., fr. pomme-fleuri, e. showy-flowering wild apple tree od. chinese crab-tree.
- Piscidia** L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Fischtod“, -fänger, fr. bois-ivrant (v. piscis Fisch u. caedo in compos. -cīdo töte — Anwend. d. Wurzelrinde z. Fischfang), z. B. carthagenensis L. (Carthagena, Südamer.), longifolia W. (Aeschynomene l. Cav.).
- Piscipula** Loeffl. i. q. Piscidia L. (s. eb. — piscis u. capio fange).
- 1) **Pisonia** L. (Ebenaceen Styraceen, XXIII. 2) „Piso's“-Ebenholz (n. W. Piso, Arzt bei Moriz v. Nassau 1634—41), z. B. aculeata L., fr. liane épineuse, P. inermis L., buxifolia Rottb., s. Ferreöla s. Maba bux. 2) **Pisonia** Rottb. (Nyctagineen, V. 1) Pison's Wunderblume. — Pisoniæe (zu Nyctagineæ) Rehb.

- Pistacia** L. (Terebinthaceen Cassuvieen, XXII. 5) „Pistazie“, Terpen-  
tin- u. Mastixbaum, fr. pistache (-chier), e. pistachio-nut (-tree) u.  
pistake-tree (arab. fustaq, gr. *πίσσα* Harz u. *ἀξέομαι* helfe), P.  
Terebinthus L. (Str. Südeuropa), vera L. Pistaziennuss, fr. noix de  
pistache (Orient), P. Lentiscus L. Mastixb. (Orient), fr. manne du  
Libanon od. mastichine.
- Pistia** Jacq., L. (Hydrocharideen od. Aroideen, XIII. 6) Muschelblume  
gr. *πιστός* getränkt — wässer. Standort!), P. stratiotes L. Wasser-  
wegerich, s. *Plantago aquatica* Rumph.
- Pistillaria** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Stempelpilzchen (v. *pistillum* Pistill  
od. Stempel — keulenförm.), z. B. *micans*, *musciola* Fr. etc.
- 1) **Pisum** L. (Leguminos. Viciaen, XVII. 4) Erbse, fr. pois, e. pea (Pl.  
pease) (gr. *πίσση* v. d. celt. *pis*), geb. P. sativum L. Feld-, Schoten-  
od. Brech-Erbse Grck. m. v. v., fr. pois verts od. en cosse,  
Abänd.: P. arvense L. Zucker-E., fr. p. sans cosse od. goulu, e.  
sugar-plum, Ackererbse, fr. petits-pois, Früherbse, fr. pois Michaux,  
etc. 2) **Pisum** (sc. Ulva) L. (Algen, XXIV. 3) Watt-Erbse, fr. pois-  
marin.
- Pitcairnea** l'Hér. (-ia Ait.) (Bromeliaceen, VI. 1) „Pitcairn's“-Schmar-  
rotzer-Ananas (n. W. Pitcairn, Prof. in Edinburg, † 1713), P. lati-  
folia Ait. (Antill.), staminea Lodd. u. splendens (Bras.), flavescens  
Bak. (Cochliopetalum flav. Bew.).
- Pittosporum** Sol., Banks (Pittosporaceen, V. 1) „Pech“- od. „Kleb-  
samen“ (*πίττα* Pech, *σπορά* Samen — dies. harzig!), Stuben: P.  
Tobira Ait. s. chinense Don, span. Azahar de la China Orangen-  
blüte v. China, coriaceum Ait. (Str. Canarische Ins.), viridiflorum  
Sims, etc. — *Pittosporæe* DC.
- Placœa** Miers (Amaryllideen, VI. 1) „Blumenbank“-Narzisse (v. *πλάξ*,  
*-αζος* Blumenbank, Wtst.: chilen. Name!), Zier. P. Arzæ, grandiflora  
Lam. (Chili).
- Plagiochila** Dum., Nees (Lebermoose, XXIV. 3) „Schrägrippe“, Stutz-  
kelch Lem. (*πλαγίως* schräg etc., *χιλος* Lippe — Mündung des  
Involucells schräg abgest.), z. B. *asplenioides* Nees.
- 1) **Planera** Gm., Mchx. (Urticaceen od. Ulmaceen, IV. 2) „Planer-  
baum“ (n. d. Prof. Planer zu Erfurt, s. d. Aut.), Zier. P. carpi-  
nifolia Wats. (Richardi Mchx.) (Kaukas.), aquatica Gm. (uhmfolia  
Mchx.), s. Anonymus aq. Walt. (Carolin.). 2) **Planera** Gies. (Seita-  
mineen, I. 1).
- Plantago** L. (Plantagineen, IV. 1) Wegerich, Wegbreit Leun., fr. plan-  
tain, e. plantain, waybread (v. *planta* Fusssohle — womit platt-  
getreten! nicht Linné v. *planta* Pflanze u. *tango* fühle an).
- Plasmodiophora** Woron. (Schmarotzerpilze, XXIV. 4) „Plasmodium-  
trägerin“ (Plasmodium Schleimkörper, *φορός* tragend), z. B. bras-  
sicae Wor. Kohl-Klauenerkrankh. Rmpl.
- Platanthëra** Rich. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Breitkölbchen“, Threm  
(Trehm) O. W. (*πλατύς* breit, *ἀνθήρα* Staubbeutel — platte An-  
therenschnäbelchen!).
- Platanus** L. (Amentac. Plantaneen, XXI. 9) „Platane“, Sykomore  
Rmpl., fr. u. e. platane, e. plane-tree (gr. *πλατάνος* v. *πλατίζ*  
breit — weg. d. Blätt. u. Baumkronen), Zier: P. vulgaris Spach  
(occidentalis u. orientalis L.) m. viel. v. v., s. g. Kleiderbaum (— weg.  
Abwerfens d. Rinde!), P. orientalis L. (orient. verus Duh.) u. P.  
acerifolia Ait. (P. vulg. Spach, v. acerifol. Spach s. orient. Ait.,  
intermedia Hort.). — *Platanæe* Rchb., *-nacæe* Lestib., Grck.
- Platycapnos** Bernh., DC. (zu *Fumaria* L.) (Fumariaceen, XVII. 2)  
„Breitfrucht“-Erdrrauch (s. v., *καπνός* Rauch), z. B. *spicatus* Bernh.

- Platycarya** (nicht -caria) v. Sieb. u. Zucc. (Juglandeen, XXI. 8) „Platt“- od. „Breitnuss“ (s. v., *κόρον* Nuss — Steinfr. flach gedrückt!), z. B. *strobilacea* S. Z., s. *Fortunaea* Ldl.
- Platyceeratum** Rich. (zu *Arabis* Rehb.) (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Breithörnchen“ (*ζερατίον* dem. v. *ζέρας*, -τος Horn), z. B. *alpina* u. *crispata* W.
- Platyceerium** Desv. (Farne, XXIV. 1) „Breit“- od. „Platthorn“, Ge- weihfarn Perring (s. v. u. *ζέρος* Horn — wie Elenngeweihe, schauf- lig!), Warmh. u. Ampel: *alcicorne* Gaud. „Elenhorn“, s. *Neuro- platyceros* Presl.
- Platyedon** DC. (Campanulaceen, V. 1) „Breitglocke“, Pracht- (s. v. u. *κόδων* Glocke), z. B. *grandiflora* DC. (*Wahlenbergia* s. *Campanula* gr. Hort.).
- Platylobium** Sm. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Blattschote D., „Breit“- od. „Platthülse“ (s. v., *λόβιον* dem. v. *λοβός*; Hülse — diese flach zusammeng.), z. B. *formosum* Sm. (Str. Austral.), *latifol.* Andr. (*Bossiaea heterophylla* Sm.) (Neuholl.).
- Platyspermum** Hook. (-ma Hoffm.) (Umbelliferen, V. 2) „Breitsamen“ (s. v. u. *στέριμα* Samen), z. B. *grandiflorum* M. u. K., s. *Caucalis* gr. L. (*Daucus* gr. Scop., *Orlaya* gr. Hoffm.).
- Plectocomia** Mart. (Palmen, VI. 1) „Haarflechten“-P., Stachelrank- stamm Rmpl. (*πλεξτός* geflochten, *κομη* lat. coma Kopfhaar — d. Staubfäden an d. Basis zusammenh.), z. B. *assamica* Griff., *macro- stachya* Krz. etc.
- Plectogyne** Lk. (Acoraceen od. Liliac. Asparagineen, VIII. 1) „Korb- stempel“, Erdschild, Schild- od. Wurzelblume (*πλεξτή* Korb, *γυνή* Weib, Stempel — Narbe sehr gross, korbförmig!), Stuben *P. variegata* Hort., s. *Aspidistra elatior* Decsn. v. varieg.
- Plectopoma** Van Houtt. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Korbbecher“, Deckel- kapsel (s. eb. u. *πώμα* Becher, Deckel — Kapsel m. Deckel!), Warmh. *gloxiniaeflora* V. H., s. *Achimenes* R. Br.
- Plectranthus** l'Hér. (Labiaten, XIV. 1) „Hahnensporn“, Mottentod, -könig, Harfenstrauch Leun. (*πληγάνθος* Sporn, Stachel — Krone an d. Basis gespornt!), z. B. *fruticosus* l'Hér. (Str. Cap), *Forskolaei* Vahl, etc., s. *Ocimum* u. *Colēus*.
- Pleēa** Rich. (-ia Mehx.) (Juncaceen, IX. 3) „Plée“-Blume (n. d. Bot. Plée, schr. Types de chaque famille etc., Par. s. 1844), z. B. *tenuifolia* Mehx. (*Carolina*) etc., s. *Anguillaria* R. Br.
- Pleurorrhizēae** (sc. *Cruciferae*) DC. „seitenwurzl. Kreuzträger“ (*πλευρόν* Seite, *ρίζα* Wurzel — bez. d. keimend. Samen!).
- Pleurospermum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Rippensamen“, Hohl- rippe Leun., Schlauchrippe Seub. (v. *πλευρά* Rippe, *στέριμα* Samen — sehr starke Fruchtrippen!).
- Pleurothallis** R. Br. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Seitenblüt“-O. (s. v., *θαλλίς* Zweig v. *θάλλω* wachse, blühe — d. Blüten stehen in d. Achsel des einen Stengelblatts!), z. B. *coccinea* R. Br. (*Rodriguezia cocc.* R. P.), *sagittifera* Kth. (*Notylia multiflora* Ldl.), etc.
- Pleurōtus** Fr. (Hautpilze, XXIV. 4) „Seitenohr“, Seitenstiel-P. Kumm., Drehling, *P. ostreatus* Fr. (s. v. u. *οὶς*, *ώτος* Ohr — d. Hut sitzt zur Seite!).
- Plinia** L. f. (Amygdaleen od. Myrtac., XII. 1) „Pliniuskirische“, Furchen- (n. d. röm. Nat. Plinius d. Alteren, † 79 n. Chr.), z. B. *crocēa* L. f., *pedunculata* s. *rubra* L. f., s. *Eugenia* autt.
- Plocāma** Ait. (Cinchonac. Coffeaceen, V. 1) „Zopfchina“, „Flechtling“ (d. *ζλόχαιμος*; Haarflechte etc. — herabhäng. verschlungene Zweige!), z. B. *pendula* Ait. (Str. Canar.), s. *Canthium* Lamb.



- Plocoglottis** Blum. (Orchideen, XX. 1) „Zopfzunge“ (v. *πλόκος* Strick etc., *γλωττα* Zunge — Labell an d. Bas. m. eingebogn. Falten an d. Columna gedr.), z. B. *javanica* Bl.
- Plocostemma** Blum. (Asclepiadeen, V. 2) „Flechtkranz“, -krone (s. eb. u. *σίγμα* Kranz — d. Nebenkronen wie gestrickt), z. B. *lasianthum* Van Houtt., s. *Hoya las. R. Br.*
- Plumbaginæae** Vent., DC., Rchb., -*inacæae* Grck., -*ines* Juss. Bleiwurzwurz., s. *Plumbago*!
- Plumbago** T., L. (Plumbagineen, V. 1) „Bleiwurz“, fr. *plombage* (plau-bage), *dentelaire*, *malherbe*, e. *plumbing*, *plummet* od. *lead-wort* (v. *plumbum* Blei u. ago führe — d. Wurzelfett ders. färbt d. Hände bleigrau), *P. europaea* L. (*Tripodium Dioscoridis*), *Zier.*: *rosea* L. (Ostind.) m. v. *coccinea* (*Thalia cocc. Lour.*, *Plumb. cocc. Boiss.*), *P. Larpentae* Lindl. (China) etc.
- Plumeria** L. (-*miera* T.) (Apocynen, V. 1) „Plumier's“-Hundswürger (n. d. ber. Bot. *Plumier*), *Zier.*: *P. rubra* L. (St. Antill.), *lutea* R. P., *mexicana* Lodd. etc.
- Plutëus** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Sturmdach“-P. (*plutëus* od. -*um* Schirm-dach), z. B. *phlebophorus*, *pellitus* etc., s. *Agaricus* L.
- Pneumonanthe** Schmidt (sc. *Gentiana*) L. (Gentianeen, V. 2) „Lungen“-Enzian, *blauer Tarant*, *gross. Herbst-E.*, eig. „Lungenblüte“, fr. *pulmonaire des marais*, e. *marsh-Gentian* od. *windflower-Gent.* (*πνεύμων* Lunge, *άνθη* Blüte — geg. Lungenkrankh. u. bauchig aufgeblas. Krone).
- Poa** L. (Gräser, III. 2) *Rispen-* od. *Viehgras*, *Rispelgras* O. W., fr. *paturin* „Futtergras“ od. *poa* (gr. *πόα* od. -*η* u. *πόα* Futter v. *πύον* weide ab), *Zier.* *P. trivialis* L. v. *variegata* Hort., *Wies. pratensis* L., zwisch. *Pflaster: annua* L., etc., s. *Glyceria* u. *Festuca*. — *Poacæae* Endl. *Rispengräser*.
- Podagraria** Riv., Mnch. (sc. *Aegopodium*) L. (Umbelliferen, V. 2) *gem. Geisfuß*, *Geier* od. *Giersch*, „*Podagra*“- od. *Fussgicht-Dolde*, fr. *herbe à Gérard*, - *à la goutte*, *podagrine*, *pièd de chèvre*, e. *goutwort* (v. *πόις*, -*όδος* Fuss u. *γράω* nage etc.), s. *Ligusticum* Pod. Crantz.
- Podaliria** Dietr. (schlecht -*lyria* Lam.) (Cassieen Cäsalpinieneen, X. 1) „*Podalirie*“, *wilder Indigo* (n. Aeskulap's Sohn *Podalirius*, gr. *Ποδάριος* Arzt d. Griech. vor Troja), z. B. *australis* Lam., e. *southern wild-Indigo*, *P. alba* W. (*Sophora a. Ait.*, *Crotalaria a. L.*, *Anonis Mart.*) (*Carolina*), *aurea* W. (*Soph. aur. Ait. etc.*) etc., s. *Baptisia* R. Br., *Virgilia* Cav. u. *Sophora* R. Br.
- Podocarpus** l'Hér., Rich. (Coniferen Taxaceen, XXI. 9) „*Fussfrucht*“, *chines. Eibenbaum* (*πόις*, -*όδος* Fuss, *Stiel*, *Basis*, *καρπός* Frucht — *fleisch. verdickte Scheibe* um d. Samen), z. B. *Zier. taxifolius* Hb. Bpl. (*Taxus montanus* W., *Mex.*), *asplenifolius* Lab. (Neuholl.), *Koraiana* v. Sieb. etc., s. *Taxus chinensis* u. *Thalamia asplenifolia* Lab.
- Podolëpis** Lab. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „*Stielschuppe*“ (s. v. u. *λεπίς* Schuppe — d. innerst. Kelchschuppen gestielt), *Zier.* *P. auriculata* Hort. s. *chrysantha* Endl., *gracilis* Grah. s. *angustifolia* Hort. m. v. v., *affinis* Hort., fr. *P. à grandes fleurs*, etc., s. *Scalia* Sims u. *Stylolepis* Gray.
- Podolobium** R. Br. (Cassieen Cäsalpinieneen, X. 1) „*Fuss*“- od. „*Stielhülse*“ (s. v. u. *λοβίον* dem. *λοβός* Hülse — diese gestielt), z. B. *trilobatum* R. Br. (*Chorozema trilobum* Sm.), *scandens* DC. etc., s. *Pultenia* Andr. u. *Daviesia* Sm.
- Podophyllum** L. (Ranunculac. *Podophylleen*, XIII. 1) „*Fussblatt*“ Rmpl., *Entenfuss*, fr. *podophylle*, e. *duck's-foot* (s. v., *πέδιλον* Laubblatt —

Aussehn dess. wie ein Entenfuss), Zier. peltatum L., e. May-apple, s. Anadophyllum canadense Catesb., P. diphyllum L., s. Jeffersonia diph. Pers. — Podophyllacæe DC.

- 1) **Podosperma** Lab., Less. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Stielsamen“ (s. v., *στῆμμα* Samen — d. Achenien gestielt), z. B. pedunculare Rchb. (*Craspedia pilosa* Spr.) (Neuholl.), angustifolia Lab. (dasselbst) etc., s. *Podotheca* Cass. 2) **Podospermum** DC. (zu *Scorzonera* Rchb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Stielsamen“—*Scorzonere*, z. B. laciniatum DC. u. octangulare Roth.
- 1) **Pogonia** Juss., R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Bart“-O. (*τῶ-γων* Bart — Labell m. Kammbart), z. B. ophioglossoides Ker (Nordamer.). 2) **Pogonia** Andr. (Verbenac. Myoporineen, II. 1) „Bart“-Mäusefrass, z. B. debilis Andr. (*Myoporum* d.) (= behaart. Schlund).
- Pogostemon** Desf. (Labiaten, XIV. 1) „Bartfaden“, indisch. Dosten, Patschoulipfl. Rmpl., P. Patschouly Pellet. (Ostind.) (s. eb. u. *στῆ-μων* Staubfaden — diese mitten bebartet).
- Poincettia** (-settia) Grah. (Euphorbiaceen, XI. 3) „Poincettie“ (n. Poincette od. Poinsette, d. Entd. d. Pfl. in Mexiko), Warmh. u. Stuben: P. heterophylla Karw. (rotgipfelblättrig!), pulcherrima Grah., s. Euphorbia pulcherrima Grah.
- Poincia** Neck. (-cinia DC., -ciana Breyn., L.) (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Poinci's“-Cassie, fr. poincillade, fleur de paon (- de paradis) „Pfauschwanz“ (n. de Poinci, Gouv. d. Antill. Mitte d. 17. Jahrh.'s), z. B. Gilliesii L. (Südamer.), bijüna Jacq. etc., s. Caesalpinia etc.
- 1) **Poiretia** Vent., Sm. (Leguminos. Onobrycheen, XVII. 4) „Poiret's“-Esparsette (n. d. franz. Bot. u. Reis. in d. Berberei Poiret), z. B. linearis Sm. (Hovea l., Coronilla l.), psoraleoides DC. (*Turpinia montevidensis* Spr.). 2) **Poiretia** Cav. (Epacrideen, V. 1) „Poiret's“-Felsbusch, P. cucullata Cav., s. *Sprengelia incarnata* Sm. 3) **Poiretia** Gm. (Gentianeen, V. 2) „Poiret's“-Enzian.
- Polemonium** L. (Polemoniaceen od. Convolvulaceen, V. 1) Speerkraut (nicht Sperrkraut!), Leiterblatt od. Jakobsleiter, fr. polémoine, valeriane grecque od. bleue griech. Baldrian Rmpl. (v. *πολεμος* Krieg — speerart. Blätter! Wtst.: n. d. pont. Kön. Polemon ben.), Zier. coerulæum L. blaue Himmelsleiter Grck. od. Jakobsleiter, reptans L., e. creeping Jacob's-ladder, rubrum L. (*Cantua coronopifolia*) etc.
- Polianthes** (bess. **Poly-**) L. (Liliac. Hemerocallideen, VI. 1) „Vielblüt“-Lilie, s. g. Tuberose, P. tuberosa L., fr. tubéreuse des jardins, Jacinthe des Indes, e. tuberosa (Mex.), s. *Amica nocturna* Rumph. s. g. Nachthyazinthe (v. *πολύς* viel, *ἄρθη* Blüte, nicht v. *πόλις* Stadt od. *πολιός* weisslich, Wtst. u. Rmpl. v. *πόλις* Stadt — Stadtblume, häufige Fensterbl. d. Städte!).
- Pollinia** L., Spr. (Gräser, XXIII. 1) „Pollini's“-Bartgras, Goldbart (n. d. Bot. Cyrillo Pollini, Prof. zu Verona), z. B. P. Gryllus Spr., depauperata ds., s. *Andropogon* u. *Homolitis* Trin.
- Pollveria** (sc. *Pirus*) W. (Pomaceen, XII. 4) „Pollwiler“ od. „Bollweiler“ Birne, Lazarol-, Hanbutten-, rote Honigbirne Vilm., fr. poirier cotonneux, e. Bollwyler Pear-tree (n. d. Dorf Bollweiler im Elsass, Wtst.: n. d. Bar. v. Pollwiler, in dessen Garten J. Bauhin d. Birne zuerst fand), s. *Pirus Pollvilleriana* Bauh. s. *Pollvilla* Gmel. (*Pir. tomentosa* W., *irregularis* s. *auricularis* Knoop u. *Lazarölus* P. Med.).
- Polyadelphia** L., XVIII. Kl. „Vielbrüderige“ (*πολύς* u. *ἀδελφός* — in mehrere Bündel verwachsene Staubfäden!).
- Polycarpicæe** Endl., Bartl., -pææ DC. „Vielfrüchtler“ (s. v. u. *καρ-πός* Frucht — d. Blum. vielfrüchtig).
- Polycarpon** Löffl. (-um L.) (Portulacæen Paronychieen, III. 3) „Viel-

- frucht<sup>4</sup>-Knaul, Nagelkraut (s. eb. — zahlr. kleine Früchte!), z. B. magellanicum L. (Donatia fascicularis Forst.).
- Polycnēnum** L. (Aizoideen Atripliceen, III. 1) Knorpelkraut, Geferkr. Ö. W. (πολύκνημον vielgliederig — bez. d. Stengels).
- Polygāla** L. (Polygalaceen, XVII. 3) Kreuzblume, Ramsel Ö. W., eig. „Milch<sup>4</sup>- od. „Vielmilchkraut<sup>4</sup>, fr. laitier (lotier), e. milk-wort u. stire-wort (πολύ viel, γάλα, -τιος Milch — das Vieh sehr nährend!), Stuben: P. latifolia Ker, cordifolia W., Treibh. grandiflora Hook., myrtifolia L. etc. — Polygalacēae Rehb., -lēae Juss., DC., Rehb., -linae Endl. Bitterlinge Leun.
- Polygamia** L., XXIII. Kl. „Vielehige“ u. Syngenesia Polygamia L., XIX. Kl. Vielblütige Syngenesisten od. s. g. Compositen (πολύς u. γάμος Ehe od. Blüte — vielerlei Blüten auf einer Pflanze od. in einem Blütenkorb!).
- Polygonātum** T., Desf. (Liliac. Smilaceen, VI. 1) Weiss- od. Schminkwurz, Gelenkwurz Rmpl., Vielgelenkblatt, Vielknoten-Maiblume, fr. grēnouillet od. muguet sceau de Salomon, e. polygony od. Salomon's-seal „Salomonssiegel“ (s. v. u. γόρνυ, -ατος Knie — zahlr. Knoten des unterird. Stocks!), z. B. multiflorum All., verticillatum Mnch., latifolium Desf. m. v. fl. pleno, vulgare Desf. (Convallaria Polygonatum L.) m. v. macranthum (japonicum Hort.).
- Polygōnum** L. (Polygonaceen, VIII. 3) „Knöterich“ (nicht v. πολύγοτος vielzeugend, sond. γόρνυ Knie od. Knoten — viele Knoten d. Stengels!), fr. centinode u. renouée, trainasse, e. knot-grass, z. B. aviculare L., fr. langue de passereau, e. knot-grass „Vogelknöterich“ od. s. g. Wegtritt, P. Bistorta L., e. snake-weed m. v. latifolium Hort., Gärt.: P. orientale L. (Persicaria or. T.) m. v. v., Zier. P. acuminatum Kth. s. cuspidatum v. Sieb. u. Zucc. (mächt., haselblättr. Zierstr. Japan's), fr. Renouée de Siebold, P. amplexicaule Don, sachaliense F. Schmidt; cultiv.: P. Fagopyrum L. „Buchweizen“ (s. d.). — Polygonacēae Juss.
- Polymnia** L. (Compos. Senecionideen, XIX. 4) Musenblume, „Liederreiche“ (n. Polymnia od. Polyhymnia, d. Muse d. Gesanges — Schönh. d. Blume!), Zier. P. Uvedalia L. (Wedalia Mill.) (Carolina), s. Delta Ait., P. maculata Cav. (Mex.).
- Polypetāla** Juss., Kl. d. „Vielkronblättrigen“ (πέταλον, lat. petālum Kron- od. Blumenblatt).
- Polypodium** L., Sw. (Farne, XXIV. 1) Tüpfelfarn, eig. „Vielfuss“-F., fr. polypode, e. polypody, male-fern (πόδιον dem. v. ποὺς, -όδος Fuss — weg. d. zahlr. Wurzelstöcke der jährl. absterbenden Wedel), wild u. Zier. P. vulgare L. Eichenfarn, Engelsüss, m. v. v. (z. B. cambricum L. Tüpf. v. Wales), Stuben u. Gewächsh. P. aurēum L. (Phlebopodium aur. R. Br.), morbillosum (Drynaria coronans Bor.), effusum Sw. (Jamaika), pectinatum L. (Westind.).
- Polypōgon** Desf. (Gräser, III. 2) „Vielbart“- od. Bürstengras (ὁ πολύγων d. Bart — dichtwollige, begrannete Spelzen!), z. B. elongatus Hb. Bpl. (Südamer.), monspeliensis Desf. (Santia plumosa Savi, Agrostis panicēa Host etc.).
- Polypōrus** L., Fr., Mchx. (Pilze, XXIV. 4) „Löcher“- od. „Porenschwamm“, Feuerschwamm, Zunderpilz (s. v. u. πόρος Durchgang, „Pore“ — unters. voller Poren!), P. igniarius, fomentarius etc. — Polyporēi DC.
- Polysaccum** DC. (Pilze, XXIV. 4) Erbsenstreuung Kumm. (saccus Sack), z. B. pisocarpium wahrer E., s. Polypēra aut.
- Polystīchum** Roth (Farne, XXIV. 1) Punktfarn, „Vielpunkt“ oder „Strich“ (στίζος Reihe — Fruchthauf. in mehreren Reihen!), Zier.

- P. Filix mas Roth „Farnkrautmännchen“ m. v. cristatum Hort., s. Lastraea Presl, Nephrodium Stempel (Polypod. Filix mas L.).
- Polytrichum** L. (Moose, XXIV. 2) „Haarmoos“, Widerthon, fr. polytrich od. perce-mousse (πολύτριχον vielhaarig — Stengel u. Mützen!), z. B. commune L. — Polytrichaceae Schimp.
- Pomacēae** Rchb. (zu Rosacēae) Kernobst, Apfelfruchtartige (v. pōmum Apfel).
- Pomaderris** Labill. (-toderris R. u. Sch.) (Rhamnaceen, V. 1) „Kapselhaut“-Dorn (πόμα Deckel, δέρσις i. q. δέρσις Haut — bez. d. Kapsel!), z. B. apetala Lab., candicans, elliptica etc. (Neuholl.).
- Pomariae** Lindl., Grck. i. q. Pomacēae s. v. (v. pōmum, pomarius d. Apfelobst betr.).
- Pombalia** Vand. (Violarien, V. 1 od. XIX. 6) „Pombal's“ Veilchenwurz (n. d. portug. Minist. Pombal, Marquis de Carvalho, † 1782), P. Ipecacuanha Vand., s. Viola s. Ionidium Ip.
- Pontederia** L. (Commelynaceen, VI. 1) „Pontederablume“ (n. d. Prof. Jul. Pontedera in Padua, † 1757), Treibh. P. cordifolia Mart. (Bras.), azurčea Sw. (Jamaica), lanceolata Nutt. (Südcarol.) etc., s. Leptanthus Mchx. u. Heteranthera R. P. — Pontederiaceae Mart.
- Populus** T. (Salicaceen, XXII. 7) „Pappel“, Belle, altd. Alber (e. abele-tree) Mej., fr. peuplier, e. poplar, wimote u. abele-tree (v. λαπάλλουμα zittere, zapple Leun., Wst.: populus Volk — dess. Plappern nachahmend!), Zier. P. nigra L. m. v. pyramidalis Roz. (dilatata Ait., italica Ludw.), fr. léard Schwarz- u. italien. od. lombard. P., canadensis Mchx. (carolinensis Mchx. s. monilifera Ait.), canad. od. Rosenkranz-P., hybrida M. B., fr. grisaille (canescens Sm., alba Mill., alba-tremula Wimm.) Grau-P., alba L. Silber-P., fr. aubel, tremula L. Zitter-P., fr. tremble, e. trembling-asp od. aspen-tree (Espe od. Aspe), atheniensis Ludw. (von Athens in Nord-Amer.) s. tremuloïdes Mchx. (graeca Ait.), balsamifera L. (Tacamahaca Mill.) echte Balsam-P., fr. harame, nebst cordata Lodd. (macrophylla Lindl.) etc.
- Porāna** Burm., L. (Convolvulac., V. 1) „Wander“-Winde (v. πορείου wandere — erstreckt sich weithin, Wst.: ostind. Name!), z. B. volubilis L. (ostind. Str.), acuminata P.-B. (Oware).
- Porcellites** Cass. (zu Hypochoeris Rchb.) (Compos. Cichoriac. XIX. 1) „Ferkelkraut“, fr. porcelle, salade de porc (porcellus Ferkel, dem. v. porcus Schwein), z. B. brasiliensis Less.
- Porliera** Rz. Pv. (-ia Hb.) (Sapindac. Zygophylleen, VIII. 1) „Porlier's“ Strauch (n. d. span. Gesandten in Indien Ant. Porlier de Laxamar), z. B. hygrometra R. P. (Peru).
- Porpax** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Griff“- od. „Henkel“-O. (πόρπαξ Handhabe — bez. d. Wurzelknollen!).
- Porphyrocōma** (-me) Hook. (Acanthaceen, XIV. 2) „Purpurschopf“ (πορφύρεα Purpur, κόμη lat. coma Haarschopf — purp. Blütenschopf!), z. B. lanceolata Hort. (Warmh.).
- 1) **Porrum** T. (sc. Allium) L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Lauch, „Porrée“, fr. poireau u. porreau, e. leek (gr. πάροσον lat. porrum v. d. celt. pori essen), cultiv. m. v. v. (z. B. Porrée v. Rouen, Erfurter P. etc.). 2) **Porrum** (sect. v. Allium Rchb.), z. B. ascalonicum, vineale etc.
- Portlandia** P. Br., Schreb. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1) „Portlandie“ (n. d. Herzogin v. Portland, Correspond. v. J. J. Rousseau 1766—76), z. B. coccinea Sw., grandiflora L. etc.
- Portula** Dill. (sc. Peplis) L. (Lythraceen, VI. 1) gem. Bachburgel Grck. (dem. porta Pforte — wie Portulak aussehend).
- Portulāca** T., L. (Portulacaceen, X. od. XI. 1) Fleischblatt, Burzelkraut, fr. pourpier, e. purslane (-lain) u. porcelain (v. porto führe,

lac Milch? Paxt., od. dem. porta Thüre — bez. abführ. Wirkung? od. latinis. Burzelkraut purslain? — ungewiss!), wild u. Gärt. P. oleracea L. Gemüse-Portulak, s. g. Kerbuzel, Zier. P. grandiflora Lindl. m. v. v., fr. chevalier d'onze heures (z. B. v. plena Hort. Portulakröschen). — Portulacaceae Rchb., -laceae Bartl., DC., Juss.

**Posoqueria** Aubl. (**Posoria** Raf.) (Rubiaceae. Cinchonaceae, V. 1) „Posoqueria“ — Chinastr. (aymara posoqueri d. Nam. ein. Art bei d. Galbis in Guiana), Warmh. P. formosa Planch. u. multiflora Ch. Lem. (kl. B. Südamer.), s. Solena W. u. Gardenia Spr.

**Potamiceae** Juss., Grck., -mogēae DC., **Potamogetonēae** Rchb. Laichkräuter (s. sogl.).

**Potamogeton** T., L. (nicht -gēton!) (Fluvialen od. Potamoegen, IV. 3) Laichkraut, Froschlattich, „Flussgewächs“, fr. potamogeton u. potamot, épi d'eau, e. pond-weed (v. ποταμός Fluss u. γειτός Verbaladj. v. γέρω erzeuge, od. γείτων Nachbar?, fr. potamo-géiton! — wächst in Wasser!).

**Potamoptychis** Buxb. (Lythraceae Elatineen, VIII. 4) „Flussfichte“ (s. v. u. πύτυς Fichte), s. Elatine L.

**Potentilla** L. (Rosaceae Potentilleen, XII. 3) Fingerkraut, fr. potentille od. quinte-feuille „Fünfblatt“, e. cinque-foil od. five-leaved grass (v. potens, -entis mächtig — heilkräft. Leun. u. Wtst.), z. B. anserina L. Gänsekr. (Gänserich), e. wild-tansy, Zier. atrosanguinea Lodd. m. v. hybrida Hort., nepalensis Hook., grandiflora L., aurea L., fruticosa L. m. v. tenuifolia W. (floribunda Pursh) etc. — Potentillaceae Rchb.

**Poterium** L. (Rosaceae Sanguisorbeen, IV. 1) „Becherknopf“, Wiesenknopf, Bibernelle (ποτήριον Becher — Gestalt d. Blümchen!), P. Sanguisorba L. (Sang. minor Scop. u. glaucescens Rchb.) (wild u. Küchengart.).

**Pottia** Ehrh. (Moose, XXIV. 2) „Pott's“ Moos (n. d. Zücht. Hofr. J. F. Pott in Braunsch., † 1805). — Pottiaceae Schimp.

**Preissia** Cord. (Lebermoose, XXIV. 3) „Preissie“ (n. d. Prof. Balth. Preiss in Prag, s. d. Aut.).

**Prenanthes** L. (Compos. Cichoriaceae, XIX. 1) Nicksalat, Nicke O. W., Hasenlattich Grck., fr. laitue de muraille, e. pellitory (v. προνήστις lat. pronus übergeneigt, άνθη Blüte), z. B. purpurea L.

**Preptanthe** Rchb. f. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schön“- od. „Anstandsblume“ (πρεπτός anständig etc., άνθη), z. B. vestita Rchb. f., s. Calanthe vest. Wall.

**Primula** L. (Primulaceae, V. 1) „Primel“ od. Schlüsselblume, Himmelschlüssel Grck., eig. „Erstlingsbl.“, fr. primevère (dem. v. primus erster — im ersten Frühling!), P. veris L. „Frühlings“-Pr., fr. primevère, e. ox-lip, polyanthe (-thos), primrose, cow's-lip u. bird's-eye, Zier. P. Auricula L. m. v. v. „Aurikel“, elatior L. nebst veris L. m. v. v. Garten-Primeln, farinosa L. Mehl-Pr., fr. majale, acaulis Jacq. (grandiflora Lam.) m. v., Topfbl. chinensis Lindl. m. v. v. (z. B. fimbriata, kermesina u. filicifolia), Gletscher minima L., villosa Lap., nivalis Pall. m. v. turkestanica Pall. (Sibir.), cortusoides L. m. v. v. (z. B. amoena) u. a. — Primulaceae Vent., DC., Grck., -lāe (zu Lysimachiaceae) Rchb.

**Prinīpes** Endl. i. q. Palmae, „Edelbäume“ (princeps, -īpis Fürst).

1) **Prinos (-us)** L. Aquifoliaceae. Ilicineen, VI. 1) Kastanien-Stecheiche, Winterbeere (gr. πίνος Stecheiche, lat. Ilex, v. πινώ säge — stachelig-gesägte Blätter!), z. B. verticillata W. (Str. Nordamer.). 2) **Prinos** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 5) Kastanien-Eiche Rmpl., fr. chène Prin, e. chest-nut-white Oak.

- Prionium** E. Mey. (Juncaceen, VI. 1) Palmgras, -binse Rmpl., Baumbinse, P. palmata E. Mey. (Cap) (v. *πριών* Säge — gesägte, schwertf. Blätter!), s. *Juncus serratus* Thb.
- Prismatoearpus** P'Her. (Campanulac., V. 1) „Säulenfrucht“, Frauenod. Venusspiegel Seub. (*πρίσμα, -ατος* Prisma, Säule, *χαρπός* Frucht), P. Speculum DC. (Legousia' arvensis Dur.), s. *Campanula* Spec. L. (*Specularia* Heist. Spec. A. DC.).
- Pritchardia** J. Linden (Palmen, VI. 1) „Pritchard's“-P. (n. Steph. F. Pritchard, s. d. Aut.), P. filifera J. Lind. s. filamentosa Mart. (Chili).
- Protëa** L. (Proteaceen, IV. 1) Silberbaum, -fichte, fr. protëe, e. silverfir (v. Proteus, dem Gestalt wechselnden Meergott, Myth., Linné: ein wahr. Proteus!), Gewächsh. argentëa L., acuminata Sims, coccinëa R. Br. etc. (immergrüne Capstr.!). — *Proteaëae* DC., -tëae Juss., Rchb., -tëinae Bartl., DC. Ord. d. Silberbäume, fr. protëoides.
- Protococcus** Ag. (Algen, XXIV. 3) „Urkorn“ (*πρωτός* erster od. Ur-, *κόκκος* Korn — gleichs. Anfang d. Pflanzenwelt!), P. nivalis Ag. „Schneepilz“ (*Coccochloris* niv. Spr.), viridis Crantz, s. g. Priestley'sche Materie. — *Protococcacëae* Endl.
- Protomyces** Unger (Pilze, XXIV. 4) „Urpilz“ (s. eb., *μύκης, -ητος* Pilz), z. B. solani Wallr. Kartoffelkrätze, -gnatz. — *Protomyces* Wallr., de By, DC. „Urpilze“.
- Protophyta** Endl. „Urpflanzen“ (s. v. u. *φυτόν* Pfl.).
- Prumnopitys** Phil. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Spitzenfichte“ (*προυνός* d. äusserste etc., *πίτυς* Fichte), P. elegans Phil.
- Prunella** L. (*Brunella* T.) (Labiaten, XIV. 1) „Brunelle“, Bräunenblume, Braummäulchen, Gottheil (— soll d. Bräune heilen!), fr. brunelle, e. prunel u. brunion (brown-wort) (dem. v. *prunus* Pflaume, — weg. d. Geruchs! od. brunus, fr. brun braun — braune Kelche! Wtst.: *pruna* Glühkohle u. Bräune — geg. diese!), P. grandiflora Jacq. n. v. alba Hort.
- Prunophora** Neck. i. q. *Prunus*, sogl. „Pflaumenträgerin“.
- Prunus** L. (Amygdalaceen, XII. 1) Pflaume, fr. prunier, e. plum-tree (gr. *πρωόνος* lat. *prunus* v. *pruina* Duft — auf d. reif. Obst!), z. B. spinosa L. Schlehe od. Schwarzdorn, fr. prunelier, épine-noire, e. sloe u. black-thorn, auch german acacia, P. domestica L. s. oeconomica Borkh. gem. Pfl. od. Zwetsche, fr. prune ronde u. longue „Rundpflaume“ u. „Langpfl.“ (Zwetsche), P. insititia L. Haferpfl., Spilling, Bilsle; P. avium L. Vogelkirsche, fr. merisier, P. Padus L. Ahl- od. Traubenkirschb., Faulb., P. Mahaleb L. Steinweichsel; Zier. P. Lauro-Cerasus L. „Kirschlorbeer“, P. lusitanica L. portugies. Lorbeer, triloba Lindl. (Amygdalopsis Carr.) (China) etc.
- Psalliota** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Ring“- od. „Fesselohr“ (*ψάλλιον* Zaun, *οὖς, ὠτός* Ohr — ringf. stehenbleib. Manschette!), Ps. campestris DC. (*Agaricus* c. L.) s. g. „Champignon“.
- Psamma** P.-B., R. u. Sch. (Gräser, III. 2) „Sandrohr“ (gr. *ψάμμη* Sand), s. *Arundo arenaria* L. (*Ammophila* Host).
- Psammisia** Van Houtt. (Gräser, III. 2) „Sandrohrgleiche“ (s. eb. u. *ἴσος* gleich), z. B. sclerophylla V. H.
- Psathyra** DC. (Hutpilze, XXIV. 4) „Mürbpilz“ Kumm. (*ψαθυρός* zerreiblich etc.), z. B. cernua, fatua etc., s. *Agaricus* L.
- Pseud-Acacia** (sc. *Robinia*) L. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) unechte Akazie, Schotendorn, fr. faux-acacia, e. locust-tree (v. *ψεύδος* Trug, in compos. pseud- od. pseudo-), Zier. v. inermis Dum. Kugel-Akazie.
- Pseud-Acorus** (sc. *Iris*) L. (Irideen, III. 1) Wasser-Schwertlilie, eig. „falscher Kalmus“, fr. flambe d'eau u. faux-Acore, lis de marais, e. water-flag, bastard-Acorus, flower-deluce (s. v.).

- Pseudo-Capsicum** (sc. Solanum) L. (Solaneeen, V. 1) „falsche Beissbeere“, s. g. Korallenkirsche (s. v.).
- Pseudo-Narcissus** (sc. Narc.) L. (Amaryllideen, VI. 1) „unechte Narzisse“, s. g. Märzbecher, fr. campane od. faux-Narcisse (s. v.).
- Pseudo-Platanus** (sc. Acer) L. (Aceraceen, XXIII. 1) Berg- od. Waldahorn, gem. weiss. Ahorn, eig. „falsche Platane“, fr. fausse Platane u. érable Sycomore, e. mock-platane-tree, Sycomore, great maple.
- Pseudo-Strobus** u. **Pseudo-Tsuga** Carr. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) unechte Weymouthkiefer u. Douglastanne, Ps.-Ts. Douglasii Carr.
- Psidium** L. (Myrtaceen, XII. 1) Heilmyrte, Guyave- od. Kujavebaum Leun., fr. gouyavier od. poirier des Indes (v. ψίδι, -ιδός Brosame, ψίδιον Granatapfelb. — wohlschmeck. Fr.!), P. pyrifera L. Erdbeer-Guyave, aromaticum Aubl. Citronellbaum, sinense, Catleyanum Sab. rote Erdbeer-Guyave.
- Psilocybe** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Kahlkopf“-Pilz Kumm. (ψιλός kahl, ζυβή Tassenkopf etc.), z. B. campanulata, coprophila etc.
- Psophocarpus** Neck. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Knallhülse“ (ψόφος Getöse, καρτός Frucht — zerplatzt m. ein. Knall!).
- Psoralea** L. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Schorf“- od. „Grindbohne“, Harzkle (ψωραλιός grindig — besond. Kelch drüsenhöckerig!), z. B. aculeata (Str. Cap), americana L. (Str. Madeira), P. Dalea L.
- Psychotria** L. (-ium P. Br.) (Cinchonac. Coffeaceen, V. 1) „Lebens“- od. „Heilchina“ (v. ψυχή Seele, Leben u. δτροφή erzeuge — wird nach P. Browne auf Jamaika als Kaffee gebr.), z. B. emetica Mut. schwarze Brechwurz Leun., pedunculata Sw. (Psychotrium fruticosum P. Br.) etc., s. Psychotrophum P. Br.
- Psyllium** T., Juss. (zu Plantago Rehb.) (Plantagineen, IV. 1) Flohsamen-Wegerich, fr. herbe-aux-puces, e. flea-wort (ψύλλιον Flöhkr. v. ψύλλα Floh — Ähnlichk. d. Samen damit!), s. Plantago Psyllium L. u. arenaria Waldst., Kit.
- Pternia** Neck., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Nieseakraut“, Dorant, Bertram, fr. bouton d'argent, e. double-flowered-Goose-tongue (gr. πταρική Nieskr. — Niesen erregend!), Zier. P. vulgaris DC. v. fl. pl., Clavennae DC. (Achillaea Clav. s. argentæa Vis.).
- Ptelèa** L. (Rutac. Xanthoxyleen, IV. 1) Kleestrauch, Leder-, Geld- u. Hopfenbaum (gr. πτελέα Ulme v. πτήμη fliege — Fruchthautflügel!), Zier. trifoliata L. Kleebaum Vilm., fr. Ptelée à trois feuilles, e. shrubby-trefoil. — Pteleaceae Kth.
- Pteris** L. (Farne, XXIV. 1), „Flügelarn“, Saumf. Rmpl., fr. ptéride (πτερίς Farn, v. πτερόν Flügel — näml. ausgebreit. Wedel!), z. B. aquilina L. „Adler“-F. (— östr. Doppeladler auf d. Querschnitt d. Stengels!), Zier. quadri-aurita m. v. argyrea (-aea Morr.) u. tricolor Lind., cretica L. m. v. albo-lineata, aspericaulis Wall. (Java), arguta Vahl (Canar.) etc.
- Pterocarpus** L. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) „Flügelfruchtbaum“, fr. ptérocarme (s. eb., καρτός Frucht — d. kreisr. Fr. rund v. Hautflügel umgeben!), z. B. santalinus L. Santel- od. s. g. Jamaikaholz (Santalum rubrum Offiz.), P. Draco L. Drachenblut.
- 1) **Pterocarpya** Nutt. (Juglandeem, XXI. 9) „Flügelnuss“ (s. v., κάρπον Nuss — angewachs. zweiflügl. Hülle!), Zier. P. caucasica C. A. Mey., s. Juglans pterocarpus Mchx. (fraxinifolia Lam.) u. Rhus obscura M. B., e. caucasian Pteroc. 2) **Pterocarpus** DC. (Polygalaceen, XVII. 3) (— Steinf. m. Hautrandumgebung!).
- 1) **Pterococcus** Pall. (Polygoneen, XI. 3) „Flügelkorn“ (s. v., κόκκος Korn — Kanten d. Nuss m. dopp. Hautflügel), z. B. aphyllus Pall., s. Pallasia L. (Calligonum Pall., l'Hér.). 2) **Pterococcus** Hassk. (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) (— d. vier Knöpfe d. Fr. geflügelt).

**Pterophyllus** Ginkgo Nels. (Cupressineen Taxaceen, XXI. 5) „Flügel-  
laub“- od. Ginkgobaum (s. v. u. *γύλλορ*), s. Ginkgo bilöba L. (Salis-  
buria adiantifolia Sm.).

**Pterospermum** Schreb. (Geranieen Dombeyaceen, XVI. 7) „Flügelkern“  
Leun. (s. v., *σπέσμα* Samen — dies. m. häut. Fortsatz!), z. B. Pt.  
acerifolium Schreb., s. Pentapètes ac. Cav. (Dombeya u. Eriochlaena DC.).

**Pterostyrax** v. Sieb. u. Zucc. (Styraceen, X. 1) „Flügelstöraxbaum“  
(*πτερόν* u. Styrax — Fr. fünfflügelig), z. B. hispida S. Z. steifhaar.  
(Jap.).

**Ptychosperma** Lab., Scheff. (Palmen, XIII. 3) „Falten“- od. „Runzel-  
samen“ (*πτυχ*) Falte etc., *σπέσμα* — Same kantig etc.), z. B. Cun-  
ninghami H. Wendl., gracile Lab.

**Ptychotis** Koch (zu Crithamus Trag., Rchb.) (Umbellifer., V. 2) „Falten-  
ohr“ (*πύξι*, -*γος* Falte, *ὄξι*, *ὀτιός* Ohr — Frucht gerippt!), z. B.  
heterophyllus Koch (Bunius Rchb.) i. q. Crith. saxifragus Rchb.  
(Seseli Sax. L.).

**Puccinia** Pers. (Staubpilze, XXIV. 4) schwarzer Rost (n. Thom. Puccini,  
Prof. in Florenz), P. graminis Tul. Gras- od. Getreiderost, Brand,  
s. Urëdo linearis Pers. (Wintersporen) u. Aecidium berberidis Pers.  
(gelbe Sommersporen an Berberitzenstr.).

**Pueraria** DC. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Puerari's“- od. knollige  
Esparssette (n. M. N. Puerari, Prof. in Kopenhagen) P. tuberosa DC.,  
s. Hedysärum tuberosum Roxb.

**Pulegium** Mill. (sc. Mentha) L. (Labiaten, XIV. 1) „Poley“-Minze, fr.  
menthe-pouliot, e. poly (-ley), penny-grass, pudding-grass, pulic, puliol  
(latinisiert poley; Wst. v. pulex u. ägo vertreibe — soll d. Flöhe  
vertreiben), P. vulgare Mill. = Mentha Pulegium L.

**Pulicaria** G. (zu Inula Rchb.) (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Flöhkraut“,  
Floh-Alant Seub., Dourian O. W., fr. pulicaire, e. flea-wort, penny-  
royal (v. pulex, -icis Floh — soll d. Flöhe vertreiben), P. vulgaris  
Mill. u. dysenterica Fl. Wett. s. Inula etc.

1) **Pulmonaria** T., L. (Boragineen, V. 1) „Lungenkraut“, fr. pulmo-  
naire, herbe aux poumons, e. pulmonary, lung-wort u. lady's-glove  
(v. pulmo, -ōnis Lunge), Zier. azurëa Bess., dahurica (-vurica) s.  
sibirica G. Don, virginica L. (Stenhammëra virg. Rchb.). 2) **Pul-  
monaria** sylvatica Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) „Lungenflechte“, fr.  
pulmonaire des chênes, thë des forets (— des Vosges), e. lichen, s.  
Sticta s. Lobularia Pulm. Hoffm.

**Pulsatilla** T. (sc. Anemöne) L. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) Küchen-  
schelle, eig. Kuckschelle (Kukuks-) Mej., fr. cloucourde od. coquelourde,  
e. pash-flower (pasque-) od. campana (dem. v. pulsatus geschlagen  
= kleine Glocke, Wst. auch pulsare schlagen, umherstossen — näml.  
vom Wind auf d. Anhöhen!), P. vulgaris Lobel = Anemone Pul-  
satilla L., pratensis Mill., alpina Delarb. Teufelsbart Grck., patens  
Mill., vernalis Mill. etc., s. Anemöne etc.

1) **Pumilio** Haenke (sc. Pinus) L. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Krumm-  
od. Knieholz-Kiefer, „Zwerg“-K., Latsche, fr. pin suffis du Briançon-  
nais, crin, mugho u. torche-pin (pumilio Zwerg). 2) **Pumilio** (sc.  
Silëne) Wulff. (Sileneen, X. 3) „Zwerg“-Leimkraut, s. Lychnis Scop.  
u. Cucubalus L. Pumilio.

**Punica** T., L. (Myrtaceen od. Lythraceen, XII. 1) Granatbaum (Punica  
Phönizierin od. Punierin, punische Farbe — intensiv rote Farbe v.  
Blüte u. Frucht), Zierb. P. Granatum L., fr. migraine, m. v. fl. pleno  
Hort., P. nana L. Zwerggranate m. v. Legrellei fl. pl.

**Puschkinia** Adams (Liliaceen, VI. 1) „Puschkin's“ Meerzwiebel (n. d.  
russ. Bot. Graf Mussin-Puschkin von Adams ben., † 1837), P. scil-  
loides Adams, s. Adamsia scill. W.



- Putennia** „Putennie“ s. *Paeonia officinalis* Retz. Pfingstrose (v. puteo stinke).
- Putoria** Pers., DC. (Rubiaceae. Coffeaceen, V. 1) Stinkkaffeestrauch, Vielast-K. (v. putor Gestank — d. zerriebenen Blätt. riechen widrig!), *P.* s. *Ernodea montana* Sm. — *Putoriáceae* DC. (zu *Spermacocéae* Endl.).
- Puya** Mol. (Bromeliaceen, VI. 1) „Puy's“ Ananaspfl. (Eigennam. Puy? od. altrf. Puy Berg, z. B. Puy de Dôme; Wtst.: Namen d. Pfl. in Chili!), z. B. *P.* *Altensteinii* Lk., *chilensis* Mol. etc., s. *Pourretia lanuginosa* R. P. u. *Pitcairnea l'Hér.*
- Pyraecanthia** Spach (sc. *Crataegus* Pers. s. *Mespilus*) L. (Pomaceen, XII. 4) „Feuerdorn“, -busch Vilm., fr. buisson ardent u. *pyracanthe*, e. fiery-thorn, m. v. *crenulata* Loud. (gr. *πυράκανθα* v. *πύρ* Feuer u. *άκανθα* Dorn). 2) **Pyraec.** Lauché (sect. v. *Cotoneaster* Med.) (Pomaceen, XII. 4) Feuersträucher, z. B. *C. Pyraecanthia* Spach u. *crenulata* Roxb.
- Pyraester** Borkh. s. *Piraster!*
- Pyrenomycetes** Fr., Endl. „Kernpilze“ (v. *πυρήν*, -ήρος Kern, *μύκης*, -ητος Pilz).
- Pyrethrum** W., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Bertram“, Mutterkraut, Flohtöter, Speiwurzel, Geiferwurz, fr. *pyrethre* (*pirètre*, -rette), *piéd d'Alexandre*, e. *bartram* (*bertram*), *soap-wort* (-weed) Gärten: *P. Parthenium* Pers., Sm. (*Matricaria* Parth. L.) m. v. *aurea* Hort. Teppichg., e. *golden-feather* u. v. *laciniata* Hort., *P. Tchihat-chewii* Boiss., *P. roseum* Lindl., s. g. *kaukas.* od. persisch. Insektenpulver, *P. eximium* DC. (*Matric. exim.* Hort.) m. v. *grandiflora* Vilm., *P. sinense* Sab. (*Chrysanthemum indicum* L.) s. g. *Winteraster*, e. Chinese od. Japanese *Chrysanth.* (gr. *πύρεθρον* hitzig gewürzh. Pfl., Wtst.: v. *πύρ* u. *άθρον*; häufig, viel).
- Pyrola** s. *Piröla*.
- Pyrus** s. *Pirus*.
- Pythion (-um)** Mart. (Araceen, XXI. 1) Bollenwurz, Glocken-Aron (gr. *πυθίων* eine Pfl. „Bollenwurz“ F. W. Riemer, v. *Πύθιος* pythisch, zu *Pytho* od. *Apollo* gehörig), s. *Arum campanulatum* autt., s. *Pythonium* Schott. (n. d. mythol. Schlange *Python* etc. — weg. d. Kolbens u. Gebrauchs geg. Schlangenbiss).
- Qualëa** Aubl. (Vochysiac. od. Myrobalaneen, I. 1) „Qualeastrauch“ (u. dem Nam. d. Pfl. bei den Galibis in Guiana quale), z. B. *Perrini* Spr., *lutea* Lk., *rosea* u. *coerulea* Aubl.
- Quamoclit** T., Mch. (sc. *Ipomoea*) L. (*Convolvulac.*, V. 1) Trichterwinde (Paxton: v. *κλίμακος* Bohne u. *κλίτος* Neigung — steigt nicht hoch), *Q. vulgaris* Choïs. (*Ipomoea* Q. L.), fr. *fleur cardinale* (— du Cardinal) od. *Ipomée* Q., e. *Indian Pink* u. *Cypress-Vine* od. *american red-bell-flower*, m. v. v. fl. albo u. roseo Hort., s. *Ipomoea coccinea* autt.
- Quapoya** Aubl. (Guttiferen *Garcinieen*, XI. 1) „Quapoya“-Gummistrauch (*quapoy* Nam. d. Str.'s in Guiana!), s. *Xanthe* Spr., *Clusia macro-* u. *microcarpa* Spr.
- Quassia** L. (Rutaceen *Simarubeen*, X. 1) „Quassien“- od. Bitterholzbaum, fr. *quassie* (u. *Quassi*, dem ersten *Negersclaven*, der v. d. Rinde Gebrauch machte, Paxton), *Q. amara* L. echte Q., *Q. Simarüba* L. *Ruhrindenbaum*.
- Quercus** L. (Cupuliferen, XXI. 8) Eiche, fr. *chêne* (veralt. *chesne*), e. *oak-tree* (n. d. celt. *quer* schön u. *cuez* Baum, latinis. *quercus*. Andere v. d. gr. *γοίφοος*; Ferkel — weg. d. Eichelfutters!), z. B. *Q. Robur* L. f. *Stiel-* od. *Sommer-E.* (*Q. pedunculata* Ehrh.), *sessili-*

fłora Sm. (Robur Mill. u. var.  $\beta$  L.) Trauben-, Stein- od. Winter-E., Zier. macrocarpa Mchx. (macrophylla Hort.), stellata Wagh. (obtusiloba Mchx.), rubra L., coccinea W. Scharlach-E., palustris W., Prinos (-us Hort.) Kastanien-E. m. v. v., Cerris L. türk., Burgunder- od. Zerr-E., ferruginea Mchx. (nigra L., marylandica Ray), Phellos L. weidenblättr. od. Kork-E., imbricaria Mchx. (laurifolia Hort.), infectoria Oliv. Färber- od. Gall-E., etc.

**Querria** G., Löffl. (Paronychieen, V. 1) „Querrie“ (n. Jos. Quer y Martinez, Prof. z. Cadix, † 1764).

**Quihoui** (sc. Ligustrum) v. Sieb. u. Zucc. (Oleaceen, II. 1) japan. Liguster (schöner Zierstr., vaterl. Name!).

**Quillaja** Mol. (Rosac. Spiräiceen, XXIII. 4) Panamaholz (-rinde), Seifenrinde, Q. saponaria Mol. (Chili) (Nam. in Chili quillai v. quillean waschen), s. Smegmaria W.

**Quina** Poir. (-ina Aubl.) (Guttiferen Clusiaceen, XXIII. 1) „Quina- baum“, fr. quiniere (Nam. in Guiana quina!), z. B. glandulosa Rz., guianensis Tul.

**Quinoa** (sc. Chenopodium) L. (Chenopodiac., V. 2) „Quinoa“-Spinat, Reismelde Rmpl. (Peru- od. Anden-Getreide) (vaterl. Name kenua od. quinoa!).

**Quinquina** Condam., Endl. (Cinchonaceen, V. 1) westind. od. St. Lucien-Fieberrindenbaum (cortex Chinae St. Luciae Offiz.), fr. bois de fièvres (vaterl. Quinquina Piton), s. Cinchona s. Pitonia DC. floribunda Sw. (Exostemma floribundum W.).

**Quisqualis** Rumph., L. (Combretaceen, VIII. 1) indian. Wunderling od. Sonderling, fr. quisqualier (n. d. Ausdruck des Erstaunens quis? qualis? quisqualis? d. i. zweifelhaft!), z. B. Zier. Q. pubescens Burm. s. indica L. grosse südind. Liane.

1) **Quivisia** Comm. (Meliaceen od. Hesperideen, X. 1) „Quiviholz“, fr. bois de quivi (quivi d. Name d. Pfl. auf Isle de France), s. Gaura L. Cav. 2) **Quivisia** Cav. (Araliaceen, IV. 1) „Quivi“- od. Gilbert's-Aralie, s. Gilbertia W.

**Racodium** Pers. (Rhacodium Lk.) (Faserpilze, XXIV. 4) Lappen- od. „Lumpenschorf“ ( $\delta\alpha\omega\delta\eta\varsigma$  lappenartig, zerlumpt — in Weinkellern etc.), z. B. cellare Pers. „Kellertuch“.

**Racomitrium** Brid. (Moose, XXIV. 2) „Zackenmütze“ (v.  $\delta\acute{\alpha}\nu\omicron\varsigma$  Fetzen etc.,  $\mu\iota\tau\acute{\iota}\omicron\nu$  Mützen — Mützenbasis zerschlitzt!), s. Grimmia Ehrh.

**Radiatae** Juss. „Strahlblütige“ Compositen i. q. Corymbiferae Vaill., Rehb. (radius Strahl — d. Randblütchen zungenförmig).

1) **Radiöla** Gm., Dill. (Lineen, IV. 3) „Zwerg“-Lein, eig. „Strahlchen“, Strahlkraut Leun. Haarkraut O. W., R. linoides Gm. (dem. v. radius Strahl — strahl. Ansehen!), s. Linum Radiöla L. 2) **Radiöla** DC. (Crucifer. Lomentac., XV. 2) (zu Raphanus T.) „Radieschen“.

**Radüla** Dumort., Nees (Lebermoose, XXIV. 3) „Kratzmoos“ (radüla Kratzeisen — d. Kapselklappen inwendig knotig gestreift).

**Radülum** Fr. (Hutpilze, XXIV. 4) „Raspelpilz“ Kumm. (s. eb. — d. Hut höcker- od. stachelwarzig!), z. B. tomentosum, quercinum etc.

**Rafflesia** Arnold, R. Br. (Cytineen Rhizantheen od. Rafflesiaceen, XI. 1) „Raffles“-Riesenblume (n. Raffles, Gouv. v. Surinam, † 1826), R. Arnoldi u. Patma Blum.

**Ramischia** Opiz (Ericaceen Piroleen, X. 1) „Ramischie“, Einseit-Wintergrün (n. d. Prof. Ramisch zu Prag), R. s. Pirola secunda L.

**Ramondia** Rich. (Solaneen od. Cyrtandreen, V. 1) „Ramondie“ (n. d. franz. Bot. u. Reis. L. v. Ramond), Zier. R. pyrenaica Rich. (sc-

pigëra St. Hil.), s. Chaixia Myconi Lap. (Verbascum Myconi L.) u. Myconia borraginëa Lap.

**Ranunculastrum** DC., Rchb. (sect. v. Ranunculus) Gelbranunkel Rchb. (deter. v. Ranunc.), z. B. asiaticus, Flammula L. etc.

**Ranunculus** Hall., L. (Ranunculaceen, XIII. 3 od. 7) „Ranunkel“, Hahnenfuss, fr. rénoncule, e. crow-foot „Krähenfuss“, eig. „Fröschchen“ (dem. v. rana Frosch, gr. βατραχίου v. βιάτραχος), auch Butterblume, e. butter-flower, z. B. Gartenzier: asiaticus L. m. v. superbissimus Hort. türkischer Turban Rmpl. (hortensis Pers.), fr. bouton d'or, e. king's-cub, gold-knops, aconitifolius L. v. fl. pleno Hort., s. g. Silberknöpfchen, africanus Hort., fr. rénoncule Pivoine oder d'Afrique u. turque oder rénoncule des fleuristes, e. garden-crow-foot, R. acris L. v. fl. pleno Hort. gefüllt. Spiegelblümchen od. kl. Goldknöpfchen, fr. bassinet (bacinet), bulbosus L. m. v. fl. pl. Hort, fr. minion gefüllt. Hahnensporn od. Taubenfuss, R. repens L. v. fl. pl. Goldknöpfchen, illyricus L. (sericicus Russel), R. Lingua L. gross. Sumpf-H., graminëus L. grasblättr. H., fr. gouette, e. grassy crowfoot, Decorat. v. Teichen R. aquatilis L., fr. rén. des marais, salade des grenouilles, e. king's flower, s. Batrachium aq. E. Mey. Frosch- od. Haarkraut, R. fluitans Lam. (fluviatilis W.), s. Batr. fluit. Wimm.; giftig: R. sceleratus L., fr. douve od. pied-pou, Sumpf-H.

**Rapa** T. (sc. Brassica) L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Rübe, Weiss- od. Wasserrübe, Rübsen od. Rübenkohl, fr. chou-rave, rabiole, e. rape-cole u. turnip (gr. ῥάπις, lat. rapa, celt. rab Weissrübe), R. esculenta Koch m. v. teltoviensis Alfid. Teltower od. märkische R., Brass. Rapa v. oleifera DC. Rübeps Grck., α. annua Koch Sommer-, β. hiemalis Martens Winter-Rübsen od. Rübssamen.

**Rapatea** Aubl. (Restiaceen od. Commelyneen, VI. 1) Spatelkraut (vaterl. Name!), z. B. paludosa Aubl. (Mnasion pal. W.). — Rapateaceae Körnicke.

**Raphanistrum** T. (Cruciferen Lomentaceen, XV. 2) Hederich Grck., Repshederich, Ackerrettig, Griebel- (Kriebel-) Rettig, Feldkohl, fr. rave sauvage od. raphanistre, e. bank-cresses (deter. v. raphanus s. d.), R. segëtum T. s. innocuum Fl. Wett., s. Raphanus Raphanistrum L.

**Raphanözon** DC., Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Rettiggeruch“-P. (s. sogl. u. ῥάπις rieche), z. B. detonsus etc., s. Cortinarius Fr.

**Raphanus** T., L. (Cruciferen Lomentaceen, XV. 2) Rettig (-tich), fr. raifort, e. radish (gr. ῥαφανίς v. ῥά leicht u. ραίνομαι gehe auf), cultiv. R. sativus L. Garten-R. m. v. niger DC. u. v. Radiola DC. „Radieschen“.

**Raphia** P.-B., Comm. (Palmen, XXI. 7) Nadelpalme (v. ῥάφις Nadel — d. Frucht nadelspitz endigend), z. B. taedigera Mart. „fackeltragende“, s. Rhapsis L., Metroxylon Kön. u. Sagus G.

**Raphiolëpis** Lindl. (Rosac. Pomaceen, XII. 2) „Nadelschuppe“ (von ῥάφιον dem. v. ῥάφις, -ίδος Nadel, λελίς Schuppe — nämll. Kelchzipfel!), z. B. indica Lindl., japonica v. S. u. Zucc. etc., s. Crataegus etc. L.

**Raphistemma** Wall. (Asclepiadeen, V. 2) „Nadelkranz“ (s. v. u. στέμμα Kranz — d. Nebenkrone m. lang. schmal. Blätt.), z. B. pulchellum Wall. (Schlingstr. Indiens).

**Rapistrum** Boerh. (Cruciferen Lomentaceen, XV. 2) Repsdotter, Windsbock Grck. (deter. rapa), z. B. orientale DC., perenne All. etc., s. Myagrum L.

**Rapontica** Hort. (Oenothereen, VIII. 1) Garten-Rapunzel = Oenothëra biennis L. (rapa u. pontica pontische).

- 1) **Rapunculus** T. (sc. Campanula) L. (Campanulac., V. 1) „Rapunzel-Rübe“ Rmpl., -Glockenblume M.-Rchb., fr. raponcule, e. rampian. 2) **Rapune**. Scop. (sc. Phyteuma) L. (Campanulac., V. 1) Ähren-Rapunzel, s. Rapunculus spicatus Scop. (Phyteuma spicatum L. s. nigrum Schmidt).
- Rapuntium** Lobel, Mill., Presl (Lobeliaceen, XIX. 6) „Rapunzel“-Lobellie, fr. raiponce (rapuntium od. rapunculus Rapunzel, veralteter Ausdr. für Rübchen), Zier. R. fulgens Presl (Lobelia f. W.), fr. lobélie éclatante od. brillante, splendens Presl (Lob. spl. W.) m. v. queen Victoria Hort., speciosum Pr. (Lob. syphilitica L.) gem. Lobellie, R. cardinale Pr. (Lob. card. L.) Cardinalblume, e. scarlet-Lobelia.
- Ratabida** Raf. (-tibida Sweet, DC.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Säulen-Rudbeckie (Wtst.: das veränd. Rudbeckia, wozu früh. gehörig!), s. Rudbeckia columnaris Pursh s. Drummondii Hook. (Obeliscaria pulcherrima s. Tagetes DC.).
- Ravenala** (-lia) Adans. (Musaceen, VI. 1) „Ravenal“-Uranie (Nam. d. Pfl. auf Madagascar ravenal!), R. madagascariensis Poir., s. Urania speciosa W.
- Reana** Brignoli (Gräser, XXI. 3) „Ré's“-Riesengras (n. d. Bot. Francisch Ré, s. d. Aut.), Zier. R. luxurians Brign., s. Tripsacum monostachyum, s. g. Teosinte (Euchlaena luxur. Schrad.).
- 1) **Regelia** Planch. (Palmen, XXII. 3) „Regel's“-P. (n. d. Bot. Regel, s. d. Aut.), R. princeps Planch. 2) **Regelia** Schauer (Myrtaceen, XII. 1) „Regels“-Myrte.
- Rehmannia** Bung., Liboschitz (Gesneriaceen, XIV. 2) „Rehmannie“ (n. d. russ. Leibarzt Jos. Rehmann, geb. Badenser, † 1838), Zier. R. chinensis Fisch. s. glutinosa Libosch. (Gerardia glut. L.), s. Digitalis G.
- Reineckea** Kth. (Liliac. Dracaeneen, VI. 1) „Reinecke“ (n. J. C. Reinecke, schr. d. Erde od. Schilderg. d. Natur u. Sitten etc., Weimar 1803), z. B. carnea Kth. v. fol. varieg. silberstreif. Blattpfl., s. Sansevieria Andr.
- Renanthera** Lour. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Nierenanthere“, Spinnen-Luftorche (v. ren, renes Nieren, ἀνθήρα Staubbeutel), z. B. coccinea Lour. (Cochinch.), arachnites Lindl. etc.
- Renealmia** R. Br. (Irideen, III. 1) „Reneaulme's“-Schwertlilie (n. Paul Reneaulme, franz. Bot., schr. 1611 Essai sur l'hist. des plantes).
- Reseda** L. (Resedaceen, XI. 3) „Resede“ od. Wau, fr. réséda (v. resēdo stille wieder — nämll. d. Krankh.), Farbpf. R. luteola L., fr. gaude od. vaude, lis des teinturiers, auch herbe-jaune, e. dier's-weed od. weld, Garten: R. odorata L. m. v. v., fr. herbe d'amour od. gaude (gode), fr. u. e. mignonette (z. B. v. eximia, v. gigantea s. rubiginosa, v. multiflora compacta Hort.). — Resedaceae DC., -dēae Rchb. (zu Cruciferae Capsulares).
- Restiaceae** R. Br. (zu Juncinae DC.) Strickgrasartige, s. Restio L.
- Restio** L. (Juncineen Restiaceen, XXII. 3) „Seil“- od. „Strickgras“ (v. restis Seil etc. — dient am Cap als solches), z. B. dichotomus Fris. Descr. (Schoenus capensis Thb. s. Willdenowia teres Thb.), elongatus s. viminus Fris. Descr., s. Calorophus elong. autt. langer „Schönschlurf“ (ῥόφος Schlurf, Schleim etc.).
- Restrepia** Kth. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Restrepus“-O. (n. Jos. Em. Restrepus, schr. Geogr. d. Anden), z. B. elegans Karst. (Columbia).
- 1) **Reticularia** Bull., Tul. (Lycoperdaceen, XXIV. 4) „Netzling“ (reticulum dem. v. rete, -is Netz), z. B. muscorum etc. 2) **Reticularia**

Baumg. (Flechten, XXIV. 3) „Netzflechte“ (zu *Sticta* Schreb.) (— *Thallus* netzaderig!).

**Retinaria** G. (Rhamnaceen, V. 1) Harz-Gouanie, amer. Harzbaum, fr. resinier (gr. *ρήτινη*, lat. *retina* od. *resina* Harz), z. B. *scandens* G., s. *Gouania Retinaria* DC. (*Sphaerocarya scandens* DC.).

**Retinospora** (= *nispōra*) Sieb. u. Zucc. (sc. *Juniperus*) (Cupressineen, XXI. 9) „Harzsamen“, Heidewachholder, Lebensbaum-Cypresse, Flach-Cypr. Perring (s. eb. u. *σπορά* Samen), Zier. *picifera* (nicht *pisif.*!), *aurea* u. *filifera* Hort., *ericoides* Hort. s. *squarrosa* S. u. Z., s. *Chamae-Cyparis picif.* u. *squarr.*, *obtusa* S. u. Z. (*Chamaec. obt.* ds.), s. g. *Sonnenbaum* Vilm. od. *Hinoki-Cypresse* (Jap.).

**Rhabdoweisia** Bruch (Moose, XXIV. 3) „Streifen“-Weisie (*ῥάβδος*; Rute etc. u. *Weisia*-Moos), z. B. *fugax* Br. (Felsritzen).

1) **Rhacōma** L. (Sapotac. od. *Celastrineen*, IV. 1) „Zottelschopf“ (gr. *ῥάκωμα* od. *ῥάκος*; Lumpen, Fetzen; Wst.: von *Rha* = *Volga*, woher d. Pfl. bezogen, *Rhacoma* Plin. = *Rhēum rhapsonticum*!), *R. Crossopetalum* (nicht *Crassop.*! *Dietr.*) „Fransen“- od. „Zottelblume“. 2) **Rhae.** Adans. (Compositen).

**Rhagadiōlus** T. (sc. *Lapsana*) L. (Composit. *Cichoriaceen*, XIX. '1) „Ritzen“- od. „Schruendenkelch“, Sichelalat D., fr. *rhagadiole* (v. *ῥήγναι*, -*ῥδος*; Ritze — jed. Kelchzipfel m. Spaltvertiefungen!), z. B. *edulis* G., etc., s. *Koelpinia* Pall.

**Rhamnaceae** R. Br., -*nēae* DC., *Rchb.*, -*ni* Juss. Kreuz- od. Wegdorn-artige, s. *Rhamnus*!

**Rhamnus** L. (Rhamnaceen, V. 1) Kreuz- (eig. Kreise-) Dorn Mej., Wegdorn Seub., eig. Wehedorn, fr. *nerprun* (lat. *niger prunus*), e. bucklethorn od. rhein-berry „Rheinbeere“ (gr. *ῥήζυρος*; Dornstr. v. d. celt. *ram* Gesträuch), z. B. *cathartica* L. Purgierdorn, Wehenbeere Mej., Dintenbeerstr. Vilm., fr. *bourg-épine*, *nerprun purgatif* od. *commun*, e. *purging buck-thorn* od. *yellow-berry*, s. *Cervispina cath.* Much.

**Ramphospermum** Andrez. (zu *Sināpis*) *Rchb.* (Cruciferen *Siliquos.*, XV. 2) „Schnabelsamensamen“ (*ῥάμφος* Krummschnabel, *στέβρα* S. — etwas krumm. Schnabelfortsatz d. Schoten).

1) **Rhaphis** Lour. (Gräser, XXIII. 1) „Nadelgras“ (*ῥάφης*, -*ῥδος*; Nadel — nadelf. Blütengrannen), s. *Andropogon acicularis* Retz. 2) **Rhaphis** P. Br. (*Rhaphis* L. f., Schreb.) (Palmen, XXI. 7) Nadel- od. Sagopalme (v. *ῥάφης*; Nadel od. *ῥάφης*; Rute — d. Palmen sind nur rutenförm. Schäfte), Zier. *R. flagelliformis* Ait. u. v. *variegata* etc., s. *Raphia* P.-B. (*Rhaphis* L. f.), *Sagus* G., *Metroxylon* Kön. „Kernholz“.

**Raphistemma** s. **Raphist.**

**Rhaphis** L. f., Schreb., Ait. (Palmen, XXI. 7) „Ruten“-P. (v. *ῥάφης*; Rute — rutenf. Stämme!), s. *Rhaphis* P. Br.

1) **Rhaponῥica** DC. (Composit. *Centaureen*, XIX. 3) Klettenblatt-Flockenblume (v. *ῥῆζυρος* u. *ῥῆζυρος*, lat. *Rha-ponticum* Fluss in Pontus, *ῥῆζυρος* auch *Volga*), *R. scariosa* DC., s. *Centaurea Rhaponῥica* L. (*Serratula Rhaponῥica* DC.). 2) **Rhaponῥicum** Less., Lam. (zu *Centaurea*), z. B. Zier. *scariosum* Lam. (s. eb. 1), fr. u. e. *rhaponῥic* Flockendistel *Rmpl.*, *pulchrum* Fisch., *Mey.* etc., s. *Centaurea Rhap.* L., *jacca* L., *alba* L. etc. 3) **Rhaponῥicum** Alp. (sc. *Rhēum*) L. (*Polygonaceen*, IX. 2) *Rhaponῥik-* od. *pontischer Rhabarber*, fr. *rapontique* (fr. u. e. *rhaponῥic*) *de montagne*, auch *Mönchs-Rhabarber*.

**Rhedia** L., Pers. (**Rhedia** *Rchb.*) (*Guttiferen* *Garcinieen*, XIII. 1) „Rheede's“-Gummibaum, fr. *cyroyer* (n. H. *Rheede* *Van Drakenstein*, s. d. *Aut.*), *R. lateriflōra* L. (*Mammēa humilis* *Vahl*).

**Rhēum** L. (*Polygonaceen*, IX. 2) *Rhabarber*, fr. *rhubarbe*, e. *rhubarb* (v. *ῥῆζυρος* Fluss u. *ῥῆζυρος* lat. *Rha* *Volga*, daher „Rhabarber“ *Rha* *bar-*

bärum), z. B. R. Rhabarbärum Pall., fr. u. e. rhabarb (rew-, rheu-) eig. „fremdes od. barbarisches Rheum“, R. Rhaponticum L. (s. v.), Zier. R. nobile Hook. f., australe Don, undulatum L., palmatum L. (Nepal), R. Emodi Wall., officinale Baill. (palmatum tantum Reg.) etc.

**Rhexia** L., Nutt. (Lythraceen Melastomaceen, VIII. 1) „Bruchheil“, Ankerblume Rmpl., fr. quadrette od. rhexie (v. ῥήξις Durchreissung, Bruch — Anwend. geg. Brüche), Zier. R. virginica L., holosericea Bpl. (Lasiandra argentea DC.), taxifolia St. Hil. (Marceetia tax. DC.). — Rhexiaceae DC.

**Rhinanthus** L. (Scrophularineen, XIV. 2) Hahnenkamm, Wiesenklapper, Klapperkraut, eig. „Nasenblume“, fr. cocrète, e. cock's-comb, fr. auch crête de coq u. oreille de cochon, s. Alectorolophus Hall., z. B. major u. minor L. (v. ῥίν, -ίρος Nase, Rüssel u. ἄνθος Bl. — Ahnl. d. Blume m. ein. Schweinsrüssel). — Rhinanthaceae DC.

**Rhinopetalum** Fisch. (Liliaceen, VI. 1) „Nasenkronblatt“ (s. eb. u. petalum Kronblatt — d. oberste Blumenblatt m. hornart. ausgeh. Nektargrube!), z. B. Karelini Fisch.

**Rhipidodendron** Willd. (Amaryllideen, VI. 1) „Fächerbaum“, -aloë (ῥιπίς, -ίδος Fächer, δένδρον Baum — fächerart. Verzweigung dess.), z. B. dichotomum W., s. Aloë dich. L.

**Rhipsalis** Haw., G. (Cacteen Opuntieen, XII. 1) „Geisselcactus“, Rutendistel, -cactus Leun. (v. ῥίψ, -ίπος Rohrschleuder, Weidenschl. v. ῥέτω schleudere — hängende Blüten!), z. B. penduliflora Nees, parasitica Haw., etc., s. Cactus etc.

**Rhizanthæa** Endl. „Wurzelblüter“ (ῥίζα Wurzel, ἄνθη Blüte) i. q. Rhizocarpæae Batsch.

**Rhizobolus** G., Schreb. (Bombaceen Rhizoboleen, XIII. 4) „Wurzelschneller“, Butternussbaum (s. eb. u. βύλος v. βύλλω werfe, d. Wurf — sehr grosse Keimwürzelchen), s. Caryocār butyrosium W. (Pekea but. Aubl., Castanea peruviana Clus.). — Rhizobolæae DC., Rehb. (zu Malpighiæae Bartl.).

**Rhizocarpæae** Batsch, Seub. „Wurzelfrüchtige“ (s. v., καρπός Frucht) i. q. Rhizanthæae Endl.

**Rhizophora** L. (Lythrac. Rhizophoreen od. Lorantheen, XII. 1) Wurzelbaum, -senker, „-träger“, fr. paletuvier (s. v., φορός tragend — d. noch hängende Samen bei d. Berührg. d. Erde Wurzeln schlagend), z. B. R. Mangle L. Mangrovebaum, Leuchter- od. Stelzenbaum, s. Aegiceras G. — Rhizophoræae R. Br., DC. Mangrove- od. Manglebäume.

**Rhizopogon** Fr., Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Wurzelbart“, -Trüffel (s. v., πύγων Bart — netzart. Wurzelfasern!), z. B. aestivus Fr., s. Tuber aest. Spr., etc., s. Lycoperdon gibbosum.

**Rhodanthe** Lindl. (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Rosenblume“ Vilm. (ῥόδον Rose, ἄνθη Blüte), Zier. R. Manglesii Lindl. m. v. v. (Neuholl.) „Rosen-Immortelle“ Leun. (z. B. v. atro-sanguinea Hort., v. fl. pleno „Fürst Bismarck“, v. maculata etc.).

**Rhodiola** L. (zu Sedum DC.) (Crassulaceen, XXII. 7) „Rosenwurz“-Fetthenne (dem. v. ῥοδίω rosig — d. Wurzel v. stark. Rosengeruch!), Zier. R. rosca L. s. odorata Lam., s. Telephium luteum minus Moris. s. g. Rhodiserwurz (Anacampsēros T.) (essb., hoh. Norden).

**Rhodochiton** Zucc. (Scrophularineen, XIV. 2) „Rosenrock“ (s. v. u. χιτών Unterkleid etc. — Kelch rosenr.!), z. B. Pracht-Schlingpfl. volubile Zucc. (Lophospermum atro-sanguineum Hort., Mex.).

**Rhododaphne** G. Fr. s. Nerium Oleander L. „Rosenlorbeer“ (ῥόδον u. Daphne Lorbeer).

- Rhododendron** L. (Ericaceen Rhodoraceen, X. 1) Alpenrose, eig. „Rosenbaum“, fr. rosage (-sagine) od. laurier rose des Alpes, e. rose-bay (*ῥόδον* u. *δέιδρον* Baum), Alpen: R. ferruginum L. gem. Alpenröschen od. Almrausch, fr. rosage commun, u. hirsutum L. haarig. Alpenr., fr. rosage velu, Zier.: R. Catawbiense Mchx., Alprose von Catawba (m. viel. Blendling.), maximum L. (Nordam.), ponticum L. m. v. v., dahuricum L. (Südsibir.), Glash. arborum Sm. (Nordind.), campanulatum Wallr. (das.), argentum Hook. f., etc.
- Rhodolēa (-leia)** Bot. Mag. (Hamamelideen, IV. 2) „Rosen-Olive“ (s. v. u. Olēa Olive), Treibh. Championi Bot. M. (China).
- Rhodōra** L. (Ericaceen Rhodoraceen, X. 1) Sumpfrosee Leun., Frührose Lauch. (s. v. u. *ῥόα* od. *ῥόα* Sicht, Ansehn), Zier. R. canadensis L., s. Rhododendron Rhodōra G. Don (Chamaer. rhododendros Duham.). — Rhodoraceae Klotzsch, Grck. (zu Ericaceae Rehb.).
- Rhodothamnus** Rehb. (Ericaceen, X. 1) Alpröschen, „Rosenbüschlein“ (s. v. u. *ῥάμνος* Busch — klein. rosenr. blüh. Str.), s. Rhododendron Chamaecistus L.
- Rhodotypos** Sieb. u. Zucc. (Rosac. Spiräaceen, XII. 5) Jambukistrauch Rmpl., Scheinkerrie Lauch., eig. „Rosenbild“ (s. v. u. *ῥότος* Schlag, Bild od. Typus — bez. d. Frucht!), Zier. kerrioides S. u. Z.
- Rhoeadēa** DC., -ades Endl. Mohnpflanzen, s. Rhoëas!
- Rhoëas** (sc. Papäver) L. (Papaverac. od. Rhoëadeen, XIII. 1) Klatschrose, -mohn Vilm., Acker-, Feld-, Ranunkelmohn, s. g. Pfaffen, fr. coquelicot, pavot coq., ponceau, fleur pleurétique, e. cockle-weed, corn-poppy etc. (gr. *ῥοία*; abfallend — näml. d. Kelchblätt. b. Aufgehen!).
- Rhopāla** G., Schreb. (Proteaceen, IV. 1) „Keulen“-Silberbaum (*ῥόταλον* Keule — näml. d. Narbe keulig!), z. B. complicata Hb. Bpl., montana Aubl., robusta Roxb. (Helicia cochinch. Lour.) etc.
- Rhūs** L. (Gen. Rhōis) (Terebinthaceen od. Anacardiaceen, V. 3 od. XXII. 5) Sumach, fr. rhus od. roux, sumac, e. rhus od. sumach-tree (gr. *ῥόζος*, *ροῖ* od. *ῥοός*; von d. celt. rhudd rot — Farbe d. Frucht! od. *ῥίω* fliesse — lass. Saft fließen, stopf. Durchfall!), Zier. R. typhinum (-na) L. Essig- od. Hirschkolbe, Essigbaum, fr. vinaigrier, e. stag's od. buck's-horn-tree, fever-Rhus, virginian sum.-tree, m. v. pumila u. v. viridiflora Hort., R. Coriaria L. Gerber-S. od. Schwarzholz Vilm., fr. roux des corroyeurs, e. hide-tanning Rh., elm-leaved Sum.-tree, R. Cotinus L. Perücken-S. (Cotinus Cocygea od. Cocygia Scop.) Gelb- od. Fisetholzbaum, fr. l'arbre à perruques, bois jaune, fustet u. marabout, e. Venus- od. Venice-Sumach, venetian S., R. Toxicodendron L. u. radicans L. (Nordam.), R. vernix L. s. vernicifera DC. Firnisbaum (Jap.), R. Copallinum L. „Kopal“-S. (Nordam.) etc.
- Rhymōris** Pers. (Blätterpilze, XXIV. 4) „Furchenschwamm“, Krämpel od. Deichselpilz Kumm. (v. *ῥυμός*; Furche, *ὄον* lat. ovum Ei), z. B. involucrata P. wahrer F.
- Rhynchocarpa** Schrad. (Cucurbitac., XXI. 10) „Schnabelfrucht“ (*ῥίγγος*; Schnabel, *καρπός* — Beere m. lang. Schnabel!), Zier. dissecta Naud. (Coniandra d. Schrad.), s. Bryonia diss. s. africana Thb.
- Rhynchopēra** Klotzsch (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Schnabelranzen“ (s. eb. u. *ῥίφα* Sack, Ranzen), z. B. punctata Van Houtt., s. Pleurothallis R. Br.
- Rhynchosia** Lour. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Schnabelkiel“ (s. v. — in Bez. auf d. carina d. Blüt.!), z. B. volubilis, menispermoïdes DC. etc., s. Glycine u. Dolichos.
- 1) **Rhynchospermum** Reinw. (Apocynen, V. 1) „Schnabelsamen“ (s. v.

u. *στέουα* S.), Zier. jasminoides Ldl. (Schlingpfl. Jap.). 2) **Rh.**- autt. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) (— Achenen kurz geschnäbelt!).

**Rhynchospora** Vahl (zu Schoenus) L. (Cyperaceen, III. 1) „Schnabelsamens“, Moorsimse, Semde O. W. (s. v. u. *σπορά* Samen — Nuss m. bleibend. Griffel), z. B. *alba* u. *fusca* Vahl.

1) **Rhytispermum** (st. **Rhytidosp.**) (Ulmaceen Celtideen, XXIII. 1) „Runzelsamen“-Zürgelbaum (*ῥυτίς*, -*ίδος* Runzel, *στέουα* Samen), s. *Celtis*. 2) **Rhyt.** Lk. (Boragineen, V. 1) (zu *Lithospermum*) (— d. Nüsschen runzlig!).

1) **Ribes** L. (Ribesiaceen od. Grossularieen, V. 1) **Johannis-** u. **Stachelbeerstrauch** (ribes veränd. *rubus* Leun., od. *ribas* eine saure Pfl. d. arab. Ärzte Paxt. = **Rheum Ribes** Wtst. — unsicher!), Gärten: *R. nigrum* L. Ahlbeere, dän. *solbaer* „Sonnenbeere“ Mej., fr. *cacis* od. *poivrier*, *R. rubrum* L. m. v. *album* Hort., rote **Johannisbeere**, s. g. *Ribissel* Vilm., fr. *ribette*, e. *currant* (corand), *R. grossularia* L. gem. od. rauhe Stachelb., fr. *groseillier commun*, *R. Uva crispa* L. Kahlbeere, *R. reclinatum* L. rote Stachelb. — Zier.: *alpinum* L. (dioecum Mch.), fr. *groseillier des Alpes*, e. *alpine currant*, *sanguinæum* Pursh m. v. v. (z. B. *atro-sanguineum* Hort.), s. *Calobotrya sang.* Spach, echte Schöntraube, auch *um* Pursh Goldtraube, s. g. *Chokoladestr.*, s. *Symphocalyx* Berland. (*R. palmata* Desf., *fragrans* Lodd., *Chrysobotrya revoluta* Spach). 2) **Ribes** (sc. **Rhæum**) L. (Polygonaceen, IX. 2) **Zuckerblatt-Rhabarber** (*folia tanquam saccharo candido adpersa* Dill.). — **Ribesiaceæ** Rchb. (*Ribesium* G. Fr. „**Johannis-träubel**“).

**Ribesia** Berland., DC. (zu *Ribes*, sect. *inermia*) **Johannistrauben** (s. eb.).

1) **Riccia** Mich. (Lebermoose, XXIV. 3) „**Riccie**“ (n. P. Franc. Ricci, Senator in Florenz im 16. Jahrh.), z. B. *glauca* Mich. — **Ricciaceæ** Rchb. 2) **Riccia** Fl. Flum. (Tange, XXIV. 3).

1) **Richardia** Kth. (Araceen, XX. 9) „**Richardie**“ od. **Calla** (n. d. franz. Bot. Prof. L. Cl. Mar. Richard z. Paris), **Stuben R.** s. *Calla aethiopica* Kth. (*Zantedeschia aeth.* Spr.), *hastata* Hook. m. v. *albo-maculata*. 2) **Richardia** L., Houst. (Rubiaceen, VI. 1) **Richardsonie**, *R. scabra* G., s. **Richardsonia** sc. Kth. (n. d. engl. Bot. u. Reis. unter Franklin 1819/22 Rich. Richardson, schr. 1699 üb. Gartenkultur).

**Ricinus** T., L. (Euphorbiaceen od. Trikokken, XXI. 9) **Wunderbaum**, fr. *ricin* od. *girasol*, e. *oil-nut-tree* u. *palmatory* (lat. *ricinus* Zecke, gr. *ρίζιον*; hebr. *kikar* d. i. rundlich — Samenähnlichk.), Zier. *R. communis* L. s. *tunicensis* Desf. (major u. minor Hort.), fr. *carapas* (-pat), *palma Christi* u. *figuier infernal*, e. *palma Christi* u. *palmary*, m. v. v. (*rutilans*, *sanguineus* etc.), *R. viridis* W., *africanus* Mill. — **Riciniæ** (sc. **Euphorbiac.**) Rchb.

**Ridolfia** Moris. (Unbellifer. Ammineen, V. 2) „**Ridolfie**“, **Saatfenchel**, *R. segutum* Moris. (wohrl. *Decorat.*-Pfl.) (n. C. Ridolfi, Prof. in Pisa, schr. ein. Pfl.-Katal., Florenz 1843), s. *Foeniculum seg.* autt.

**Rindera** Pall. (Boragineen, V. 1) „**Rinder's**“ **Hundszunge** (n. Dr. Rinder in Moskau, der d. Pfl. b. Orenburg fand), *R. tetraspis* Pall., *carolinensis* Pers., etc., s. *Cynoglossum Rindera* Pall. s. *laevigatum* L. u. *Batschia canescens* Pers.

**Ritro** Schkuhr, Endl. (sc. **Echinops**) L. (Compos. Echinopeen, XIX. 5) echter „**Ritro**“, *kochblättr.* **Kugeldistel**, fr. *boulette azurée* (Nam. d. Pfl. in Südeuropa), s. *Echinops strictus* Schrad.

**Rivina** L. (bess. *-nia* Juss.) (Phytolaceen od. **Chenopodiaceen**, IV. 1) „**Rivinie**“ (n. d. Prof. Rivinus in Leipzig, † 1723), Zier. *R. humilis* L., *R. paniculata* L., s. **Salvadora persica** Vahl etc.

**Robertsonia** Haw. (zu *Saxifraga*) Rchb. (**Saxifragaceen**, X. 2) „**Robertsonie**“ (n. W. Robertson, schr. *Collect. de Serres chaudes pour forcer*



- des ananas etc., Lond. 1798), Ampelpfl. *R. sarmentosa* Haw. s. *stolonifera* Jacq., s. g. Judenbart, s. *Diptera stol.* Borkh. (*Saxifr. sarm.* L. s. *stol.* Jacq.), *R. crenata* Mnh. s. *dentata* Haw., s. *Saxifr. Gēum* L.
- Robinia** L., DC. (*Leguminos. Galegeen*, XVII. 4) „Robinie“, s. g. Akazie, fr. Robinier, bois d'ainon, e. locust-tree (n. Joh. Robin, Gärtn. d. Kön.'s Heinr. IV. v. Frankr. um 1600), Zierb. *R. Pseud-Acacia* L. gem. Schotendorn, m. v. v. (z. B. *inermis* Dum. s. *umbra-culifera* DC. Kuglakazie, fr. Rob. Parasol); *R. viscosa* Vent. s. *glutinosa* L. Pech- od. Klebakazie, m. v. *albiflora* Hort.), *R. hispida* L. (*rosea* Lois.) m. v. v. (z. B. *bella rosea*) Rosen-Ak. Vilm., fr. Rob. rose, e. hispid Robinia.
- Robsonia** Berland., DC. (*Ribesiaceen*, V. 1) „Robson's“ -Johannisbeere (n. Steph. Robson, schr. t. brit. Flora, York 1777), s. *Ribes speciosum* Pursh (*Californ.*).
- 1) **Robur** (sc. *Quercus*) L., W. (*Cupuliferen*, XXI. 8) Stein-, Winter-, Rot-, Traubeneiche (*robur*, -böris Kraft u. Hartholz, celt. rove), fr. rouvre (roure) od. durelin, e. elke, holm-oak (-tree), auch barren scarlet-oak, s. *Q. sessilis* Ehrh. (*sessiliflora* Sm.). 2) **Robur** (sc. *Quercus*) Sm., Grck., s. *Q. pedunculata* Hoffm. s. *racemosa* Lam. Stiel- od. Sommer-eiche, fr. gravelin (*Q. femina* Roth, *longaeva* Salisb., *fructipendula* Schrk.).
- Roccella** DC. (*Flechten*, XXIV. 3) Fels- od. Lackmusflechte, fr. orseille (ursolle), e. archil u. litmoss (*span. rocca* Felsen), s. *Lichen Roccella* L. — *Roccellæ* Nyl.
- Rochëa** DC. (*Crassulaceen*, V. 5) „De la Roche's“ Dickblatt (n. d. Bot. De la Roche), Zier. *R. falcata* DC., *odoratissima* u. *coccinea* DC. (*Larochea* Pers., *Dietrichia* Tratt., *Kalosanthes* Haw.).
- Rodschiedia** Gärtn. (*Cruciferen Siliculos.*, XV. 1) Hirtentäschchen, *R. bursa pastoris* Fl. Wett. (n. d. Bot. E. K. Rodschied, schr. de necess. et util. studii bot. Marburg 1790, † 1796 in Essequebo), s. *Capsella Bursa* s. *Thlaspi burs. past.* L.
- Roëlla** L. (*Campanulaceen*, V. 1) „Roëlle“ (n. W. Roëll, Prof. d. Anatom. z. Amsterd.), z. B. *ciliata* L. s. *reticulata* Lam. (*Campanula afric. Comm.*, *Aculeosa mauretanica* Pluk.), s. *Zygophyllum fruticosum* autt. u. *Roeperia* Spr. *fruticulosa* A. Juss.
- Roestelia** Rebert., Lk. (*Staubpilze*, XXIV. 4) „Röstel's“ - od. Gitterrost, -brand D. (n. d. Apoth. Röstel zu Landsberg), *R. cancellata* Rebert., s. *Gymnosporangium fuscum* Oerst. (davon die *Aecidium*-Generation!).
- Rogiera** Planch., Lindl. (*Rubiaceen Hedyotideen* od. *Rondeletieen*, V. 1) „Rogiere“ od. *Rondeletie* (n. d. Namen Rogier u. *Rondelet*), Zier. *R. cordata* u. *elegans* Planch., *gratissima* Pl., Ldl. s. *Rondeletia* Plum.
- Rolandra** Schreb., Rottb. (*Compos. Echinopeen*, XIX. 5) „Rolander's“ -Kugeldistel (n. Dan. Rolander, Schül. v. Linné, bereiste Surinam), *R. argentæa* Sw., s. *Echinops fruticosus* L. f.
- Romulæa** Pers. (*-lia* Marrat.) (*Irideen*, III. 1) (zu *Ixia* L.) römische Uchtblume (*Romulæus* v. Kön. Romulus od. römisch), z. B. *R. Bulbocodium* v. *nivale* Bak. Schnee-Haarfaden, s. *Trichonema nivale* Boiss., Ker.
- Rondeletia** Plum., L. (*Rubiaceen. Cinchonac.*, V. 1) „Rondeletie“ (n. d. Nat. Guill. *Rondelet* z. Montpellier, 16. Jahrh.), Zier. *R. speciosa major* Hort. (*odorata* Jacq., *coccinea* Moç., *speciosa* Lodd.) (*Havanna*), *americana* (das.), *Burdiei* Hook. (*Venezuela*). — *Rondeletieæ* DC.
- Roripa** Scop. (*Crucifer. Siliquos.*, XV. 2) Wasserkresse Leun. (rös, -ris Tau? *ripa* Ufer? — unklar! viell. N. propr.), s. *Nasturtium amphibium*, *silvestre* etc.
- Rosa** L. (*Rosaceen*, XII. 5) Rose, fr. rose (-sier), e. rose, wilde: *R. canina* L. Hunds- od. Heckenrose, fr. *cynorrhodon*, e. dog-briar

(-rose), sweet-briar, canker-rose u. hep-tree od. haw-thorn „Hagedorn“, *R. arvensis* Huds. (*sylvestris* Herm., *serpens* Ehrh., *repens* Scop., Gm.) Kriechrose, fr. *R. rampante*, e. field-r., *R. rubiginosa* L. Weinrose, fr. *rosier rouillé*, *R. villosa* L. (*pomifera* Herm., K. Koch, *mollis* Sm.) Apfelrose, etc.; Zierr.: a) *Pimpinellifoliae* K. Koch „Bibernellrosen“, z. B. *lutēa* Mill. (asiat. Türkei) m. v. v. (z. B. *bicolor* Jacq. s. *punicēa* Mill. s. g. Kapuziner-R., v. persian yellow (fl. pl.) etc.), *R. sulphurēa* Ait. (*hemisphaerica* Herm.) „Schwefel“-R. od. s. gelbe Centifolie Rmpl., *R. spinosissima* L. s. *pimpinellifolia* DC. (auch wild), fr. r. *pimprenelle*, s. g. Marien-R. od. Marterdorn, m. v. v. — b) *Cinnamomēae* K. Koch „Pfingstrosen“, z. B. *cinnamomēa* L. „Zimmt“-R. m. v. v. (z. B. *focundissima* Münchh.), *R. alpina* L. „Alpen“-R. m. v. v. u. Hybr. (z. B. *Boursaultrosen alpina-chinensis*). — c) *Hortenses* K. Koch „Gartenrosen“, z. B. *dama-scēna* Mill. (Syr.) *Damascener-R.*, Hauptstammrose d. edlen Gartenrosen, *R. centifolia* L. „Centifolie“ m. v. v. (z. B. *muscosa* Mill. „Moosrose“, v. *provincialis* Mill. *Pomponrose*, e. *cabbage-r.*, v. *parvifolia* W. „Burgunder“-R., v. *pulchella* Hort. „Champagner“-Röschen, v. *divionensis* Hort. „Dijon“-R.), *R. gallica* L. *Essig-* od. *Purpur-R.* (Südeur.), fr. r. de *Provins* (Champagne). — d) *Caninae* K. Koch „Hundsrosen“, z. B. *villosa* L. (*pomifera* Koch) *Apfel-R.*, *alba* L. *weisse R.* m. v. v. (z. B. *maiden's-blush*, fr. *Cuisse de Nymphe*. — e) *Corymbiferae* K. Koch „Büschelrosen“, z. B. *repens* Scop. (s. ob.) s. *capreolata* Mill. m. v. v. (z. B. *Ayrshire-R.*), *R. sempervirens* L. (Orient), *multiflora* Thb. (Jap., Chin.), *moschata* Mill. *Moschus-R.* (als Hybr. *Noisette-R.*), *setigera* Mchx. *Prairie-* od. *Kletter-R.* (Nordam.) — f) *Nobiles* K. Koch „Edelrosen“, z. B. *chinensis* Jacq. s. *indica* Hort. m. v. v. (z. B. *semperflorens* Curt. s. *bengalensis* Pers. *Monats-R.*), *R. minima* Curt. „Liliput“- od. *Lawrence-R.* (Topf.), *R. fragrans* Réd. *Theerose*, *R. borbonica* Hort. „*Bourbonrose*“ m. v. v. (z. B. *Gloire de Dijon*), *R. Noisettana* Réd. „*Noisette*“-R. (Hybr. v. *R. bengal.* m. *moschata*!). — *Roses remontantes* (immerblüh. Hybriden) früher s. g. *Herbstrosen* (— *Abkömml.* v. *Damascener* u. *Chineser-Rosen*, Rmpl.). — *Rosaceae* Juss., DC., -sée (zu *Rosaceae*) Rchb.

**Rosanowia** Reg. (Gesneriac., XIV. 2) „*Rosanowie*“ (n. d. Nam. *Rosanow* geb.), z. B. *conspiciua* Reg., s. *Biglandularia* Seem.

**Rosiflorae** Endl., Rchb. „*Rosenblütige*“ (*rosa* u. *flos*, -ōris Blume etc.).  
**Rosmarinus** L. (Labiaten, XIV. 1) „*Rosmarin*“, eig. „*Meertau*“, fr. *encensier* u. *romarin*, e. *rosemary* (*ros-marine*) u. *heart's-root* (*ros*-, *ōris* *Tau*, *marinus* vom Meer — Standort! viell. v. *ζώψ* niedr. Strauch u. *μύρω* balsamisch, Leun.).

**Ros-sōlis** T., Scop. (Droseraceen, V. 5) rundblättr. „*Sonnentau*“ (s. v., *sol*, -is *Sonne*), s. *Drosera rotundifolia* L.

1) **Rottboella** L. (-ia Roth, Schreb.) (Gräser, III. 2) „*Rottboell's*“-Gras, *Dünnschwanz* (n. d. dän. Bot. C. F. *Rottboell*, schr. *Descr. plant. quarundam Surinamensium*, Hafn. 1798), s. *Lepturus* R. Br. (*Aegilops* L. u. *Cymbachne* W. 2) **Rottb.** Scop. (*Lucumeen*, X. 1).

**Roupellia** Hook. (Apocynen, V. 1) „*Roupellie*“ (n. ein. Eigennamen), *Treibh. R. grata* Hook. (Schlingstr. Westafr.), s. *Strophanthus Stanleyanus* Hook.

**Royēna** L. (*Lucumeen* od. *Mimusopeen*, X. 2) „*Royene*“ (n. d. Prof. *Adr. v. Royen* z. *Leyden*, † 1779), z. B. *glabra* L. (*Vitis* *Idaea aethiopica* Comm., *capische* *Preisselbeere*), *ambigua* Vent., *lucida* L. (*Staphylo-dendron* *afric.* Comm., *Cap-Str.*) etc.

**Roylea** Wall. (Labiaten, XIV. 1) „*Royle's*“ *Ballote* (n. d. Prof. *J. Forbes*

Royle z. London), z. B. *elegans* Wall. (*Phlomis calycina* Roxb., Str. Ostind.), s. *Ballota cinerea* Don.

**Rubia** T. (Rubiaceen od. Stellaten, IV. 1) Krapp, „Färberröte“, *R. tinctoria* L., fr. garance, provinziell auch rapequicou u. rubi, e. madder od. mather u. gosting (v. rubëo bin rot — roter Farbstoff d. Wurzeln). — Rubiaceae Juss., DC., Rchb., fr. rubiacées i. q. Stellatae L. Sternkräuter — Rubicinea Bartl. Ord. d. Krappgew.

**Rubus** L. (Rosaceen, XII. 3) Brombeere, Steinbeere O. W., fr. ronce od. framboisier, e. bramble, black-, knot- u. rasp-berry (hind-) (v. d. celt. rub rot, d. lat. rubëo bin rot — nämlich d. Früchte etl. Arten), z. B. wild: *R. plicatus* W., Nees s. *fruticosus* L. faltenblättr. od. Wald-Brombeere, fr. ronce commune, thyrsoidëus Wimm., caesius L. Bocks- od. Kratzbeere, fr. ronce bleue, e. grey-bramble od. dew-berry, *R. Idaeus* L. Himbeere, fr. framboise (-sier), e. rasp- od. hind-berry, Zier. *R. odoratus* L., fr. ronce odorante, m. v. fl. albo, nobilis Reg., bellidi- u. rosaeflorus Hort., arcticus L., laciniatus W., fr. ronce à feuilles laciniées, e. cut-leaved-bramble, *R. fruticosus* L. m. v. fl. pl. u. rubro fl. pl. Hort., fr. r. commune, c. common black-berry.

**Rudbeckia** Ad. (Myrobaleen, X. 5) „Rudbeck's“-Balsampflaume (s. sogl.).

**Rudbeckia** L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Rudbeckie“ (n. d. schwed. Bot. Prof. Olaus Rudbeck), Zier. *R. hirta* L., *speciosa* Wend., *amplexicaulis* Vahl (-folia Jacq.), *Drummondii* Hook., *purpurea* L. s. *serotina* Nutt. etc., s. *Dracopis*, *Obeliscaria*, *Echinacea* Munch. etc.

**Rudgëa** Salisb. (Rubiaceen, Coffeaceen, V. 1) „Rudge's“-Kaffeestrauch (n. Edw. Rudge, schr. *Plantae Guianae rarioris*, Lond. 1805), *R. macrocephala* Sal., *spicata* Spr. (*Coffea spic. Kth.*) etc.

**Rudolphia** W. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Rudolphi's“-Süssbohne (n. d. Bot. K. Asm. Rudolphi zu Jena), z. B. *peltata* W. (*Erythrina planisiliqua* Corallodendron Plum.), s. *Glycine sagittata* autt.

**Ruëllia** L. (Acanthaceen, XIV. 2) „Ruëllie“, fr. crustolle (n. d. franz. Arzt etc. Jean de la Ruelle, lat. *Ruellius* in *Soissons*, Leibarzt Franz I., † 1537, schr. *de natura Stirpium*), Zier. *R. superba* Dietr. (*formosa* Andr., *elegans* Poir.) (Hstr. Brasil.), *maculata* Wall. (Ostind.) etc.

**Rumex** L. (Polygonaceen, VI. 3) Ampfer, fr. raguette u. oseille, e. sorrel u. dock (lat. *rumex*, -icis v. *δύμα* Fluss, Paxton: v. *rumo sauge?*, *ruma* od. -mis säugende Brust), Gärten *R. Patientia* L. s. g. englischer Spinat, *scutatus* L. Schildampfer, wild: *R. Acetosa* L. Wiesen-Sauerampfer, fr. oseille ordinaire, e. sorrel, *R. Acetosella* L. Spitzampfer, *R. aquaticus* L., fr. plante britannique, *R. crispus* L., *sanguineus* L. s. *nemorosus* Schrad., fr. sang-de-dracon, e. bastard-rhubarb, etc.

**Rupifraga** Otth. (Sileneen, X. 3) „Felsbrech“, s. *Silene rupestris* L. (v. *rupes*, -is Felsen, frango zerbreche — liebt stein. Boden!).

**Ruppia** L. (Fluvialen od. Potamogeen, IV. 3) Seestrands- od. Meerfaden, Wasserriemen, Salde O. W. (n. d. deutsch. Bot. Bernh. Rupp, lat. *Ruppia*), *R. maritima* L. (*Buccaferrëa* m. Mich.).

1) **Russelia** L. (Saxifragaceen, V. 2) „Russellie“, R. s. *Vahlia* Thb. *capensis* (n. d. Bot. Lord John Russell, Herz. v. Bedford, Wtst.: n. d. engl. Arzt u. Orient-Reis. Alex. Russell, † 1786). 2) **Russellia** Jacq., Juss. (Scrophularineen, XIV. 2) „Russellie“, Zier. (Ampeln) *R. juncëa* Zucc., *multiflora* Sims, *sarmentosa* v. *semperflorëns* Hort.

**Ruscus** L. (Sarmentaceen, XXII. 13) Mäusedorn, fr. brusce (bruse) (lat. *Radix Brusci*), fragon, houx frëlon, petit-houx, auch husson, e. butcher's-broom „Fleischerbesen“, knee-holm (rus, -ris Land, scopae Besen, *uris scopae*, unde *Ruscus* Plin.), z. B. *androgynus* L. (Canar.).

- Russūla** Fr., Pers. (Hutpilze, XXIV. 4) „Rotpilz“, Reizker (dem. v. russus rot), z. B. emetica s. lurida Pers., s. g. „Täubling“, s. Agaricus em. Schaeff., R. foetens Pers. Stink-Täubling, essb. aurata, lutēa etc.
- 1) **Ruta** L. (Rutaceen, VIII. 1) „Raute“, fr. rue, e. rue, herb of grace (gr. ῥύτι) v. ῥιόματι rette od. ῥίω mache fließen), R. graveolens L. Duft- od. Gartenraute, fr. sauve-vie. 2) **Ruta muraria** (sc. Asplenium) L. (Farne, XXIV. 1) Stein- od. Mauerraute, e. wall-rue od. stonefern. — Rutacēae Juss., DC., -tariae Rehb. Rautengew.
- Sabadilla** (sc. Verātrum) L. (Melanthaceen, VI. 3) Läusesamen, fr. cévadille, e. louse-wort (-bane) (dem. v. cebada span. Gerstenkorn).
- Sabal** Adans. (Palmen, VI. 1) Zwergpalme (vaterl. Name!), Stuben S. umbraculifera Mart. (Blackburniana Hort.), Adansonii Guerus (Corypha minor Murr.).
- 1) **Sabbatia** Adans. (Gentianeen, V. 1) „Sabbatie“ (n. d. ital. Bot. Const. Sabbati, schr. 1772—84 üb. d. röm. Gart., Wtst. n. Liberatus Sabbati, schr. 1745 Synops. pl. Romae), Gewächsh. S. campestris Nutt. (Tex.). 2) **Sabbatia** Mneh. (Labiaten, XIV. 1) „Sabbati's“-Lippenblume.
- Sabina** (sc. Junipērus) L. (Junipereen od. Cupressineen, XXII. 12) Sade- od. Sevenbaum (Sieben-, Seben-), Mägdebaum, Stinkwachholder, fr. sabine od. savinier, e. sabine od. common savin (v. Sabina Sabinerin? Seben (Seven) d. lat. sabīna, Wtst.: σέβω verehere — weg. d. Heilkraft! — ungewiss).
- 1) **Sabinēa** DC. (Papilionaceen, XVII. 4) „Sabine's“ Schmetterlingsblüte (n. d. engl. Bot. J. Sabine, Stifter d. Vereins f. Gartenkultur in London, † 1837). 2) **Sabinēa** C. Koch (sect. v. Pinus L.) (Coniferen, XXI. 9) Sabine-Kiefern (— 3 Nadeln in d. Scheide), z. B. P. Sabineana Dougl. (n. d. Reis. Sabine, 1823 in Grönland), Coulteri Don (Macrocarya Lindl.), Jeffreyi Oreg. „Jeffrey's“-K. (alle in Californ.), Gerardiana Wall. (Himal.).
- Sabulina** Rehb. (zu Arenaria L.) (Alsineen, X. 3) „Sandmiere“, fr. sabline (v. sabūlum, fr. sable Sand — Standort), z. B. stricta Rehb. (Aren. uliginosa Schleich.).
- Saccharum** L. (Gramineen, III. 2) Zuckerrohr, fr. canne à sucre, e. sugar-cane (gr. σάκχαρον, arab. soukar), S. officinarum L. gem. Z. m. v. off. violacēum, S. cylindricum Lam. u. Maddenii Hort. (Ziergr.).
- Saccolabium** Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Sacklippe“ (saccus u. labium), z. B. guttatum Ldl. (Sarcanthus gutt. ds. s. Aërides retusa Sw.), s. Saccochilus Blum.
- Sagina** L. (Alsineen, X. 3) „Mastkraut“, Knebel O. W., fr. sagine, e. pearl-wort (sagina Mästung etc.), Zier. S. subulata Wimm. (Arenaria sub. s. acicularis Hort.).
- Sagittaria** L. (Alismaceen, XXI. 5) „Pfeilkraut“, fr. saette od. sagette, léchière „Lieschkraut“, e. arrow-head (v. sagitta Pfeil — Form d. Blätter!), z. B. sagittifolia L. m. v. fl. plen. s. japonica Hort., S. sinensis s. gigantēa u. lancifolia Hort.
- Sagus** Rumph., G., Jacq., W. (Palmen, XXI. 7) „Sagopalme“, fr. sagu od. lançan, e. sago-tree (malay. sagu d. Name v. mancherlei Palmen), Zapfenpalme Perring, z. B. S. Rumphii W. (Raphia Comm., Metroxylon Rottb., Saguera Rumphii Roxb.), s. Arenga saccharifera Lab. (Gomutus sacch. Rumph.), S. taedigera Mart., vinifera Hort. (Raphia v. P.-B.) (Guinea), S. Ruffia Hort. (Madag.) etc.
- Salicacēae** Rich., -licēae Rehb., -licinae Rich., DC., -cinēae Seub. (zu Ord. Iteoidēae Bisch.) Weiden (s. Salix).

- Salicaria** T. (sc. *Lythrum*) L. (Lythraceen, XI. 1) „Weiderich“, fr. salicaire, gem. Blutkraut (v. *salix*, -icis Weide — wächst unter solchen!). — *Salicariae* Juss., -cariëae Rchb.
- Salicornia** T., L. (Aizoideen Atripliceen od. Chenopodiaceen, II. 1) Glasschmalz, „Salzhorn“-Kraut, fr. *salicor* (-cot, -corne), e. glasswort (v. *sal*, -lis Salz, *cornu* Horn — d. Zweige wie Hörner spitz etc.).
- Salisburia** Sm. (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) „Salisbury's“- od. Ginkgobaum (n. d. engl. Gärtn. u. Bot. R. A. Salisbury), Zier. S. *adiantifolia* Sm. = *Ginkgo biloba* L.
- Salix** T., L. (Salicaceen, XXII. 2) Weide, fr. saule, e. willow, withy „Wiete“ u. wicker (*salix*, -icis Weide, v. d. celt. *sal* nahe u. *lis* Wasser), z. B. Zier. S. *babylonica* L. Trauer- od. Thränenweide, fr. saule pleureur, e. weeping-willow, s. *pendula* Mnch., m. v. *annularis* Hort. Locken-W., wild u. Zier.: S. *daphnoides* Vill. (praecox Hoppe) gem. Reif- od. Duft-W., *acutifolia* W. (pruinosa Bess., *caspica* Hort.), *amygdalina* L. (*triandra* Hoffm.), *viminalis* L. gem. Korb- od. Flechtw., fr. u. e. osier (ozier), *pentandra* L. Lorbeerw., *alba* L. gem. Weiss- od. Kopfw. m. v. *vitellina* L. Gold- od. Dotterw. u. v. *argentëa* Hort. s. *regalis* Hort. Silberw., *fragilis* L. Bruch- od. Knackw., *purpurea* L. (Napoleonis, *nigra pendula*, *babylonica violacea* Hort.), S. *Helix* L. gem. Bachw. (m. v. *uralensis* Hort., v. *Doniana* Sm. u. v. *mirabilis* Hort.), *rubra* Huds. (m. v. *Forbiana* Sm., v. *Pontederana* W. Koch, v. *austriaca* Host. etc.), S. *Caprea* L. Sal-, Sohl- od. Palmw. (m. v. *pendula* Hort. u. Hybrid. *capr. fol. varieg. od. tricolor* etc.), *Silesiaca* W., *aurita* L., *cineræa* L., *phylicæ-* u. *prunifolia* Sm., S. *Elaeagnos* Scop. (*rosmarinifolia* u. *aspleniifol.* Hort.) Rosmarin-W., u. a. m.
- Salpianthus** Hb. Bpl. (Nyctagineen, V. 1) „Trompetenblume“ (*σαλπιγγίς* Trompete, *ἀνθος*; Bl.), s. *Boldoa* Lag.
- Salpiglossis** Rz. Pv. (Srophularin. od. Solaneen, XIV. 2 od. V. 1) „Trompetenzunge“ (s. eb. u. *γλωσσοειδής* Zunge — d. Griffel bild. eine röhrl. Zunge!), Zier. S. *sinuata* R. P. s. *variabilis* Hort. (Chili) m. v. *nana* Hort., *coccinea* Van Houtt. etc.
- Salsola** L. (Chenopodiaceen, V. 2) „Salzkraut“, fr. salsovie, marie u. cornulaque, e. salt-weed (-wort) (dem. v. *salsus* salzig — Salzboden!), z. B. S. *Kali* L. gem. S. (*Kali siculum lignosum* Bocc.), S. *aphylla* L. (*Caroxylon* Sals. Thb., Cap).
- Salzwedelia** G. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Pfeilginster, S. *sagittalis* Fl. Wett. (n. P. Salzwedel in Frankfurt a. M. im vor. Jahrh.), s. *Genista* sag. L. (*Cytisus* s. Koch).
- Salvadōra** L. (Phytolaceen, IV. 1) „Salvadore“, s. g. Siwāk (Senfbaum des Neuen Testamentes) (n. d. span. Bot. J. Salvador ben.), S. *persica* Vahl, s. *Cissus arboræa* Forsk. u. *Rivinia paniculata* L. (*Grossularia Embelia* Retz.).
- Salvia** L. (Labiaten, II. 1) „Salbei“, fr. sauge, e. sage (v. *salvus* gesund od. salvo rette, heile), Zier. S. *Sclarea* L. Muskateller-S., S. *Horminum* L. Scharlachkraut, S. *officinalis* L., Garten-S. m. v. *tricolor* Hort., S. *patens* Benth. (Mex.), S. *splendens* Sell. (ponceaurote Brakteen, Bras.), *coccinea* L. m. v. v., S. *Roemeriana* Scheele (*Porphyrantha* Decsn., Tex., Bras.), *tricolor* Lem. (Mex.), *janthina* Ott., *Dietr.* (Mex.) etc.
- Salvinia** Mich., Guett. (Wasserfarne od. Rhizocarpeen, XXIV. 1) „Salvinie“, Büschel- od. Schwimmfarn, Schwimmblatt O. W., Kugelknäul (n. Ant. Maria Salvinius, Prof. in Florenz im 17. Jahrh.), S. *natans* All., Hoffm., s. *Marsilia natans* L. — *Salvinia*cëae Bartl., -acëi Rchb.

- Sambac** Ait. (sc. *Jasminum*) L. (Oleaceen, II. 1) arabischer Jasmin, fr. sambac (pers. Name zambac!), s. *Nyctanthes* Samb. Thb. (*Mogorium* Juss.).
- Sambucus** T., L. (Caprifoliaceen Sambuceen, V. 3) Hollunder, Holder od. Flieder, fr. sureau, e. bore-tree, elder- od. pipe-tree (gr. σαμβύκη Harfe — aus dess. Holz gemacht! od. σαμβύξ äol. rot — bez. d. Fruchtsaftes! ungewiss!), z. B. *nigra* L. s. *vulgaris* Lam. Flieder, Sebestenbaum Vilm., fr. sureau commun, e. common Elder, m. v. v. (z. B. v. *laciniata* Hort., s. g. Petersiljen-H.), *S. canadensis* L., *racemosa* L. Trauben- od. Berg-H. m. v. v., *californica* s. *glauca* Hort. m. v. *Fontenaysii* Carr., etc. — *Sambucæ* H. B. K., -cinæe Batsch (zu *Caprifoliaceæ* Juss., Rchb.).
- Samolus** T., L. (Primulaceen, V. 1) „Salzbunge“, fr. samole od. mou-ron d'eau „Wasser-Gauchheil“ (v. d. celt. san heilsam u. mos Schwein — bei den Galliern geg. Viehkrankh.), *Samolæe* (sc. *Lysimachiacæe*) Rchb., Bungen (nicht Pungen! Grck.).
- Samyda** L. (*Amygdaleen* *Samydeen*, X. 1) „Birkenpflaume“ (v. σαμύδα Birke — Ähnlichk. damit), z. B. *polyandra* W. (*Melistaureum* *distichon* Forst. Neuceal.), *serrulata* L. (*Guidonia* *ulmifolia* Plum., Südamerika). — *Samydæe* DC. (zu *Amygdalacæe* Rchb.).
- Sanchezia** Rz. Pv. (*Acanthaceen*, II. 1) „Sanchezblume“ (n. Jos. Sanchez, Prof. d. Bot. in Cadix), z. B. *nobilis* Hook., *oblonga* u. *ovata* R. P., etc.
- Sandersonia** Hook. (*Sarmentaceen*, VI. 1) Maiblumen-Kaiserkrone, *S. aurantiaca* Hook. (Südaf.) (N. pr.).
- Sandoricum** Cav. (*Hesperideen*, XVIII. 2) „Sandoribaum“ (malay. sandori od. santoor).
- Sanguinaria** Dill., T. (*Papaveraceen*, XIII. 1) „Blut“- od. Rotwurz, fr. sanguinaire, e. blood-wort (v. sanguis, -inis Blut — gelbroter Saft!), Zier. *canadensis* L., e. canadian Buccoon, Redrot od. Turmeric.
- 1) **Sanguisorba** L. (*Rosac.* *Sanguisorbeen*, IV. 1) „Blutsauge“, Wiesenknopf, Kölbl O. W., fr. sanguisorbe, e. burnet (v. sanguis, s. eb. u. sorbeo sauge), z. B. *officinalis* L., Zier. *S. media* L. (Canada), *canadensis* L. u. *dodecandra* Moretti (Alp.). 2) **Sanguis**. (sc. *Poterium*) L., s. g. „Bibernelle“, jetzt mit 1 zusamm.! s. *S. minor* Scop. — *Sanguisorbæe* Torr. u. Gr.
- Sanicula** T., L. (*Umbelliferen*, V. 2) „Heilkraut“, -dolde, Bruchkraut, fr. sanicle, herbe de St. Laurent, e. bear's-ear „Bärenohr“, sanicle u. self-heal „Selbstheil“ (v. sano heile — als Heilm. sehr in Ruf!). — *Saniculæe* Rchb.
- 1) **Sansevieria** Thb. (-*severia* Réd.) (*Liliac.* *Asparageen*, VI. 1) „Sanseviere“ (n. Raim. v. Samaro, Fürst v. Sanseviero in Neapel, † 1771, Paxton: n. d. schwed. Bot. M. Sansevier, Stuben: *S. carnæa* fol. varieg. (*Reineckia* *carn.* Kth.), *zeylanica* Thb. (*Liriope* *spicata* Lour.) (*Faserpfl.* Südindiens). 2) **Sans.** Andr. (*Aroideen*, XXI. 9).
- Santalacæe** R. Br., DC., Rchb. „Santelgew.“, s. sogl.
- Santalum** L. (*Santalaceen*, IV. 1) „Santelbaum“, fr. u. e. santal (auch sandal) (v. d. pers. sandul, arab. sandal „nützlich“), z. B. *album* L. (*Sirium* *myrtifolium* Roxb.), *rubrum* L. (*Pterocarpus* *santalinus* L. f.), *paniculata* u. *Freycinetiana* Santelholz d. Sandwichsinseln.
- 1) **Santolina** (sc. *Achillæa*) L. (*Compos.* *Anthemideen*, XIX. 2) „Heiligen“-Garbe. 2) **Santolina** T. (*Compositen* *Eupatorineen*, XIX. 1) „Heiligenpflanze“, Heiligen- od. Dochtkraut, Baumwollenkr. Leun., fr. santoline od. petit cyprès u. aulone femelle „weibl. Äberute“, e. ground-cypress, Zier. *S. Chamae-Cyparissus* L. u. *rosmarinifolia*, *S. viridis* W., fr. *S. verdâtre* (*santolinus* v. *sanctus* heilig u. *Linum* Lein).

- Sanvitalia** Lam. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sanvitalie“, fr. sanvitalie (n. d. Prof. Sanvitali zu Brescia, † 1767), Zier. procumbens Lam. s. villosa Cav. m. v. fl. pleno Hort., mexicana Hort. (Zinnia Haageana Reg. s. Ghisbreghtii Verlot).
- Sapindus** L. (Sapindaceen, VIII. 3) „Seifenbaum“, fr. savonnier, pomme de savon, e. soap-berry (sope-) (contrah. aus *sapo indus* „indische Seife“ — d. fleisch. Samenmantel als Seife!), z. B. *edulis* Ait., s. *Dimocarpus Litchi* Lour. „Zwillingspflaume“. — Sapindacæe DC., Rchb., -deæe Rchb., -di Juss.
- Sapinus** Endl. (zu *Pinus*) (Coniferen, XXI. 9) „Safttanne“, fr. *sapin* (v. *sapa* Saft, *Pinus* Tanne).
- Sapium** Jacq., P. Br., Juss. (Euphorbiaceen, XXI. 2) „Fettbaum“ (v. d. celt. *sap* fett od. klebrig — in Südamer. als *Vogelleim*!), z. B. *aucuparium* Jacq., s. *Hippomäne biglandulosa* L.
- 1) **Saponaria** L. (Sileneen, X. 2) „Seifenkraut“, fr. *saponaire* od. *savonnaire*, e. bruisse-wort od. *saponary*, auch *soap-wort* (-weed), Zier. *S. officinalis* L. m. v. v. (fl. pleno etc.), *calabrica* Guss. (multiflora Hort.) m. v. fl. albo Hort., *caespitosa* DC., Stuben: *ocimoides* L.
- 2) **Saponaria** Lour. (sc. *Sapindus*) L. Seifenbeerbaum (*sapo*, -ōnis, gr. *σάπων*, -ωνος Seife).
- Sapōta** Mill. (Sapotaceen od. Lucumeeen, VI. 1) „Sapotillbaum“, s. g. Breiapfel, fr. *sapote* (-tier, -tillier) (in Mex. *cochit-zapotl*!), s. *Achras Sapōta* L. (Surin.). — Sapotacæe Rchb., -tæe R. Br., -tae Juss., „Sapotaceen“.
- Sappan** (sc. *Caesalpinia*) L. = **Sappania** DC. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Sappan“- od. Braunholz. (malayisch. Name!).
- Sarāna** Kamschatka Hort. (Liliaceen, VI. 1) „Serenna“ od. kamschadalische Kaiserkrone (vaterl.), s. *Fritillaria Kamsch.* autt. (essbare Zwiebelknollen!).
- Sarauja** s. **Sauravia!**
- Sarcanthus** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Fleischblume“ (*σάρκοζ*. -ζος Fleisch, *ἀνθος* — fleisch. Blüten!), z. B. *paniculatus* Ldl., s. *Aërides* pan. Ker.
- Sarcocephalus** Afz. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Fleischkopf“, essbare Chinabeere (s. eb. u. *ζεγαλή* Kopf), *S. esculentus* Afz.
- Sarcophilus** (nicht -um!) R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Fleischlippe“ (s. v. u. *γείλος* Lippe — Mittellippe d. Labells fleischig!), z. B. *falcatus* R. Br. (Neuholl.), *nepalensis* Spr. (*Gastrochilus calceolaris* Don s. *Saccolabium* c. Ldl.).
- Sarcostemma** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Fleischkrone“, Pfeffermilch D. (s. v. u. *στέμμα* Krone, Kranz — d. Blättch. d. inner. Blumenkrone fleischig!), z. B. *annulare* Roth (Ostind.), s. *Asclepias viminalis* (Cynanchum vim. L.).
- Sargassum** Ag. (Tange, XXIV. 3) Beerentang, „Sargasso“-Meertang (portug. *sargasso* See gras, Wtst.: *σαργάνη* Band — platte Thalluszweige!).
- Sarmentacæe** Rchb. Zaukenlilien, fr. *sarmentacées* (v. *sarmentum* Schössling, s. g. Zauke).
- Sarmienta** Rz. Pv. (Gesneraceen, II. 1) Kletterhelm (n. d. span. Bot. Mart. *Sarmiento* ben.), Warmh. *S. repens* R. P., s. *Utricularia fol. carnosis* Feuille. (Chili).
- Sarthannus** Wimm. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Besenstrauch“, Pfrieme, gem. Besenpfiemen Rmpl. (*σάρκον* Besen, *θάυρος* Strauch), fr. *sartion*, e. broom, *S. scoparius* Wimm., s. *Spartium* Sc. L.
- Sarracenia** (-cinia) L. (st. *Sarrasinia* Croom.) (Cistineen Droseraceen, XIII. 1) Wasserkrug, Damensattel, Trompetenblatt (n. Dr. J. A. Sarrasin, Übers. d. Dioscorides 1598, Wtst.: n. d. Arzt Sarrasin in Que-

bec im 18. Jahrh., schr. üb. d. Natg. v. Canada), Kalth. S. Drummondii Hook. m. v. alba u. v. rubra, S. purpurea L., flava L. m. v. Catesbaei, etc. — Sarraceniäe Rchb.

**Sarsaparilla (-parrilla)** (sc. Smilax) L. (Smilaceen, XXII. 6) „Sarsaparillen“—Smilax, fr. salsepareille, e. sarsa od. sarsaparilla (in Südamer. aus zarza span. Brombeerstr. u. parrilla dem. v. parra Weinstock — kl. wind. Str. m. Stacheln!), s. Smilax glauca Mchx.

**Sassafras** F. v. Nees (Laurineen, IX. 1) „Sassafras“—Lorbeer, fr. sassafras, pavame, bois de canelle, laurier des Iroquois „Irokesen-Lorbeer“, e. sassafrass (saxafr.-) u. ague-tree (vaterl. Name!), S. officinalis F. v. N., s. Persca s. Laurus Sass. L.

**Sassaparilla** W., s. Sarsap.- L.

**Saturėja** T., L. (Labiaten, XIV. 1) Pfefferkraut, Bohnenkräutchen, „Serge“ O. W., fr. sarriette, e. savoury od. dittander u. thymbra, Gärt.: S. hortensis L. u. Thymbra L. (lat. saturėja od. -jum von Σάτυρος Satyr — weg. d. aphrodisischen Wirkung!). — Saturinäe Benth.

**Satyrium** Sw., L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Satyr“—O., Bocksgelien Diatr., fr. testicle de chien, e. satyrion (gr. Σάτυριον geilmachende Pfl. F. W. Riemer, v. d. arab. satar Bock), s. Orchis etc.

**Satyrus** Bosc (Pilze, XXIV. 1) „Satyr“—P. (Σάτυρος Satyr, geiler Bacchus-Gefährte, Myth.), S. rubicundus Bosc, s. Phallus rubic. Fr.

**Sauraja (-auja, -avia)** W. (Theaceen Ternstroemiaceen, XII. 5 oder XIII. 3) „Saurauja“—Theestr. (n. d. port. Bot. Graf Fr. v. Saurauja, Willdenow's Bekanntn., g. z. Wien 1760 etc., Diatr.: n. d. Geheimrat Graf v. Saurau!), Warmh. S. macrophylla u. excelsa W. (südamer. B.!), s. Palava R. P. u. Ternstroemia Mut. — Sauraujäe A. Juss.

**Sauromätium** Schott (-tium Spach) (Araceen Dracunculaceen, XX. 9) „Sarmaten“—Aron (v. Σαυρομάται od. Σαρμάται Sarmaten in Südrussland, Wst.: σαύρος Eidechse u. μάτος d. Suchen — von den Eidechsen aufgesucht!), S. guttatum Schott., s. Arum pedatum Wall. s. Colocasia Brong. (Nepal, Java).

**Saururus** L. (Piperaceen Saurureen, VII. 3) „Eidechsen“— od. „Molchschwanz“ Rmpl., fr. lézardelle u. saurure (σαύρος od. -οη Eidechse, οἶσα schwanz — bez. d. Blütenkätzchen!), Zier. S. cernuus L. (Virg.) s. S. Serpentaria repens Pluk., S. natans L. (Aponogëton monostachyon L.) etc. — Saururäe Rich.

**Sauvagesia** Jacq., St. Hil. (Violaceen od. Droseraceen, V. 1) „Sauvagesie“ (n. d. Prof. F. B. Sauvages in Montpellier, † 1767), z. B. elegantissima St. Hil. (Lavradia el. St. Hil.), erecta Jacq. — Sauvagesiäe Bartl. (zu Violacäe Rchb.).

**Saxe-Gothaea** Lindl. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Sachsen-Gothäe“ (n. d. Prinz. Albert v. Sachsen-Gotha, Königin-Gemahl v. England), Saxgothaea conspicua Ldl.

1) **Saxifräga** L. (Corniculaten Saxifrageen, X. 2) „Steinbrech“, fr. u. e. saxifrage (v. saxus Fels u. frango zerbreche — Standort!), Zier. (Ampel) S. sarmentosa L. (Diptera s. Borkh.), s. g. Judenbart, Garten: S. umbrosa L., s. g. Porzellanblümchen Rmpl., crassifolia L. roter od. sibirisch. Garten-St., e. drop-wort, Fortunēi Hook. m. v. tricolor Hort., oppositifolia L. m. v. pyramidalis Hort., S. Cotyledon L. etc. 2) **Saxifr.** (sc. Gypsophila) L. (Caryophyllen, X. 2) steinbrechende Felsnelke Grck., s. Tunica Sax. Scop. 3) **Saxifr.** (sc. Pimpinella) L. (Umbelliferen, V. 2) gem. Bibernelldolde, fr. sanicle de montagne (- de Virginie), e. break-stone u. London-pride, auch mountain-heath. 4) **Saxifr.** (sc. Silene L. s. Lychnis Scop.)



- (Sileneen, X. 3) steinbr. Leimkraut (Alp.). — Saxifragacēae Vent., DC., -gēae R. Br., -gae Juss. „Steinbrechartige“.
- 1) **Scabiōsa** L. (Aggregaten od. Dipsaceen, IV. 1) „Grindrose“, fr. scabieuse, e. scabious (v. scabies, -ei Räude, Grind), Zier. S. atro-purpurea Desf. m. v. v. (z. B. candidissima u. nana), fr. fleur des veuves, e. sweet-scabious, s. g. Wittwenblume, s. Asterocephalus atrop. Spr., S. caucasica M. B., tatarica Gm., alpina L., etc. 2) **Scabiōsa** (sc. Centaurēa) L. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Scabiosen-Flockenblume“.
- Scammonia** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulaceen, V. 1) „Scammonium“-Winde (arab. scamunia, od. v. d. gr. *σκάμμουα* Gegrabenes?), s. Scammonia syriaca Mor.
- Scandix** G. (Umbelliferen, V. 2) Kerbel, Nadelkerbel Seub., Hechel O. W., e. cicely u. shepherd's-needle, cow-weed (v. scando klettere? gr. *σκάριδιξ*, -ιξος Kerbel), z. B. Cerefolium L. Garten-K., fr. cerfeuil, e. sweet-cicely (-fern), S. Pecten L. Kamm-K. od. Venuskamm, S. odorata L., s. Myrrhis Scop.
- Scariōla** Endl. (sc. Lactūca) L. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) Wildlattich (st. seriōla dem. *σέρις* Salat, od. st. Serriōla dem. serra Säge — sägeartige Rippenstacheln d. Blatt!).
- Schedonorus** P.-B. fehlerh. st. Schoenodorus P.-B. (nicht etwa von *σχεδον* in der Nähe u. *σοος* Berg!).
- Scheeria** Seem. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Scheerie“ (n. Fr. Scheer Esq. ben.), Treibh. S. mexicana Seem., s. Achimenes Scheerii Hort.
- 1) **Schelhammēra** R. Br. (Liliac. od. Melanthac., VI. 1) „Schelhammer's“-Giftlilie (n. d. Prof. C. C. Schelhammer in Jena), z. B. undulata R. Br. u. multiflora ds. (Str. Neuholl.). 2) **Schelhammeria** Mch. (Cyperaceen, XXI. 3) „Schelhammer's“ Cypergras, S. cyperoides Mch. 3) **Sch.** Heist. (Cruciferen).
- Scheuchzeria** L. (Juncaceen, VI. 1) Blumensimse, Moorbinse, Spinnling O. W. (n. d. Prof. Scheuchzer in Zürich, † 1738, s. d. Aut.), S. lacustris L.
- Schinus** L. (Terebinthaceen Anacardieen, XXII. 9) Mastix-Nierenbaum (gr. *σχινος* Mastixbaum, v. *σχιζω* schneide ein — näml. dass d. Harz fließt, lat. lentiscus), z. B. S. Molle L. peruvian. Pfefferbaum (Piperodendron Heist), S. tragodes L. (Fagara tr. L., Xanthoxylon tr. DC.).
- Schisandra** Sm. (Schiz-) Mchx. (Menispermeen Schisandreen, XXI. 5) „Spaltantheren“-Mondsamen, „Spaltbeutel“ D. (v. *σχιζω* spalte, *ἀνήρ*, -δός Mann, Bot. Staubbeutel — diese öffnen sich durch vertikale Ritzen), z. B. coccinea Mchx. (Schlingstr. Nordam.), chinensis (Kadsura) Turcz. u. japonica L. (Kads. u. Uvaria j.).
- Schisanthes** Haw., s. Schizanthus Endl.
- Schistocarpi** C. Müll. (sc. Musci) spaltfrüchtige Laubmoose (*σχιστός* v. *σχιζω* gespalten, *καρπός* Fr.).
- Schistostēga** Web., Mohr (Moose, XXIV. 2) „Spaltdeckel“-Moos (s. eb. u. *στέγη* Deckel — dies. zerreisst strahlig), z. B. osmundacea Web., M., s. Gymnostomum pennatum Hedw.
- Schizaea** Sm. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) „Spalt“-Rispenfarn (v. *σχιζω* spalte — fächerf. gespalt. Wedel!).
- Schizandra** s. Schisandra!
- Schizanthus** Endl. (Schis.-Haw.) (Amaryllideen, VI. 1) „Spaltblumen“-Narzisse (s. v. u. *ἀνθή* Bl. — Kranz d. Blütenschlunds gelappt!), s. Narcissus L.
- Schizanthus** Rz. Pv. (Scrophularineen, II. 1) „Schlitzblume“ (s. v., *ἀνθος* — d. Krone zweilipp., d. Lippen gespalten!), Zier. S. pin-natus R. P. m. v. v., retusus Hook. m. v. v., papilionaceus Hort. m. v. albus, L. Grahami Hook.

- Schizolobium** Vogel (Cassieen, X. 1) „Spalthülse“ (s. v., *λόβιον* Hülse — d. lederart. Epicarp trennt sich v. d. häut. Endocarp!), *S. excelsum* Vog. (B. Bras.).
- Schizonotus** Lindl. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Spaltrücken“, -blatt od. -blume (s. v. u. *νότος*: Rücken, Wtst. *ὄζ, ὄτος* Ohr — d. Blätt. fiederspalt. u. m. Blattohren!), Zier. *S. tomentosus* Ldl., s. *Spiraea Lindleyana* Wall.
- Schizopetalon** Sims (-um Hook.) (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Schlitzkronblatt“ (s. v. u. *πέταλον* Kronblatt — dies. geschlitzt, fiederspaltig!), Zier. *S. Walkeri* Sims (Chili).
- 1) **Schizophyllum** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Spaltlamellen“-P. (s. v. *γίλλοι* Blatt — d. Lamellen d. Länge nach gespalten!), z. B. *commune*, s. *Daedalea* Pers. 2) **Schizoph.** Nutt. (Compositen) — d. Blätt. dopp. fiederspaltig!).
- Schizostylis** Harv. (Irideen, III. 1) „Spaltgriffel“ (s. v. u. *στυλίς* Griffel — dies. dreispaltig!), Stuben (Winterbl.) *S. coccinea* Harv. (Südafr.).
- Schlagintweitia** Griseb. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) „Schlagintweit's“-Habichtskr. (n. d. Reis. im Himalaya, Gebr. Schlagintweit), *S. intybacea* Gris., s. *Hieracium* L.).
- Schleichera** W. (Sapindac. od. Malpighieen, XXIII. 2) Macassarölbaum (n. d. Schweiz. Nat. Schleicher, schr. 1815 Verz. d. Schw. Flora, s. d. Aut.), *S. trijuga* W. (*Stadmannia* tr. Lam.), s. *Melicocca* Juss. (B. Ceylon).
- Schlimmia** Planch. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schlimmie“ (Eigennam.), z. B. *trifida* Rchb., s. *Wallisia* Schwägr.
- 1) **Schmidtia** Tratt. (Gräser, II. 1) Scheidenklapp-Gras (n. Fr. Wilib. Schmidt, Prof. in Prag, † 1796), *S. subtilis* Tratt., s. *Coleanthus* s. *Seid.* „Scheidenblüte“. 2) **Schm.** Mch. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1), s. *Aethionia* D. Don (n. d. Bot. J. A. Schmidt, s. d. Aut.).
- Schobëra** (-ia) C. A. Mey. (Amarantac. od. Chenopodiac., V. 2) „Schobere“ od. Soda-Gänsefuß (n. d. Reis. Gottl. Schober, an d. Wolga etc. 1717—18), *S. maritima* C. A. Mey., s. *Suaeda* m. *Dumort.* u. *Chenopodina* m. Moq., Tand.
- Schoenia** Steetz (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Schönie“ (n. Dr. J. M. A. Schön in Hamburg), Zier. *S. oppositifolia* Steetz, s. *Helipterum Cassinianum* DC.
- Schoenoprasum** (sc. Allium) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Schnittlauch, fr. *cive* od. *civette*, e. *chives* od. *porret* u. *shalot* (v. *σχοίρος*: Binse, *πόσσον* Lauch).
- Schoenodorus** P.-B. (nicht *Schedonorus* P.-B.) (Gräser, III. 2) Binsengras (v. *σχοίρος*: Binse u. *δῶρον* Gabe — d. Blätt. binsenart.!), z. B. *pratensis* u. *arundinaceus* Schreb., s. *Festuca* u. *Bromus*.
- Schoenus** P.-B., L. (Cyperaceen, III. 1) Kopfried, Strickgras, Schmerle O. W., fr. *choin* (*σχοίρος*: Binse u. Strick — zum Binden benutzt!).
- 1) **Schollëra** (nicht *Scoll.*-) Roth (Caprifoliac. od. Siphonandrac. Vaccinieen, VIII. 1) „Scholler's“- od. Moosbeere (n. F. G. Scholler, schr. Fl. Barbiensis, Lps. 1775), *S. Oxycoccus* Roth = *Vaccinium Oxyc.* L. s. *Oxycocc. palustris* Pers. 2) **Sch.** W. (Commelynaceen, III. 1) „Dünnblume“, s. *Leptanthus* Mchx. 3) **Sch.** Rohr (Chenopodiac. od. Amarantaceen, XXI. 4) Kleinfrucht-Amarant, s. *Microtea debilis* Sw. 4) **Sch.** Sw. (Phytolaccaceen, X. 5).
- 1) **Schomburgkia** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Schomburgk's“-O. (n. d. Reis. Dr. Rob. H. Schomburgk, in Brit. Guiana Entd. d. Victoria Regia, s. d. Aut.). 2) **Schomburgkia** DC. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Schomburgk's“-Schönaster, *S. caleoides* DC.
- Schortia** s. *Shortia*!

- Schotia** Jacq. s. **Scotia** Thb. (**Scottia** R. Br.) (Cassieen, X. 1) (n. Rich. Van der Schot, Reis. mit Jacquin).
- Schottia** Jacq. (Asclepiadeen, V. 2) „Schott's“ *Asclepias* (n. H. Schott).
- Schousboea** W. (Myrobaleen, XI. 1) „Schousboe's“-Schlingstr. (n. d. dän. Reis. in Marokko 1791/93 Assessor Schousboe, s. d. Aut.), Zier. S. coccinēa W. (Guian.), s. *Cacoucia* Aubl., DC.
- 1) **Schubertia** Mart., Zucc. (Asclepiadeen, V. 2) „Schubert's“ Wachspfl. (n. d. Prof. Schubert in Erlangen, s. d. Aut.), z. B. *multiflora* Mart.
- 2) **Schub.** Mirb. (Cupressineen, XXI. 9) Wasser-Cypresse (zu *Cupressus* Rchb.), z. B. *S. disticha* Mirb., s. *Taxodium* Rich. s. *Cupr. dist. L.* (Zierb.).
- 1) **Schweiggera** St. Hil. (-ria Spr.) (Myrobaleen od. Violaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Schweigger's“-Veilchen (n. d. Prof. Schweigger, s. d. Aut.), z. B. *Warmh. S. microphylla* u. *pauciflora* Spr., s. *Glossarrhen* Mart. 2) **Schweiggeria** Mart. (Guttiferen Clusiaceen, XXIII. 1), s. *Renggeria* Meisn.
- Schweykerta** Gm., W. (Gentianeen, V. 2) „Schweykert's“ Teichblume, Seekanne etc. (n. J. M. Schweykert, s. d. Aut.), *S. Nymphoides* Gm., s. *Villarsia Nymph.* Vent. (*Limnanthemum* etc.).
- Sciadocälyx** Reg. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Schirmkelch“ (*σκιάς, -άδος*; Schirm, *σάλευξ* Kelch), Zier. Warscewicz Reg.
- Sciadophyllum** P. Br. (fehlerh. **Sciodaph.-!**) (Araliac., V. 5) „Schirm“- od. Schattenblatt Seub. (zu *Actinophyllum* R. u. S.), z. B. *Brownii* Spr., s. *Aralia Sciadoph.* Hort. (v. *σκιάς, -αδος* u. *φύλλον* — d. Blätter fingerf. ausgebr. wie ein Schirm).
- Sciadopitys** Sieb. u. Zucc. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) „Schirmtanne“ (s. v. u. *πίτυς* Fichte etc. — d. Zweige stehen im Quirl!), Zier. *verticillata* S. u. Z., s. *Taxus vert.* Thb.
- Seilla** L. (Liliaceen, VI. 1) Meerzwiebel, Haspel od. Zille O. W., fr. *scille* od. *squille*, e. *squill*, sea-onion (-leek) (gr. *σκίλλα* Meerzwiebel v. *σπίλλω* i. q. *σπίζω* spalte — d. Zwiebel in dünne Blätter!), wild u. Zier. *S. bifolia* L., s. g. Sternhyazinthe Seub. od. Blaustern Rmplt., *S. amoena* L. (*Hyacinthus stellaris* Jacq.), *campanulata* Ait., *italica* L., *nutans* Sm., *sibirica* Andrez., *peruviana* L. (*Hyac. peruv.* Hort. s. *Sc. Clusiana* Hort.) m. v. v., *nivalis* Hort. etc., s. *Agraphis* Lk.
- Scimmia** (**Skimmia**) Thb. (Xanthoxyleen, IV. 1) „Skimmie“ (vaterl. Name *Mijama Skimmi*, Japan), *Gewächsh. S. japonica* Thb.
- 1) **Sciophila** Heller (Smilaceneen, VI. 1) „Schattenlieb“, -blume (*σκιά* Schatten, *φιλος* Liebhaber), *S. convallarioides* Wib., s. *Majanthemum bifolium* (Smilacina b. Desf.). 2) **Sciophila** Gaud. (Urticaceen, XXI. 4) (— schattig. Stand!).
- Scirpus** T., P.-B. (Cyperaceen, III. 1) *Simse*, fr. *scirpe*, e. *rush*, bentgrass, *reak* (reate) (lat. *scirpus* *Simse* u. *Binse*, v. d. celt. *sirs* *Binse*, davon *scirpo* ich binde).
- Scitaminēae** Bartl., DC., Endl., Rchb. *Bananengew.*, *Gewürzschilfe* (-lilien) (v. *scitāmen*, -inis *Peitsche* — weg. d. *Wurzelausschläge*!).
- Sclarēa** T. (sc. *Salvia*) L. (Labiaten, II. 1) *Muskateller-Salbei*, „*Scharleien*“ G. Fr., fr. *sclarée* od. *orvale*, *toute-bonne*, e. *clary-sage* u. *orvial* (*Sclarēa* — d. latinisierte „*Scharlei*“, ital. *schiarea* — v. *clarus*?).
- Scleranthus** L. (Portulacac. *Sclerantheen*, X. 2) *Knaul* (eig. *Gnaphalium*, fr. *gnavelle* *Mej.*), „*Knorpelblume*“ (v. *σκληρός* hart, *ἄρθος* — feste, vertrockn. Blüte!), z. B. *polycarpus* L. (*Vermicula nova planta* *Col.*). — *Scleranthacēae* Lk., Grck., -thēae Rchb. (zu *Portulacacēae* ds.).
- Sclerochlōa** P.-B. (Gräser, III. 2) „*Hartgras*“ (s. eb. u. *χλόα* od. -η *Gras* — *Gräser* v. *dürr.* *Ansehn* m. *Borstenblättern*!), z. B. *dura* u. *rigida* P.-B., s. *Cynosurus dur.* L. u. *Megastachya rig.* R. u. S.

- Scleroderma** Pers. (Lycoperdaceen, XXIV. 4) „Hart“- od. Kartoffel-Bovist (s. v., *δέρουα* Fell etc. — *Peridium* fest, rindenartig!), z. B. vulgare Fr. falsche Trüffel. — *Sclerodermi* DC.
- Sclerotium** Tode (Urpilze, XXIV. 4) „Hart“- od. Knorpelpilz (*σκληρότιον* i. q. *σκληρότης* Verhärtung — nämll. d. Schlauchlager!), z. B. *clavus* Fr. s. g. Mutterkorn (Hungerkorn).
- Scollëra** Roth s. Schollëra!
- Scolochlōa** Lk., Koch (Gramineen, III. 2) „Stachelgras“ (*σκόλος* Dorn etc. — weg. d. Kelchspelzen!), z. B. *arundinacëa* M. u. K. zahmes Rohr = *Arundo* Donax L. (*Donax arundinac.* P.-B.).
- Scolopendrium** Sm. (Farne, XXIV. 1) Hirschwanz, Zungenfarn O. W., fr. scolopendre, e. mule-fern, stone-wort od. scolopendra (v. *σκολοπένδρα* Skolopender od. Tausendfuss — weg. d. Fruchthaufen, Wst.), Zier. Sc. officinarum Sm. m. v. v., s. *Asplenium* Scolop. L.
- Scelosanthus** Vahl (Cinchonac. Coffeaceen, IV. 1) „Stachelblume“, s. g. Tutenbl. D. (s. v., *ἀνθος* — Kronlappen zurückgekrümmt! Wst.), z. B. *versicolor* Vahl (*Catesbaea parviflora* Lam., Str. Ins. St. Cruz).
- 1) **Scolymus** (sc. *Cynära*) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) gem. Artichoke, fr. artichaut, e. artichok u. shard (v. *σκόλος* Dorn — Pfl. sehr stachlig!). 2) **Scol.** (sc. *Protëa*) L. (Protaceen, IV. 1) Artischoken-Weissbaum, s. *Leucadendron scolymocephalum* L. f. 3) **Scolymus** L. (Compos. Carduac., XIX. 1) Golddistel M.-Rehb., z. B. *maculatus* L.
- 1) **Scopolia** Jacq. (-la ds.) (Solaneen, V. 1) „Scopolie“ (n. d. Nat. Scopolii z. Pavia, s. d. Aut.), z. B. *carniolica* Jacq. = *Hyoseyamus* Scopolia L. (*Scopolina* R. u. S.). 2) **Scopolia** L. (Thymeläaceen, XX. 6), *S. composita* L., s. *Daphne pendula* Sm. 3) **Scopolia** Sm. (Xanthoxyleen, V. 1 od. XXI. 5) Scopoli-Gelbholz, s. *Toddalia* Juss. u. *Paullinia* Schum. 4) **Scopolia** Forst. (Euphorbiaceen od. Trikokken, XXIII. 2), s. *Griselinia* Forst., z. B. *lucida* Forst. (Str. Neuseel.). 5) **Scop.** Ad. (Cruciferen).
- Scopolina** R. u. S. (Solaneen, V. 1) Krainer Toll- od. Frühlings-Wolfskirsche (vgl. 1. *Scopolia* Jacq., n. Scopoli ben.), *S. atropoides* Schult., s. *Scopolia carniolica* Jacq. (*Atröpa* c. Scop.).
- 1) **Scordium** Sloan. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Knoblauchstrauch“ (*σχοροδιον* dem. *σχοροδον* Knoblauch), *S. maritimum fruticosum* Sloan., s. *Stemodia maritima* Jacq. (*Stemodiaca* m. P. Br.). 2) **Scordium** T., Cav. (sc. *Teucrium*) L. (Labiaten, XIV. 1) knoblauchduftender Stachel-Gamander, fr. *chamarras* (*Scordium spinosum* Cav.), s. *Teucrium spinosum* L.
- 1) **Scorodonia** T. (sc. *Teucrium*) L. (Labiaten, XIV. 1) salbeiblättr. od. Knoblauch-Gamander (s. eb.). 2) **Scorodonia** (sc. *Scrophularia*) L. (*Scrophularineen*, XIV. 2) „Knoblauchs“-Braunwurz.
- Scorodopräsum** Mich. (sc. *Allium*) L. (Liliaceen, VI. 1) Schlangen- od. wilder „Knoblauch“, e. *scordion* (-dium) (s. eb. u. *πράσον* Lauch).
- Scorodosma** Bunge (Umbelliferen, V. 2) „Knoblauchsduft“, s. g. Teufelsdreck (s. v. u. *δσμή* Duft), s. *Ferula Asa foetida* L.
- Scorpiurus** L. (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) „Skorpionschwanz“, -klee, s. g. Raupenklee, fr. *chenille*, e. scorpion's-tail (Scorpius Skorpion, *ὄφια* Schwanz — gekrümmte u. geglied. Hülse!), Zier. *S. vermiculatus* L., fr. ch. *vermisseau*, e. *vermicular caterpillar*, *muricatus* L., fr. ch. *hërissée*, *chenillette*, e. prickly cater-pillar, *subvillosus* L., fr. ch. *velue*, etc.
- Scorzonëra** T., Vaill., L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Schwarzwurz, „Schlangenzwurz“, fr. *scorsonëre*, auch „Vipergras“, e. *vipre's-grass* (v. *scurzon*, d. catalon. Wort für Viper, Paxton, od. ital. *scorza* Rinde u. *nëra* schwarze).

- Scotia** Thb., Jacq., Ait. (Scottēa DC., Scottia R. Br.) (Cassieen, X. 1) „Scott's“-Cassie od. Guajacstrauch (n. R. D. Scott, Prof. in Dublin, schwedl. d. mittelalterlichen Gelehrten Duns Scotus, † 1308), *S. speciosa* Thb., s. *Guajacum afric.* Plum., *S. dentata* R. Br. (Str. Neu-holl.), *laevis* Ldl. (Str. Afr.) etc.
- Scribaea** Fl. Wett. (Sileneen, X. 3) „Scriba's“-Beeren-Traubenkropf (n. d. Bot. u. Pfarr. Scriba in Arheiligen b. Darmst.), *S. divaricata* Fl. W., s. *Cucubalus baccifer* L. (*Silene baccifera* W.).
- Scrophularia** T., L. (Scrophularineen, XIV. 2) Braun- od. Drosswurz O. W., Kropfwurz- od. „Skrophelkraut“, fr. *scrophulaire*, e. *scrophulary*, fig-wort, brown-, kernel- (scrophulae Drüsen od. Skropheln v. *scrofa* (-pha) Schwein — Gebr. geg. d. Drüsen d. Schweine), z. B. *Zier. S. aquatica* L., fr. *scr. aquatique* od. *herbe du siège*, m. v. fol. variegat. Hort. buntes St. Antonskr. od. Wasserkropfwurz. — Scrophulariaceae R. Br., -rinēae ds., Juss., -rināe (sc. Personatae) Rehb.
- 1) **Scutellaria** L. (Labiatae, XIV. 1) „Schälchen“- od. Helmkraut, Schildhelm od. Schildträger Grck., fr. *scutellaire*, *tertianaire*, *lysimachie bleue*, e. *skull-cap* (scutella Schlüsselchen — nāml. auf d. Kelch!), *Zier. macrantha* Fisch., fr. *Toque à grandes fleurs*, *alpina* L. etc. 2) **Scutellaria** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) Schüsselflechte (— Fruchtlager schüsself.).
- Scyanthus** Sweet, Don, Presl (Loasaceen, XVIII. 2) „Tassenblume“, (v. *σζύφρη* od. *σζάφρη* Wanne od. Tasse, *ἄρθος* — d. 5 od. 10 Kronblätter kappenf.! Wtst.), *Zier. elegans* Don, s. *Grammatocarpus volubilis* Presl.
- Scytanthus** Hook. (Asclepiadeen, V. 2) „Lederblume“ (*σζύτος* Leder etc., *ἄρθος*), *Zier. S. Gordoni* Hook., s. *Stapelia* s. *Hoodia Gordoni* Sweet.
- Seaforthia** R. Br. (Palmen, XXIII. 1) „Seaforth's“-P. (n. Franc. Lord Seaforth, Gönn. d. Bot.), Stuben: *S. elegans* R. Br., *Dicksoni* u. *robusta* R. Br., s. *Arēca* L.
- Sebestena** G., Dill. (sc. *Cordia*) L. (Convolvulac. od. Asperifolien, V. 1) „Sebestenpflaume, Brustbeerlein (d. pers. Name d. Frucht sebestan), s. *Cordia Myxa* L. s. *Sebestena officinalis* Blackw., *Cord. Seb.* L. s. *Seb. scabra* Dill. u. *S. domestica* (Cord. *Myxa* Blackw.).
- 1) **Sebifera** Lour. (Amyrideen od. Laurineen, VIII. 1) „Seben“- oder „Sebestenträgerin“ (s. eb.), *S. glutinosa* Lour., s. *Litsea* s. *Dinocarpus Litchi* (*Sapindus edulis* Lour.), s. g. Zwillingspflaume. 2) **Sebifera** Lour. (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Talgbaum“ (v. *sebum* Talg, *fēro* (trage), s. *Ricinus chinensis sebifera* Pet. s. *Croton sebiferum* L.
- Sebipira** Mart. (Palmen) (südamer. Name! Wtst. od. s. eb. u. *pira* od. *pera* ital. Birne?).
- Sebophora** Neck. (Myristiceen, XXII. 13) (zu *Myristica* L.) Fett-Muscattussbaum (*sebum* Talg u. *φορός* tragend).
- 1) **Secale** L. (Gräser, III. 2) Korn, Roggen, fr. *seigle*, e. *rye* (v. *seco* schneide? v. d. celt. *segal* v. *sega* Sichel, Wtst.), *S. cereale* L. Saatroggen. 2) **Secale cornutum** L. (Pilze, XXIV. 4), s. g. Mutterkorn, Entwick. v. *Cordiceps* Fr.
- Secchium** P. Br. (Cucurbitaceen, XXI. 8) „Mast“- od. Stachelgurke D. (v. *σικζός* Stall — dient z. Mästen! Wtst.: d. veränd. *Sicyos*, wozu früher gehörig!), z. B. *edule* R. Br. essb. *Chayotte* (Cuba), s. *Sicyos edulis* Sw.
- 1) **Securidāca** L. (Polygalaceen, XVII. 3) „Beil“-Kreuzblume (*securis* Beil, *δάξω* od. *δίξω* beisse, greife an — das Beil weg, d. Härte? d. Kaps. m. lang. messerf. Flügel!), z. B. *erecta* L. (Str. Domingo), *volubilis* L. s. *scandens* Jacq. (Str. Südamer.). 2) **Securid.** Mill., T. (sc. *Coronilla*) L. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) Beilkronwicke,

- S. lutea* Mill. = *Coronilla Secur. L.*, fr. faucille d'Espagne, e. hatchet-  
vetch (— Beilform d. Hülse!), s. *Securigera* DC. u. *Securilla* Pers.
- Securinġa** Juss. (-nġa Comm.) (Euphorbiaceen, XXII. 5) „Beiltrotz“,  
Axtspott D. (v. *secūris* Beil, *nġo* verneine, widerstehe — mehr wie  
beilhart. Holz!), *S. nitida* W. (B. Isle de France).
- Sedġae** (sc. *Corniculatae*) Rchb. s. *Sedum*!
- Sġdum** L. (Corniculaten *Sedeen*, X. 5) Mauerpfeffer, Fetthenne, Fett-  
kraut Seub., „Sede“ O. W., fr. orpin, e. stone-crop „Steinkröpf“  
(ob v. *sedeo* sitze? od. v. *sġdo* stille? — unsicher!), z. B. *S. acre*  
L., fr. *vermiculaire* od. *pain d'oiseau*, e. pepper-crop, *S. album* L.  
s. *teretifolium* Lam., fr. *trique-madame* „Tripmadam“, Zier: *pur-*  
*purġum* Lk. s. *Telephium*  $\beta$  *purp. L.*, *coerulġum* Vahl, Sieboldii  
Sweet m. v. *variegata* Hort. (Ampeln), *maximum* Rchb. m. v. fol.  
*variġ.*, *splendens* Hort., *kamschatġum* Fisch., Mey., Topf *S. fa-*  
*barium* Lem. (*Fabaria* Koch), *Sempervġum* Ledeb. (Kaukas.), Amp-  
eln: *sarmentosum* Bge., *Anacampseros L.*, *spurium* M. B. etc.
- Segregatae** L. (*Polygamia segregata*, XIX. 5) Compositen mit „geson-  
derten“ Blütchen (*segrġgo* sondere ab).
- Selaginġae** Juss. i. q. *Acanthacġae* „Licht-Acanthaceen“ (*Selago*, -ġnis  
Leuchtkraut etc.).
- Selaginella** P.-B., Spring. (Lycopodiaceen od. Bärlappe, XXIV. 1) (zu  
*Lycopodium* L.) Zwerg-Bärlapp, Mooskraut O. W., e. rock (dem. v.  
*Selago*, -ġnis Leucht- od. Blitzpulverkraut, v. *σελαγġω* leuchte), z. B.  
*denticulata* Spring. Wimperzahn-B. — *Selaginellġae* Metten.
- 1) **Selġo** L., Pers. (Acanthaceen, XIV. 2) „Licht“-*Acanthus* (Wst.:  
celt. sel Gesicht, jach heilsam — geg. Augenkrankh. od. seligo wähle  
aus — auserw. Pfl. (?)), z. B. *S. ovata* (Lippia ov. Burm.), *articulata*  
u. *bracteata* Thb., s. *Stilbe*, *Erinus* etc. 2) **Selago** (sc. *Lycopodium*)  
L. (Lycopodiaceen, XXIV. 1) Tannen-Bärlapp, Tangelmoos, Semust  
Grek., fr. selage (-gine) (v. *σελαγġω* leuchte — weg. d. Blitzpulvers  
od. Hexenmehls, d. i. Bärlappsamens!).
- Selenipedġum** Rchb. f. (Orchid. *Cypripedġen*, XX. 1) „Mondfrauen-  
schuh“ (v. *σελήνη* Mond u. Mondgöttin Selene, u. *πέδιον* Fuss-  
schuh — analog *Cypripedium*!), z. B. *caudatum* Rchb. f. (Peru).
- Selinum** L., Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Silje“, Waldsilje, fr. *assilis*  
od. *sġlin* (gr. *σġλινον* Silje od. Eppich — besond. in compos.), z. B.  
*S. Carvifolia* L. „Kümmelblatt“-S.
- Semecarpus** L. f. (Terebinthaceen *Anacardġen*, XXIII. 2) „Zeichen-  
frucht“, ostind. Herzfrucht od. Dintenbaum, Acajou (*σġμα* Zeichen,  
*ζαγωτῶς* — d. schwarze Saft zum Zeichnen d. Zeuge!), *S. Anacard-*  
*ium* L. f. (*Anac. orientale* Bauh.).
- Sempervġum** L. (Corniculat. *Sedeen*, XI. 5) Haus- od. Dachwurz,  
Hauslauch Vilm. (-laub), fr. orpin, grassette, barbe de Jupiter (Jou-  
barbe), herbe magique od. maure, e. jubarb, house-leek etc. (*semper*  
immer, *vġvum* lebendig), z. B. *tectorum* L. Donnerbart etc., m. v.  
*rustica* Schnittsp. s. *Requieni* Hort., *arachnoidġum* L., *arborġum*  
L., etc.
- Senebiġra** Pers., Poir. (Crucifer. *Siliculos.*, XV. 1) Feldkresse, Krähen-  
fuss (n. d. Pastor Joh. Senebier zu Genf, † 1809, s. d. Aut.).
- Senecio** T., L. (Compos. *Senecionid.*, XIX. 2) Kreuzkraut, eig. „Greis-  
kraut“ Mej., „Senwurz“ O. W., Baldgreis Grk., fr. *seneġon*, e.  
cross-word, groundsel (-sil) (v. *senex*, -ġnis Greis — nach d. Blüten  
schnell m. weiss. Pappus bedeckt!), Zier. *S. mikanoides* Otto (*Mi-*  
*kania scandens* Lem., *Delairea micanoides* Lem.), s. g. Sommer- od.  
Schnellepheu d. Stuben, Spaliere: *macroglossus*, Gärt.: *pulcher*  
Hook. u. Arn., *aurantiġcus* DC., *flammġus* Turcz., *elegans* L. m. v. v.

- fr. sen. d'Afrique, e. purple Jacobaea, etc. — Senecionçae Cass., -cionoidçae Less.
- Senëga** DC. (sc. Polygala) L. (Polygalaceen, XVII. 3) „Senegawurz“ (vaterl., Wst. n. d. engl. snake Schlange — d. Wurz. geg. Schlangengbiss!), *S. contrayerva* DC. „giftwiderstehende“.
- Senna** T., G. (sc. Cassia) L. (Cassieen, X. 1) „Sennes“-Bitterblatt, fr. sënë, e. senna od. sene (vaterl. arab. senna!).
- Sequoia** Endl. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Mammouthskiefer, fr. séquoja (californ. Name d. B.), *S. sempervirens* Endl., e. (in Amerika) Red-wood (*Taxodium* s. Lamb.), gigantçea Endl. = *Wellingtonia* gig. Lindl.
- Serapias** L., Sw. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Schwert-O. (gr. *Σεραπιὰς* eine Orchis, nach *Σέραιτις* pers. Kleid weiss m. Purpurstreif, Wst.: n. Serapis, egypt. Gott — als *Aphrodisiacum* dienend), z. B. *S. Lingua* Sw., *Xiphophyllum* L. f. s. *ensifolia* L. etc., s. *Neottia*, *Disa* etc.
- Seriana** (-jana) Schum. (-jania) Plum. (Sapindaceen, VIII. 3) „Ketten“-Liane (Paxton: n. d. franz. Mönch Paul Sergeant, od. v. series Reihe, Kette — als s. g. Liane od. Schlingguirlande), *S. sinuata* Schum., s. *Paullinia Seriana* L., *angustifolia* W. (Paull. mexic. Jacq.) etc.
- Sericobonia** autt. (Acanthaceen, XIV. 2) „Seidenpinsel“-Libonie aus *Sericogräphis* u. *Libonia floribunda* zusammengezog.! — künstlicher Bastard v. beiden), *S. ignea* autt. (*Serico-Libonia ign.*).
- Sericogräphis** Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Seidenpinsel“ (*σερικὸς* v. Seide, *γραφίς*, -ίδοξ Pinsel — d. Griffel!), s. *Aphelandra Ghiesbreghtii* u. *Gendarussa* Nees.
- Seriola** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Klein“- od. Nesselsalat, fr. sérieole Kugelträger Wolff (dem. *σέρις* Lattichsalat — ähnl. Blätt.!), z. B. *laevigata* L., *aetnensis* L., Jacq. etc.
- Seriphium** L. (Compos. Inulsen, XIX. 6) Meer-Wermut (*σερίφιον* eine Art Wermut v. d. Insel Seriphos), z. B. *cinereum* L. f. (*Stoebe* c. Berg., *Brynia cineroides* cap. Petiv.), *plumosum* etc.
- Serissa** Commel. (Rubiaceen, Cinchonaceen, V. 1) „Serissa“-China (Wst.: n. d. Bot. Serissa, schr. Vollst. Char. d. Garten-Nelke, 1804), *S. foetida* W. s. japon. Thb., s. *Lycium* jap. Thb. s. indic. Retz.
- Serpentaria** Rich. (sc. Aristolochia) L. (Aristolochieen od. Serpentarien, XX. 5) „Schlangenzwurz“, fr. liane à serpent, vipérine de Virginie, e. serpenty etc. (*serpens*, -tis Schlange — d. Wurz. gegen deren Biss!). — *Serpentariae* Endl. Kl. d. Schlangenzwurz-Gew.
- Serpicula** L. (Onagrariaceen Halorageen, XXI. 5) „Kriechkraut“, Schleichling D. (v. serpo krieche), *S. repens* L. s. *serpyllifolia* Burm. (*Lau-rembergia* rep. Berg.), *verticillata* L. f. (*Hydrilla* v. Rich.).
- Serpyllum** T. (sc. Thymus) L. (Labiaten, XIV. 1) Feldthymian, Quendel, Hühnerpoley Vilm., fr. thym sauvage, e. wild-thyme, stone-basil etc. (gr. *ἔρπυλλον* v. *ἔρπω* krieche, dem. v. *serpens*?).
- Serratula** L., DC. (Compos. Carduac., XIX. 1) „Scharte“, fr. sarrette, e. shard od. saw-wort (dem. v. *serratus* gesagt — bez. d. Blätter!), z. B. *tinctoria* L., fr. s. teinturienne, e. dyer's-shard, Zier. *S. coronata* L., etc.
- Sersalisia** R. Br. (Sapotaceen, V. 1) Seiden-Eisenholz (n. d. neapol. Geistl. J. B. *Sersalis*, gepriesen v. *Fabius Columna*), *S. sericea* R. Br. = *Sideroxylon sericeum* L. f.
- 1) **Sesänum** L. (Bignoniaceen od. Sesameen, XIV. 2) weisser „Sesam“, Kuntschut Leun., fr. sésame, e. oily-grain (arab. semsem), z. B. *S. orientale* L., *indicum* L., *javanicum* Burm., s. *Achimenes sesamoides*

- W. 2) **Sesamum** G. Fr. s. *Camelina sativa* Crantz (Cruciferen Sili- culos., XV. 1). — *Sesamöae* DC.
- Sesëli** L. (Umbelliferen, V. 2) „Sesel“, Steinkümmel od. Rossfenchel, fr. sëseli, e. sesely u. heart's-wort (*σέσέλι, -εω;* Diosc. vier versch. Dolden, Wtst.). — *Seselinöae* Koch.
- Sesleria** Hard. (Gräser, III. 2) Balgähre, Gilzgras O. W. (n. d. venet. Arzt Leonh. Sesler, schr. Natg. d. adriat. Meeres), *S. coerulea* Ard., s. *Cynosurus* c. L.
- Setaria** P.-B. (zu *Panicum* L.) (Gräser, III. 2) Borstengras, -Fennich Seub. (seta Borste — Ahre m. Borsten).
- Sheppardia** (*Shepherdia*) Nutt. (Elaeagnen, XXII. 4) „Sheppard's“ Silber-Sanddorn (n. John Sheppard, Curat. d. Bot. Gartens zu Liver- pool, † 1836, schr. on trees etc. Lond.), Zier. *S. argentöa* Nutt. (Hip- pophäe arg. L.), scandens Nutt. (Hipp. canad. L.).
- Sherardia** Dill., L. (Rubiaceen, IV. 1) Acker- od. Blausternchen, Nolde O. W. (n. d. engl. Reis. W. Sherard, † 1728 in Oxford).
- 1) **Shortia** (*Schortia*) Hort. (Compos. Helianthen, XIX. 3) „Shorts- blume“ (n. Thom. Short, schr. Medicina brit. Lond. 1747), Zier. *S. californica* Hort., s. *Hymenoxis cal.* DC. (*Ptilomöris aristata* Hort.).
- 2) **Shortia** A. Gray (Ericaceen) (n. Prof. Ch. Wilk. Short in Lexing- ton, Nordam., † 1862).
- Sibbaldia** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Kriechrose (n. Rob. Sibbald, Prof. in Edinb., schr. üb. schott. Pfl. in Scotia illustr. 1634), *S. pro- cumbens* L., s. *Chamaerhödos* Don u. *Pentaphylloides frutic.* Pluk.
- Sibthorpia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Sibthorpie“ (n. d. Prof. John Sibthorp in Oxford, † 1796, s. d. Aut.), Ampeln: *S. europaea* L. (*Disandra prostrata* L.), *evolvulacea* L. (*Dichondra repens* Forst.).
- Sicydium** Schldl. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Texas-Haargurke (*Sicyos* u. *είδομαι* gleiche), *S. Lindheimeri* Torr. u. Gr.
- Sicyos** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Haargurke, Stichling (gr. *σίκυος* Gurke), Zier. *angulata* L., s. *Bryonoides* Dill., *S. edulis* Sw. (*Sec- chium* ed. Sw.) essb. Chayote.
- Sida** L. (Malvaceen, XVI. 8) Sammetmalve, -pappel (*σίδη* Theophr. eigentl. weisse Teichrose u. Granatapfel, Linné irrt bei Aufstell. dies. Namens, wie öfter, Wtst.), z. B. *S. Abutilon* L. (*Abut. pubescens* Mnch.).
- Sideritis** L. (Labiaten, XIV. 1) Gliedkraut, „Eisenkraut“, fr. crapau- dine, marrube-faux, e. clown's- od. iron-wort (gr. *σιδηρίτις* v. *σί- δηρος* Eisen — Heilm. geg. Wunden v. Eisen geschlagen!).
- 1) **Sideroxylon** L. (-lum L. f.) (Sapotac. Mimosopeen, V. 1) „Eisen- holz“, fr. arbre de Mars, e. iron-wood s. eb. u. *ξύλον* Holz), z. B. *cymosum* L. (Str. Cap), *decandrum* L. (*spinos.* L. f.) (B. Nordam.).
- 2) **Sider.** (sc. *Acacia*) L. (Mimoseen, XXIII. 1) Kieselholz der An- tillen. 3) **Sider.** s. *Scleroxylon* W. (Myrsineen, V. 1) Hartholz, s. *Melanophloeos* (sc. *Myrsine*) R. Br.
- Sieglingia** Bernh. (zu *Festüca* L.) (Gräser, III. 2) „Siegling's“ Gras (n. d. Prof. Siegling in Erfurt von Bernhardi 1800 ben.), *S. decumbens* Bernh., s. *Triodia* P.-B. dec. (*Danthonia* d. DC.).
- Sieversia** W. (zu *Göum* Rchb.) (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Bergnelken- wurz (n. d. russ. Samml. J. Sievers), s. *Geum montanum* L. (*Dryas anemonoides* Pall., *Anemöne pusilla* G.).
- 1) **Sigillaria** Brongn. (foss. Lycopodiaceen, XXIV. 1) „Siegelbaum“ (v. sigillum Siegel — weg. d. Eindrücke!). 2) **Sig.** Raf. (Smilacineen, XXII. 6) „Siegelwurz“ (= Wurzelstock m. Siegelnarben!).
- Siläus** Bess. (Umbelliferen, V. 2) „Silau“ (v. *σελάω* glänze — bez. d. Blätter!), *S. pratensis* Bess.



- Silēne** L. (Caryophylleen Sileneen, X. 3) Leimkraut, Klebnelke Leun., Spettel O. W., fr. silēne u. cornillet, e. catch-fly (v.  $\Sigma\acute{\iota}\lambda\acute{\eta}\rho\omicron\varsigma$  Gott Silen, der immer mit Geifer od.  $\acute{\alpha}\acute{\iota}\alpha\lambda\omicron\nu$  bedeckt war — weg. d. klebr. Stiele!), z. B. inflata Sm. s. vulgaris Græk. Taubenkropf, nutans L. nickende, Zier. S. pendula L. (barbata, rosea u. graeca Hort.) m. v. v. (z. B. nana, alba etc.), compacta M. B., etc. — Silenĉae Rchb., -nacĉae DC., Græk.
- Siler** Scop. (Umbelliferen, V. 2) Rosskümmel, fr. sermontaine, e. mountain-laser-wort (lat. siler, -ĉris eig. Spindelb. u. Bachweide, Wtst. d. abgeänd. Sium od. Selinum), S. montanum Crantz, s. Laserpitium Siler L.
- Siliculosae** L. (sc. Crucifĉrae) Schötchenträger (silicula dem. v. silĉqua Schote) XV. 1 L.
- Siliquastrum** T. (sc. Cercis) L. (Cassieen, X. 1) Schotenhülbaum, Judasb., fr. arbre de Judĉe „von Judĉa“ (deter. v. silĉqua Schote), Zier. cordatum u. orbiculatum Mnch. (Cercis canad. u. Siliquastr. L.).
- Siliquosae** L. (sc. Crucifĉrae) „Schotenträger“ (siliquosus v. silĉqua Schote) XV. 2 L.
- Silphium** L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Langstrahl (gr.  $\Sigma\acute{\iota}\lambda\phi\iota\omicron\nu$  i. q.  $\lambda\acute{\alpha}\sigma\alpha\phi\omicron\nu$  saft. Arznei u. Speise, nordafr. Wort silphĉ), Zier. S. laciniatum L.
- Silybium** G., Vaill. (fehl. **Silybrum** Hornem.) (Compos. Carduaceen. XIX. 1) (zu Cardius Rchb.) Stechkraut, Marien-, Frauen- od. Silberdistel (gr.  $\acute{\sigma}\acute{\iota}\lambda\upsilon\beta\omicron\nu$  Quaste, Wtst. d. ägypt. Name sobil), Zier. S. marianum G., fr. lait de Ste. Marie, e. lady's- od. milk-thistle, S. eburnĉum Coss., Durieu (Algerien).
- Simaruba** Aubl. (zu Quassia Rchb.) (Rutac. Simarubeen, X. 1) Bitteresche Leun., „Simaruben“-Bitterholz, fr. macre (c-ier) (d. caraĉb. Name!), S. amara u. ferruginĉa Aubl. s. g. Cedronbohne, s. Quassia Sim. u. excelsa. — Simarubĉae DC., -bacĉae Seub.
- Sināpis** T., L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Senf, fr. sinapi od. senĉve (moutarde „Möstrich“), e. mustard u. senvy (Augment  $\sigma\iota$  u.  $\nu\acute{\alpha}\lambda\iota\nu$  Senf, schwerl.  $\sigma\iota\nu\acute{\omicron}\varsigma$  schädlich u.  $\acute{\omega}\psi$  Auge — beisst in diese, Wtst.), S. nigra L. (Brassica n. L.), fr. roquette sauvage (Melanosināpis Schimp.), gebaut S. alba L., Unkraut S. arvensis L. Hederich, e. carlock, harlock u. kedlack, auch wild-rape.
- Sinningia** Nees (Gesneriaceen, XIV. 2) „Sinningie“ (n. d. Univ.-Gärtn. W. Sinning in Bonn), z. B. Helleri Nees, s. Gloxinia Schottii Mik.
- Sipho** P'Hĉr. (sc. Aristolochĉa) L. (Aristolochieen, XX. 5) Pfeifenkopfstr., Heberblume Vilm., fr. aristoloche en siphon, e. siphon-like od. tubeflowered Birth-wort ( $\acute{\alpha}\acute{\iota}\phi\omicron\nu$  Pfeife etc.).
- Siphocampylos (-us)** Pohl (Lobeliaceen, XIX. 6) „Krummhals“-Lobelia (s. eb. u.  $\kappa\alpha\mu\pi\acute{\upsilon}\lambda\omicron\varsigma$  krumm — d. Kronnröhre krumm!), Zier. (Winterbl.) Encianus Hort., bicolor etc., schönste coccineus Hook. (Bras.).
- Siphonandracĉae** Klotzsch „Röhrenbeutelige“, Heidelbergew. (s. v. u.  $\acute{\alpha}\nu\eta\omicron$ , - $\delta\theta\omicron\varsigma$  Staubbeutel).
- 1) **Siphonia** Rich. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Kaoutschukbaum (s. v. — weg. d. Gewinnung in Röhren- od. Gefäßform!), S. Caluchu Rich. s. elastica Pers., s. Jatrĉpha elast. L. f. u. Hevĉa guian. Aubl.
- 2) **Siph.** Benth. (Rubiaceen, V. 1) „Dünnröhrenkrone“ (d. Krone m. sehr lang. dünn. Röhre!).
- Siphonocaulae** Bisch. i. q. Characĉae DC. „Röhrenstengelige“ (s. v. u.  $\kappa\alpha\upsilon\lambda\acute{\omicron}\varsigma$  lat. caulis Stengel).
- Sisārum** T., Ad., DC. (sc. Sium) L. (Umbellifer., V. 2) „Zuckerwurz“, fr. girolle, sison-chervi, e. skirret (gr.  $\acute{\sigma}\acute{\iota}\sigma\alpha\phi\omicron\nu$ , arab. dgizer, Siser Plin.), s. Sisar. Germanorum Moris.

- Sison** L. (Umbelliferen, V. 2) Gewürzdoide, fr. sison (v. d. celt. sisun fließender Strom — als Standort!), z. B. inundatum L., fr. sison inondé, S. Amōmum L., fr. ginseng.
- Sisymbrium** All., L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) Rauke, Raukensenf Grck., fr. roquette (gr. *σισύμβριον* Diosc.), z. B. officinale Scop., Sophia L. etc.
- Sisyrinchium** (-syrinchium) T., L. (richt. Syorrh.- Hoffmg.) (Irideen od. Hämodoraceen, XX. 2) Rüsselschwertel, „Schweinsrüssel“, fr. sisyrinque (v. *σῖρος* Speise, *σῦς* Schwein, *δύγγος* Rüssel — bez. d. Zwiebel!), Zier. grandiflorum Dougl. (Mex.), longistylum s. Douglasii Hort. (Chil.), Bermudianum L., fr. Bermudienne, e. Bermuda-flag, etc.
- Sium** L. (Umbelliferen, V. 2) Wassermerk (gr. *σίον* v. d. celt. siw Wasser, ein Sumpfrk. F. W. Riemer), Zier. S. latifolium L. Brunnen- od. Froschpeterlein, Wassereppich, fr. ache d'eau, e. large-leaved Skirret.
- Skimmia** s. Scimmia!
- Skinnēra** Forst. (Onagrarien od. Myrobalaneen, VIII. 1) „Skinner's“ Fuchsia (n. Steph. Skinner, gab 1671 ein Etymologicon bot. heraus), Sk. coccinea Forst. = Fuchsia cocc. Ait.
- Smegmaria** W. (Rosac. Spiräaceen, XXIII. 2) „Seifenstr.“, Wäscherbäum D., s. g. Panamaholz (-rinde) (*σμήγμα* d. Schmierien — d. Rinde dient als Seife!), s. Quillaja Saponaria Mol. (Chili) u. Smegma-dermos Rz. Pv. „Seifenrinde“.
- Smilacina** Desf. (Smilacineen, VI. 1) Schattenblume (v. *σμίλαξ*, -νος Stechwinde), S. bifolia Desf. = Majanthemum bif. Schmidt.
- Smilax** L. (Smilacineen, VI. 1 od. XXII. 6) Sarsaparill-Stechwinde, „Kratzeisenstengel“, fr. squine od. ësquine (*σμίλαξ* Stechwinde v. *σμίλη* Kratzeisen — Stengel voll Stacheln), z. B. S. excelsa L., fr. boyau du Diable, „Teufelsdarm“, S. Sarsaparilla L. (Nordam.), etc. — Smilacēae R. Br., DC.
- Smyrnum** L. (Umbelliferen, V. 2) Myrrhendolde, Liebstöckel, fr. macēron, e. smyrnian (gr. *σμύριον* Dolde mit Myrrhensamen v. *σμύριον* i. q. *μύριον* Myrrhe), z. B. S. olus atrum L., gem. Maceron- od. Myrrhenkr. Leun., etc. — Smyrnēae DC., -niēae Rchb.
- Sobralia** Rz. Pv. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Sobral's“-O. (n. d. span. Bot. Don Fr. Mart. Sobral), z. B. macrantha Lindl., dichotōma R. P. (Peru, span. Flor del paradis) etc.
- Sodada** Forsk. (Capparideen, XIII. 1) Soda-Kapper (v. d. arab. sodad).
- Sogalgina** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sogalgine“ (Anagramm v. Galinsogea!), Zier. S. trilobata Cass., s. Galinsogea tr. Hort.
- Soja** Mnch. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Sojabohne“ (v. sooja Name einer Sauce in Japan, zu welch. d. Bohnen benutzt), Zier. S. hispida Mnch. = Dolichos Soja L.
- 1) **Solandra** L., Sw. (Solaneen, V. 1) „Solander's“ Stechapfel (n. d. schwed. Reis. D. K. Solander, Begleit. d. Weltumseglers Sir Jos. Banks, s. d. Aut.), Zier. S. herbacea Hort. (Datura ceratocaula Ort.), grandiflora Sw. (Stramonium scandens Pluk. s. Dat. sarmentosa Lam.).
- 2) **Solandra** L. f. (sc. Hydrocotyle) L. (Umbellifer., V. 2), z. B. capensis L. f. 3) **Sol.** Murr. (Malvaceen, XVI. 8) „Sol.'s“ Eibisch, S. lobata Murr., s. Hibiscus Solandra P'Her. (Lagunaea l. W.).
- Solanoides** T. (Phytolacceen, X. 5) „Nachtschattengleiche“ (Solanum u. *είδομαι* gleiche).
- Solānum** L. (Solanaceen, V. 1) Nachtschatten, fr. endormie, herbe aux sorciers u. morelle, e. morel, night-shade, dwale u. bane-wort (v. solari Schmerz stillen — einschläf. Wirkung!), Culturpfl. S. tuberosum L. Kartoffel, fr. pomme de terre, e. potatoe, irish-auricot, m.

v. v., S. Melongēna L. Eierpflanze, fr. aubergine, S. Lycopersicum L. Liebes- od. Paradiesapfel (Lycopersicum esculentum Dun.), Zier. S. Pseudo-Capsicum L. Korallenkirsche m. v. nanum (Stubenpfl.), Gärten: pyracanthum Lam. (Madag.), galeatum Hort. (Bras.), gigantum Jacq.'s. niveum Hort., etc. — Solanēae Juss., DC., -nacēae Rehb.

- 1) **Soldanella** T., L. (Primulaceen, V. 1) Alpenglöckchen, Troddelblume Seub., fr. soldanelle des Alpes (ital. soldo, Sou, lat. solidus — weg. d. kreisrund. Blätt.! od. dem. v. soldana Sultanin?). 2) **Soldanella** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulac., V. 1) Meerstrands-Winde, Seekohl Wolff.

**Solidago** L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Goldrute, fr. verge d'or, e. golden-rod (v. solidus dicht u. ago führe, Wtst. — zum Wundenheilen), Zier. S. canadensis L., nutans Ait., multiflora Desf., wild S. Virga-aurea L. gem. „Goldrute“.

**Sollya** Lindl. (Pittosporeen, V. 1) „Solly's“-Pechsamenblume (n. d. Bot. Rich. Horsm. Solly ben.), z. B. Ampel S. heterophylla Ldl., s. Billardiera fusiformis Lab.

**Sonchus** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Sau- od. Gänsedistel, „Sonche“ O. W., fr. laiteron (laceron), lait d'âne, laitue de lièvre, e. hare's-lettuce, sow-thistle etc. (gr. σόγγος Theophr. od. σόγγος Hasenkohl, Wtst.: v. σομφός weich etc. — Struktur d. Stengels!).

**Sonerila (-rilla)** Roxb. (Melastomac. od. Burmannieen, III. 1) „Sonerile“ (vaterl. indisch Sonneri-lla Rheed.), Zier. S. margaritacea Lindl. (Ostind.).

**Sophora** R. Br. (Cassieen Sophoreen, X. 1) „Sophore“, Eschen-Akazie (d. arab. Name sophera), Zier. S. japonica L. s. g. Schnurhülse, m. v. v. (z. B. pendula Hort.), s. Styphnolobium Schott.

**Sophrontis** Lindl. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Züchtige“ (v. σσφροντέω bin züchtig — Anthere durch d. Flügel d. Columna verdeckt!), z. B. grandiflora Ldl. (Sophronia gr. Ldl.) etc., s. Cattleya Ldl.

**Sorbaria** Ser. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Ebereschen“-Spiräe (v. Sorbus Eberesche — ähnl. Laub!), s. Spiraea sorbifolia L. u. Lindleyana Wall.

- 1) **Sorbus** T., L. (Rosac. Pomaceen, XII. 3) Eberesche, Mehlbirn- u. Elzbeerbaum Vilm., fr. sorbe (-bier), e. sorb-apple (Sorbus d. Sorbe, slav. Volk, od. sor celt. „herb“!, Wtst. wohl auch sorbeo verschluckte od. arab. sorbet od. sherbet, Getränk aus deren Saft!), z. B. Obst S. domestica L. Speierling, Spier- od. Sporpapfel etc., fr. corne (-mier), e. sorb-apple-tree od. service-tree (Cornus domestica Spach), Wald- u. Zierb.: S. Aucuparia L. m. v. v. „Vogelbeerbaum“, fr. sorbier des oiseaux, e. fowler's-service-tree, quicken-tree „Quitschen-beerb.“, S. torminalis Crantz Elz- od. Arlsbeerb., fr. alisier, e. maple-leaved serv.-tr., s. Crataegus t. L. (Pirus t. Ehrh., Mespilus t. All., Azarolus t. Borkh.), S. americana W., S. hybrida L. (Pirus pinatifida Ehrh. s. fennica Bab., Azarolus pinn. Borkh., S. quercifolia Hort.), S. Aria Crantz Mehlbeerb. u. intermedia Pers. (scandica Fries) s. g. Oxelbirne. 2) **Sorbus** DC. (Rosac. Spiräac., XII. 4), s. Sorbaria Ser.

**Sorëma** Lindl. (Nolanaceen, V. 1) „Hauf“-Cymbelblume (v. σώρευμα Anhäufung), Zier. lanceolata Miers (Nolana l. Miers).

**Sorghum** Pers. (Gramineen Andropogoneen, XXIII. 1) Mohrrhirse, „Sorgho“ od. Durrha (sorgho indian. dsura od. durra arab. Name), S. vulgare Pers., fr. millangue od. grand-millet, s. Holcus avenaceus s. Sorgho L.

**Soria** Ad., Desv. (Crucifer. Nucamentac., XV. 2) Nusschötchen (n.

Soria, ein. span. Provinz Alcastiliens?), *S. syriaca* Desv., *s. Euclidium* syr. R. Br.

**Southwellia** Salisb. (Sterculiaceen, XVI. od. XXI. 9) „Southwell's“ Stinkbaum (n. Rob. Southwell, schr. 1698 Anleit. z. Trockn. d. Blum.), *S. nobilis* Sal. (Sterculia nob. Sm.).

**Soyeria** Monn. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Soyer's“ Pippau (n. d. franz. Bot. Soyer-Willemet), *z. B. montana* Monn. (Hieracium m. Jacq., *Crepis* m. Tausch.) etc.

**Spadiciflorae** Endl. (-es Seub.) „Kolbenblütige“ Seub. (spadix, -ίς Blumenkolbe, flos, -ός Bl.).

**Sparassis** Fr. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) Strunkpilz, Ziegenbart, *s. g. Glucke* (v. *σπαρῶσσα* zerzupfe — zerzupft. Ansehen!), *z. B. crispa* Fr.

**Sparaxis** Ker (Irideen, III. 1) „Schlitzschwertel“ Perring (s. eb. — Blüten-scheide grannig zerrissen), *z. B. Stuben: pulcherrima* Ker, *s. Ixia amoeniflora* autt. u. *Gladiolus*.

**Sparganium** T., L. (Typhaeaceen, XXI. 1) Igelskolbe, fr. métel, laiche „Liesch“, e. bur-reed (*σπάργανον* Wickelband — Gebr. d. Blätt. als Böttcher-Liesch!), *z. B. ramosum* L.

**Sparmannia** Thb. (nicht **Sperr-** od. **Sparrm.-**) (Tiliaceen, XIII. 1) „Sparmannsstrauch“ (n. d. schwed. Reis. in Südafr. Andr. Sparmann, † 1787), *Zier. S. africana* Thb.

**Spartianthus** Lk. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Binsenpfriemen“ Rmpl. (*σπάρτιν* od. -ον Strick, wovon *Spartium* L., u. *ἄρθος* Bl.), *z. B. juncéus* Mnch. m. v. v., fr. genét d'Espagne, e. spanish-broom, *s. Genista junc.* Lam. *s. odorata* Mnch.

**Spartina** Schreb. (Gräser, III. 1) Strick- od. Besengras, Pfriemengriffel D. (s. eb. — steife, *z. B.* Binden anwendb. Gräser), *z. B. cynosuroides* W. *Prairiegras*.

**Spartium** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Pfriemenstr., Besenpfriemen Vilm., *s. g. Besenginster*, fr. spartion, genét à balais, e. broom (v. *σπάριον* Strick), *Zier. scoparium* L. m. v. v. (*z. B. album* Hort.), *juncéum* L. (*Spartianthus* j. Lk.), *purgans* L. (*Genista* p. L. f.), fr. griot Purgierginster, etc., *s. Sarothamnus* Wimm.

**Spartocytisus** Webb., Berth. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Pfriemengeisklee Lauch. (*s. v. u. Cytisus*), *Zier. sessilifolius* Borkh. (*Cytisus* sess. L.) italien. Bohnenbaum, *album* Webb., etc.

**Spatalanthus** Sweet (Irideen, III. 1) „Prachtblume“ (*σπατάλη* Luxus etc., *ἄρθος*), *s. Trichonema monadelpha* Ker.

**Spathodea** P.-B., R. Br. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Scheidenkelch“ D. (*σπάθη* Blattscheide, *εἶδομαι* gleiche — Kelch blumenscheidenartig), *Zier. speciosa* (Westafr.) u. *campanulata* P.-B., *s. Bignonia*.

**Spatulea** (bess. **Spath.-**) Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Spatenpilz“ Kumm. (*σπάθη* lat. spatha *s. eb. u. οἶλος* derb, ganz — d. Gipfel spatenf. vom Stiel durchsetzt Kumm., spatelähnl. Form d. Schlauchlagers Wtst.), *s. Spathularia* Pers.

**Specularia** Heist. (Campanulaceen, V. 1) „Venusspiegel“ (v. *speculum* Spiegel — rund. Spiegel in d. Blume!), *S. Speculum* A. DC., fr. mirette, e. Venus'-looking-glass, *s. Campanula* u. *Prismatocarpus*.

**Spelta** Endl. (sc. *Triticum*) L. (Gramineen, III. 2) „Spelz“ od. Dinkel, fr. speautre u. blé-locar (-ocular), e. pelt od. amel-corn, auch fesels (neulat. spelta, d. latinis. Spelz!).

**Spergella** Rehb. (zu *Spergula* L.) (Caryophylleen od. Illecebreen, X. 5) „Spörkling“ Seub. (dem. *Spergula*).

**Spergula** L. (Caryophyll. od. Alsineen, X. 5) Spark od. „Spörgel“, fr. aspergoutte (esparg-, -goule), e. spurry (neulat. Spörgel latinis., od. v. spargo streue aus), *Zier. subulata* Schwartz (*pilifera* Hort.).

- Spergularia** Pers., Presl (Alsineen, X. 5) Schuppenmiere Grck., Sperkling O. W. (s. eb.), z. B. segetalis Fenzl (Alsine s. L., Lepigonum s. Koch, Arenaria s. Lam.), salina u. rubra Presl.
- Spermacöce** Dill., L. (Rubiace. Spermaceen, IV. 1) „Kronsame“ od. Zahnwirbel D. (σπέουα Same u. ἀκροκή st. ἀκρή Spitze — zwei Kelchspitzen auf d. Frucht sitzenbleibend), z. B. tenuior L. (Anonymus americ. Pluk.). — Spermacöceae Rehb.
- Sphaeranthus** Vaill., Schreb. (Compos. od. Inuleen, XIX. 5) „Kugel“ od. Ballblume D., fr. sphéranthe (σφαίρα Kugel u. ἄνθος — d. Bl. in kugl. Köpfen), z. B. ind., afric. u. chin. L., s. Ethulia, Cotula u. Senecio.
- Sphaerobolus** Tod. (Pilze, XXIV. 4) „Kugelschneller“ (s. eb. u. βόλος Wurf — bei d. Reife kohlsamenähnl. Sporidienblasen abwerfend), z. B. stellatus Tod.
- Sphaerococcus** Stackh. (Florideen, XXIV. 3) „Kugel“- od. „Knopftang“ (s. eb., κόκκος Korn etc. — Form d. Behält.), z. B. bacciferus Ag. „Beerentang“, crispus Ag. Caraghen-Moos, etc.
- Sphaerophoron** Pers. (-um Duperr., -us Pers.) (Flechten, XXIV. 3) „Knopfflechte“ (s. v., φορός tragend — kugl. Massen an d. Spitzen d. Thallus!), z. B. ceratites (Dufourea cer. Sommerf.), coralloides Pers. (Stereocaulon globiferum Schreb.).
- Sphaerostigma** Ser. (Onagrarieen, VIII. 1) „Kugelnarbe“ (s. v., στίγμα Narbe), Zier. S. bistortum Walp., s. Oenothera Bistorta Veitchiana Hort. s. Botta Hort.
- Sphagnum** Dill., L. (Moose, XXIV. 2) Torfmoos, fr. sphoigne (gr. σφάγγος i. q. σφόγγος Schwamm — locker u. leicht wie Schw.). — Sphagnacöce C. Müll., -ninae Schimp.
- Sphenogyne** R. Br. (Compos. Calendulaceen, XIX. 4) „Keilnarbe“ (σφήν, -νος Keil, γυνή Weib etc. — d. Narbe schräg abgestutzt), Zier. S. speciosa Fisch., Mey. (crocea, elegans u. versicolor Hort.).
- Sphenophyllum** Brongn. (foss. Farne, XXIV. 1) foss. „Keilblatt“ (s. eb., σφύλλον Laub — dies. keilförm.).
- Sphondylium** T., Hoffm. (Spondyl.- Scop., DC.) (sc. Heraclëum) L. (Umbelliferen, V. 2) Bärenklau (σφόνδυλος od. σπόνδυλος Wirbel — aufgetriebene Stengelknoten!), Zier. S. asperum s. pubescens Hoffm. Riesen-B., wild S. branca Scop. = Heracl. Sphond. L.
- Spica** Benth. (sc. Lavandula) L. (Labiaten, XIV. 1) gem. Lavendel, Öl- od. Ähren-Lavendel, fr. lavande, e. lavender-spike (v. spica Ähre — Blütenstand, daher Spiköl st. Lavendelöl!).
- Spicaria** Benth. (zu Hyptis Jacq.) (Labiaten, XIV. 1) „Ähren“-Beuglippe (s. eb.).
- Spigelia** L. (Apocynen Carisseen, V. 1) „Spigelie“, fr. spigélie, e. worm-grass, pink-root (n. d. Prof. Adr. van der Spigel zu Padua, † 1625), z. B. marylandica L. (Lonicera m. L. f.), splendens Hook. (Centralamer.). — Spigiaceae Mart.
- Spilanthes** Jacq., W. (-thus Forst.) (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Fleckenblume“, Husarenknopf od. Parakresse Leun. (v. σπύλος Fleck, ἄνθη od. -ος Bl. — weisbl. Bl. m. schwärzl. durch Pollen verursachten Flecken), z. B. Acnema L. s. g. ABC-Pflanze (— Kinder müssen sie kauen etc. Willd.), s. Verbesina Acm. L. f.
- Spinacia** T., L. (-chia G. Fr.) (Chenopodiaceen, XXII. 4) „Spinat“, veralt. Binetsch, fr. les épinards, e. spinach (-age) (latinis. Wort, od. v. spina Dorn — stachl. Früchte!), cult. S. oleracea L. m. v. parvifolia Hort. „Winter“-Sp.
- Spiraea** L. (Rosac. Spiräceen, XII. 4) „Spiräe“ od. Spierstrauch, fr. spirée, e. drap-wort (gr. σπειραία v. σπειρα lat. spira Spirale, d. Gewundene — nämll. d. Kapsel v. Spir. Ulmaria Wst.), Zier.: pal-

- mata Thb., japonica Hort. (Hoteia j. Decsn., Astilbe rivularis G. Don), callosa Thb. s. Fortunei Planch. m. v. v., bella Sims s. Hookeri Hort. m. v. coccinea Hort., crataegifolia Lk., fr. sp. à feuilles d'aubépine, salicifolia L., Lindleyana Wall. (Schizonotus tomentosus Ldl.) u. v. a. — Spiraeaceae (sc. Rosaceae) Rchb.: a) Sorbaria, b) Physocarpus, c) Holodiscus, d) Spiraria Rispen-Sp., e) Chamaedryon Gamander-Sp., f) Calospira Grossdolden-Sp.
- Spiranthes** Rich. (Orchid. Neottien, XX. 1) „Wendel“-O., Drehling, Spiral-O., Drehwurz O. W. (s. v. u. ἄρρη — Blütenstand spiralig!), s. Ophrys u. Neottia.
- Spirodela** Schleid. (Najadeen, II. 1) „Deutlichgewundene“ (s. v. u. ὄλος deutlich), S. polyrrhiza Schleid., s. Lemna p. L.
- Splachnum** L. (eig. Splachn.-) (Moose, XXIV. 2) „Lungenmoos“, Schirm- (σπλάγγνον Lunge etc. — weg. d. Sporangiums). — Splachnacae Schimp.
- Spondias** L. (Terebinthac. Spondiaceen, X. 4) Mombin- od. Balsampflaumenbaum (σποιδιάς od. σποδία; Pflaumenbaum — Ähnl. d. Frucht), s. Mombin Plum. u. Myrobalanus G. — Spondiaceae Kth.
- Spongia** L. (Algen od. Amorphozoen, XXIV. 3) Meer- od. Seeschwamm (v. σπώγγος Schwamm), S. communis u. usitatissimus Lam.
- Spongilla** DC. (Algen od. Amorphozoen, XXIV. 3) Flussschwamm, S. fluviatilis (Spongia fluv. L.) (demin.).
- Spongostemma** Rchb. (zu Scabiosa L.) (Dipsaceen, IV. 1) „Schwammkranz“-Scabiose (s. v. u. στέμμα Kranz — d. Saum d. Hüllchenkranzes ist schwammig), Zier. S. atro-purpurea L.
- Sprekelia** L., Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Sprekelie“ (n. J. H. v. Sprekelsen in Hamburg, † 1764), Zier. S. formosissima Herb. s. g. Jakobslilie (Amaryllis form. Hort.).
- Sprengelia** Sm. (Epacrideen, V. 1) „Sprengelie“ (n. d. Bot. Konr. Sprengel, s. d. Aut.), Stuben S. incarnata Sm. (Str. Austral.), s. Poretia cucullata Cav.
- Spumaria** Pers. (Lycoperdaceen, XXIV. 4) Schaumpilz, Kukuksspeichel (spuma Schaum — d. Inhalt d. Peridium eine schaum. Masse), S. Mucilago P.
- 1) **Squamaria** Hall., Scop. (sc. Lathraea) L. (Scrophularin. Orobanchen, XIV. 2) „Schuppenwurz“ (squama Schuppe — schupp. Schaft), s. Squam. Orobanche Scop. 2) **Sq.** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) Schuppenflechte (— Thallus schuppenf.).
- Stachys** T., L. (Labiaten, XIV. 1) Ziest, fr. stachide od. épiaire, e. hedge-needle (στάχυς Ähre — weg. d. Blütenstands), Teppich: lanata Jacq., Zier.: coccinea Jacq., grandiflora Hort. (Betonica gr. s. hirsuta L.), wild: germanica L. Rosspoley, etc.
- Stachyurus** v. Sieb. (Pittosporoen, V. 1) „Ährenschwanz“ (s. eb. u. οὐρά Schwanz — d. Blütenraube im Herbst als Kätzchen erscheinend), z. B. praecox Sieb. u. Zucc.
- Stagmaria** Jack, Wall. (Terebinthac., XXII. 5) „Teufel“- od. „Tropfen“-Firnissbaum (v. στάγμα Tropfen — tropft ätzend. Milchsafte aus), S. verniciflua Jack.
- Stalagmites** Murr., Schreb. (Guttifer. Garcinieen, XVIII. 2) „Tropfgummibaum“, Guttabaum D. (Ostind.) (v. σταλαγμός d. Tröpfeln — entlässt gelb. Milchsafte), S. Gutta s. cambogioides W. Gummiguttb., s. Garcinia Spr. (Xanthochymus Roxb.).
- Stanhopea** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Stanhope's“-O. (n. d. Grafen v. Stanhope, Vice-Präs. d. Lond. Bot. Gesellsch.), Warmh. insignis Hook., oculata Ldl., tigrina Batem., etc.
- Stapelia** L. (Asclepiadeen, V. 2) „Stapel's“-Aaspflanze, fr. stapélie, fleur de crapaud „Krötenbl.“, s. g. Schachbrett (n. d. holländ. Arzt

- J. B. van Stapel, Übers. des Theophrast, † 1736), *S. variegata* L., *hirsuta* L., *cactiformis*, etc. — Stapeliaceae (sc. Asclepiadéae) Rchb.
- Staphisagria** Riv., Bauh. (sc. Delphinium) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) Läuse Samen-Rittersporn, fr. staphisaigre, herbe aux poux, e. stave's-acre (*σταφίς*; -*ίδος* Rosine, *ἄγριος* wild — Samen rosinenähnl. geg. Läuse!).
- Staphyléa (-laea)** L. (Sapindac. od. Celastraceen, V. 3) Pimper- od. Klappernuss, fr. staphylier, pistache sauvage, e. bladder-nut (gr. *σταφυλή* Weintraube — Blütenstand), Zier. trifoliata L. (Staphylo-dendron tr. Mneh.) u. pinnata L. Paternosterstr., Blasen- od. Judennuss.
- Staphylo-dendron** Scop., T. (Sapindaceen, V. 3) „Traubenbaum“ (s. eb. u. *δέρδρον* B.), *S. pinnatum* Scop., s. *Staphylea* p. L. 2) **Staphylo-d.** Pluk. (sc. Dodonaea) L. (Sapindaceen, VIII. 1) Dodoens'-Traubenbaum, s. Dod. s. *Thlaspidioides arborescens* Barr. 3) **Staph.** africanum Comm. (Sapotac. Mimusoepen, X. 2) afr. T., s. *Royēna lucida* L.
- Statice** T., L. (Plumbagineen, V. 6) Nelkengras, Strandnelke Leun., fr. herbe à sept tiges, e. lavender (gr. *στατιζή*) zum Stehen bringend., adstringierend. Kraut — hemmt d. Bauchfluss Plin.), Zier. *S. incana hybrida* Hort., *sinuata* L. m. v. v., *elata* Fisch., *tatarica* L. s. *dalmatica* Presl (trigona Pall.) m. v. *angustifolia* Boiss. (Goniolimon tat. Boiss.), *Armeria* Sm. (Arm. vulg. *W. s. campestris* Wallr.) Grasnelle Grck., fr. gazon d'Espagne, *maritima* Mill. (Arm. mar. *W.*) Strandgrasnelle, e. common sea-lavender, m. v. v.
- Steenhammera** Rchb. (Boragineen, V. 1) virgin. Lungenkraut, *S. virginica* Rchb., s. *Pulmonaria* v. L. (n. d. Probst in Stockh., C. Steenhammer, dem Reichenbach bot. Mitteilungen verdankte).
- Stelis** Sw. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Stangensegel“ (*στηλίς* Stange m. Segel am Schiffshinterteil, bei Theophr. eine Schmarotzerpflanze *Loranthus europ.*), z. B. *micantha* Sw. (Epidendron s. *Dendrobium* m. Sw.), *racemosa* Sw. (Bletia *bicallosa* Don, *Empusa paradoxa* Ldl.).
- 1) **Stellaria** L. (Caryophyllen od. Alsineen, X. 3) Stern- od. Vogelkraut, Sternmiere Seub., e. bethlehem-star, hen-bit „Hühnerbiss“ (v. stell a Stern), *S. media* Cyr. (Alsine m. L.) Vogelmeier od. Meierich, fr. mouron, e. chick-weed. 2) **Stellaria** Dill. (Onagreen, VIII. 1) „Blattsternkraut“ (— d. Blätter bilden einen Stern).
- 1) **Stellaris** Mneh. (Liliaceen, VI. 1) Milchstern (v. stella Stern), *S. corymbosa* Mneh., s. *Ornithogalum umbellatum* L. 2) **Stellaris** bifolia Mneh. (Liliac., VI. 1) zweiblättr. Zille, s. *Scilla* bif. L.
- Stellatae** L. „Sternkräuter“, i. q. Rubiaceae Juss., sternblättr. Pfl., fr. étoillées (s. v.).
- Stellera** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Steller's“-Seidelstr. (n. d. bot. Samml. G. W. Steller, Reis. in Kamschatka, † 1745), *St. Passerina* L. (*Passerina annua* Wickstr.) Spatzenkraut, fr. grémil d'Allemagne u. langue de passerau „Sperlingszunge“.
- Stemodia** L., Schreb. (Gesneriac., XIV. 2) „Doppelfaden“ (*στέμμιον* Staubfaden, *δις* od. *δίς* dopp., zwei — jed. Faden scheinbar m. zwei Antheren), z. B. *aquatica* W. (Ostind.), *camphorata* Vahl (Ceyl.), s. *Chonacola* Herm., *Capraria* u. *Columna* Plum.
- Stemōna** Lour. (Smilacene, XXII. 6) „Fadenspargel“ (s. eb. — d. inner. Blumenblätt. tragen d. Antheren), Warmh. *S. tuberosa* Lour., s. *Ubiūm polypoides* Rumph. (zu *Tamus* W.).
- Stemphylium** Wallr. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Tresterschimmel“ (*στέμφυλον* Trester v. Oliven etc. — Wtst. Sporidien oliventörm!) z. B. *ericocetnum* Wallr. Russtau od. Schwärze der Ericaceen, „Eric.-Töter“.

- Stenactis** Cass., Nees (Compos. Erigereen, XIX. 2) „Feinstrahl“, Feinchen O. W. (*στεινός* schmal, *ἀκτίς* Strahl — feine Strahlenblütchen!), z. B. *annua* Nees s. *bellidiflora* A. Br., s. *Bellis* a. L. (*Diplopappus* a. Bl. Fing. u. *Polyactidium* DC. a.).
- Stenocarpus** R. Br. (Proteac., IV. 1) „Dünn“- od. „Feinfrucht“ (s. eb., *καρπός* Fr. — dies. linienf. dünn!), z. B. *Cunninghamii* R. Br., s. *Agnostus sinuatus* Cunningh.
- Stenogastra** Bot. Mag. (Cyrtrandreen od. Gesneriac., XIV. 2) „Dünnbauch“ (s. v., *γιάστρα* od. -η Bauch), Zier. S. *concinna* Hook.
- Stenoglossum** Kth. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Schmal“- od. „Dünnzunge“ (*γλώσσα* Z. — schmal. Labell!).
- Stenophragma** Celak. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) „Dünn“ od. „Schmalwand“ Grck. (s. v., *γοῦγμα* Zaun, Wand), S. *Thalianum* Col. (Arab. *Thaliana* L., *Sisymbrium* Thal., Gay-Monn.).
- Stenospermium** Schott (Aroideen, XXI. 1) „Schmalsamen“-Aron, s. *Spathiphyllum* Schott (*σπέρμα*, -ατος Samen).
- Stenospermum** Sweet (Myrtaceen, XII. 1) „Feinsamen“-Eisenholz (s. eb.), s. *Metrosideros* R. Br.
- Stenotaphrum** Trin., Kth. (Gräser, III. 2) „Enggrabenspelz“-Gras, Flach- od. Amerikagr., s. *Americum complanatum* autt. (s. v. u. *τάφος* od. -γοή Graben — Kelch- u. untere Kronspelze hohl!).
- Stephanotis** P.-Thou. (Asclepiad., V. 2) „Kranzohr“ (*στέφανος* Kranz, *ὄτις*, *ὄτος* Ohr — fünfblättr. Nebenkrone), Warmh. S. *floribunda* A. Brongn. u. *Thouarsii* ds. (Schlingstr. Madagascar).
- Sterculia** L. (Sterculiaceen od. Büttneriac., XI. 1 od. XVI. 7 u. XXI. 9) „Stinkbaum“ Leun. (v. *Sterculius* Gott des Mistes, *stercus*, -ōris Kot — übler Geruch einiger Arten), z. B. *acuminata* P.-B. (Cola Bauh.), *crinita* Cav. (*Viira pruriens* Aubl.), s. *Helictères*. — *Sterculiaceae* Rehb., -iëae Kth.
- Sternbergia** Waldst. u. Kit. (Amaryllid., VI. 1) „Sternberg's“-Narzisse (n. d. Bot. Kasp. Graf Sternberg, s. d. Aut.), z. B. *lutëa* Ker (Istrien), s. *Amaryllis* *lut.* L., *colchiciflora* W. K. (Ungarn) etc.
- Stevia** Cav. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Stevie“ (n. P. J. Esteve, Prof. z. Valencia im 16. Jahrh.), Zier. S. *purpurea* Pers., *ivaefolia* W. u. *serrata* Cav.
- Stewartia** Cav. (Malvac. od. Ternstroemiaceen, XVI. 8) „Stewart's“ Malvenbaum (n. John Stewart, Marq. v. Bute b. London), S. *Malachodendron* s. *virgin.* Cav., s. *Stuartia* P'Hër.
- 1) **Stiftia** (Stiftt.-) Mik. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Distelbaum (n. d. kais. Leibarzt A. J. v. Stiftt in Wien, † 1836), z. B. *insignis* u. *chrysantha* Mik. 2) **Stifttia** Nord. (Fucoideen, XXIV. 3).
- Stilago** L. (Euphorbiaceen, XXII. 3) Tropfenbaum, Salamanderb. D. (v. *στίλη*, lat. *stilla* Tropfen u. ago führe — d. Rinde von Saft strotzend), z. B. S. *Bunius* Burm. Brustbaum (Ostind.). — *Stilaginæ* DC.
- Stillingia** Gard., Schreb. (Euphorbiac., XXI. 8) „Stilling's“ od. chines. Talgbaum, Talgbeerenb., fr. *sëbifère*, e. *tallow-tree* (n. d. engl. Bot. Stilling-Fleet im vor. Jahrh., schr. *Miscellaneous tracts*, 1759), S. *sëbifera* Mchx., s. *Croton sëbif.* L. Talg-Croton.
- Stipa** Vahl, L. (viell. bess. **Stypa**) (Gräser, III. 2) Pfriemen- od. Federgras, fr. *stipe* od. *ëtiëpe*, e. *feather-grass* (v. *στύπη*, lat. *stupa* Werg, od. v. *stïpo* stopfe aus — lange federige Grannen!), S. *pennata* L. Waisenhaar, Steinfeder etc., fr. *plumet de Vaucluse* etc., e. *true f.-gr.*, *capillata* L. „Haarfedergr.“ etc.
- 1) **Stoebe** Leyss. (zu *Centaurea* Rehb.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Sommer-Flockenblume (gr. *στοίβη* d. Stopfen — bei d. Alten eig. = *Poterium spinosum* L.), s. *Centaurea* *stolitalis* L. s. *sicula* Leyss.



- u. C. Stoebe L. schmalblättr. Fl. M.-Rchb. 2) **Stoebe** L. (Compos. Segregaten, XIX. 5) „Stopfblume“, z. B. aethiop. L. etc., s. Seriphium L. u. Gnaphalium L. f.
- 1) **Stoechas** T. (sc. Lavandula) L. (Labiaten, XIV. 1) „Zeilen“-Lavendel, fr. stécas u. quercillet, e. cassidony od. french lavender (gr. *στοιχάς*, -*ῥόδος*; in Zeil. geordn., Wtst. n. d. Stoechaden, d. s. lyerische Inseln), s. St. arabica Antiq. 2) **St.** citrina autt. (sc. Gnaphalium) L. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) Sand-Immortelle (Gnaph. arenar. L., Helichrysum ar. DC.).
- Stokesia** l'Hér. (Compos. Ethulieen, XIX. 1) „Stokesie“ (n. Dr. Jon. Stokes, Withering's Gehülff., schr. bot. mater. med., Lond. 1812, Rümpl. n. d. Dublin. Arzt W. Stokes), Zier. S. cyanea l'Hér. (Cartesia centauroides Cav., Carthamus laevis Mill. s. carolinian. Mehx.).
- Stramonium** T., Mnch. (sc. Datura) L. (Solaneen, V. 1) gem. Stechapfel, fr. stramoine, e. thorn-apple (v. *στορέγω* Perf. Pass. *ἑστραμίου* drehe — Blüt. der Contorten, Wtst. aus *στορέγγιον*, unser Solanum, u. *uavizón* rasend zusamm. — macht rasend), Zier. S. fastuosum Mnch. (Datura f. L.) egypt. St., fr. str. d'Égypte.
- 1) **Stratiotes** L. (Hydrocharid., XIII. 6 od. XXII. 10) Wasser- oder Krebs-scheere, Siggel D., fr. stratiote, e. water-soldier (*στορεπιώτης*; Soldat — Schwertblätter), Zier. S. aloides L., s. g. Straussfeder, fr. str. Aloès, e. aloë-like w.-s. 2) **Str.** (sc. Pistia) L. (Lemnaceen, XX. 5) Muschelblume, s. Plantago aquatica Rumph.
- Streblidia** Lk. (zu Chaetospóra R. Br.) (Cyperac., III. 1) „Dreh“- od. „Walzen“-Riet (v. *στορέβλος*; verdreht od. *στορέβλη*; Walze u. *εἰδόμεαι* gleiche), z. B. ferruginea Lk. (Schoenus f. L.).
- Strelitzia** Ait., Schreb. (Musaceen, V. 1) „Strelitzie“ (u. d. Gemahlin Georgs III., g. Prinzessin v. Meckl.-Strelitz), Warmh. S. reginae Banks (Heliconia Bihai L. f.), augusta Thb. (Hel. alba L. f.) (Cap) etc.
- Streptocarpus** Lindl. (Cyrtdandreen od. Bignoniac., XIV. 2) „Drehfrucht“ (*στορεπτός*; gedreht, *ζαροτός*; Frucht — d. lange Schoteukaps. spiralig gedr.), s. Didymocarpus W.
- 1) **Streptogyne** Rchb. (zu Himantoglossum Rchb.) (Orchideen Ophryd., XX. 1) „Drehstempel“ (s. eb., *γυρῆ* Weib etc.), z. B. viridis Rchb. (Platanthera v. Ldl., Gymnadenia v. Rich.). 2) **Str.** P.-B. (Gräser, III. 2) „Spiralnarben“-Gr.
- Streptopus** Rich., Mehx. (Smilacineen, VI. 1) „Dreh“- od. Knotenfuss, Zapfenkraut D., Hockenblatt M.-Rchb. (s. v. u. *ποῦς*; Fuss — die Stiele gedreht!).
- Strizolobium** P. Br. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Kreisch“- od. „Rauschhülse“, Juckhaarbohne (v. *στρίζω*, lat. strideo rausche — beim Streichen d. rauhfilz. Hülse), s. Dolichos pruriens L.
- Strobilacæae** Rchb. (sc. Coniferae) „Zapfeubäume“ (v. *στροβύλος*; Tannenzapfen).
- Strobilanthes** Blum. (Acanthaceen, XIV. 2) „Zapfenblume“ (s. eb., *ἄνθη* — bez. d. beblätt. Blütentrauben), Zier. auriculata Bl. u. Sabiniiana Nees (Ruëllia Sab. Lindl.).
- Strobis** (sc. Pinus) L. (Conifer. Abietineen, XXI. 9) Weymouthskiefer, fr. pin du lord W. od. de la nouvelle Angleterre, e. Weymouth od. white-pine, Pumpkin- etc. (*στροβίτος*; Wirbel od. Wirtel, aber auch Betäubung — beschwert b. Räuchern d. Kopf, Wtst.).
- Strophanthus** Pers., Desv. (Apocyneen, V. 1) „Drehblumen“-Hundswürger (*στροσφή*; Drehung, *ἄνθος* — d. Kronzipfel mit gedrehten Schwänzen), Warmh. dichotomus DC. (Echites caudata L.), capensis A. DC. etc.
- Strumaria** Jacq. (Amaryllid., VI. 1) „Kropfllilie“ D. (struma Kropf — d. Griffel in d. Mitte m. solchem), z. B. spiralis Ker (Haemanthus

- spir. Ait.), filifolia Jacq. (Leucojum strumos. L., Crinum tenellum L. f.
- Struthiopteris** W. (Farne, XXIV. 1) „Strauss“-F. (struthio Strauss, *πτέρις* Farn — grosse Wedel), Zier. S. germanica W. u. pennsylvanica W., s. Osmunda Struth. L.
- Strychnos** L. (Apocynen, V. 1) Krähenauge (*στοιγγος* Diosc. eine Pfl. v. *στοίγω* reisse herum Leun. wegen der narkot. Wirkung), S. Nux vomica L. „Brechnuss“, fr. noix vomique, e. vomice-nut, S. Ignatia Berg. (Ignatia amara L.) Fiebernuss, fr. noix d'ignace, S. colubrina L. f. (Lignum col. Blackw.) „Schlangenhholz“.
- Stuartia** l'Hér. s. Stewartia Cav.
- 1) **Sturmia** Rehb. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) Knielippe, Gelbkiel (n. d. Nat. Jak. Sturm in Nürnberg, † 1848, s. d. Aut.), z. B. Loeselii Rehb. „Lösel's“ Glanzkraut, s. Liparis Rich. 2) **Sturmia** lucida G. f. (Rubiaceae. Guettardeen, V. 1), s. Laugeria luc. Rz. Pv.
- Stylidium** Sw. (Plumbagineen Stylidieen, XX. 2) „Säulenblume“ (*στύλιος* Säule, *εἶδομαι* erscheine — d. Blüthe in eine Säule verwachs.), Zier. S. fasciculatum u. Armeria Pers., s. Stylis Poir., auch s. Candollea Armeria Rich. u. Ventenatia Sm.
- Stylolëpis** Lehm. (Compos. Senecionid., XIX. 2) „Stielschuppe“ (zu *Podolëpis* DC.) (*στύλιος* u. *λεπίς* Schuppe — d. Anthodiumschuppe. m. drüsig. Stielen), z. B. gracilis Lehm.
- Styphelia** Sm. (Epacrideen Styphelieen, V. 1) „Hartheide“ (*στυφελός* hart, fest — d. Frucht betr.), Zier. S. tubiflora u. splendens Sm., s. Epäeris, Monotoca R. Br., Ventenata Sm. etc. — Stypheliëae Rehb.
- Styphnolobium** Schott (Cassieen, X. 1) „Sauerhülse“, s. g. Schnurhülse (*στυφνός* od. *στοιφνός* sauer, herb, *λόβιον* Hülse — dies. m. herb. Mark), s. Sophora R. Br.
- Styrax** T., L. (Sapotac. Styracineen, X. 1) „Storaxbaum“ (n. d. arab. assthirak, od. v. stiria Eiszapfen od. Tropfen, Wst. — weg. d. austretend. Harzes), S. officinalis L. Apothek.-St. u. S. Benzoïn Dryand.
- Suaeda** Pall., Forsk. (zu Chenopodium L.) (Chenopodiëen, V. 2) „Strand-Soda“, Meerstrands-Gänsefuß M.-Rehb. (v. d. arab. souad Soda), S. maritima s. chenopodioides Pall. (Salsola mar. M.-B.).
- Suber** T. (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) Korkeiche, fr. phello-drys u. liège, e. cork-tree (suber Kork — liefert in d. Rinde Kork, s. g. Pantoffelholz).
- Subularia** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) „Pfriemenkresse“ (subula Pfriemen — bez. d. Stengelblätt.), z. B. aquatica L.
- Succisa** Vaill. (zu Scabiosa L.) (Dipsaceen, IV. 1) Teufelsabbiss, Sumpfschabiose, fr. succise, mors du diable, e. devil's-bit (succisus unten abgestutzt — gestutzte Wurzel).
- Succulentae** Bartl. „Saft“- od. Fettpflanzen (succulentus saftig).
- Superflua** L., XIX. 2, Ord. der „Überflüssigen“ (Strahl- wie Scheibenblüthen fruchtbar) (superfluus überflüssig).
- Suriana** L. (Thymeläac., X. 4) „Surian's“ Seidel (n. Joh. Donat. Surian, Arzt in Marseille, Mitarb. Plumier's), z. B. maritima L., s. Thymelaea Sloan. (Str. Südä.). 2) **Sur.** Jacq. (Terebinthaceen).
- Sutherlandia** R. Br. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Sutherland's“ Blasenstr. (n. d. Herzog Jam. v. Sutherland in Edinburgh, beschr. 1683 d. Pfl. s. Gartens), Zier. S. frutescens R. Br. (Colutea frut. L.), fr. bague-naudier d'Ethiopie, e. shrubby bladder-Senna.
- Swainsonia** Salisb. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Swainson's“ Blasenstr. (n. d. Zücht. Isaac Swainson zu Ende d. vor. Jahrh.'s), Zier. S. purpuræa Sal. u. Greyana Lind., s. Colutea L. u. Loxidium Vent.
- 1) **Swartzia** W. (-zia Rehb.) (Mimoseen Swartzieen, XXIII. 1) „Swartz“-Mimose, Cocoholz, Eisenholz von Cayenne, Panacocoholz (n. d. Prof.

- Ol. Swartz in Stockh., s. d. Aut.), *S. tomentosa* W. etc. 2) **Swartzia** Schreb. (Solaneen, V. 1), z. B. *grandiflora* Gm. (Solandra gr. Sw.). 3) **Sw.** Hedw. (Moose, XXIV. 2), s. *Cynodontium* Hedw.
- 1) **Sweertia (Swertia) L.**, Pers. (Gentianeen, V. 2) Sumpf- od. Flügelstiel-Enzian, Tarant O. W. (n. d. holl. Gärtn. Em. Sweert, schr. 1612 Florilegium etc., s. d. Aut.), Zier. *S. perennis* L., fr. *Swertie vivace*, e. perennial Fell-wort. 2) **Swertia** Ludw. (Compositen).
- Swietenia L.** (Cedrelaceen od. Meliaceen, X. 1) Mahagonibaum (n. Gerh. v. Swieten in Leiden, † 1772), *S. Mahagoni* L., fr. *acajou à meubles*, e. mahagony, *S. febrifuga* Roxb. Fieberrindenb.
- Syāgrus Mart.** (-um Dietr.) (Palmeen, XXI. 6) „Saurüden“-P. (v. *σύν-α-γρος* wilder Eber u. Saurüde, od. *Syagrus*, nach Aelian vorhomer. Geschichtsschr. d. Trojan. Kriegs?), z. B. *cocoides* Mart. (Bras.).
- Sycomōrus** (sc. *Ficus*) L. (Urticac. Artocarpeen, XXIII. 3) Maulbeerfeige, Stamm-, cypr. od. egypt. Feige, fr. *sycomore*, e. *sycamore* (-camine) (v. *σύνος* Feige u. *Morus* Maulbeere — Maulbeerblätt. u. Feigenfrüchte!), s. *Ficus cypria* Rauw.
- Symphocalyx** (st. **Symphyc.**) Berland. (zu Rüb. Rmpl.) (Ribesiace., V. 1) „Verwachskehl“ Goldtraube (*σύνκλις* verwachsen u. *κόλις* Kelch), Zier. *S. s. R. aurēum* Pursh u. *tenuiflorum* Ldl., s. *Chryso- botrya* Lindleyana Spach.
- Symphoria** Pursh, Spr. (Caprifoliace., V. 1), Peterstrauch, Schneebeerenstr. (v. *σύνφορά* Versammlung — näml. v. Beeren), Zier. *S. racemosa* Pursh, glomerata ds., s. *Symphoricarpus* Dill.
- Symphoricarpa** Neck. (-pus Dill., Mchx.) (Caprifoliace., V. 1) Peter- od. Schneebeerenstr., Wachsbeerenstr., fr. *symphorine*, e. St. Peter's-wort (s. eb. u. *καρπός* Frucht), Zier. *vulgaris* Mchx. m. v. fol. varieg., *racemosus* Mchx. (alba Raf., *leucocarpa* Hort., *Symphoria* rac. Pursh), s. *Lonicera Symphoricarpus* L.
- Symphiandra** A. DC. (Campanulaceen, V. 1) „Verwachsmännige“ (v. *σύνφυις* u. *άνθη*, -δούς — d. Antheren zu ein. lang. Röhre verwachs.), Zier. *S. pendula* A. DC. (Campanula p. M.-B.).
- Symphysogynae** A. Rich. sc. Monocotyledonae DC., „Verwachsweibige“ (*σύνφυσις* u. *γυνή*).
- Symphytum T., L.** (Boragineen, V. 1) Beinwell, Wallwurz, fr. *symphyte*, *consoude royal*, herbe du Cardinal, e. wall-wort, consound etc. (*σύν-φυτον* v. *σύνφύω* wachse zusammen — heilt Beinbruch), wild u. Zier. *S. officinale* L. m. v. *purpureum* Hort. u. v. *coccineum*, Zier. *aspernum* Sims m. v. fol. varieg., *caucasicum* M.-B. s. *orientale* L.
- Sympiēza** Lichtenst. (Ericaceen, IV. 1) „Pressheide“ (v. *σύνπιέζω* drücke zusamm. — näml. d. Staubf. an d. Krone, Wst. zusamm. gedr. Kelche), z. B. *capitella* Licht. (*Blaeria bracteata* L.).
- Symplocarpus** Salisb., Nutt. (Araceen, XX. 9) „Fruchtvereinigung“ (*σύνπλοκή*) Verknüpfung, *καρπός* — d. Beeren, vereinigt), Gewächsh. foetidus Sal. (*Pothos foet.* Sims), s. *Dracontium* f. L.
- Synplōcos** L. (Styraceen od. Lucumeen, XVIII. 4) „Staubfadenring“ (*σύνπλοκος* verflochten — näml. d. Staubfäd. an d. Basis), z. B. *martinicensis* Jacq., *tinctoria* l'Hér. (Hopea t. Pers.) etc.
- Synandrae** A. Br. i. q. *Synantherae* Rich. „Verwachsbeutelige“ (*σύν* zusammen, *άνθη*, -δρός Mann etc.).
- Synantherae** Rich., Juss., s. *Syngenesia* L. Röhrenbeutelige Korbblüter (s. eb. — d. Staubb. in e. Röhre verwachsen).
- Syngenesia** L. Kl. d. „Verwachsbeuteligen“ (v. *σύνγενής* zusammengewachsen — näml. d. Staubb.).
- Synpetälae** Rehb. Ganzblumige (*σύν* zusammen, *πέταλον* Kronblatt — diese bild. ein Ganzes!).

**Syntherisma** Schrad., Walth. (Gräser, III. 2) Bluthirse (v. *συνθηροέω* gehe mit auf d. Jagd — wird mit gemäht zu Viehfutter), z. B. ciliare Schrad. (*Digitaria cil.* Kön., *Panicum c.* Retz.), s. *glabrum* Schrad. (*Digit. humifusa* Rich.) etc.

**Syrenia** Andr. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Syrenie“, Lackrute (*Anagramm v. Erysimum*), z. B. *angustifolia* Rehb. etc., s. *Cheiranthus*.

1) **Syringa** L. (Oleaceen, II. 1) Nägelein, span. Flieder, Lilak, fr. lilas, e. lilac (-lach) u. staff-tree (v. *σύγγυς*, -*γγος* Röhre — Form d. Blüte?), Zier. *S. vulgaris* L. m. v. v. (z. B. *alba* Hort.), *persica* L., e. persian jasmin, m. v. *laciniata* Hort., *rothomagensis* Renault (chinens. W., *dupia* P.) (wahrsch. Hybride d. beid. vor.), *Rouen-flieder* m. v. lilas royal „Königsflieder“. 2) **Syringa** *suspensa* Thb. = *Forsythia susp.* Vahl (Oleaceen, II. 1). 3) **Syringa** *amurensis* Rupr. = *Ligustrina am.* Reg. (Oleac. II. 1). 4) **Syringa** T. = *Philadelphus* L. (Philadelphéen, XII. 1) Pfeifenstrauch (— Holz z. Pfeifenröhren).

**Syurus** Endl. (Gräser, III. 2) (zu *Lepturus* R. Br.) „Sauschwanz“ (*σὺς*, -*σο*; Schwein, *οὐρά* Schwanz).

**Tabernaemontana** L. (Apocynen, V. 1) „Tabernämontan's“—Milch- od. Kaoutschukbaum (n. Jac. Th. *Tabernaemontanus* „aus Bergzabern“, Leibarzt d. Pfalzgraf. Joh. Casimir, † 1590), z. B. *utilis* Walk.-Arn., s. *Galactodendron* ut. Kth., *elastica* Spr. (*Urceola el.* Roxb.) etc., s. *Nerium* u. *Cameraria* L.

1) **Tacamahaca** Spach (subgen. v. *Populus* L.) (Salicineen, XXII. 7) Balsampappel (vaterl.), z. B. *P. balsamifera* L. 2) **Tac.** (Guttiferen, XI. 1) (Name in Ostind.).

**Tacca** Forst. (Taccaceen od. Aristolochieen, VI. 1) tahitisches Arrowroot od. = Salep Leun. (malay. Name d. Pfl.), z. B. *integrifolia* Ker (Ostind.), *pinnatifida* Sw. (*Leontice leontopetaloides* G.). — *Taccaceae* Presl.

**Tacsonia** Juss. (Asclepiad. Passifloreen, XVI. 2) „Tacsonie“ (*tacso* peruan. Name einer Art), Warmh. *T. insignis* Maxw. (Peru), *quitensis* Maxw. u. *Vanvolxemii* Hort. (Neugran.) etc.

**Tacsonioides** DC. (zu *Passiflora* L.) „Tacsonienleiche“ (s. eb.).

**Taeda** (sc. *Pinus*) L. (Coniferen, XXI. 9) Weihrauch- od. Terpentinkiefer, fr. *pin de l'encens*, e. frank-incense-Pine (*Loblolly*-, in Amer. *Oldfield-Pine*) (*taeda* Kienfackel).

**Tagetes** T., L. (Compos. Tageteen, XIX. 2) Sammetblume, s. g. Studentenbl., Totenbl. D., Afrikane od. Tuneserbl., stinkende Hoffahrt etc., fr. *fleur africaine* (- de Tunis, - de Rome), e. french-marigold *pass-velours* u. *velvet-flower* (v. Tages, -*ētis* Enkel Jupiter's, schön. Jüngling, etrusk. Gottheit Myth.), Zier.: *patula* L. m. v. v., *lucida* Cav., *erecta* L. m. v. fl. pl., etc., s. *Ozölis* Spr., *Enalcida* Cass. u. *Boebëra* W. — *Tagetëae* Rehb., -*tinëae* Cass.

**Talinum** Ad., Juss. (Portulacac., XI. 1) Blüten-Portulak, Brautpfl. Leun. (v. *θαλίνα* Blüte? Wtst. Name d. Pfl. am Senegal), Zier. *T. patens* W. (*Calandrinia Andrewsii* Hort.) u. *spectabile* Ott.

**Tamarindus** L. (Cassieen Cäsalpinieneen, III. 1) „Tamarindenbaum“, Sauerdattel Wolff, fr. *tamarindier*, e. Indian-date u. *tamarind* (v. d. arab. *tamer* Dattel u. hindi indisch), *T. indica* L., *Intsia* Spr. (*Metrosidëros amboinensis* Rumph., *Rumphia amb.* L., P.).

1) **Tamariscus** T., All., Lam., s. *Tamarix* Desv. 2) **Tamariscus** *aethiopicus* (Compos. Segregaten, XIX. 5), s. *Stoebe cinerea* s. *ericoides* L. (*Eupatorium eric.* Breyn.) (s. sogl.).

- Tamarix** Desv. (Aizoideen Tamariscineen, V. 3) „Tamariskenbaum“, fr. tamaris, e. tamarisk (v. Tamaris, jetzt Tambro, Fluss d. Pyrenäen, an dessen Ufern wachst., Wtst. n. d. Volk der Tamarisker dort), Zier. T. gallica L. (pentandra Pall.), fr. athle, T. germanica L. (decandra Mneh., Myricaria germ. Desv.), tetrandra Pall. m. v. v. (Oligadeniae Ledeb. „wenigdrüsige“), africana, chin. etc. (Decadeniae Ledeb. „zehndrüs.“).
- Tamus** L., Ait., l'Hér. (Tamnus Juss., Dietr.) (Smilaceen, XXII. 6) Schmeer- od. Stickwurz, fr. tame (-mier), e. black-bryony, choke-weed etc. (gr. *θάμος* od. *θάμρος*, Tamnus Plin. Kletterstr. m. Beeren), Zier. T. Elephantipes l'Hér. (Testudinaria Elephantopus Burch.), s. Dioscorēa Spr., T. communis L. gem. Schmeerwurz.
- Tanaëctum** L. (Compos. Anthemid., XIX. 2) Rainfarn, Wurmkraut Vilm., fr. tanaisie, herbe aux vers, e. tansy (n. J. Bauhin st. *ἀθανασία* Unsterblichk., schwerl. *ταναός* lang u. *ἀζή* Spitze od. *ἀζέομαι* heile — bleibt lang frisch etc., Wtst.), Zier. T. vulgare L. m. v. crispum Hort., fr. Barbotin, e. common tansy, T. annuum L. (Balsamita ann. DC., Athanasia a. Hort.).
- Tapia** Plum. (sc. Crataeva) L. (Capparideen, XI. 1) Stinkapfel, Totenbaum D., Knoblauchsbirne, fr. tapin (-nier), s. Apioscorödon Pluk. u. f. Tapia arborea triphylla Plum. (vaterl.).
- Taralëa** Aubl. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) Tongabohne (Name bei d. Galibis tarala), s. Diptërix Schreb. u. Dalbergia L.
- Taraxäcum** Hall., Juss. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) Löwenzahn, Röhrenkraut, Pfaffenöhrlin Seub., Milchbusch Rmpl., fr. dent de lion, e. dandelion od. lion's-tooth u. cucullate-flower (v. *ἀράξις* Bauchgrimmen u. *ἀζέομαι* heile), T. officinale Web. (Leontodon Taraxacum L.), fr. pissenlit „Bettpisser“ u. salade de taupe „Maulwurfssalat“.
- Tarchonanthus** L. (Compos. Tarchonantheen, XIX. 2) „Tarchon“- od. Tarragonblume, Pelzsame D. (v. Tarchon arab. Name für Tarragona in Spanien, Wtst. tarchon = Artemisia Dracunculus od. Esdragon), T. camphoratus L.
- Tatula** (sc. Datura) L. (Solaneen, V. 1) blassblauer Stechapfel (Gart. Zier.) (schwerl. dem. v. *τάτα* Väterchen, sond. v. d. arab. tatorah, lat. tatula = Datura).
- Taxodium** Rich. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Eiben- od. Sumpfcypresse, Sumpfeeder, fr. chauve od. cyprès d'Amérique, e. deciduous cypress (*τάξος* Eibenb. u. *εἶδουαι* gleiche), Zier. T. distichum Rich. m. v. v., s. Cupressus s. Schubertia Mirb. disticha.
- Taxus** T., L. (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) Eibenbaum, Ibe Vilm., Taxus, fr. if, e. yew od. ewe-tree (gr. *τάξος*; i. q. *συιλιάξ* Eibe, v. *τάξις* Reihe — Stellung d. Nadeln, Wtst. angebl. v. *τόξον* Pfeil od. Bogen), Zier.: T. baccatus L., fr. If commun, m. v. v., T. canadensis W. (baccata minor Mehx.) etc. — Taxäe Rehb., -inæ ds.
- Tazetta** (Tazzetta) (sc. Narcissus) L. (Amarylhideen, VI. 1) Tross- od. Dolden-Narzisse, fr. Narcisse à bouquet od. - de Constantinople (dem. v. Taza span. d. Tasse — Form d. Nektariums!), s. Hermione Taz. Haw. u. Narcissus orientalis Hort.
- Tecoma** Juss. (zu Bignonia Rehb.) (Bignoniaceen, XIV. 2) Trompeten-Jasmin (mex. Name tecoma cochitl „Bettpisser“ — harntreib. Wurzeln! Leun.), Zier. T. radicans Juss. m. v. v., fr. Jasmin trompette od. - de Virginie, e. trumpet-flower, grandiflora Sweet (Bignonia gr. Thb. s. chinens. Lam.).
- Tecophilaea** Bert. (-ëa Endl., Lindl.) (Irideen, III. 1) „Kindlieb“, Topfbl. T. Cyanocrocus Bert. Blau-Crocus (*τέζος* Kind, *γυλιέω* liebe, Wtst. n. Tecophila Billotti, Tocht. d. Bot. Al. Colla).

- Tectona** Sm. (-nia L. f.) (Verbeneen, V. 1) „Teakbaum“, „Thekab.“, ind. Eichenb. Leun. (tecca d. Namen dies. Schiffsbauholzes in Malabar), T. grandis L., s. Theka Hort., Kew. etc.
- Teedia** Rudolph (Scrophularineen, XIV. 2) „Teedie“ (n. d. Bot. J. G. Teede in Portugal, † in Surinam), T. lucida Rud., s. Capraria l. W., Herzblume D. (Borkhausenia Roth).
- Teesdalia** R. Br. (bess. -Iëa Grck.) (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Zwerg-Bauernsenf, Rahle O. W. (n. d. engl. Bot. Rob. Teesdale, † 1804), z. B. nudicaulis R. Br. (Ibëris nud. L.), T. Lepidium R. Br. (Guepinia Lep. Desv.).
- Teganium** Schmidel (Convolvulaceen, V. 1) „Tiegelchen“, niederlieg. Schellenblume T. procumbens Schmid. (τηγάριον dem. v. τηγάρον Tiegel — d. Eierstock in ein. fleisch. hypogyn. Scheibe), s. Nolana prostrata L. (Walkesia Ehret., Neuendorffia peruv. repens Ad.).
- Telanthëra** (Teleianth.-) Reg. (Amarantaceen, XXI. 5) (zu Alternanthëra R. Br.) „Vollantheren“-Amarant (τελειός vollendet, άνθηρούα — alle Antheren vollständig!), Blattpfl. versicolor Reg.
- Telebölus** s. Thelebölus!
- Telekia** Baumg. (zu Bupthalmum Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Telekie“, Rindsauge (n. d. ungar. Grafen Teleki v. Szek), Zier. T. speciosa Baumg. (Buphth. sp. Schreb. s. cordifolium W. K.).
- 1) **Telephium** (sc. Sëdum) L. (Sedeen, X. 5) Fetthenne, e. live-ever (-long). 2) **Tel. Imperati** L. (Paronychieen, V. 1) wechselblättr. Telephium Leun. (gr. τηλέφιον i. q. -φιλον „ferne Liebe“, F. W. Riemer, Plinius: n. Telephos, von Achilles verwund. Könlg v. Mysien, Fraas: i. q. Cerinthe aspera! Wst.). — Telephiëae DC. (sc. Paronychiacëae St. Hil.).
- Telfairia** Hook. f. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Telfairie“ (n. d. irisch. Bot. Ch. Telfaire, † 1833), s. Feuillëa peltata s. Jollifia Boj.
- Telmateja** (sc. Equisetum) Ehrh. (Equisetaceen, XXIV. 1) grossscheidiger Schafthalm (τελματιαίος in Sumpf wachsend), s. Equis. maximum Lam.
- Telmatophäce** Schleid. (Lemnaceen, II. 1) „Teichlinse“ (τέλμα, -ατος Teich, γαζή Linse), T. gibba Schl. (Lemna g. L.).
- Telopëa** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Weithinsichtbare“ (τέλος Ferne, όπτεω sehe — in d. Auge fallend rotblühend), T. speciosissima R. Br. (Embothrium spec. Sm.).
- Tenageia** (sc. Juncus) Ehrh. (Juncaceen, VI. 1) Sumpfbirse (v. τέναγος Sumpf), s. Juncus gracilis s. Vaillantii Thuill.
- Tephrosia** Pers. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Aschenblatt“, surinam'scher Giftbaum Leun. (τέφρα od. -η Asche — aschgrau behaart), s. Galëga, Robinia u. Indigofëra.
- Terannus** P. Br., Schreb. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Weich“- od. Laubenbohne D. (v. τεράμων od. -μός weich, gut zu kochen, Wst.: reichbehaart, od. v. τεραυρον od. -ουρον Zelt, Laube — wozu in Jamaika gebr.), T. volubilis Sw., s. Phaseölus hirtus Plum. s. Dolichos uncinatus L.
- Terebinthus** T. (sc. Pistacia) L. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Terebinthe“, Terpentin-Pistazie, fr. térébinthe (gr. τερεβινθος v. τερέω bohre od. schneide an — dass Saft fliess). — Terebinthacëae DC., -thinae Endl.
- Terminalia** L. (Combretac. od. Myrobalaneen, XXIII. 1) „Gipfelbündel“, Catappabaum (Katappenb. Perring), indian. Tintenholz od. Mandelb. (v. terminus Spitze — bez. d. Blätterstands an d. Zweigen), T. Catappa L. (Amygdalus ind. Raj.), s. Myrobalanus Fatraea Poir., T. Bezoin L. s. angustifolia Jacq.

- Ternatēa** T. (sc. Clitoria) L. (Legumin. Glycinieen, XVII. 4) „Ternate“-Schamblume, Blaublume, fr. fleur-bleue (n. d. Molukken-Insel Ternate).
- Ternstroemia** L. f., Mut. (Theaceen Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Ternstroemie“ (n. d. schwed. Reis. in Ostind. C. Ternstroem, † 1745), T. meridionalis Sw. u. japonica Thb. (Cleyera j. Thb.). — Ternstroemiaceae DC., -miēae (sc. Theaceae) Rchb.
- Terpanthus** Mart., Nees (Rutaceen Diosmeen, V. 1) „Reiz“- od. „Lustblume“ (τεπρινός reizend etc., ἄριστος — schöne, wohlriech. Blüten), T. jasminodorus Mart. (Spiranthera odoratissima St. Hil.).
- Testudinaria** Salisb. (Dioscoreen od. Smilaceen, XXII. 6) „Schildkrötenwurz“, Elephantenfuss-Schmeerwurz (v. testudo, -inis Schildkröte — Form d. Wurzelkopfs), T. elephantipes Ait. (Tamus el. l'Hér.).
- Tetracera** L. (Dilleniaceen, XXII. 12) „Vierhornkapsel“-Strauch, Raspelstr. D. (τέτρα vier, ζέπος Horn — krummvierhörn. Kapseln), T. potatoria W. (Dillenia scandens autt.) Brunnenb. Leun.
- Tetradynamia** L., XV. Kl. „Viermächtige“ (s. eb. u. δύναμις Stärke — unter 6 Staubgef. 4 grössere!).
- Tetragonia** L. (Aizoideen Tetragoniaceen, XII. 4) „Vierecksfrucht“ od. -blatt (s. v. u. γὰρος od. γωρία Ecke — Fr. vierkantig geflügelt!), s. Tetragonocarpus Comm., cult. T. expansa L. neuseeländ. Spinat, s. Demidovia tetragonoides Pall. — Tetragoniaceae Rchb.
- Tetragonolobus** Scop. (zu Lotus Rchb.) (Legumin. Loteen, XVII. 4) Flügelhülse, Spargelerbse, -bohne, Sparz O. W. (s. v., λοβός Hülse — diese geflügelt vierkantig), T. siliquosus Roth (Lotus siliq. L.) u. purpureus Mch.
- Tetrahit** Dill. (sc. Galeopsis) L. (Labiaten, XIV. 1) breitblättr. Hohlzahn, gem. Daun, Hanfnessel (τέτρα u. ἄρις Runde — vier Blätter in d. Runde od. vierkant. Stengel, nicht te u. trahit „täuscht dich“).
- Tetralix** (sc. Erica) L. (Ericaceen, VIII. 1) Sumpf-Glockenheide Græk., „Vierdraht“-Heide, vierblättr. H. Vilm., fr. bruyère des marais, e. four-leaved od. cross-leaved heath (s. v. u. ἑλίξ Drehung — d. Blätter zu vieren in Reihen).
- Tetrandria** L., IV. Kl. „Viermännige“ (s. v. u. ἀνῆρ, -δρὸς Mann, Staubgefäss).
- Tetranema** Benth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Vierfaden“ (s. v. u. νῆμα Faden — Gegensatz zu Penstemon „Fünffaden“), z. B. T. mexicana Benth. (Penstemon mex. autt.).
- Tetranthera** Jacq. (Lauraceen, IX. 1) „Vierantheren“-Lorbeer, Topf- od. Talg-L. Leun. (s. v. ἀνθήρα Staubbeutel — d. Antheren vierfächerig), z. B. trinervia Spr., s. Laurus Myrrha Lour. s. Litsēa ceylanica Nees.
- Tetrapeltis** Wall. (Orchideen, XX. 1) „Vierschild“-O. (s. v., πέλιτι Rundschild — vier Pollenmassen an gemeins. Drüse), z. B. fragrans Wall. (Nepal).
- Tetraphis** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Vierzahnmoos“ (s. v. u. ὄαρις Nadel — 4 spitze Peristomzähne), z. B. Browniana Brid. (ovata Hook.), s. Tetrodontium Brid. — Tetraphidēae Schimp.
- Tetraptēris** Cav. (-ra Dietr.) (Malpighiaceen, X. 3) „Vierflügel“ D. (s. v. u. πτερόν Flügel — d. Kaps. m. 4 gekreuzt. Flügeln), z. B. acutifolia Cav. etc., s. Trioptēris Spr.
- Tetrathēca** Sm. (Tiliaceen od. Tremandrac., VIII. 1) „Vierzellen“-Anthere, „Vierbüchse“ Perring (s. v. u. θήκη Büchse etc. — d. Antheren vierfäch.), z. B. ericifolia Pers. u. juncēa Sm. (Neuholl.).
- 1) **Teucrium** L. (Labiaten, XIV. 1) Gamander, Bergsalbei, Bathengel, Frauenbiss, fr. germandrée od. calamandrier, e. germander (τέριζιον n. d. Trojan. Frinzen Teucer ben., Plinius), Zier. T. Chamaedrys

- L. Edel-Gamander od. Feldeypresse, Topf: T. Marum L. (Marum verum Hort.) Katzen- od. Mastixkr. 2) **Teucr.** (sc. Veronica) L. (Scrophularineen, II. 1) breitblättr. Ehrenpreis, fr. teucrlette Erdweihrauch Wolff, s. Teucris u. Teucropsis Benth.
- Teutliopsis** Celak. (zu Atriplex L.) (Atripliceen, XXIII. 1) „Mangoldgleiche“ (*τευτλίωv* lat. Beta Mangold od. Bete u. *ὄψις* Aussehen), z. B. A. litorale L., patulum L. etc.
- Thalamia** Spr. (Cupressineen Taxaceen, XXI. 9) „Ruder“- od. Thränenbaum (v. *θαλαμία* Ruder — dazu dien. Holz? Wtst.: v. *θαλάμιος*; Lager — becherf. Scheibe d. Eierstocks), z. B. asplenifolia Lab. (Podocarpus aspl. Lab.) (B. Neuholl.), s. Dacrydium Sol.
- Thalamiflorae** DC. „Bodenblütige“ od. „Fruchtbodenblütler“ Grck. (s. eb. u. floreo blühe — d. Blütenteile alle auf d. Blumen- od. Fruchtboden stehend).
- Thalia** L., Schreb. (Marantaceen od. Cannac., I. 1) „Thal“-Pfeilwurz, fr. Thalie (n. d. deutsch. Arzt J. Thal, lat. Thalius, schr. 1588 Verz. d. Harzpf.), Zier.: cannaeformis W. (Phrynium dichotomum Roxb.), dealbata Sowerb., s. Pteronia stricta Réd. s. Maranta racemosa.
- Thalictrum** T. (Ranunculaceen, XIII. 7) Wiesenraute, Wielandskraut O. W., fr. thalictron od. pigamon, e. meadow-rue (gr. *θάλικτροv* v. *θάλλω* grüne — besond. frischgrüne Sprossen), Zier.: T. aquilegifolium L. m. v. v., fr. colombine plumacée od. plumeuse, Stuben anemoides Mchx. v. fl. plen., wild T. minus L., flavum L. etc.
- Thallophyta** Endl. „Lagerpflanzen“ (*θαλλός*; Zweig, Thallus d. Flechten etc., *φυτόv* Pfl.).
- Thapsia** T., L. (-ium Nutt.) (Umbelliferen, V. 2) Laser- od. Böskraut, Liebstockel (gr. *θαψία* Diosc., n. d. Insel Thapsus ben.), z. B. villosa T., fr. malherbe, T. Asclepium L. „Aeskulap's“-Böskr., s. Panax Ascl. apulum Col., actaeafolium Nutt. (Ligusticum act.), atro-purpureum etc.
- Thapsus** (sc. Verbascum) L. (Scrophularineen, V. 1) Königskerze, kleinform. Wollkraut Grck., fr. chandelle royale od. molène, e. high-taper etc. (gr. *θάψος* Wollkr., Kr. d. Ins. Thapsus).
- Thea** L. (Theaceen od. Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Theestrauch“, fr. thé, e. tea (chines. Nam. teha, nicht etwa *θεά* Göttin!), z. B. T. Bohēa L. brauner Thee, fr. thé bou, T. viridis L. (sinensis Blackw.), fr. thé vert u. impérial „Kaiserthee“ (— beide auch Stubenpfl.). — Theaceae Rehb.
- Theka** Juss., s. Tectona!
- Thelala** Alfd. (Hypopithaceen od. Pirolaceen, X. 1) Wintergrün (v. *θηλή* Mutterbrust, Zitze — Aussehen d. Blütenknospen), z. B. rotundifolia Alfd. (Pirola r. L.), chlorantha Alfd. etc.
- Thelobolus** Tod. (bess. Telebolus autt.) (Pilze, XXIV. 4) Weitschneller Kumm. (v. *τέλος*; Ferne, nicht v. *θηλή* Zitze u. *βόλος*; Wurf — werfen kugl. Sporenblasen aus), T. terrestris Tod.
- Thelygönum** Pers. (Urticac. od. Begoniaceen, XXI. 9) „Mädchenschiefblatt“ (v. *θηλή*; weiblich u. *γονή* Geburt — Plinius: sie bewirkt, dass Mädchen empfangen werden), z. B. Cynocrambe Pers. „Hundskohl“.
- Thelyphönum** (sc. Aconitum) Rehb. (Ranunculac., XIII. 3) „Frauentod“ (*θηλυφόρος* Weiber mordend).
- Thelypteris** (sc. Podium s. Acrostichon) L. (Farne, XXIV. 1) „weiblicher“ od. Sumpf-Farn (s. v., *πτερίς*; Farn).
- Thenardia** Kth. (Apocyneen, V. 1) „Thenard's“ Hundswürger (n. d. franz. Chemiker Thenard, Kunth's Freunde), z. B. floribunda Kth., scabra Spr. (Echites sc. Lab.) etc.



- Theobrōma** Juss., L. (Sterculiaceen od. Büttneriac., XVIII. 1) Cacao-  
baum (v. *θεός* Gott u. *βροῦμα* Speise), Th. Cação L. Chokoladebaum.
- 1) **Theophrasta** (-*ea*) L. (Solaneen Ardisiaceen od. Myrsineen, V. 1)  
„Theophrast's“ Myrtenblume, fr. coquemollier (n. Theophrastus, d.  
Vater d. Naturgesch.), Treibh. T. macrophylla Lk. (Bras.), longifolia  
Jacq. (Claviga ornata Don) (Neugran.). 2) **Th. imperialis** Juss. (Dil-  
leniac., XIII. 2), s. Curatella L.
- Thermopsis** R. Br., Don (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) Feigbohnenstr.,  
Fuchsbohne Rümpl. (v. *θερμός* Feigbohne od. Lupine u. *ὄψις* Aus-  
sehen — d. Lupinen ähnl. Kräuter, Wtst.), Zier. T. fabacæa DC.,  
fr. Th. Fève, e. garden-bean-like Th., s. Podaliria u. Sophōra.
- Thesium** L. (Santalaceen, V. 1) Leinblatt, Verneinkraut, Vermainkr.  
O. W. (v. *θηξ* Sklave — weg. gering. Ansehens, n. Athenäus v.  
Theseus, welch. der Ariadne ein. Kranz daraus gab, Wtst.), T. Lino-  
phyllum L., etc.
- Thespesia** Corr., Spr. (Malvaceen, XVI. 8) Kirchen-Malve, -pappel (v.  
*θεοπέσιος* göttlich — um Kirchen gezogen, Wtst.: herrl. gelbe Bl.  
m. rotteck. Basis!), T. populneā Corr. (B Ost- u. Westind.), s.  
Hibiscus p. L.
- Thladiantha** Bung. (Cucurbitac., XXI. 10) „Quetschblüte“ (v. *θλάω*  
zerquetsche, *ἀνθή* Blüte — weg. d. Aussehens? Wtst.: Bunge kannte  
nur ein gepresst. Exemplar), Zier. dubia Bung. (Nordchina).
- Thlaspi** Dill., L. (Cruciferen Silliculos., XV. 1) Täschelkraut, Breittasche,  
Pfennigkraut, Klasper O. W., fr. thlaspie (v. *θλάω* drücke zusam-  
men — Form d. Schötchen!), z. B. T. bursa pastoris L. (Capsella  
b. p. Mnch.), fr. bourse à berger ou pasteur, T. arvense L., cam-  
pestre L. etc.
- Thora** (sc. Ranunculus) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) Gift-Ranunkel, fr.  
thora (st. *θηορά* Verderben — früher zur Vergift. d. Pfeile), s. Ran.  
scutatus W.
- Thrinax** L. f., Schreb. (Palmen, VI. 1) Fächer- od. Schilf-P. (gr. *θρί-  
ραξ* Dreizack — Fächerform d. Blätt.), Stub. T. parviflora Sw., argentea  
Lodd. etc., s. Corypha palmea P. Br. (span. Palma plateada  
Silber-P.).
- Thrinicia** Roth (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Hundslattich, Zinnen- od.  
Randkrönchen, Zinnsaat O. W. (v. *θρινικός* Zinne, Rand — Standort  
auf Mauerzinnen? Stand d. Samen in einem Kranz auf dem Frucht-  
boden?), T. hispida Roth, s. Colobium h. Roth.
- Thryallis** L. (Malpighiaceen, X. 1) Kurzhähre, Docht pfl. D. (gr. *θουάλλις*  
Docht — weg. Anwendg. d. ähnl. Verbascum zu Dochten), z. B.  
brachystachys u. brasiliensis L.
- Thuja** T., L. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Lebensbaum, Opfer-  
od. Weihrauchbaum (gr. *θυία* v. *θύω* opfere), Zier. T. occidentalis  
L. m. v. v. (Friedhöfe), fr. Cypres arbre de vie, Cèdre américain  
od. blanc, e. western arbor vitae, T. orientalis L. (Biota or. Don)  
m. v. aurea Hort., v. nana u. v. pendula Endl., T. plicata Don, fr.  
Thuja plissé, m. v. nana Hort., T. gigantea Nutt. Riesen-L., s.  
Libocedrus decurrens Torr. etc.
- Thujopsis** Sieb. u. Zucc. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) „Lebensbaum-  
gleiche“, japan. Cypresse (*θυία* u. *ὄψις* Aussehen), z. B. borealis  
Fisch. (Chamaecyparis nutkaensis Lamb.), T. dolabrata S. Z., fr.  
Thuyops. en doloire, s. Phyllocladus dol. Spach.
- 1) **Thunbergia** L. (Acanthaceen, XIV. 2) „Thunbergie“ (n. d. schwed.  
Bot. Thunberg, s. d. Aut.) Stubenklimmpfl. T. alata Boj., Hook. ni.  
v. v. (z. B. Sommerbank: v. Barkeri, Fryeri u. lutea Hort.), Warmh.  
fragrans Roxb. 2) **Thunb. capensis** Montin (Cinchonaceen, V. 1), s.  
Gardenia Thunb. L.

- Thymelaea** Ad., Scop. (sc. Daphne) L. (Thymeläaceen, VIII. 1) Seidelbast, Purgierstr., fr. thyméléé (gr. *θυμelaía* Purgierstr. F. W. Riemer, eig. Daphne Gnidium L.), T. Mezeréum Scop. = Daphne Mez. L., T. Passerina Coss., Germ. = Stellera Pass. L. (Pass. annua Wikst.), T. minor Gessn. = Daphne Cneorum L., etc. — Thymeläeae DC., -leacéae Rehb. Seideln.
- Thymus** T., L. (Labiaten, XIV. 1) „Thymian“, fr. thym, e. thyme (thime u. tyme) (gr. *θύμος* od. -ov Thymian, Wtst.: v. *θυμός* Kraft — stärkende Wirkung!), Gart. T. vulgaris L. m. v. fol. varieg. Hort. u. v. golden-fleece, T. citriodora Schreb. (Mittelmeerl.), Topf: T. Mastichina L. (Span. etc.), etc.
- Thysanacanthus** Planch. (Acanthac., XIV. 2) „Strauss“-Acanthus (*θύσσανος* weinlaubumrankt. Stab u. Acanth.), z. B. barterioides Pl. u. rutilans Lindl.
- Thysselinum** Hoffm. (Thysel.- Ad.) (Umbelliferen, V. 2) „Opfersilje“, Sumpfhhaarstrang, Oelsenich Grck. (v. *θύω* opfere u. Selinum Silje), T. palustre Hoffm., s. Peucedanum p. Mch.
- Tiarella** L. (Saxifrageen, X. 2) „Spitzmütze“ Perring, Turbankapsel, fr. tiarelle (dem. v. tiara pers. Turban — Kapselform), Zier.: cordifolia L., trifoliata L. (Mitella fol. tern. L.).
- Tigllium** Klotzsch, Meyen (sc. Croton) L. (Euphorbiac., XXI. 9) Purgier-Croton, fr. grains de tilli, e. bezoar-nut „Bezoarnuss“, s. Granum moluccanum Rumph. Granatillbaum (n. ein. d. molukk. Inseln, Wtst. n. *τίλος* Diarrhöe — weg. d. Wirkung).
- Tigridia** Juss. (Irideen, XX. 2) „Tigerlilie“, -blume, fr. tigridie od. fleur tigrée (v. *τίγρις*, -ίδο; Tiger — bunt wie Tigerfell), Zier. T. Pavonia Réd. m. v. v., s. Ferraria Tigridia Bot. Mag. (Tigr. grandiflora Hort.), conchiflora Sweet, gelbe T.
- Tilia** L. (Tiliaceen, XIII. 1) Linde, fr. tilleul, e. linden-tree (lime- u. teil-tree) (v. *τίλον* st. *πίλον* Feder od. Flügel — geflüg. Blütenstiele), T. parvifolia Ehrh. (ulmif. Scop. etc.) Stein- od. Winterlinde, m. v. pendula Hort. u. fol. varieg., T. platyphyllos Scop. (grandifolia Ehrh. etc.) holländ. od. Sommerlinde, m. v. v., T. americana L. Schwarzl. Vilhm. (canadens. Mchx. etc.), argentæa DC., Silberl. (alba Waldst. Kit. etc.) etc. — Tiliacéae DC., Rehb., -liæae Rehb.
- Tillaea** Mich. (Crassulaceen, IV. 4) „Tilli's“ Moosblümchen, Moosniedlich (n. M. A. Tilli zu Pisa, † 1740), T. muscosa L.
- Tillandsia** L. (Bromeliaceen, VI. 1) „Tillandsie“, Greisenbart, Packod. Polstermoos Leun. etc., fr. caragate (n. Prof. Elias Til-Lands, lat. Tillandsius, zu Åbo in Finnland), Zier.: T. splendens A. Brong. (Guian.), bivittata Hook., bulbosa v. picta Hook., etc.
- Tilletia** Tul. (Staubpilze, XXIV. 4) „Tillet's“ Weizenbrand, s. g. Schmierbrand (n. Matth. Tillet in Bordeaux, † 1791), T. Caries Tul.
- 1) **Timmia** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Timm's“-Moose (n. d. Bot. J. C. Timm in Malchin, † 1805). — Timmiacéae DC. 2) **Timmia** Gm. (Liliaceen, VI. 1) „Timm's“-Lilie.
- 1) **Tinus** (L. Ericaceen od. Laurineen, IX. 1) Heidenerle (gr. *τινος* lat. tinus Lorbeerschneeballen, v. *τείνω* dehne hinaus — blüht im Winter!), T. occidentalis L. s. Clethra trifolia Sw. 2) **Tinus** (sc. Viburnum) L. (Caprifoliac., V. 1) Lorbeer-Schneeballen, fr. laurier thym od. tin, s. Laurus Tinus Hort.
- Tithonia** Desf. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Aurorablume, fr. tithonie (v. Tithonus Liebling der Aurora od. Göttin d. Morgenröte, Myth. — d. Blum. meist morgenrot!), Zier. tagetiflora Desf. u. tubiflora Hortul.
- Tithymalus** T., Haw. (Euphorbiac., XI. 3 od. XXI. 1) Wolfsmilch (gr. *τιθύμαλος* od. -μαλλος; Wolfsm. v. *τιθή* od. *τιτθή* Amme u. *μα-*

- λός od. *μαλλός* weich — giebt Milch), s. *Euphorbia* L. — *Tithymalæa* Rchb. eigentl. Wolfsmilchpfl.
- Tobira** Kämpf. (Pittosporeen od. Celastraceen, V. 1) (zu Evonymus L.) „Tobira“-Spillbaum (vaterl. Name in Japan), s. *Evonymus Tobira* L. (Pittospörum Tob., Ait.) (Stubenzier).
- Todæa** W., Sw. (Osmundaceen, XXIV. 1) „Tode’s“-Rispenfarn (n. d. Bot. u. Pred. H. J. Tode, † 1797, s. d. Aut.), Zier. T. *africana* W. (*barbara* Moore, *Osmunda totta* Sw.) (Cap), *superba* Col. etc.
- Toffieldia** Huds. (Melanthaceen, VI. 3) „Tofieldie“, Kelchblilie, Kelke O. W. (n. d. engl. Bot. Tofield † 1793), T. *calyculata* Whlbg. Sumpf-T. Grck., *pubescens* Pers. (*Narthecium p. Mehk.*) etc.
- Tolpis** Ad., G. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Borsten- od. Bartpippau (v. Tolp od. Zülpich, *Tolpiacum?* od. *τολυπη* Zwirnknäul? — ungewiss!), Garten: T. *barbata* G. (*Crepis b. L.*, *Drepania b. Juss.*).
- 1) **Toluifera** Lour. (Terebinthaceen, X. 1) Tolubalsambaum, fr. *tolu* (vaterl. *tolu* = Balsam), T. *Balsamum L.* Tolubalsam (n. Tolu, ein. Stadt am caraïbischen Meer ben. Wtst.), s. *Myroxylon toluiferum* Rich. (*Myrospermum tol. Spr.*).
- Tommassinia** Bertol. (Umbellifer., V. 2) „Tommassini“-Dolde (n. d. Bot. Tommassini, s. d. Aut.), z. B. *verticillaris* Bert., s. *Peucedanum vert. Koch.*
- Tordylium** T., L. (Umbelliferen, V. 2) Zirmet, Drehkraut, Kletterdolde, fr. *tordyle*, *codille laiteuse* (gr. *τοοδύλιον* eine Doldenpfl., aus *τὸο-ροσ* Dreheisen u. *ἴλλω* drehe — d. Samen schneckenf. etc.), T. *nodosum L.*, fr. *manchette*.
- Torenia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Torenie“ (n. Olaf Tore, Linné’s Schüler, Reis. in China, † 1753) Ampel T. *asiatica L.*, T. *Fourrieri* Lind. (*edentula*) etc.
- Torilis** Ad., Spr. (Umbellifer., V. 2) Borstdolde, Klettenkerbel (v. *τοορίω* bohre? Wtst. d. *corruipierte* *Caucalis!*), z. B. *infesta* Koch u. T. *Anthriscus* Gm., s. *Caucalis* etc. Crantz, Jacq.
- Toringo** v. Sieb. (sc. *Pirus*) L. (Rosac. Pomaceen, XII. 4) japan. Toringo-Apfel (jap. Name d. Pfl.), s. *Pirus Sieboldii* Reg.
- Tormentilla** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 3) Heidegger, Blutwurz, fr. *tormentille*, e. *tormentil u. sept-foil* „Siebenblatt“ (v. *tormen*, -inis Bauchgrimmen? *tormentum* Bauchweh? viell. besser v. *tormentum* Seil v. *torqueo* drehe).
- Torminaria** Ser. (zu *Pirus s. Sorbus*) (Pomaceen, XII. 4) „Kolikbirne“, Elsbeerbaum Rmpl., fr. *tormal* (*tormen*, -inis Bauchweh — früh. geg. Ruhr), s. *Sorbus torminalis* Crantz.
- 1) **Torreya** Walk. (Taxaceen, XXII. 12) „Torrey’s“-Eibenbaum (n. d. engl. Bot. J. Torrey, s. d. Aut.), T. *grandis* Walk., *taxifolia* Arn., T. *Myristica* Van Houtt. etc. 2) **Torreya** Arn. (Nyctagineen, V. 1), z. B. *paniculata* Spr. (Bras.). 3) **Torr.** Raf. (Cyperaceen, III. 1), z. B. *caespitosa* Raf. (*Cyperus caesp. Torr.*). 4) **Torr.** Spr. (Verbeneen).
- 1) **Tortula** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Drehzahn“-M. (*tortus* gedreht — spiräl. Zähne d. Peristoms), s. *Zygotrichia* Brid. u. *Barbula* Hedw. 2) **Tortula** Roxb. (Verbeneen, XIV. 2), s. *Streptium* Roxb. Drehkrone.
- 1) **Tournefortia** L., R. Br. (Boragineen od. Ehretiaceen, V. 1) „Tournefort’s“ Heliotrop, fr. *pittone* od. *faux héliotrope* (n. d. ber. franz. Bot. J. Pitton de Tournefort, s. d. Aut.), Zier. T. *heliotropoides* Hook., s. *Messerschmidia* L. 2) **Tourn.** Ponted. (Rubiaceen).
- Tourretia** Domb. (-rettia Schreb., W.) (Bignoniaceen, XIV. 2) „Tourrettie“ od. klettenartige Dombeye (n. Marc. Ant. Louis Claret de la Tourrette, bot. Aut. u. Rousseau’s Freund), T. *volubilis* Schr. s. *lappača* W., s. *Dombeya lapp. l’Hér.*

- 1) **Toxicodendron** T. (sc. Rhus) L. (Sumachineen, XXII. 5) m. v. radicans L. „Giftbaum“, wurzelnder Gift-Sumach (*τοξικόν* Pfeilgift, *δένδρον* B.). 2) **Toxic.** pinnatum Mill. (Terebinthaceen Amyrideen, VIII. 1) Giftbalsambaum, s. *Amyris toxicifera* L. (*Elemifera* fol. pinn. Hort. Cliff.). 3) **Toxic.** G. (Sapindac.). 4) **Tox.** Thb. (Euphorbiac.).
- Tozzia** Mich. (Scrophularin., XIV. 2) **Tozzi's-** od. **Alpen-Hahnenkamm** (n. d. Arzt u. Prof. Luc. Tozzi in Neapel, † 1717), *T. alpina* L.
- 1) **Trachélium** (sc. Campanula) L. (Campanulaceen, V. 1) „Halskraut“-Glockenbl., fr. gantélé, gant de Nôtre-Dame u. trachélion, e. throatwort (v. *τραγγίλος* Genick). 2) **Trachelium** L. (Campanulaceen, V. 1) „Halskraut“, fr. trachélion u. herbe aux trachées, z. B. Zier. *T. coerulëum* L. m. v. fl. alb. Hort. (Nordafr.), fr. Trachélie bleue.
- Tradescantia** L. (Commelyneen, VI. 1) „Tradescantie“, Blumenschilf, *T. virginica* L. m. v. v. (Ephemërum *T. phalangioides* Moris.), fr. Ephemère d. Virginie, e. virginian spider-wort, Ampelpfl. *T. guianens.* Miq., discolor l'Hér. m. v. varieg. Hort. (Bras.), zebrina Hort. etc. (n. d. Gärtn. Tradescant Vat. u. Sohn, unt. Karl I. v. Engl., Museum Tradesc. 1656).
- Tragacantha** L. (zu *Astragalus* Rchb.) (Legumin. Astragaleen, XVII. 4) „Bocksdorn“-Traganth (v. *τραγάος* Bock, *άζαργα* Dorn — Blattstiele dornig, Wst. d. ausfließ. Gummi bockshornförmig!), z. B. *argentea* Mill., *Astr. verus*, *creticus* etc.
- Tragium** Spr. (Umbelliferen, V. 2) „Bocksdolde“ (s. eb. — Bocksgeruch d. Pfl.), *T. tauricum* Ledeb.
- Tragopogon** T., L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Bocksbart“, Haferwurz, fr. barbe de bouc (- de dieu), e. goat-beard (s. eb. u. *πάγων* Bart), z. B. *pratensis* L., fr. vignette, *T. porrifolius* L., fr. salsifis, e. salsify, etc. — Samenkronen u. Kelchzipfel langhaarig!).
- Tragopyron (-um)** M. B. (Polygonaceen, VIII. 3) „Bockswitzen“ (s. v. u. *πυρός* Weizen — analog *Fagopyrum* Buchweizen), z. B. *grandiflorum* M. B. (*Polygonum* gr. W.) etc.
- Tragoselinum** T., Mch. (Umbelliferen, V. 2) „Bockssilje“, grosse Bibernelle (s. v. u. *Selinum*), *T. magnum* Mch. (*Pimpinella* m. L.), *T. Angelica* Lam. (*Aegopodium Podagraria* L.).
- 1) **Tragus** Hall. (Gräser, XXIII. 1) Stachelgras (gr. *τραγάος* Bock u. Spelzgrütze etc.), z. B. *racemosus* Desf. (*Cenchrus* r. L., Lappago r. Schreb.). 2) **Tragus** (sc. *Salsöla*) L. (Chenopodiaceen, V. 2) Bocksmelde, i. q. *Salsöla* Kali L. gem. Salzkraut.
- Trametes** (st. *Tremates*) Kumm. (Pilze, XXIV. 4) „Löcherpilz“ (v. *τράμη* i. q. *τρήμα* od. *τρήμη* Loch), z. B. *pini*, *suaveolens* etc., s. *Polyporus* L.
- Trapa** L. (Halorageen, IV. 1) Wassernuss, Drabe, fr. corniole, écharbot, marron d'eau, e. water-nut (- caltrop) (n. d. franz. trape, lat. calcitrapa Fussangel — Stacheln d. Nussfrucht!), *T. natans* L., s. g. Jesuitenmütze, fr. tribule aquatique. — *Trapacëae* Rchb.
- Trauensteineria** Rchb. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Trauensteiner's“-O. (n. Jos. Trauensteiner, schr. d. Weiden Tyrols, Innsbr. 1842), *T. globosa* Rchb. (*Orchis* gl. L.).
- Tremandra** R. Br. (Tiliac. Tremandreen, VIII. 1) „Lochanthere“, Vierkapsel- od. Zellen-Anthere (*τρήμα* Bohrloch, *άνθη*, -δόος Mann, Staubbeutel — diese springen durch ein Loch auf), s. *Tetrathëca* Sm. — *Tremandrae* R. Br. (zu *Tiliacëae* Rchb.).
- Tremella** Dill. (Pilze, XXIV. 7) „Zitterpilz“, fr. tremelle (v. *tremulus* zitternd dem. -mellus), z. B. *lutescens* Pers., *Nostoc* L. Schleimling (Nost. commune Vauch.). — *Tremellini* Fr.
- Trevirania** W. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Treviranie“ (n. d. Prof. L. Chr.

- Treviranus in Bonn, s. d. Aut.), Treibh. *T. coccinea* W., s. *Cyrilla pulchella* l'Hér.
- Trianea** Karsten (Hydrocharideen, XXII. 8) „Trianie“ (n. Dr. J. Triana, schr. mit Planchon Prodr. Flor. Novo-Granatensis, Paris 1862), Aquarien: *T. bogotensis* Karst.
- Trianthema** L. (-um Gaudich.) (Portulacaceen, V. 1 od. X. 2) „Dreiblume“ (*τρία* in comp. *τρι-* drei, *ανθημα* Blume — zu drei in d. Achseln!), z. B. *crystallinum* Vahl (Papularia cr. Forsk.), *decan-drum* L. (*Zaleya* dec. Burm.) etc. — *Trianthemæae* Rchb.
- Trias** Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Dreiecksblumen“-O. (*τρία*: Dreiheit — d. offn. Blumen bilden ein Dreieck), z. B. *oblonga* u. *ovata* Ldl. (Ostind.).
- Tribulus** T., L. (Rutaceen Zygophylleen, X. 1) Burzeldorn, „Dreispiß“ D., fr. tribule od. herse (*τριβόλος* dreispitzig — d. Fr. m. 3 od. 4 Stacheln!), z. B. *Fischeri* Kellogg, *trestris* L., s. g. Teufelsdröckchen.
- Trichera** Schrad. (Dipsaceen, IV. 1) Grindrose (*τρι-* drei u. *ηρα* od. -η Wittwe? Wst. v. *θριξ*, *τριχος* Haar — d. ganze Pfl. haarig), z. B. *arvensis* Schrad. (*Scabiosa* a. L., *Knautia* a. Coult.).
- Trichilia** (-lia) L. (Hesperideen Meliaceen, XVI. 5) „Dreilipp“ (*τρι-* u. *ειλος* Lippe od. *τριχα* dreifach — Narbe u. Kapsel!), *T. moschata* Sw. „Moschusholz“, *alliacæa* Forst. (*Dysoxylon* a. Blum.).
- Trichocladus** Pers. (Hamamelideen, XXII. 1) „Haarweig“-Lorbeer (*θριξ*, *τριχος* Haar, *κλαδος* Ast etc. — weichwoll. Str.), *T. crinitus* Pers., s. g. Stellmacherholzbaum (Str. Cap), s. *Dahlia* cr. Thb.
- Trichoderma** Pers. (Pilze, XXIV. 4) „Haarhaut“, Deckschimmel Leun. (s. eb. u. *δερμα* Haut — d. Sporengehäuse ein Haargeflecht! Wst.), z. B. *viride* Pers., *varium* Ehrbg. s. *laeve* Pers.
- Trichodium** Mchx., Schrad. (Gräser, III. 2) Straußgras (*τριζώδης* voller-Haare — näml. d. Blütenstand!), z. B. *caninum* Schrad. = *Agrostis can.* L.
- Tricholoma** DC. (Pilze, XXIV. 4) Haarsäumling (s. v. u. *λομα* Saum — d. Manschette randst., flockig), z. B. *equestre* „Ritterschwamm“, *pomoniae*, *tigrinum* etc. (essb.), s. *Agaricus* L.
- Trichomanes** R. Hedw. (sc. *Asplenium*) L. (Farne, XXIV. 1) Frauenhaar, Becherfarn D. etc., fr. *trichomane*, e. *tricomanes* (trich.-) (*θριξ*, *τριχος* Haar, *μανος* dünn — dünne, zarte Zweige etc., ihres Aussehens wegen geg. d. Ausfallen d. Haare, Plinius), Zier. *T. spicatum* R. Hedw. s. *spiciferum* Desv. (*elegans* Hook.) (Guin.), s. *Flea polypodina* Bory.
- Trichonema** Ker (Irideen, III. 1) „Haarfaden“-Schwertel (s. v. u. *νημα* Faden — lineargeteilte Narbe des fadenf. Griffels), *T. Bulbocodium* Ker, *Columnae* Rchb. (*Romulea* s. *Ixia* Col. R. u. S.).
- Trichopilia** Lindl. (Orchideen Vandeem, XX. 1) „Haarkappen“-O. (s. v., *πυλιν* klein. Filzhut — Antheren mit einer Haarbüschelkappe), z. B. *Treibh. coccinea* Ldl., *suavis* ds., etc.
- Trichosacme** Zucc. (Asclepiadeen, V. 2) „Haarspitze“ (s. v. u. *ακμη* Spitze — bez. d. Nebenkronen!), *Treibh. lanata* Zucc.
- Trichosanthes** L. (Cucurbitaceen, XVI. 1 od. XXI. 9) Haarwimperblume, fr. *trichosanthe* (s. v. u. *ανθη* Bl. — wimperig gefranste Kronzipfel), z. B. *anguinea* L. s. *colubrina* Jacq. (*Cucumis* a. L.).
- Tricoceae** Endl., Kl. der Schneller od. Springfrüchtler Leun. „Dreikornfrüchtler“ (*τρι-* u. *κόκος* Korn).
- Tricyrtis** Hook., Wäll. (Melanthaceen, VI. 3) „Dreihöckerlilie“ Rmpl., -blume Vilm. (*τρι-* u. *κιστος* bucklig — d. 3 äuss. Blumenblätt. an d. Basis sackhöckerig), Zier. *T. hirta* Hook. (Jap.), fr. *Tr. hérissée*, e. rugged Tr.

- Tridax** L. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Dreibiss“, Dreispalt D. (s. v. u. *δάκος* Biss v. *δάκνω* beisse — Strahlbl. dreizahnig), z. B. *Procumbens* L. (Aster americ. proc. Houst.), s. *Balbisia elongata* W.
- Tridentea** Haw. (Asclepiad., V. 2) „Dreizahn“-Wachspfl., „Dreizack“ D. (*tridens*, -tis Dreizahn etc. — bez. d. Zipfel d. äuss. *corona staminea*), z. B. *gemmiflora* u. *moschata* Haw.
- Trientalis** Rupp, L. (Primulaceen, VII. 1) Siebenstern, „Dreifaltigkeitsblume“ (schwerl. v. *triens*, -ntis Drittel, sond. *triens* „Dreiwesen“ st. *trinitas* Dreifaltigkeit), T. *europaea* L.
- 1) **Trifolium** Ser., Mch. (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Schabziegerkr., blauer Steinklee (deter. v. *trifolium*, sogl.), T. *coerulæum* Mch., s. *Melilotus coer.* Desr. u. *Trigonella* L. 2) **Trifolium** DC., Rchb. (sect. v. *Trifolium* L.), z. B. *repens*, *hybridum* etc.
- Trifolium** T., L. (Legum. Loteen Trifolieen, XVII. 4) „Dreiblatt“, Klee, fr. *trèfle*, e. *trefoil* u. *clover*, auch *shamrock* (*tri-drei* u. *folium* Blatt), z. B. wild u. geb. T. *pratense* L., s. g. deutscher Klee, fr. *mignonet* od. *rougerole* (*tremone*), e. *purple-wort* (-grass), T. *repens* L. weisser od. s. g. Stein-Klee (auch als Zier. m. v. *purp.* s. *atro-purp.*), fr. *triolet*, e. *white clover* od. *honey-stalk*, T. *incarnatum* L. „Inkarnatkl.“, Zier. T. *aurantiacum* Boiss. Schaf- od. Bienenkl., fr. tr. orange, T. *rubens* L. gross. Ähren-, Fuchs- od. Katzenkl., fr. tr. rouge, m. v. fl. albo Hort., wild T. *arvense* L. s. *lagopus* (*Lagopodium* Ger.), s. g. Hasenpfötchen, fr. *pièd-de-lièvre*, e. *hare-foot* od. *trinity-grass*, etc. — *Trifoliæe* (sc. *Lotæe*) Rchb.
- Triglochin** L. (Juncaceen, VI. 3) „Dreizack“, Salzbinse Leun., Kröten-gras, fr. *trocart* (*troscart*) u. *mille-greux*, e. *toad-flax* (*τρί-* u. *γλω-ζῖν* od. -ίς Spitze — bez. d. Kapsel!).
- Trigonella** L. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) Bockshorn-Klee, fr. *trigonelle*, eig. „Dreieckchen“ (dem. v. *trigōnum* Dreieck — wegen d. kleinen Kiels wie dreieckige Blüte), T. *coerulæa* DC., s. *Trifolium* c. Mch. s. *Melilotus coer.* Pers., Schabzieger-Kl., T. *foenum graecum* L. „griechisches Heu“ (offiz. *Foeni graeci semina*).
- Trillium** Salisb. (Melanthaceen od. Smilaceen, VI. 3) „Dreiblatt“ od. „Dreifaden“ (contrah. aus *trifolium* od. *trilicium*, *licium* Faden od. Trum — überh. dreizähl. Blütenteile), Zier. *grandiflorum* Sal. (Nordamerika), sessile L. (*Solanum virgin. triphyllum* Pluk.) etc.
- Trinia** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Trinie“, Erdmolde. Blumenkohldolde, Scherbet O. W. (n. d. russ. Staatsr. Frhrn. v. *Trinius*, † 1844, s. d. Aut.), T. *glauca* Dumort. s. *vulgaris* DC., s. *Pimpinella* gl. L.
- Triodia** P.-B., R. Br. (Gräser, III. 2) (zu *Festuca* L.) „Dreizahngras“, Haarscheide (*τρί-* u. *δόντις* Zahn — d. Spitzen d. unt. Kronspelzchen), T. *decumbens* R. Br. (*Sieglingia* d. Bernh., *Tridens* d. Röm.), s. *Festuca decumbens* L.
- Triōnum** (sc. *Hibiscus*) L. (Malvac., XVI. 8) Stunden-Eibisch (-blume), Wetterröschen Rmpl., fr. *fleur changeante* od. -*d'une heure* (von *Triōnes*, -num Siebengestirn — Wst.: dreiteil. Blätter!), s. *Hibiscus mutabilis* s. *ternatus* Cavend. (*Ketmia Triōnum* Scop.).
- Triostemum** L. (Lonicereen, V. 1) „Dreiknochenkern“, Dreistein D. (*τρί-* u. *στέον* Knochen — drei knochenharte Beerenkerne!), z. B. *hirsutum* Roxb., *Emodum* Spr. s. *himalayanum* Wall. (Nepal, *Emodi montes*, Himalaya u. *δασον* Gabe).
- Triphasia** Lour. (Aurantiaceen, V. 1 od. VI. 1) „Dreifaltigkeits“-Orange (*τριφάσιος* dreifach — nämli. Blätt., Kelch u. Krone), z. B. *monophylla* DC. (Timor), *aurantiola* Lour. s. *trifolia* DC. (*Limonia* tr. L.).
- Tripinnaria** Pers. (Gesneriaceen, XIV. 2) Kürbis- od. Calabassenbaum

- D. (tri u. pinna Feder — d. Blätt. dreifach gefiedert), *T. africana* Spr. (Crescentia pinnaria Jacq., Tanaëcium Sw. „Langstiel“).
- Triplaris** L. (Polygonaceen, XXII. 8) Ameisenbaum v. Guiana, s. g. „langer John“ Leun. (v. triplus dreifach — bez. d. Blütheile u. dreikant. Frucht), *T. americana* L. s. *pyramidalis* Jacq.
- Tripleurospermum** Schultz-Bip. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Dreirippensamen“ (πλευρά Rippe, στέμμα Samen), *T. inodorum* Sch.-Bip., s. *Matricaria inod.* L. (*Chryanthemum in.* L. etc.).
- Tripolium** Dod., Besl. (sc. Aster) L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Strand-aster (gr. τριπόλιον, ob von τριπόλος fruchtbar? Wtst.: v. πολέω od. πολέω wende um — wechselt dreimal d. Farbe!), *T. vulgare* Besl. = *Aster Trip.* L. 2) **Trip.** (sc. Mesembryanthemum) L. (Crasulaceen, XII. 4) asterblüt. Zaserblume.
- Tripsacum** L. (Gräser, XXI. 3) Löchergras D. (löcher. Spelzen!) (v. τρίψω zerreibe od. mahle — bez. d. Samens zu Mehl? — ungewiss!), z. B. *cylindricum* Mchx., *Zier. monostachyum* Mchx. (Südcarol.), s. *Reana luxurians*, *Teosinte* (auch als Futtergr.) (*Euchlaena lux.* Schrad.).
- Trisepalae** Bartl. Ord. d. Dreikelchblättrigen (sepala Kelchzipfel).
- Trisetum** Pers. (zu Avēna) Rchb. (Gräser, III. 2) „Dreiborstengras“ (sēta Borste), z. B. *lobatum* Trin. (*Trisetaria l.* Poir.), s. *Reboulia gracilis* Kth.
- Tristania** R. Br. (Myrtaceen, XVIII. 2) Lorbeermyrte (n. d. franz. Bot. Jean de Tristan, schr. üb. d. Fl. v. Orleans 1810), z. B. *laurina*, conferta, macrophylla etc. R. Br. (Neuholl.), s. *Melaleuca* L.
- Triteleia** Hook., Lindl. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Dreifaltigkeitslilie“ (τέλειος od. -λεος vollendet — Blüt. doldig in dreiblättr. Hüllen), *Zier. uniflora* Lindl. (Südam.), *grandiflora* Ldl.
- Triticum** T. (Gräser, III. 2) Weizen, fr. froment, e. wheat (v. trītus zerrieben, gemahlen), cult. *T. vulgare* L. Winter- od. Kolben-W. (β. hibernum L.), fr. vulgär rascalade, Sommer- od. Bart-W. (α. aestivum L.), fr. from. barbu (marsais, marsage), wild *T. repens* L. Queckengras, fr. chiendent, panic rampant, e. quick-grass etc.
- Tritoma** Ker (Liliaceen, VI. 1) „Dreischnitt“-L., fr. tritome (gr. τριτόμοος dreimal geschnitt. — bez. d. Narben u. Kapseln), *Zier. T. Uvaria* Gawl. m. v. v., fr. tr. faux Aloës, *Aletris à grappes* „Trauben“-L. (Südaf.), s. *Veltheimia speciosa* Roth (*Aletris Uvaria* L., Aloë Uv. L., *Kniphofia aloïdes* Mnch.), *T. Burchelli* Herb. (*Tritomanthe* B. Lk.), *T. glauca* Hort. m. v. *recurvata* Hort. (Südaf.) etc.
- Tritomanthe** Hoffmg., Lk. (Liliaceen, VI. 1), s. *Tritoma* Ker (so eben), *T. media* Lk. (*Aletris sarmentosa* W.).
- Tritonia** Ker (Irideen, III. 1) „Triton's“-Schwertel (v. Triton Wassermolch, mit feuerrotem Bauch — weg. d. Blumenfarbe, Wtst. Tubiform d. Blumen, Meergott Triton auf d. Muschel blasend), *Zier. T. aurēa* Papp (Babiana aur. Ker), *croceata*, *purpurea* etc.
- Trollius** Gesn., L. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) „Troll“- od. Troddelblume, Kugelranunkel etc., fr. trolle, boule d'or, e. globe-flower (trollius latinis. Troddel od. Troll — Blumenform). wild u. *Zier. T. europaeus* L. m. v. v., *T. asiaticus* L. m. v. v. etc.
- Tropaeolum** L. (Geraniaceen od. Tropaeoleen, VIII. 1) Kapuzinerkresse, Spornblume, fr. fleur en capuchon (capucine), e. yellow-lark, indian cress (- nasturtium) (v. τρούλαιον Trophäe od. Siegeszeichen — Schildform d. Blätt. u. Helmf. d. Blumen), *Zier. T. majus* L. m. v. v. (z. B. king of the Tom-Thumb, „König der Zwerge“, v. ruby-king etc.), *T. canariense* Hort. Kanarienvogelrebe, *T. minus* L., e. dwarf ind.-cress, m. v. v. (z. B. *coccinea* Hort.), *peregrinum* Jacq. (*aduncum* Sm.), *Balkons: T. Lobbianum* Paxt. m. v. *Lily Smith*, *Spaliere:*

- T. pentaphyllum* Lam. (Chymocarpus pent. D. Don), tricolōrum Sw. (coccinēum Miers) etc. — Tropaeolēae DC. (zu Geraniacēae) Rchb.
- Tropperaria** pestifera autt., s. *Elodēa canadensis* Mchx. „Wasserpest“ (s. *Elodēa* Rich.).
- Tsuga** Sieb. u. Zucc. (Conifer. Abietineen, XXI. 9) Schierlings- od. Hemlockstanne, e. hemlock-spruce-fir (vaterl. Name), *Ts. canadensis* Carr. (*Abies Tsuga* ds., *Abies can.* Mchx. etc.).
- 1) **Tsutsui** Kämpf. (Ericaceen Rhodorac., X. 1) japan. Rhododendron (Name in Japan u. China). 2) **Tsutsui** G. Don (subgen. v. *Azalea* L.), z. B. *A. amoena* Lindl. (Bürgeri Miq.), *indica* L.
- Tuber** Mich., L. (Pilze, XXIV. 4) Trüffel, fr. truffe, e. truffle od. earthnut, auch sow-bread „Saubrot“ (tuber Knolle — Knollenform d. Pilzes unter Moos od. Laubabfall).
- Tuberaria** Dun., DC. (sc. *Cistus*) L. (Cistineen, XIII. 1) Knollen- od. Trüffelcist (s. eb. — Wurzelknollen), *T. variabilis* Willk. (*Cistus guttatus* L., *Helianthemum gutt.* Mill.).
- Tubiflorae** Endl., Bartl., Ord. od. Kl. d. „Röhrenblütigen“ (tūbus Röhre, florēo blühe).
- Tulbaghia** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Tulbagh's“-Lilie (n. d. holländ. Gouv. am Cap, Tulbagh, † 1771), z. B. *alliacea* L. (*inodora* G.), *violacea* Harv. (Cap), Heisteri Fabr. (*Agapanthus umbellatus* l'Hér.).
- Tulipa** T., L. (Liliaceen, VI. 1) „Tulpe“, veralt. „Tulipane“, fr. tulipe, e. tulip (v. tulipan türk. d. Turban, gr. *τολίπη*, pers. dolbend, dalmat. duplant), Zier. *T. Gesneriana* L. (*hortensis* Hort., Asien) m. v. v. (z. B. *suaveolens* Roth s. Duc van Thol, v. *turcica* Roth, monströse od. Papagei-T.), *T. praecox* Ten., *oculus solis* St. Amans, *persica* W. (*patens* Ag., *sibirica* Patrin, *tricolor* Ledeb., *Browniana* Hort.), *Clusiana* DC., fr. *T. de l'Ecluse*, auch wild *T. sylvestris* L. (*florentina odorata* Hort.), fr. *Avant-pâques*.
- Tulipifera** (sc. *Liriodendron*) L. (Magnoliaceen, XIII. 6) „Tulpenbaum“, fr. tulipier (s. eb. u. fero trage).
- Talostoma** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Schwielenmund“, Stielbovist Kumm. (*ύλος* Schwiele etc., *στόμα* Mund — d. *Peridium* am Scheitel m. offh. Mund), z. B. *mamosum* Zitzen-St. Kumm., s. *Tylostoma* Pers.
- Tunica** Scop. (Caryophyllen od. Sileneen, X. 2) Felsennelke, „Frieslein“ O. W. (*tunica* Hemd — vierblättr. allg. Hülle der Blüten), wild u. Zier. *T. Saxifraga* Scop. m. v. *flore pleno*, s. *Dianthus* u. *Gypsophila* L.
- Tupa** Sweet, D. Don (Lobeliaceen, V. 1) Chili-Lobelia (Name d. Pfl. in Peru-Chili), z. B. *Feuillei*, *blanda*, *ignescens* etc., s. *Lobelia amplexifolia* Hortul.
- Tupistra** Ker (Acoraceen od. Liliaceen, VI. 1) „Hammerkalmus“ (v. *τυλίς*, *-ίδος* Hammer — Blumenform, Wtst. Name d. Pfl. auf Amboina), z. B. *squalida* Ker u. *macrostigma* Bak.
- Turgenia** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Turgenie“, Zwiesel O. W. (nicht etwa v. *turgeo* schwelle an, sond. v. d. russ. Staatsr. Dr. Alex. Turgeneff in Moskau), *T. latifolia* Hoffm. (*Caucalis* l. L.).
- Turpethum** (sc. *Convolvulus*) L. (Convolvulac., V. 1) „Turbith“-Winde, ostind. Purgierwurzel, fr. turbit, e. turbith od. gut-wort (arab. *turbid* Wtst.), s. *Ipomoea Turp.* Rchb.
- Turrita** Wallr. (zu *Arabis*) Rchb. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) turmkrautart. Gänsekresse, fr. plateau (*turritus* m. Turm verseh., getürmt), *T. major* Wallr. (*Arabis Turr.* L. s. *rugosa* Mnch.), s. *Turritis ochroleuca* Lam.
- Turritina** Rich. (zu *Arabis*) Rchb. Turm-Gänsekresse (s. eb.), z. B. *auriculata* Lam., *stricta* Huds. etc.



- Turrītis** Dill. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) Turmkraut, fr. turritte (-rette) (v. turris, -ītis Turm — turmart. Habitus d. Pfl.), z. B. *glabra* L.
- Tussilāgo** T., L. (Compos. Eupatorineen od. Tussilagineen, XIX. 2) „Hustwurz“, Hufblattich, fr. tussilage u. taconnet, auch pas d'âne, e. horse-shoe od. colt's-foot (v. tussis Husten u. ago vertreibe), Zier. T. nivea Vill. (Petasites nivēus Baumg.), fr. t. blanc de neige, Warmh. T. fragrans Vill. (Nardosmia fr. Rechb., T. suaveolens Desf. etc.) s. g. Winterheliotrop, fr. héliotrope d'hiver. — Tussilaginéae Less., DC.
- Tweedia** Hook. u. Arn. (Asclepiadeen, V. 2) „Tweedie's“-Wachspfl. (n. John Tweedie, Samml. in Buenos-Ayres), Zier. *coerulea* Hook. (Buen.-Ayr.) s. Oxyetälum coer. Decsn.
- Tydaea** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Tydeische“ Prachtblume (ob v. Tydeus, Vat. d. Diomedes, Myth.?), z. B. *picta* Decsn. (Mex.) m. v. v. u. Blendlingen (z. B. *ocellata*, v. *splendidissima* u. *reticulata*, Lindenl, pardina, Blendl. Beelzebuth, compacta, floribunda etc.).
- Tylophōra** R. Br. (Asclepiad., V. 2) „Warzenträgerin“ (τύλος Warzenhöcker, φορός tragend — d. Blättchen d. Nebenkronne dick, fleischig), z. B. *grandiflōra* u. *barbata* Spr. (zu Hoya Spr.).
- Tylostōma** Pers., s. Tulostōma Fr.
- Typha** (Tīpha) L. (Typhaceen, XXI. 3) Rohr- od. Teichkolbe, fr. roseau u. masse d'eau (massette), e. reed-club, mace-reed „Keulen“- od. „Kolbenriet“ (gr. τύφη Pfl. z. Ausstopfen, od. v. τύφος Teich — Standort!), Zier. T. latifolia L., fr. roseau de Passion etc., e. great cat's-tail, T. angustifolia L., fr. m. à feuilles étroites, e. Red-mace, etc. — Typhacēae DC. (zu Aroideae DC.).
- Typhula** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Fadenkeulchen Kumm. (dem. v. Typha, Rohrkolbe), z. B. *Todēi*, *filiformis* etc.
- Udōra** Nutt. (Hydrocharideen, III. 1) Wasserquirl (v. udor Nässe — Standort), z. B. *occidentalis* Koch, s. *Hydrilla* Rich. (*Elodea* Ad., *Martia* Spr.), *verticillata* Casp. etc.
- Uhdēa** Kth. (Compositen) „Uhde's“ Blattpfl. (n. Kunth's Freunde Uhde ben.), Zierblattpfl. U. pinnatifida u. bipinnatifida Kth. (Mex.).
- Ulex** L. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) Stachelginster, Gaspeldorn, Hecksame, fr. argousier, e. gorse (-ze), z. B. Zier. *europaeus* L. m. v. v. (fl. pleno, vernalis u. nanus Hort.) (wie *Ilex* v. ec od. ac celt. d. Spitze).
- Ulmaria** T. (sc. Spiraea) L. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) Ulmen- od. Sumpfpierstaude, s. g. Mehlkraut od. Johanniswedel, fr. ulmaire (-mère) od. ornière, reine des près Wiesenkönigin, e. common meadow-sweet, U. pentapetala Gilib. (Spir. Ulm. L.) u. *Filipendula* A. Br. (Spir. Fil. L.). — *Ulmariae* Vent.
- Ulmus** L. (Urticac. Ulmaceen, V. 2) „Ulme“, Ilmenbaum, Rüster, fr. orme od. ipréau, e. elm (d. celt. elm, lat. ulmus), z. B. *campestris* L. m. v. v. (z. B. *suberosa* Loud. Korkrüster od. Yper, auch als Art U. *suberosa* Mneh.), *effusa* W. Weiss- od. Flatter-R., *montana* Sm. m. v. v. (z. B. *pendula* Hort.), *americana* L., etc.
- Uva** L., Lmx. (Ulvaceen od. Hautalgen, XXIV. 3) Haut- od. Blasen- alge, Ylle, Wassergallert D. (v. d. celt. ul Wasser), z. B. U. *lactuca* L. Meerlattich od. s. g. Watt, fr. ulve, laitue d'anguille etc., s. *Tremella* Schreb. — *Ulvacēae* Ag., Endl.
- Ulvina** Kütz. (Algenpilze, XXIV. 3) Kahm (s. eb.), z. B. *aceti* Ktz. s. g. Essigmutter.
- Umbellatae** L. „Doldenpflanzen“, fr. ombellées i. q. Umbelliferae Juss., DC., fr. ombellifères (umbella Schirm v. umbra Schatten u. féro führe, trage).

- Umbelliflorae** DC., Leun., Ord. d. „Schirmblütler“ Leun. (s. eb. u. floreo blühe).
- Umbilicus** DC. (Crassulaceen, X. 4) „Nabelkraut“, fr. nombril de Venus, e. Venus-navel-wort (umbilicus Nabel), s. Cotylédon L.
- 1) **Uncaria** Roxb., Schreb. (Rubiaceen, Cinchonac., V. 1) Gambir- od. „Hakenstr.“ (v. uncus Haken — d. alt. Blattstiele hakig), z. B. aculeata u. inermis W., s. Nauclea L. 2) **Unc.** Burch. (Bignoniaceen, XIV. 2) (— hakig gekr. Kapsellappen!).
- Unedo** (sc. Arbütus) L. (Ericaceen, X. 1) echter Erdbeerbaum, fr. arbousier (Plinius v. unus ein u. edo esse — unum tantum edo, Frucht ungesund, Wtst.), s. Arb. serratifolia Lodd.
- Ungnadia** Endl. (Sapindac. Hippocastaneen, VII. 1) „Ungnad's“-Rosskastanie (n. Chr. Sam. Ungnad, Gesandt. Rudolfs II., schr. de Malo Persica, Frankf. a. O.), Treibh. U. speciosa Endl.
- Unifolium** Hall., Gm. (Smilacineen, VI. 1) „Einblatt“, Schattenbl. (unum u. folium), s. Majanthemum bifolium Schmidt (Convallaria bif. L.) (— nur 1 gross. Stengelblatt).
- Uniola** L., Mchx. (Gräser, III. 2) „Einspelz“-Dord, Spitzgras D., Küstenhafer (v. unus ein — meist nur 1 Staubgef. d. Blüte), Zier. U. latifolia Mchx. (Nordam.).
- Unōna** L., Schreb. (Ranunculac. Annonaceen, XIII. 6) „Einheitsbaum“, fr. unone (v. uno vereinige — Staubgef. mit d. Stempeln, Wtst. analog Anona), z. B. discreta L., concolor etc., s. Uvaria L.
- Unxia** L. f., W. (Compos. Millerieen, XIX. 4) „Riech“- od. „Pomadenkraut“ (v. ungo, unxi etc. salbe — riecht stark nach Kampher), z. B. camphorata W. etc., s. Villanova etc. Lag., Spr.
- Urania** Schreb. (Musaceen, VI. 1) „Himmelsbaum“, Reise- od. Wanderb. (Urania, Muse d. Sternkunde, Himmlische — Schönh. d. Gew.'s), U. speciosa W. s. Ravenala madagasc. Sonner.
- Urania** Desv. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) „Hasenschwanz“, Hasenfussklee (v. οὐρά Schwanz, Wtst. n. d. indisch. Namen!), U. lagopus Desv., s. Lespedezia Nutt.
- Urceola** Roxb., Rich., Vand. (Apocyneen, V. 1) malay. Krugbaum, ostind. Federharzb., Kautschukranke (v. urceolus klein. Krug — Form d. Blume), U. elastica L. (Tabernaemontana el. Spr.).
- 1) **Urceolaria** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) Krug-Narzisse (s. eb. — Saum d. Blüte krug- od. glockenförm.), z. B. pendula Herb. (aurēa Endl.). 2) **Ure.** W. (Rubiaceen, V. 1) (— Blüt. krugf.). 3) **Ure.** Feuill. (Bignoniaceen, XIV. 2).
- Urceolina** Rchb. (Amaryllideen, VI. 1) Krug-Narzisse (s. eb.), s. Urceolaria Herb.
- Urēdo** Pers. (Staubpilze, XXIV. 4) Staub- od. Zellenbrand, fr. urède od. bullaire, e. blast od. blight (lat. urēdo v. uro brenne), z. B. segētum u. sitophila Pers. Schmier- od. Faulbrand, Kornfäule. — Uredinæe Rchb. „Brandpilze“.
- Urēna** L. (Malvac., XVI. 8) Malabar-Malve, Stachelkopf (malab. Name uren), z. B. sinuata u. lobata L. etc. s. Hibiscus u. Pavonia.
- Urginea** Steinh. (Liliaceen, VI. 1) „Urginee“, Meerzwiebel (n. d. Araberstamm Ben Urgin, Wtst. v. urgeo drücke — d. Sam. zusammengedr., während v. Scilla kuglig), U. maritima St. (Scilla mar. L.).
- Urinaria** (sc. Phyllanthus) L. (Euphorbiaceen, XXI. 3) „Urinkraut“ (Ostind.) (urina Urin od. Harn).
- Uromyces** Lév., Lk. (Brandpilze, XXIV. 4) „Schweifspore“, „Brandpilz“ (v. οὐρά Schwanz, μύκης Pilz, od. v. uro brenne — Brandpilz!), z. B. rubigo Lk. Getreidebrand.
- Uropedium** Lindl. (Orchid. Cyripedieen, XX. 1) (zu Cyripedium L.)

„Schwanzschuh“ (s. eb. u. *πέδιον* dem. *πέδη* Fussfessel, Schuh), Warmh. U. Lindenii Ldl. (Neugran.).

**Uropetalum** Ker (-lon Burch.) (Liliac., VI. 1) „Schwanzzipfel“-Lilie (zu *Lachenalia* Spr.) (s. v. u. *πέταλον* Kronblatt — d. Perigon tief sechsteilig, Staubf. im Schlund, Wtst.), U. hyacinthoides Spr. (*Scilla* hyac. L.), s. *Polemannia hyacinthiflora*.

1) **Urospermum** Juss., Desf. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Schwanzsamen“ (s. v., *σπέρμα* S. — dies. m. lang. Pappus), s. *Arctotis* L., *Tragopogon* L. u. *Arnopogon* W. 2) **Urosp.** Nutt. (Umbellifer., V. 2), U. aromaticum Nutt., s. *Spermatura* Rehb. (*Myrrhis* Moris.).

**Urtica** T., L. (Urticaceen, XXI. 4) „Brenn“-Nessel, fr. ortie, e. nettle (v. uro brenne), z. B. U. urens L. kleine Br. od. Heiternessel, fr. ort. grièche, cult. u. wild dioeca (-oica) L. grosse Nessel, geb. U. nivèa L. s. g. Ramie (*Rameum majus* Rumph., *Boehmeria ramiflora* Jacq.), arborèa L. (Boehm. arb. Jacq.), heterophylla (Faserpfl. Südind.) etc. — Urticacèae Rehb., -cèae DC., Bartl., -ticae Juss., -cinae Bartl., DC., Ord. d. Nesselgewächse.

**Urvillaea** H. B. K. (-èa Kth.) (Sapindaceen, VIII. 1) „Urvillee“ (n. d. franz. Seefahr. Capit. Dumont d'Urville, s. d. Aut.), z. B. ulmacèa Kth., s. *Koelreuteria triphylla* Pers.

**Usnèa** Dill., Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) Teller-, Wickel- od. Bartflechte (Paxton v. d. arab. achneh), s. Oschnah Avicenna, U. barbata Dill. (Lichen b. L.) etc. — Usneacèae Eschw., Rehb.

1) **Usteria** Cav. (Scrophularineen, XIV. 2) Kletter-Usterie, U. scandens Cav. (n. P. Usteri in Zürich, Annal. d. Bot. 1791—95), s. *Maurandia semperflòrens* Jacq. 2) **Ust.** W. (Gentianeen od. Carisseen, V. 1) Usteri's-Enzian. 3) **Ust.** Dennst. (Euphorbiaceen, XXI. 1) Usteri's-Wolfsmilch.

**Ustilägo** Lk. (Staubpilze, XXIV. 4) Flug- od. Staubbrand, fr. nielle (v. ustus verbrannt — Brand auf allerlei Gräs. u. and. Pfl.). — Ustilaginèae Tul., DC. „Brandpilze“.

**Utricularia** L. (Lentibularien, II. 1) „Wasserschlauch“, -helm, fr. utriculaire, mille-feuille des marais (v. utriculus Schlauch — als Anhängsel an d. Wurzeln), z. B. vulgaris L., major u. minor L., etc., s. *Lentibularia* maj. Riv. u. *Millefolium* aq. Lob. — Utricularièae Seub.

1) **Uvaria** L. (Ranunculac. Annonaceen, XIII. 6) „Trauben“-Flaschenbaum, fr. uvaire (v. uva Traube — traubenständ. Beeren), z. B. guianensis (Aberomoa Aubl., *Cananga* Juss.), javanica L. (*Unona discreta* L.) etc. 2) **Uvaria** (sc. *Tritöma* Ker etc.) (Liliaceen, VI. 1) Traubenlilie, U. longifolia autt., s. Trit. Uv. (*Aloë* s. *Veltheimia Uvaria*) — dicht traub. Blütenstand).

**Uvularia** L. (Melanthaceen, VI. 1) „Zäpfchenkraut“, Affenblatt, fr. uvulaire „Traubenblume“ Wolff, Kronlilie Perring (v. uvula Zäpfchen — Mittel geg. d. betr. Krankh., Wtst. d. Blüt. als kleine Trauben, dem. uva), Zier. grandiflòra Sm. s. lanceolata Ait. etc., s. *Streptopus* etc.

**Vaccaria** Med., Bernh. (zu *Saponaria* L.) Rehb. (Sileneen, X. 2) „Kuhnelke“, -kraut (v. vacca Kuh), V. vulgaris Host., s. *Lychnis Vacc. Scop.* (Sapon. Vacc. L.).

**Vaccinium** L. (Siphonandrac. Vaccinieen, VIII. 1) Heidel-, Bick- u. Preisselbeere od. Preissel O. W., fr. airelle, raisin de bois, e. bilberry (blea-), whortle-berry u. whurt (v. vaccinus — d. Kuh betr.? od. st. baccinium v. bacca Beere? — ungewiss), z. B. V. Myrtilus L. gem. Heidelb., fr. myrtille od. airelle, V. vitis Idaea L. Preisselbeere, fr. air. rouge, e. red-bilberry, V. Oxycoccus L. (Schollera

- Ox. Roth) u. macrocarpum Ait. gem. u. amer. Moosbeere (cranberry) etc. — Vacciniëae DC., Rchb.
- 1) **Vahlia** Thb., Schreb. (Lythraieen od. Saxifrageen, V. 2) „Vahlie“ (n. d. ber. Bot. Vahl, s. d. Aut.), z. B. *V. capensis* Thb. (*Russelia* cap. L.). 2) **Vahlia** Dahl (Büttneriaceen, V. 1).
- Vaillantia** R. u. S., DC. (*Valantia* T., L.) (Rubiaceen od. Stellaten, XXIII. 1) „Vaillant's“- od. Kreuz-Labkraut (n. d. franz. Bot. Seb. Vaillant, s. d. Aut.), *V. Cruciata* R. S. (*Galium* Cr. Scop., *V. ciliata* Presl).
- Valeriana** L., Neck. (Valerianeen, III. 1) „Baldrian“, Speerwurz, fr. valériane, e. valerian od. marum u. spear-wort (v. valère kräftig sein? od. latinis. Baldrian, dem Gott Baldur geweihte Pfl. am Hochzeitstag? nicht etwa n. Horat. Valeriani, schr. Cat. pl. horti Firmani 1812), Zier. *V. macrosiphon* Hort. (*Centranthus* m. Boiss.) m. v. v., *V. Cornucopiae* L., *V. rubra* L. α. m. v. v. (*Centranthus ruber* DC.) Gartenbaldrian, fr. v. des jardins, e. red valerian, *V. angustifolia* Mill. s. *rubra* L. β. (Centr. ang. DC.), *V. officinalis* L. Wiesen-B., fr. herbe aux chats, e. shop-valerian, *V. Phu* L. röm. B. od. Theriakwurzel, fr. grande val., e. cut-finger, etc. — Valerianëae DC.
- Valerianella** T., Lois., Bert. (Valerianeen, III. 1) Rapünzchen, Ackerod. Feldsalat, Nisschen od. Nissel O. W., fr. valerianelle, bourcette, mâche etc., e. rampion (dem Valeriana, wozu früher geh.), *V. olitoria* Mnch. (*Fedia* ol. Mnch., Vahl), s. *Valeriana Locusta* v. *olitoria* L.
- Vallisneria** Mich. (Hydrocharideen, XXII. 3) „Vallisnerie“, Schraubengestengel, -lilie (n. d. Prof. Ant. Vallisneri in Paris, † 1730), *Aquar. V. spiralis* L.
- Vallöta** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Vallot's“-Narzisse (n. d. franz. Bot. Pierre Vallot, schr. Hist. de la bot. en Bourgogne, Dijon 1828), *V. purpurea* Herb. (*Cyrtanthus* p. Herb., *Amaryllis* p. Ait. s. *speciosa* l'Hér., *Crinum* spec. L.).
- Valoradia** Hochst. (Plumbagineen, V. 1) „Valorado“-Bleiwurz (n. d. Nam. Valorado? Wst. abyss. Name), Zier. *V. plumbaginoides* Hochst. (*Plumbago* Larpentae).
- Vanda** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Vanda“-O., Schleuderstendel Leun. (v. Vanda, dem Sanskrit-Nam. d. urspr. bek. Art. d. Geschlechts), Warmh. *scripta* Sw. (*Cymbidium* scr. Sw.), *Roxburghii* R. Br. (Nordind.). — Vandëae Lindl.
- Vandellia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Vandellie“ (n. d. Prof. Dom. Vandelli z. Lissabon, s. d. Aut.), z. B. *pratensis* L. (*Matourea* pr. Aubl.) etc., s. *Hornemannia* W. s. *Tittmannia ovata* Rchb. u. *Torenia diffusa*.
- Vangueria** Juss. (-guiera Pers.) (Cinchonac. Guettardeen, V. 1) Zwiebelbaum v. Madagascar (aus voavango madagassisch, fr. vanguier), *V. edulis* Vahl (*Vavanga* ed. ds.) etc.
- Vanilla** Plum., Sw. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Vanille“, fr. vanille (-llier), e. vanilla (v. d. span. vainilla, dem. v. vayna, lat. vagina Scheide od. Schote — Form d. Frucht), *V. aromatica* Sw., s. *Epidendron Vanilla* L.
- 1) **Varëca** autt. (Tange, XXIV. 3) „Vareke“ (v. Varec od. Varech, Nam. d. Seeauswurfs, besond. d. gem. Blasentangs etc.). 2) **Varëca** Roxb. (Violarieen, V. 1) Stachelfrucht, z. B. *lanceolata* Roxb. etc., s. *Hydnocarpus* Vahl, etc. 3) **Var.** G. (Passifloreen, XVI. 2) (auf Ceylon walvareka), *V. zeylanica* G.
- Variolaria** Pers., Ach. (Flechten, XXIV. 3) Blatternflechte, fr. vario-laire (v. variöla Pocke od. Blatter — Ähnl. d. Fruchtlager damit).

- Varronia** Jacq., L. (Asperifolien Hydrophylléen, V. 1) „Varronie“, fr. monjoli (n. d. röm. Schriftst. üb. Landbau M. T. Varro, 116—26 v. Chr.), z. B. floribunda Desv. (Cordia salviaefolia H. B. K. s. Humboldtii R. u. S.), lineata Jacq. (Lantana corymbosa L. f.) etc.
- Vasculares** DC. (sc. Cryptogämae L.) Gefäss-Kryptogamen (v. vasculum dem. vas, -sis Gefäss).
- Vateria** Rheed., L. (Tiliac. Elaeocarpeen, XI. 1) „Vaterie“, ostind. Copalbaum (n. Abr. Vater, Prof. in Wittenberg, † 1751), V. indica L. (Elaeocarpus copalliföerus Vahl, Retz).
- Vatica** L. (Tiliaceen, XI. 1) „Seher“- od. Prophetenstr. (v. vates, -is Weissager etc. — dient in China bei relig. Gebräuchen), V. chinensis L.
- Vanathes (-us)** Haw. (Crassulaceen, V. 5) Schriftblume od. „V-Blüte“, s. Grammanthes DC. (d. Buchstaben V u. ἄνθη Bl. — Zeichen auf d. Kronblättern).
- Vaucheria** DC. (Ulvaceen, XXIV. 3) „Vaucherie“ (n. d. Prof. u. Pred. J. P. Vaucher in Genf, † 1841), V. sessilis Lyngb., s. Eccoptosperma Vauch. u. Conferva L. — Vaucherieae Kütz.
- Vella** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) Velarkressa (v. veler, d. celt. Wort für Kresse), z. B. annua L. (Nasturtium sylvestre Bauh.) etc. — Vellæe Rehb.
- Veltheimia** Gled. (Liliaceen, VI. 1) „Veltheimie“ (n. d. Bot. F. A. Graf v. Veltheim, † 1801), Stuben V. viridiflora Gled. (Aletris cap. Murr.), Gärten: V. Uvaria Gled. (Tritöma Uv. Ker etc.) etc.
- Venidium** Less., DC. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Aderstengel“-Bärenohr (v. vena Ader u. εἶδομαι gleiche), Zier. V. calendulacëum Less. (Südafr.) m. v. multiflorum Hort., etc.
- 1) **Ventenata (-tia)** Koel. (zu Avēna L.) Rehb. (Gräser, III. 2) „Ventenat's“ Hafersgras (n. d. franz. Bot. Ventenat, s. d. Aut.), V. bromoides u. avenacëa Koel. (Avena tenuis Mch. u. Trisetum striatum Pers.). 2) **Ventenatia** Sm. (Plumbagineen, XX. 2), s. Stylidium Sw. 3) **V. P. Br.** (Ternstroemiaceen, XIII. 1). 4) **V. Cav.** (Epacrideen, V. 1), s. Styphelia Sm., Astrolöma R. Br. u. Melichrus R. Br.
- Veratrum** T., L. (Melanthaceen, XXIII. 1) Niesswurz, Germer, fr. varaire od. vérate, e. paddock-pipe (padow-) (v. veräre weissagen — Bedeutung d. Niessens!, Paxton: v. vere wirklich u. ater, -trum schwarz — d. Wurzel! — unsicher), Zier. V. album L. m. v. viridiflorum M. u. K. Brechwurz, fr. éllebore blanc, V. nigrum L., fr. varaire noir, e. dark-flowered Ver.
- Verbascum** Mch., L. (Scrophularineen od. Solaneen, V. 1) Wollkraut, Kerze, fr. molène, e. mullein, wool-blade etc. (n. Tournefort st. barbasum v. barba — bärtige Staubfäden), z. B. V. Thapsus L. Königskerze, fr. bouillon blanc, e. high-taper (torch-weed etc.), Zier. V. phoenicëum L.
- Verbena** T., L. (Verbenaceen, XIV. 2) Eisenkraut, fr. verveine, e. vervain od. vervine (Mejer: eig. Ferbena v. ferrum, Wtst. celt. ferfaen v. fer wegführen u. faen Stein — geg. Steinbeschwerden, viell. auch v. verbum Wort, weil man bei ihm schwor — ungewiss!), Zier. V. triphylla L. (Lippia s. Aloysia citriodora Pers.) Citronenstr., V. hybrida Hort. m. v. v. (z. B. v. striata Hort., fr. verv. italiennes), V. Aubletia L. s. grandiflora Mch., longifolia Lam., pulcherrima Hort. Vilm., venosa Gill., pulchella Sweet m. v. Mahoneti Hort. (geranifolia Hort., tenera Spr.) etc. — Verbenæe Rehb., -nacæe Juss.
- Verbesina** L. (Compos. Heliantheen od. Anthemideen, XIX. 2) „Verbesine“ (einige Ähnl. m. Verbena), z. B. V. pennatifida Cav. (Mex.).
- Vernicia** Lour. (Euphorbiaceen od. Sumachineen, XVI. 4 od. XXII. 5)

- „Firnissamen“-Wolfsmilch (v. vernix, -icis Firnis — Öl aus d. Samen!), *V. montana* Lour., s. *Dryandra cordata* L. u. *Vernix* Thb.
- Vernix** Thb. (sc. *Rhus*) L. (Terebinthaceen Sumachineen, XVI. 4 od. XXII. 5) „Firnissumach“, fr. vernis (so eben), s. *Vernicia montana* Lour.
- Vernonia** Schreb. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Vernonie“, Wurmkrant, -töter, fr. vernonie (n. d. Bot. u. Reis. in Nordam. W. Vernon), Zier. *V. praealta* W. u. *novaeboracensis* W. (*Aster gigantēus* Hort., *Chrysocōma gig.* Walt.) etc., s. *Acaricida* s. *Conyza anthelmintica* W.
- Veronica** T., L. (Scrophularineen, II. 1) Ehrenpreis, fr. véronique u. thé d'Europe, e. broom-lime od. speed-well (n. *Veronica* i. e. vera unica sc. virgo od. Wtst. v. *ῥέον* bringe u. *ρίζη* Sieg), wild *V. Chamaedryes* L. Bathengel, Denk' an mich, Männertreu etc., fr. *V. Germandrée* etc., e. wild-gamander, bird's-eye etc., Zier. *V. Lindleyana* Past., *V. decussata* Ait. s. *myrtiformis* (eleg. Hstr. m. viel. Blendl.), Treibh. *V. hybrida* Hort. m. v. blue Gem, Stuben *V. speciosa* Hook. m. v. rubra, etc. — *Veronicēae* Benth.
- Verpa** Sw. (Pilze, XXIV. 4) „Fingerpilz“, Eichelschwamm (verpa i. q. Phallus männl. Glied), *V. digitaliformis* u. *conica*, s. *Phallus conicus* Müll.
- Verrucaria** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) „Warzenflechte“ (verruca Warze — Form d. Fruchtkörper).
- Verschaffeltia** Herm. Wendl. (Palmen, XXII. 3) „Verschaffelt's-P. (s. d. Aut.), Treibh. *V. splendida* H. Wendl., *melanochaetes* Wendl. „schwarzborstige“, etc., s. *Regelia Planch.* u. *Stevensonia* H. Wendl.
- Verutina** Cass., DC. (Compos. Centaureen, XIX. 3) grossdornige Flockenblume (v. véru Wurfspieß), s. *Centaurea Verutum* L. (*Crocodilium* Pers.) — d. Anthodschuppen langdornig!).
- 1) **Vesicaria** Lam. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Blasenschötchen“ (v. vesica Blase), z. B. *V. utriculata* Lam., s. *Alyssum Vesicaria* u. *utriculatum* L. 2) **Vesicaria** L., Pers. (zu *Trifolium* L.) (Leguminos. Trifolieen, XVII. 4) Blasenkelchklec, z. B. *fragiferum* L. u. *vesiculosum* Savi.
- Vesicastrum** Ser (zu *Trifolium* L. sect.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Blasenkelchklec (s. eb., deter.).
- Vestia** W. (Cestraceen od. Solaneen, V. 1) „Vest's“ Hammerstrauch (n. d. Prof. Lor. v. Vest in Grätz, schr. Manuale bot. 1805), *V. lycioides* W., s. *Cantua ligustrifolia* Juss. s. *foetida* Pers.
- 1) **Viborgia** (Wib-) Roth (Compos. Inuleen, XIX. 2) Kopfkraut (n. d. dän. Bot. Erich Nilsen Wiborg, † 1822), *V. Acmella* Roth s. *parviflora* H. B. K., s. *Galinsogea* Rz. Pv. 2) **Viborgia** Mnch., Thb. (Wib.-Thb. u. -quia Orteg.) (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Wiborg's“ Ginster, Zier. *purpurea* Mnch. (*Cytisus purp.* Scop.), *austriaca* Mnch. (*Cytis. aust. L.*), s. *Crotalaria* L.
- Vibrio** Ehrbg. (Vibrionen od. Bakterien) „Zittertierchen“ (v. vibro vibriere od. zittere).
- Viburnum** L. (Caprifoliaceen, V. 3) Schlingstrauch, Schlinge Grck., Schneeballenstr., Mehlbeerstr., fr. viorne, e. snow-ball od. wayfaring-tree „Wanderbaum“ (v. viēo binde, flechte — biegsame Zweige — ungewiss!), Zier. *V. Opulus* L. (*lobatum* Lam.) m. v. fl. pleno (*rosae-florum sterile* Hort.), s. *Opulus glandulosa* Mnch., s. g. Wasserholder, fr. obier d'Europe, e. marsh-elder, *V. Lantāna* L. Mehlbeerstr., *V. prunifolium* L. (*Lentago* Dur.) etc., Stuben *V. Tinus* L. (*Laurus* T.). — *Viburnēae* Bartl.
- Vicia** T., L. (Legumin. Viciēen, XVII. 4) „Wicke“, fr. vesce, e. vetch od. fitch (celt. gwig, gr. βικιά od. -ov, Paxton u. Wtst. v. viēo binde od. vincio unwickle — weg. d. Wickelranken). — *Viciēae* Rchb.

- Vicioides** Mnch. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Zitterlinse (v. *Vicia u. εἰδομαί* gleiche), *V. hirsuta* Mnch. (*Vicia* h. Koch, *Ervum* h. L.).
- Victoria** Schomb., Lindl. (Nymphaeaceen, XIII. 1) „Victoria“-Wasserlilie (n. d. Königin Victoria v. Grossbrit., geb. 1819), *V. regia* Ldl. s. *regalis* Schomb. (in Guiana „Irupé“ Leun.).
- Victoralis** (sc. *Allium*) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Siegllauch“, Netzwiebellauch, Allermannsharnisch (v. *victoria* Sieg — d. Wurzel verleiht Sieg, Talisman, Wtst. häuf. auf d. Berge St. Victoire, Mons Victoralis, in der Provence).
- Vidua** Coult., DC. (Dipsaceen, IV. 1) „Wittwenblume“ (*vidua* v. *viduus* leer, d. Wittwe — Wtst. d. Grübchen d. Involucellumröhre fehlen!), Zier. *V. atro-purpurea* Coult., s. *Asterocephalus* s. *Scabiosa* L.
- Vieusseuxia** Lar. (nicht *Viess.*-Dietr.) (Irideen, XX. 2) „Vieusseux“ Schwertel (n. M. Vieusseux, Arzt in Genf), z. B. *V. aristata* Lar., *tricuspis* Thb. etc.
- 1) **Villarsia** Vent. (Gentianeen, V. 1) Seekanne, Teichenzian, Tauche etc., fr. Villarsie (n. d. franz. Bot. Villars, s. d. Aut.), wild u. Zier. *V. Nymphoides* Vent. (Schweykertia N. Gm., *Linnanthemum nymphaeoides* Lk. etc.), *chilensis* Lodd. etc. 2) **Vill.** Guett. (Compositen).
- Vilmorinia** DC. (Leguminos. Glycineen, XVII. 4) „Vilmorin“'s Schamblume (n. d. Bot. Vilmorin, s. d. Aut.), s. *Clitoria multiflora* Sw.
- Vinca** L. (Apocynen od. Contorten, V. 1) Sinngrün, „Winke“ O. W., fr. pervenche (*Pervinca* Scop.), e. winter- od. ever-green, periwinkle, virginian bower (v. *vinco* besiege — nämli. d. Winter, od. Wtst. v. *vincio* binde — lange, biegs. Stengel), wild. u. Zier. *V. minor* L. m. v. v., *major* L. m. v. v., *V. herbacea* W. K., *rosa* L. (*Lochera* r. Rehb., *Catharanthus* r. G. Don), e. old-maid, etc.
- Vincetoxicum** Mnch. (sc. *Asclepias*) L. (Asclepiadeen, V. 2) Hundswürger, Schwalbenwurz, Giftwurz, fr. *asclepiade dompte-venin*, e. swallow-wort (v. *vinco* überwinde, *τοξικόν* Pfeilgift — nämli. als Gegengift).
- Viniferae** Juss., DC. (sc. *Palmae*) Weinpalmen (*vinum* Wein u. *fēro* trage).
- Viola** T., L. (Violarieen, V. 1 od. XIX. 6) „Veilchen“, fr. violette, e. violet, heart's-ease „Herzlust“ (lat. *viola* dem. v. *ἴον* Veilchen), wild u. Zier. *V. odorata* L. März-V. m. v. v. (z. B. fl. plen. Hort., v. *alba*, v. *sempervirens* Hort. s. *italica* Voigt, v. *praecox* Hort., v. *rossica* (z. B. the Czaar u. Victoria Riesen-V.), *V. tricolor* L. Stiefmütterchen, s. g. *Pensée*, fr. herbe od. fleur de la Trinité, e. pansy od. paunce, heart's-ease, m. v. *hortensis* Hort. (*grandiflora* u. *perennis* Hort.), *V. altaica* Ker s. *pura* Hort., fr. *Pensée vivace bleue*, *V. canadensis* L., *cornuta* L. Horn-V., *calcarata* L., fr. violette éperonnée, long-spurred-violet „Langsporn“-V., u. a. m. — *Violaceae* Rehb., -læae ds., -lariæae Endl., DC., Bartl.
- Viorna** (sc. *Clemätis*) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) Haargriffel-, „Wegzier“-Waldrebe (N.-Amer.), fr. *Clématide Viorne*, e. road-ornamenting Cl., purple-climber etc. (v. *via* Weg u. *orno* ziere).
- Virgaurea** T., DC. (*Virga-auræa* T.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Goldrute“, fr. bose od. bosée (*virga Rute*, *auréus golden*), s. *Solidago Virga-auræa* L.
- 1) **Virgilla** Cav., Pers. (Cassieen Cäsalp., X. 1) Gelbholz v. Cumberland (n. d. ält. röm. Dicht. Virgil), *V. lutæa* Lam. (*Cladrastis tinctoria* Raf.) etc., s. *Sophora*, *Podaliria* etc. 2) **Virgilia** l'Hér. (Compos. Astereen, XIX. 2) Virgil's-Aster, s. *Aster Amellus* L.
- Viscaria** Riv., Röhl. (sc. *Lychnis*) L. (Sileneen, X. 2) „Pechnelke“, klebrige Lichtnelke, fr. *atrape-mouche* u. *Bourbonnaise*, e. clammy-Lychnis (v. *viscum* Leim — klebr. Stengel), wild u. Zier. *V. vul-*

- garis Röhl. s. purpuræa Wimm. m. v. fl. plen. u. albo Hort., alpina Fries, oculata Lindl., coeli-rosa v. aspéra Poir., fr. V. à fleurs oculées, e. oculate rock-Lychnis, etc., s. Lychnis L.
- Viscum** T., L. (Loranthaceen, XXII. 4) Mistel, urspr. Mistle Mej., Leimbere od. Vogelheim, fr. gui od. gillon, e. mistle-toe (missletoe od. mistle-tow) (viscum gr. ἴζος; Leim, celt. gui od. gwid Strauch).
- Vismia** Vand., Pers. (Hypericaceen, XVIII. 4) Gummistrauch, fr. gomme-gutte od. scammonée jaune (n. d. Lissabonner Kaufm. Visme ben.), V. guianens. Vand. — Vismiæe Choix.
- Visnāga** Lam. (sc. Ammi Rchb., sc. Daucus L.) (Umbellifer., V. 2) „Visnāge“, s. g. Zahnstocher, fr. visnage u. herbe aux curedents (aux geneives) (Wtst. st. Bisnaga = bis acutum doppelt spitz — zu Zahnstochern), V. daucoides G. (Südeur., Levante).
- 1) **Visnā** Schreb. (Sapotac. od. Lucumeen, XI. 3) Wagenholzbaum (Wtst.: Ableit. wie Vismia), V. Mocanera W. (Mocanera canariens. L. f.). 2) **Visnā** Steud. (Amaryllideen).
- Vitalba** (sc. Clemätis) L. (Ranunculaceen Clematideen, XIII. 3) gem. Waldrebe, „Weissrebe“, Teufelszwirn od. Hexenstr., fr. Clématide des haies, viorne des pauvres, e. bend-with, wild Climber (vitis Rebe u. albus weiss).
- Vitellaria** G. (Sapotac. od. Lucumeen, XI. 3) Butterbaum v. Sudan (v. vitellus Eigelb), V. paradoxa G.
- Vitex** L. (Verbenaceen, XIV. 2) Müllen- od. Pfefferstrauch, Mönchs- od. Klosterpfeffer, Keuschlamm (-baum D.), fr. petit-poivre, gatilier etc., e. chaste-lamb-tree (v. viēo biege — d. biegs. Zweige zu Körben etc.), V. agnus-castus L., s. Wallrothia Leucoxydon Roth.
- Viticella** Dill. (sc. Clemätis) L. (Ranuncul. Clematid., XIII. 3) violette, blaue od. ital. Waldrebe, fr. vignette od. Clématide viticelle, e. vine-bower-Cl. od. red-flowered lady's-bower (ital. viticella = kleiner Weinstock), Zier. v. coerulæ Sweet u. V. multiplex G. Don.
- Vitis** L. (Vitaceen od. Ampelideen, V. 1) Weinstock, -rebe, fr. vigne, e. vine (v. d. celt. gwid = bester Baum, Paxton, v. viēo binde? — lat. vitis Rebe), V. vinifera L. m. zahlr. v. v. edler W., V. indīca L. (vinifera sylvestris Pluk.), V. cordifolia s. cordata Mchx. (incisa Jacq.), e. heart-shaped vine od. chicken-grape „Hühnchentraube“ (in Amer. frost- od. wintergrape), V. hederacæa Ehrh. (Hedera s. Cissus u. Ampelopsis quinquefolia autt.) wilde od. Jungferrebe, V. arboræa L. s. caroliniana (Frutex scandens Pluk.), V. Labrusca L. Sommerrebe od. nördl. Fuchsrebe, V. rotundifolia Mchx. s. vulpina Torr. u. Gr. südl. Fuchsrebe, V. riparia Mchx. Uferrebe (odoratissima Don) etc. — Vitacæe i. q. Viniferae Rchb. = Sarmentacæe DC. Weinrebengew. Leun.
- Vittadinia** Rich. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Vittadini's“-Baldgreis (n. Dr. C. Vittadini in Mailand), z. B. Ampel V. triloba Hort. (Neuholl.), s. Erigeron quercifolius A. Gray.
- Voandzeia (-zoua)** P. -Thou. (Cassieen Geoffreen, X. 1) „Voandzoue“ (n. d. madagass. Nam. voandzou geb.), V. s. Glycine subterranea L. unterird. Süssbohne od. Erdnuss.
- Vochysia** Juss., Lam. (-chya Vand.) (Onagreen Vochysiac., I. 1) prachtblumig. „Wotschibaum“ Hb. (Nam. in Guiana vöchy), V. guianens. Aubl., s. Cucullaria excelsa W. — Vochysieæ DC., -siacæe Mart. (zu Calycifloræ Bartl.).
- 1) **Vogelia** Hornem., Med. (Crucifer. Nucamentaceen, XV. 2) „Vogelie“ od. „Neslee“ (n. d. ält. Bot. Mart. Vogel, Herausg. v. Jung's Botanophysica 1678), V. paniculata Horn. (Neslea p. Desv.) s. sagittata Bernh. 2) **Vogelia** Gm. (Amaryllid.). 3) **Vog.** Lam. (Plumbagineen).



- Voglĕra** Fl. Wett. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Vogler's“ od. deutscher Ginster (n. ein. Bot. Vogler, s. d. Aut.), *V. spinosa* Fl. Wett., s. *Genista germanica* L.
- Vohiria** Juss., Pers. (**Voyra** Aubl.) (Gentianeen, V. 1) „Vohirie“ (guian. Name d. Pfl.), *V. coerulescens* u. *rosacea* Aubl., s. *Lita coer. u. ros. W.*
- 1) **Volkameria** L., Pers. (Verbenaceen, XIV. 2) „Volkamerie“ (n. d. Stadtrat J. G. Volkamer in Nürnberg, † 1693), Warmh. Stub. *V. fragrans* Vent. s. *japonica* Jacq., s. *Clerodendron fr. Hortul.* (*Rhododendron villosum* Roth). 2) **Volk.** Burm. (Capparideen). 3) **Volk.** P. Br. (Ericaceen).
- Volvaria** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Scheidenpilz“ (v. *volva* Hülle etc. — d. Perithecium in besond. warzig. Hülle).
- Volvox** L. (Protococcaceen od. Urkornalgen) Kugeltierchen, -alge (v. *volvo* wälze), *V. globator* L.
- Voyra** Aubl. s. *Vohiria* Juss.
- 1) **Vriesĕa** Hassk. (Scrophularineen, XIV. 2) „Van-Vriese's“—Blume (n. d. Prof. W. Van Vriese in Amsterd., s. d. Aut.). 2) **Vriesia** Lindl. (Bromeliaceen, VI. 1) „Vriesie“, Zier. *V. Glazoviana* u. *psittacina* Lindl., s. *Tillandsia* etc.
- Vulneraria** Mnch., Lam. (sc. *Anthyllis* L. u. sect. v. *Anth. Rehb.*) (Legumin. Anthyllideen, XVII. 4) „Wundklee“, fr. *vulnĕraire*, e. wound-wort od. lady's finger (v. *vulnus*, -ĕris Wunde), s. *Vuln. rustica* T. m. v. fl. albo, *V. tetraphylla* L., etc.
- Vulparia** Rehb. (sect. v. *Aconitum* L.) (*Ranunculac.*, XIII. 3) „Fuchstod“—Eisenhut (*vulpes*, -is Fuchs).
- Vulpia** Gm. (Gräser, III. 2) „Fuchsschwengel“, Mäusehafer, fr. *vulpin*, queue de rĕnard, e. fox-tail (Wtst. n. d. Apoth. *Vulpus* in Pforzheim, schr. 1786 *Spicil. Fl. Stuttgartensis*), *V. myurus* Gm. u. *sciuroides* Rehb., s. *Festuca* etc.
- Vulvaria** (sc. *Chenopodium*) L. (Chenopodiaceen, V. 2) „Schamkraut“, stinkend. Gänsefuss, fr. *vulvaire*, Stinkmelde Wolff, s. *Chenopodium olidum* Curt. (*vulva* Scham od. Gebärmutter).

**Wachendorfia** Burm., L. (Commelyneen, III. 1) „Wachendorfie“ (n. d. holl. Bot. Is. Eb. Wachendorf), Stuben: *W. thyrsiflora* L. u. *hissata* Thb., etc., s. *Dilĕtris* u. *Erythrobolbus* Pluk.

1) **Wahlenbergia** Schrad. (Campanulaceen, V. 1) Epheu- od. Zwergglocke (n. Wahlenberg, s. d. Aut.), Topf: *W. grandiflora* Schrad. (*Platycodon* gr. DC., *Campan.* gr. Jacq.), wild *hederacea* Rehb. 2) **W.** Blum. (Rubiaceen). 3) **W.** P. Br. (Terebinthaceen).

1) **Waitzia** Wendl. (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Waitz“—Strohblume (n. d. Bot. K. F. Waitz in Altenburg, † 1848), Zier. *aurea* Steetz (Neuholl.), s. *Leptorrhynchus* aur. Benth. (*Helichrysum elegans* Hort., *Morna* el. Hort. s. *nitida* Ldl.), *W. grandiflora* Thomps., *corymbosa* Wendl. m. v. v. 2) **W.** Rehb. (Irideen).

**Waldschmidtia** Neck. (Gentianeen, V. 1) Seekanne, Tauche etc. (n. ein. Bot. Waldschmidt), *W. nymphoides* Wigg., s. *Limnanthemum*, *Villarsia*, *Schweykertia* etc.

1) **Wallichia** Roxb. (Palmen, VI. 2) „Wallich's“—P. (n. Dr. Nath. Wallich, Insp. d. bot. Gart. zu Calcutta, s. d. Aut.), z. B. *caryotoides* Rxb. (*Harina* car. Ham.). 2) **W.** DC. (Theaceen od. Geraniac. Wallichieen, XVI. 2) „Wallich's“ *Geranium*. — *Wallichieae* sc. *Geraniaceae* Rehb.

**Waltheria** L. (Büttneriaceen, XVI. 2) „Waltherie“ (n. d. Prof. A. F. Walther in Leipzig, † 1746), z. B. *americana* L. u. *indica* L., s. *Malvinda ulmifolia* Burm., *W. Astropus* Spr. (*Astrop. tomentosa* Spr.).

- Warszewiczella** Van Houtt. (Orchid. Vandeem, XX. 1) „Warszewicz“-O. (n. d. Bot. u. Reis. in Centralamer. 1845/53 Warszewicz, s. d. Aut.), s. *Zygopetalum* Hook.
- Washingtonia** Winslow (Conif. Cupressineen, XXI. 9) „Washingtonie“, *W. californica* Winsl. = *Wellingtonie* (n. G. Washington, dem Befreier v. Nord-Amer.), s. *Wellingtonia* Lindl. s. *Sequoia gigantea* Endl.
- Watsonia** Ker, Mill. (Irideen, III. 1) „Watson's“-Schwertel (n. d. Lond. Apoth. W. Watson, s. d. Aut.), z. B. *plantaginea* Ker, *humilis* Mill. etc., s. *Gladiolus* etc.
- Weigela** Thb. (-lia Pers.) (Caprifoliaceen, V. 1) „Weigel's“-Rose (n. d. Prof. in Greifswald E. Weigel, s. d. Aut.), *Zier. W. rosea* Thb. m. v. v. (*Diervilla ros.* Ldl.), *amabilis* Van Houtt. (*Diervilla coraeensis* Thb. s. *grandiflora* Sieb. u. Zucc.) m. v. v., *W. japonica* Thb. s. *arboræa* Hort.
- Weingärtneria** Bernh. (Gräser, III. 2) Silbergras, Bunke O. W. (n. d. Conrect. Weingärtner in Erfurt, s. d. Aut.), *W. canescens* Bernh., s. *Corynephorus can.* P.-B. (*Aira can.* L.).
- Weisia** Spr. (*Weissia* Hedw.) (Moose, XXIV. 2) „Weiss“-M. (n. d. Prof. F. W. Weiss in Götting., s. d. Aut.). — *Weisiaceae* Schimp.
- Welfia** H. Wendl. (Palmen) „Welfen“-P. (n. d. Dynastie der Welfen ben.), z. B. *W. Georgii* H. Wendl., *regia* ds. (Neugran.).
- 1) **Wellingtonia** Lindl. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) *California-Ceder* (n. d. Herzog v. Wellington ben.), *W. gigantea* Ldl. *Mammuthskiefer* od. *californ. Riesentanne*, s. *Sequoia gig.* Ldl. (*Washingtonia californica* Winslow). 2) **W. Meisn.** (*Sapindaceen*).
- Welwitschia** Rchb. (*Gnetaceen*, XXI. 9) „Welwitsch's“ Wunderpfl., *W. mirabilis* Rchb. (*Westafr.*) (n. d. österr. Arzt u. Reis. für Portugal in Südafr. Dr. Franz Welwitsch), s. *Huegelia* Benth.
- Westringia** Sm. (*Labiaten*, XIV. 1) *Zwergrosmarin* (n. J. P. Westring, schr. Schwedens Färbeflechten, Norrköping 1805), *Warmh. W. rosmarinifolia* Sm. (*Cunila fruticosa* W.) (Neuholl.).
- Whitlavia** Harv. (*Hydrophylléen*, V. 1) „Whitlaw's“-Wasserblatt (n. ein. eifr. Bot. Whitlaw ben.), *Zier. grandiflora* Harv. m. v. v. (z. B. *alba* u. *gloxinioides* Hort.) (*Californ.*).
- Wibelia** Hoppe, Röhl. (nicht *Wiebelia* Fl. Wett.) (*Compos. Cichoriac.*, XIX. 1) „Wibel's“-Pippau (n. d. Arzt etc. Wibel in Wertheim), *W. apargioides* Röhl. u. *graveolens* Fl. Wett. (*Barkhausia grav.* Rchb.).
- Wiborgia** s. *Viborgia*.
- Wigandia** H. B. K. (*Hydroleaceen*, V. 1) „Wigand's“-Blattpfl. (n. Joh. Wigand, Bisch. v. Pommern 1540—87, schr. üb. preuss. Pflanzen), *Zier. W. caracasana* Kth. s. *macrophylla* Hort. (Neugran.), *Vigieri* u. *urens* Kth., s. *Hydrolæa* L.
- Wiggersia** Fl. Wett. (*Legumin. Viciéen*, XVII. 4) „Wigger's“-Wicke, *Zaun-* (n. d. Götting. Prof. F. H. Wiggers), *W. sepium* Fl. Wett., s. *Vicia sepium* L.
- 1) **Willemetia** Neck. (*Composit. Cichoriaceen*, XIX. 1) „Willemet's“-Pippau (n. P. R. Willemet, s. d. Aut.), *W. apargioides* Cass. (*Wibelia* ap. Röhl.) u. *hieracioides* Monn., s. *Crepis*. 2) **W. Märk.**, *Gm.* (*Chenopodiaceen*, V. 2) *Sand-Willemetie*, *W. arenaria* Gm., s. *Kochia* ar. Roth. 3) **W. A. Brong.** (*Rhamnaceen*, V. 1), *W. africana* A. Brong., s. *Ceanothus* afr. L.
- 1) **Wintēra** L. (*Dilleniaceen*, XIII. 4) echter Winter-Rindenbaum (n. Capt. Winter, Drake's Begleiter 1578), *W. aromatica* L. (*Drimys Winteri* L. f.), s. *Winterana* ar. Soland. u. *Tasmania* ar. R. Br. 2) **Winterania** L. (*Hesperideen* od. *Guttiferen*, XI. 1) *Kaneelzimmt*, *W. Canella* L., s. *Can. alba* Murr. (*Winteranus Cortex* d. Offizinen).

- Wistaria** Nutt. (Leguminos. Glycineen, XVII. 4) „Wistar's“—Süßbohne (n. Casp. Wistar, Prof. in Pennsylvania, † 1818), Zierkletterstr. *W. chinens.* DC. (Glycine chin. Sims) m. v. fl. albo Hort., *W. frutescens* DC. (Glyc. frut. L., Apios fr. Pursh, Anonymus fr. Walt., Thyrsanthus frut. Elliott) s. *speciosa* Nutt. m. v. v. (z. B. *magnifica* Fl. d. Serr.).
- Witheringia** Schreb., l'Hér. (Solaneen od. Polemonieen, V. 1) „Witheringsblume“ (n. d. Arzt u. Bot. Withering, schr. 1776 Flora v. England, s. d. Aut.), *W. solanacea* l'Hér. u. *superba* ds. (*Cantua splendens* Lam.).
- 1) **Witsenia** L., Schreb. (Irideen, III. 1) „Witsen's“—Schwertlilie (n. d. holl. Liebh. d. Bot. Witsen ben.), *W. corymbosa* Gawl. (*Nivenia cor. Bak.*). 2) **Wits.** Thb. (Büttneriaceen, XVI. 2) „Witsen's“—Salatmalve, *W. indica* Gm., s. *Melochia odorata* L.
- Wittelsbachia** Mart. (Ternstroemiaceen, XVI. 8) Schneckensamen-Baumwollenbaum (n. d. bairischen Dynastie Wittelsbach ben.), *W. insignis* Mart., s. *Cochlospermum hibiscoides* Kth. u. *Bombax* L.
- 1) **Wolffia** Mich., Hork. (Lemnaceen, II. 1) „Wolff's“—Wasserlinse (n. d. Prof. Kasp. Friedr. Wolff, † 1794), *W. Michellii* Hork. = *Lemna arrhiza* L. 2) **Wolffia** Spr. (Apocynaceen, V. 1) brasil. Wolfsstrauch, *W. brasiliensis* Spr. (nach demselben).
- Woodsia** R. Br., Spr. (Farne, XXIV. 1) „Woods“—Wimper- od. Schildfarn, Hüllchenteller-F. (n. d. engl. Bot. Jos. Woods, s. d. Aut.), *W. pubescens* Spr., *hyperborea* R. Br. etc., s. *Ceterach*, *Acrostichum* etc.
- Woodwardia** Sm. (Farne, XXIV. 1) „Woodward's“—F. (n. d. engl. Bot. Thom. Jenk. Woodward, schr. m. Goodenough üb. engl. Algen), *Zier. radicans* Sm., *caudata* Sw. (*Doodia c. R. Br.*) (Neuholl.).
- 1) **Wormia** Rottb. (Dilleniaceen, XIII. 5) „Wormius“—Dillenie (n. d. dän. Philos. Olaus Wormius ben.), *W. triquetra* Roxb. (*Dillenia dentata* Thb.). 2) **Wormia** Vahl (Myrobaleen).
- Wredowia** Eckl. (Irideen, III. 1) „Wredow's“—Schwertel (n. d. Bot. Wredow, schr. ökon.-techn. Flora Mecklenburgs, Lüneburg 1811), z. B. *pulchra* Eckl. (Cap).
- Wulfenia** L., Jacq. (Scrophularineen, II. 1) „Wulfen's“—Hahnenkamm (n. F. X. v. Wulfen, Geistl. u. Prof. in Klagenfurt, † 1805), z. B. *carinthiaca* Jacq. s. *obliqua* Wall. (*Paederota Wulfenia* Lam.).
- Wurmbia** Thb., Schreb. (Melanthaceen, VI. 1) „Van Wurmb's“—Schwarzblume (n. F. Van Wurmb, Sekr. d. Akad. d. Wiss. zu Batavia), *W. campanulata* W. (*Melanthium Wurmbium* autt.), *purpurea* Ait. (*Melanth. spicatum* Van Houtt.).
- Xanthe** W., Schreb. (Guttiferen Garcinieen, XI. 1) Gelbwurz, Gelbmilcher D., „Gelbgummistrauch“ (*ξανθοζ*; gelb — solcher Saft d. Str.'s), *X. parviflora* W. (Schlingstr. Guiana), *scandens* W. (*Quapoya* sc. Aubl.) etc., s. *Clusia micro-* u. *macrocarpa* Spr.
- Xanthium** T. (Compos. Ambrosiaceen, XXI. 5) Spitzklette, Klettenwurzel, Klisse O. W., fr. gloutron, tignon, plante à jaunir (gr. *ξανθίου* Kraut z. Gelbfärben v. *ξανθοζ*), *X. strumarium* L. Kropfklette Wolff, fr. lampourde, *X. fruticosum* L. (*Franseria* Cav. *artemisifolia* L., *Ambrosia arborescens* Mill.).
- Xanthoceras** Bung. (Sapindaceen, XXIII. 1) „Gelbhorn (s. v. u. *ξείραξ* Horn — zwisch. d. Kronblätt. 5 gelbe Hornrüsen), z. B. *sorbifolia* Bung.
- Xanthochymus** Roxb. (Guttiferen Garcinieen, XIII. 5) Cambodscha-Stalagmit (Cambogia-), eig. „Gelbsaft“ (s. v. u. *χυμῶς* Saft, „Chy-

- mus<sup>4</sup>), *X. pictorius* Roxb. Maler-Gummiguttb., *X. ovalifolius* Roxb. (Warmh.).
- Xanthorrhiza** Marsh. (Ranunculaceen, V. 7) „Gelbwurz“ (s. v., *δίζα* Wurzel — diese gelb u. zum Gelbfärben), geb. u. wild *X. apifolia* P'Hér. s. tinctoria Woodh. (Str. Nordam.).
- Xanthorrhoea** Sm. (Commelyneen od. Asphodeleen, VI. 1) „Gelbfluss“, Harzaffodil Leun., -lilie D. (s. v., *ροία* od. *ροή* Fluss — gelbes Harz tritt aus), *X. resinosa* Sm., *arborëa* R. Br., s. g. Graskgummi-  
baum, *hastilis* Sm. etc.
- Xanthosöma** Schott (Aroideen, XXI. 1) „Gelbleib“, -narbe (s. v., *σῶμα* Leib — d. Narbe m. gelb. Klebmasse überzogen), Zier. *X. sagittifolium* Schott (Arum s. *Caladium* sag. Vent.), *pubescens* Pöpp., Endl. (Calla od. Calad. pub.).
- Xanthoxylon** L. (-um Kth.) (Zanthox.- H. B. K.) (Terebinthac. Xanthoxyleen, XXII. 12) „Gelbholz“, fr. clavalier, e. tooth-ache-tree, s. g. Zahnwehholz (s. v., *ξύλον* Holz), *X. fraxinëum* W. s. americanum Mill. (ramiflorum Mchx.) gem. Zahnwehholz (in Amerika prickly-Ash), s. Fagära Schreb.
- Xenopöma** W. (Scrophularineen od. Labiaten, XIV. 1) „Fremdentrank“, s. g. Königs- od. Mandarinthee D. (*ξένος* fremd, *πῶμα* od. *πόμα* Trank), *X. obovatum* W. (Str. China).
- Xeranthëum** T., L. (Compos. Cynarcephaleen, XIX. 2) Strohlume, Spreu-, Papierbl., fr. xeranthème, e. amarinth the everlasting, silberknap (v. *ξηρός* trocken, *άνθημον* Blume), Zier. *X. annuum* L. Papierbl. Rmpl. m. v. v. (z. B. imperiale, violacëum, atro-purpurëum, grandiflorum, flore roseo pleno), *X. inodörum* Mch., *ornatum* Cass., *radiatum* Lam. etc., s. Eli- s. Helichrysum W.
- Ximenesia (-zia)** Cav. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Ximenesie“, fr. ximénésie (n. d. span. Apoth. Jos. Ximenes, s. d. Aut.), Zier. encelioides Cav. (Mex.), s. Coreopsis u. Simsia R. Br.
- Xiphidium** Löffl., Schreb. (Hämodoraceen od. Commelyneen, III. 1) „Schwertblatt“, Scheidenlilie D., fr. glaiwane (*ξίφος* Schwert, *είδομαι* gleiche — bez. d. Blätter), z. B. floribundum Sw. s. album W. (albidum Lam.), s. Ixia Xiphidium Löffl. m. v. coeruleum Aubl.
- Xiphium** Mill. (sc. Iris) L. (Irideen, III. 1) spanische Schwertlilie, fr. u. e. xiphion (*ξίφιον* dem. v. *ξίφος* Schwert — näml. d. Blätter), s. Xiphium vulgare Hort.
- Xiphophyllum** (sc. Serapias) L. f. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Schwertblatt“-O. (*ξίφος* u. *φύλλον*), s. Serapias\_ensifolia L. (Cephalanthëra Xiphoph. Rehb. f.).
- Xōra** Sw. (Rubiace. Coffeaceen, V. 1) westind. Kaffeestr. (v. *ξηρός* lauter, rein), *X. americana* Sw., s. Coffëa occidentalis Jacq. (Tetramerium odoratissimum G.).
- Xylocarpus** Schreb., Kön. (Hesperideen Meliaceen, VIII. 1) „Holzfrucht“-Mannabaum (*ξύλον* Holz, *καρπός* Frucht — holzige Kapsel), *X. Granätum* Kön. „Grenadillenholz“ (Granätum litorëum Rumph.).
- Xylomëlon (-um)** Sm. (Proteaceen, IV. 1) „Holzapfel“ (s. v., *μύλον* lat. mälum Apfel — d. holz. Frucht verkehrt birnförmig), z. B. piri-forme Sm. (B. Neuholl.), s. Hakea Pers. u. Banksia G. pirif. (Conchium pyriforme W.).
- Xylon** T., Mch. (Malvaceen, XVI. 8) Baumwollenstaude, fr. u. e. xylon (*ξύλον* Holz u. Baumwolle), s. Gossypium L.
- Xylophylla** L. (Euphorbiaceen, V. 3) „Holzblatt“ (s. v., *φύλλον* Laub — blattart. verbreit. Holzweigmasse), *X. arbuscula* W., s. Phyllanthus speciosus s. latifolius autt.
- Xylopia** L. (Annonaceen, XIII. 6) Bitterholz (Xylopicron Pluk.) (st.

- ξυλόπιζρον* abgekürzt. Paxton, *πιζρός* bitter — sehr bitt. Holz), *X. glabra* L. u. *muricata* L.
- Xylopleurum** Spach (zu *Oenothëra* L.) (Onagrarien, VIII. 1) „Holzrippe“, Prachtnachtkerze (s. v., *πλευρον* Rippe — achtrippige holzige Kapsel), Zier. X. *Nuttalii* Spach, s. *Oenoth. speciosa* Nutt.
- Xylostëon** Ad. (-stëum T., Mnch.) (sc. *Lonicëra* L. (Lonicereen, V. 1) Heckenkirsche, Ahl-, Hunds-, Zaunkirsche, „Beinholz“ Vilm. (*ξύλον* u. *λατίον* Knochen — Holz knochenhart), fr. *camërisier* (lat. *Chamaeceräsus*), *chèvre* des buissons od. des haies, e. *fly-honey-suckle*, *bony-wooded-h.-s.*, s. *Lonicëra vulgaris* Roehl. s. *dumetorum* Mnch. (*Chamaeceräsus* *Xylostëon* Med.), Zier. X. *cordatum* Mnch. (*Lonic. tatarica* Lam., *Chamaec. tat. Med.*), *ciliatum* Pursh, *pyrenaicum* T., *canadense* Duham. (*Lonic. coerulëa* L.) etc.
- Xyris** L. (Commelyneen Xyriden, III. 1) „Scheer“- od. Scharfblatt, Degenkraut D., Stinkschwertel Wolff, fr. u. e. *xyris* (v. *ξύρός* od. -ον Scheermesser — scharfe, schwert-fadenf. Blätter), X. *brasiliensis* Hort. (*Abildgaardia monostachya* Vahl, *Cyperus m. L.*). — Xyridëae Kth.
- Xysmalobium** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Staubhülse“, Schabsel- (v. *ξύσμα* Geschabtes, Mulm u. *λόβιον* Hülse — d. Frucht mit grob. Staub bestreut), X. *grandiflorum* R. Br. etc. (Cap), s. *Asclepias*.
- Yucca** L. (Liliaceen, VI. 1) Palmlilie, Bajonettblume Leun., Schilf-Aloe, Brotwurz etc., e. Adam's-needle (vaterl. Name d. Pfl.), Zier. Y. *aloifolia* L. m. v. *variegata* Hort., *gloriosa* L. (Faserpfl. Südind.'s), *recurvata* Haw. (*recurvifolia* Salisb.), *pendula* Carr. (*reflexa* Hort.), *filamentosa* L. (*concava* Hort.) s. g. Seidegras, e. *silk-grass*, *fiaccida* Carr. (*glaucescens* Haw.) etc.
- Yulan** Desf. (sc. *Magnolia*) (Magnolieen, XIII. 6) schönste od. Lilien-Magnolie (chines. Name *yu-lan* „Lilie“), s. *Magnolia conspicua* Salisb. (*Gwillimia Yulan* Rottl.).
- Zabala** *umbraculifera* Hort. (Palmen, VI. 1) Schirm- od. Zwerg-P. (vaterl. *sabal*), s. *Corypha minor* Lam. (*Rhapis acaulis* W. etc.) u. *Sabal* Ad.
- Zacintha** (bess. *-ynthia*) T. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Zakynthos-Rainkohl (v. *ζάκυνθος* Insel Zante, eine d. jonisch. Inseln), Z. *verrucosa* G. Warzenkraut Wolff, s. *Lapsana Zac. L.*
- Zamia** L. (Cycadeen, XXII. 12) Zapfenfarn, -palme, Keulen- D. (v. *ζαμία* Schaden, Plin. nennt so gewisse Tannenzapfen, die auf d. Baum selbst verderben, Wtst.), z. B. *cycadifolia* Jacq., Z. *furfuracea* Ait. (*Palmifolia* Ehret.) etc., s. *Zaluzania* u. *Bertiera*.
- Zannichellia** L. (Fluvialen od. Potamoegen, XXI. 1) Fadenblatt, Flutstengel, Halde O. W. (n. Hieron. *Zannichelli*, Apoth. zu Venedig, † 1729).
- Zantedeschia** Spr. (Aroideen, XX. 9) s. g. *Calla* (n. d. ital. Bot. Franc. *Zantedeschi*, schr. üb. Pfl. um *Brescia* etc., 1824), Zierpfl. Z. *aethiopica* Spr. = *Richardia* Kth. s. *Calla aeth. L.*
- Zanthorrhiza** s. *Xanth.*-; **Zanthoxylon** s. *Xanth.*-
- Zappania** Scop. (Verbeneen, XIV. 2) „Zappa“-Verbene (n. d. ital. Bot. P. A. *Zappa*, Vorst. d. bot. Gartens z. Pavia), Z. *mexicana* Lam. (*Priva m. Pers.*, *Blairia m. G.*) etc., s. *Lippia* u. *Verbena*.
- Zasmidium** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Krepelwollen“-P. (v. *ζάσμα* od. *ζάσμα* Krepelwolle, *ειδομαι* gleiche).
- Zauschneria** Presl (Onagrarien, VIII. 1) „Zauschner's“ Nachtkerze (n. d. Prof. *Zauschner* in Prag, † 1799), Z. *californica* Presl.

- Žeā L.** (Gramineen Olyreen, XXI. 3) Mays od. Welschkorn (gr. ζεῖα od. ζέα ein Getreide), Z. Mays L., fr. maïs, millet gros, e. maize, indian u. turkey-corn, Zier. v. fol. vittatis Hort. „Bandmays“, fr. m. à feuilles rubanées, e. striped-leaved Japan Maize.
- Zedoaria** (sc. Curcūma) Rosc. (Scitamineen, I. 1) Zittwer-Curcume, fr. zédoaire (v. d. arab. djetuar), Z. officinalis u. rotunda Offiz., s. Curcuma aromatica Salisb.
- Zenobia** D. Don (Ericaceen, X. 1) Zenobia-Torfheide, s. g. Gränke Grck. (Ζηρόβια Königin v. Palmyra, in Fesseln beim Triumphheinzug in Rom, wie Andromeda in Fesseln lag), Z. speciosa Don, s. Andromeda cassinaefolia Vent. s. speciosa Mchx.
- Zeocrithon** (nicht -ton) P.-B. (sc. Hordēum) L. (Getreide, III. 2) Bartod. Reisgerste, fr. rizon d'Allemagne, e. sprat-barley (v. ζέα Getreide u. ζοιθη Gerste), Z. commune P.-B. u. secalinum P.-B. (Hordeum capense s. pratense autt.).
- Zephyra** D. Don (Liliaceen, VI. 1) Zephyrlilie (ζεφυρος Westwind — schön azubl. duft. Bl.), Z. elegans Don.
- Zephyranthes** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Zephyrblume“ (s. eb. u. ζοιθη — schöne, duft. Bl.), z. B. grandiflora Ldl. etc.
- Zerumbet** autt. (Cannaceen, I. 1) wild. od. Block-Ingwer (vaterl.), Z. specios., s. Amomum Zer. L., s. Renealmia nutans R. Br.
- Zeugites** Schreb. (sc. Aplūda) L. (Gräser, XXI. 3 od. XXIII. 1) „Ehe“ od. Zwittergras (ζεγγίτης angejocht — jed. Ährchen 1 sitz. ☉ u. ☿ gestielte ♂ Blüten!), Z. americana Schr.
- Zichya** v. Hüg. (Legum. Phaseoleen, XVII. 4) „Zichy's“-Bohne (n. d. österr. Gräfin Molly Zichy, Liebh. d. Bot.), z. B. tricolor u. villosa Ldl. etc., s. Kennedyā.
- Zieria** Sm. (Rutac. Diosmeen, IV. 2) „Zier'sstr.“ (n. d. poln. Bot. J. Zier, schr. mit Dickson Cryptogamia etc.), z. B. Smithii Andr. s. lanceol. R. Br., etc., s. Boronia Sm.
- Zilla** Forsk. (Crucifer. Lomentaceen, XV. 2) „Zille“ (arab. Name), z. B. myagroides Forsk., s. Bunias aegyptiaca s. spinosa L. (Myagrūm spin. Lam. etc.). — Zillēae Rchb.
- Zingiber** G. (Scitamineen, I. 1) „Ingwer“, fr. gingembre, e. ginger (ind. gingi, Wurz v. Zindschi, westl. v. Pondichery), Z. officinale Rosc. — Zingiberacēae DC.
- Zinnia** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Zinnie“ (n. d. Prof. J. G. Zinn in Göttingen), Zier. Z. elegans Jacq. m. v. v. (z. B. nana fl. pl. etc.), Haageana Reg. (aurēa Hort.) m. v. v., s. Sanvitalia mexic. Hort., Z. multiflora L. (hybrida Sims.) m. v. v. etc.
- Zizania** L. (-ium G. Fr.) (Maisgräser, XXI. 6) Wasserreis, -kappengras D. (gr. ζιζάνιον i. q. Lolium Lolch), Z. aquatica L., fr. risave, s. Hydropyrum esculentum Lk.
- Ziziphora** L. (Labiaten, II. 1 od. XIV. 1) „Zizikraut“ D., „Flaustträgerin“ (zizi d. Indier, gr. ζιζυς od. ζιζυσα Vliess, ποδος tragend), z. B. capitata L. (Clinopodium fistulosum Pluk.).
- Zizyphus** T., L. (Rhamnaceen, V. 1) Jubenbaum, Judendorn, Brustbeerenstr. Rmpl. (phöniz. zizuf, gr. ζιζυφοr lat. jujuba), Z. Jujuba W. Dornkirsche, fr. pommier d'Inde, Z. spina Christi W. (Oenoplia spinosa Bauh.) etc., s. Rhamnus Ziz. L. (Jujuba aculeata Burm.).
- Zoophthalmum** P. Br., DC. (Legum. Phaseoleen, XVII. 4) Tierauge (ζωον Tier, οφθαλμος Auge etc. — kreisr. Samen m. linear. Nabel umgürt.), Z. urens DC. (Dolichos. s. Strizolobium ur. Adans.).
- Zostera** L. (Potamoegen, XX. 9) „Wasserriemen“, Wier. O. W., fr. atomère (v. ζωστρη, -ηρος Gürtel — Form d. Blätter), Z. marina u. oceanica L. s. g. Seegras, fr. foin de mer, e. ore-weed, slank etc., s. Kernēra ocean. W. u. Phycagrostis major Caulini autt. „Tanggras“.

- Zozimia** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Zozima's“ - Dolde (n. d. Gebrüder Zozima, Herausg. gr. Classiker), *Z. orient.* H. s. *absinthifolia* DC.
- 1) **Zuccagnia** Thb., Réd. (Liliaceen, VI. 1) Zipfelblatt-Lilie (n. d. ital. Bot. Att. Zuccagni in Florenz), *Z. viridis* Thb., s. *Uropetalon vir.* Ker (Lachenalia v. Thb. etc.). 2) **Zucc.** Pers. (Cäsalpinieen, X. 1).
- Zuccarinia** Blum., Spr. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1), z. B. *macrophylla* Blum., *ornata* Spr. (*Jackia orn.* Wall.) (B. Malacc.) (s. d. Aut.).
- 1) **Zygia** P. Br., Juss. (Mimoseen, XXIII. 1) „Joch“ - Mimose (*ζυγών* Joch — verwachs. Staubgef. etc.), s. *Inga marginata* W. 2) **Zygia** G. Fr. (i. q. *Acer* — jochart. Flügelfrüchte).
- 1) **Zygödon** Hiern (g. n.) (Rubiaceen, V. 1) „Jochzahn“, Doppelzahn. 2) **Zygod.** Hook. (Moose) Paarzahn-M. (s. eb. u. *ὀδών* Z.).
- Zygopetalum** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Jochkronblatt“ (s. v., *πέταλον* — Perigonbl. u. Fuss d. Columna verw.), z. B. *crinitum* Lodd. (Mackai Hook., Südam.), s. *Odontoglossum* u. *Eulophia* R. Br.
- Zygophyllum** L. (Sapindac. od. Rutaceen, X. 1) „Jochblatt“, Bohnenkapper D., z. B. *Z. Fabago* L. (*Capparis* Fab. Dod.), *coccinèum* L. s. *desertorum* Forsk. etc. (*φύλλον* Laub — d. Blätter jochart. gegenüber).

## Übersicht der nicht näher ausgeführten Synonyme des Buches.

- |  |   |
|--|---|
| <b>Aberemoa</b> Aubl. s. <i>Cananga</i> Rumph. u. <i>Uvaria</i> L. | <b>Aeschynomène</b> DC. s. <i>Daubentonia</i> DC.                         |
| <b>Acanthospöra</b> Spr. s. <i>Gunnera manic.</i> L.               | <b>Aeschynomène</b> Cav. s. <i>Piscidia</i> L.                            |
| <b>Acaricida</b> W. s. <i>Vernonia</i> Schreb.                     | <b>Aethionia</b> D. Don s. <i>Schmidtia</i> Mnch.                         |
| <b>Aceranthus</b> Morr. s. <i>Epimedium</i> L.                     | <b>Akeesia</b> Tuss. s. <i>Blighia</i> Kön.                               |
| <b>Acia</b> Schreb. ( <i>Acioa</i> Aubl.) s. <i>Dulacia</i> Neck.  | <b>Alibertia</b> Rich. s. <i>Genipella</i> Rich.                          |
| <b>Acia</b> W. s. <i>Couepia</i> Aubl.                             | <b>Alicastrum</b> P. Br. s. <i>Brosimum</i> Schreb.                       |
| <b>Acianthëra</b> Scheidw. s. <i>Centranthëra</i> Scheidw.         | <b>Alismorehis</b> A. Rich. s. <i>Centrosia</i> Rich.                     |
| <b>Aerodrÿon</b> Spr. s. <i>Cephalanthus</i> L.                    | <b>Alphitomorpha</b> Wallr. s. <i>Erysibe</i> Reber.                      |
| <b>Actinella</b> Pursh s. <i>Helenium lanatum</i> Spr.             | <b>Amica nocturna</b> Rumph. s. <i>Poli-anthes</i> L.                     |
| <b>Actinodaphne</b> Nees s. <i>Litsaea</i> Lam.                    | <b>Ammannia</b> L. s. <i>Cornelia vertic.</i> Andr. u. <i>Ludwigia</i> L. |
| <b>Actinophyllum</b> R. S. s. <i>Sciadophyllum</i> P. Br.          | <b>Ambora</b> Juss. s. <i>Mithridatea</i> Comm.                           |
| <b>Aculeosa</b> Pluk. s. <i>Roëlla</i> L.                          | <b>Ambora</b> St. Vinc. s. <i>Monimia</i> P.-Thou.                        |
| <b>Adhatoda</b> Herm. s. <i>Justicia</i> Adh. L.                   | <b>Ambulia</b> Lam. s. <i>Lindernia</i> All.                              |
| <b>Adamsia</b> W. s. <i>Puschkinia</i> Adams                       | <b>Amphinomia</b> DC. s. <i>Connarus</i> L.                               |
| <b>Adamsia</b> Fisch. s. <i>Gëum</i> L.                            | <b>Anadophyllum</b> Catesb. s. <i>Podophyllum</i> L.                      |
| <b>Adenötus</b> Lour. s. <i>Elaeocarpus</i> L.                     | <b>Anchietea</b> St. Hil. s. <i>Noisetia</i> H. B. K.                     |
| <b>Adyseton (-um)</b> Adans. s. <i>Koniga</i> R. Br.               | <b>Andrachne</b> L. s. <i>Cluytia</i> Ait.                                |
| <b>Aegicëras</b> G. s. <i>Rhizophöra</i> L.                        | <b>Angioptëris</b> Hoffm. s. <i>Clementëa</i> DC.                         |
| <b>Aegiphila</b> W. s. <i>Knoxia</i> L.                            | <b>Angostura</b> R. S. s. <i>Galipëa</i> Aubl.                            |
| <b>Aegoceratos</b> Raj. s. <i>Hugonia</i> L.                       | <b>Anguillaria</b> R. Br. s. <i>Pleea</i> Rich.                           |
| <b>Aegopögon</b> Hb. s. <i>Chrysürus</i> P.-B.                     | <b>Angularia</b> R. Br. s. <i>Melanthium</i> L.                           |
| <b>Aerua (-va)</b> Juss. s. <i>Iresine</i> Spr.                    |   |

- Anisophyllum** Forsk. s. *Boerhavia* Vahl  
**Anneslea** Andr. s. *Euryale* Salisb.  
**Anogeissus** Wall. s. *Leiocarpus* DC.  
**Anonis** Mart. s. *Podaliria* Dietr.  
**Anonyma** Mer. s. *Costus* arab. L.  
**Anonymus** Walt. s. *Liättris* odorat. W.  
**Anonymus** Pluk. s. *Spermacoce* L.  
**Anredëra** Juss. s. *Basella* L.  
**Antirrhoea** Gm. s. *Cunninghamia* Schreb.  
**Antrophÿum** Kaulf. s. *Hemionitis* L.  
**Apama** Lam. s. *Bragantia* Pers.  
**Aplopappus** DC. s. *Leucopsis* DC.  
**Aquilia** Cav. s. *Leea* Blum.  
**Argolasia** Pursh s. *Conostylis* Pursh  
**Argolasia** Juss. s. *Lanaria* Ait.  
**Arthrostemma** Pav. s. *Monochaetum* DC.  
**Asaphes** Spr. s. *Morina* L.  
**Asjogam** Rheed. s. *Jonesia* Roxb.  
**Asperella** Hb. s. *Elÿmus* L.  
**Asteriscus** Mnch. s. *Nauplius* Cass.  
**Astrolöma** R. Br. s. *Ventenatia* Cav.  
**Aströpus** Spr. s. *Waltheria* L.  
**Atrodaetylÿs** Forst. s. *Pandänu* L. f.  
**Aubletia** G. s. *Mangium* Rumph.  
**Avicennia** L. s. *Mangle* Sloan.  
**Azorella** Cav. s. *Bolax* Comm.
- Bactyrilobium** W. s. *Cassia* L.  
**Baccka** L. s. *Cedrëla* Lour.  
**Balbisia** W. s. *Tridax* L.  
**Balsamëa** Gled. s. *Opobalsänum* L.  
**Banara** Aubl. s. *Boca* Fl. Flum.  
**Banava** Camell. s. *Münchhausia* L.  
**Bandura** Burm. s. *Nepenthes* L.  
**Bardäna** Fenzl. s. *Cucurbita* dipsacëa Ehrbg.  
**Barnadesia** L. f. s. *Diacantha* Lag  
**Batis** Jacq. s. *Bucephälon* Plum.  
**Baumgartenia** Spr. s. *Borya* R. Br.  
**Benthamidia** Spach s. *Cornus* L.  
**Bergëra** L. s. *Murraea* L.  
**Bergëra** L. f. s. *Papaya* T.  
**Berkheya** W. s. *Cullumia* R. Br.  
**Bertiëra** aut. s. *Zamia* L.  
**Biglandularia** Seem. s. *Rosanowia* Reg.  
**Blackwellia** Comm. s. *Homalium* Jacq.  
**Bombonaxa** s. *Carlodovica* Rz. Pv.  
**Bonduccella** L. s. *Bonduc* Plum.  
**Bon-hopas** Ostind. s. *Mithridatea* tox. Dietr.  
**Borbonia** autt. s. *Liparia* L.  
**Brasenia** Pursh s. *Hydropeltis* Mchx.
- Buccaferrea** Mich. s. *Ruppia* L.  
**Bunchosia** DC. s. *Malpighia* L.  
**Buphäne** Herb. s. *Brunswigia* Heist.  
**Bupleurifolia** Pluk. s. *Corymbium* L.  
**Burtonia** R. Br. s. *Gompholobium* Sm.  
**Byrsonima** DC. s. *Malpighia* L.
- Cahuchu** W. s. *Castillöa* Cerv.  
**Calamaria** Dill. s. *Isoetes* L.  
**Calomeria** Vent. s. *Humea* Sm.  
**Calorophus** autt. s. *Restio* L.  
**Calydermos** Rz. Pv. s. *Nicandra* Ad.  
**Camptospermum** Spr. s. *Fusisporium* Lk.  
**Candalia** aut. s. *Coccocypselus* P. Br.  
**Canthium** Lamb. s. *Plocäma* Ait.  
**Capinoga** Aubl. s. *Homalium* Jacq.  
**Carpopögon** Roxb. s. *Mucuna* Aubl.  
**Cartesia** Cav. s. *Stokesia* P'Her.  
**Cassipourea** Aubl. s. *Legnötis* Sw.  
**Castanea** peruv. Clus. s. *Rhizobölus* G.  
**Castorëa** Plum. s. *Duranta* L.  
**Catesbaea** Lam. s. *Scolosanthus* Vahl  
**Catesmyce** Ach. s. *Baeomyce* Pers.  
**Centella** L. s. *Hydrocotÿle* L.  
**Cephaloceräsus** Pfeiff. s. *Pilocerëus* Lem.  
**Ceratosperrum** Pers. s. *Diötis* Schreb.  
**Chaenanthëra** Rich. s. *Charianthus* Don  
**Chaixia** Lap. s. *Ramondia* Rich.  
**Chalcas** Lour. s. *Murraya* L.  
**Chamaejasme** Pluk. s. *Houstounia* L.  
**Chamaelëdon** Lk. s. *Loiseleuria* Desv.  
**Chamaerëpes** Spr. s. *Chamorchis* Rich.  
**Chamaerrhododendron** Duham. s. *Rhodora* L.  
**Chamaerrhödos** Don s. *Sibbaldia* L.  
**Chamira** Thb. s. *Heliophÿla* L. f.  
**Chimatobia** Mey. s. *Monëses* Salisb.  
**Chondrodendron** R. P. s. *Menispermum* L.  
**Chorisma** Lindl. s. *Jenkinsonia* Sweet  
**Chorispora** DC. s. *Diptychocarpus* Reg.  
**Chrysangia** Lk. s. *Musschia* Don.  
**Chuquiraga** Juss. s. *Johannia* W.  
**Chymocarpus** D. Don s. *Tropaeölum* L.



- Cichlanthus** Blum. s. *Dendrophthoe* Blum.  
**Cipadessa** Blum. s. *Lansium* Rumph.  
**Cipura** Aubl. s. *Marica* Schreb.  
**Coa scandens** Plum. s. *Hippocratea* L.  
**Cochliopetalum** Bew. s. *Pitcairnea* l'Hér.  
**Codium** Ag. s. *Lamarckia* Olivier  
**Cola** Baub. s. *Sterculia* L.  
**Collomioides** DC. s. *Hügelia* Benth.  
**Colobium** Roth s. *Thrinicia* Roth  
**Colyris** Vahl s. *Dischidia* R. Br.  
**Conchium** Sm. s. *Hackea* Wendl.  
**Conchium** W. s. *Xylomelon* Sm.  
**Coniandra** Schrad. s. *Rhynchocharpa* Schrad.  
**Conobea** Spr. s. *Collinsia* Nutt.  
**Coutoupita** Aubl. s. *Lecythis* W.  
**Crantzia** Lag. s. *Moricandia* DC.  
**Critonia** P. Br. s. *Kuhnia* L. f.  
**Cryphiospermum** P.-B. s. *Caesulia* Roxb.  
**Cryptospermum** Pers. s. *Opercularia* Rich.  
**Cryptostomum** W. s. *Moutabea* Aubl.  
**Ctenium** Spr. s. *Chloris* Sw.  
**Cucifera** Pers. s. *Hyphaena* G.  
**Cucurbitifera** Pluk. s. *Marmelos* L.  
**Cusparia** St. Hil. s. *Galipea* Aubl.  
**Cybelion** Spr. s. *Jonopsis* Hb. Kth.  
**Cyclophorus** Desv. s. *Niphobolus* Kaulf.  
**Cymbachne** W. s. *Rottboella* L.  
**Cynorrhinchium** Pluk. s. *Penstemon* Ait.  
  
**Daltonia** Spr. s. *Neckera* Hedw.  
**Danais** Balf. f. s. *Paederia* L.  
**Debraea** R. S. s. *Ditmaria* Spr.  
**Decadiantha** Rchb. s. *Hügelia* R. Br.  
**Declieuxia** Schldl. s. *Knoxia* L.  
**Delilia** Spr. s. *Milleria* L.  
**Dens leonis** Pluk. s. *Hyosëris* L.  
**Desvauxia** R. Br. s. *Centrolëpis* Lab.  
**Diascia** DC. s. *Hemimëris* L.  
**Diastella** Salisb. s. *Leucospermum* R. Br.  
**Dichelostemma** Sm. s. *Brodiaea* Sm.  
**Dieliptera** Juss. s. *Hygrophila* R. Br.  
**Diconangia** Mitch. s. *Itëa* L.  
**Didymocarpus** W. s. *Streptocarpus* Lindl. u. *Klugia* Endl.  
**Diphyes** Blum. s. *Bolbophyllum* P.-Thou.  
  
**Douma** Duham. s. *Hyphaena* G.  
**Dracaenopsis** DC. s. *Dracaena australis* autt.  
**Dracophyllum** Lab. s. *Epacris* Forst.  
**Drakena** Clus. s. *Dorstenia* L.  
**Drepania** Juss. s. *Tolpis* G.  
**Dryobalanus** G. f. s. *Dryobalanops* G. f.  
**Duabanga** Kurz s. *Lagerstroemia* L.  
**Dufourea** Sommerf. s. *Sphaerocephalon* Pers.  
  
**Eccoptosperma** Vauch. s. *Vaucheria* DC.  
**Echinoïdes** Riv. s. *Lycopsis* L.  
**Echinolýtrum** Desv. s. *Dichostylis* P.-B.  
**Edechia** Löfl. s. *Laugieria* Spr.  
**Elaeodendron** DC. s. *Crocoxylon* Eckl.  
**Elýna** Schrad. s. *Kobresia* W.  
**Embela** Retz. s. *Salvadöra* L.  
**Enargea** Schreb. s. *Callixène* Juss.  
**Encelia** Kth. s. *Pallasia* Ait.  
**Endoptera** DC. s. *Nemauchenés* Cass.  
**Engelmannia** Pfeiff. s. *Cuscutina* Pfeiff.  
**Enneapogon** Desv. s. *Pappophorum* Schreb.  
**Erigonum** Mchx. s. *Chrysosplenium* Walt.  
**Erisma** Rudg. s. *Ditmaria* Spr.  
**Erythrobulbus** Pluk. s. *Wachendorfia* L.  
**Erythrodanum** P.-Thou. s. *Nertera* Soland.  
**Erythropalum** Blum. s. *Mackaya* Arn.  
**Esenbeckia** St. Hil. s. *Evodia* Forst.  
**Euchroma** Nutt. s. *Castilleja* Mut.  
**Eulophia** R. Br. s. *Zygopetalum* Hook.  
**Eumorpha** DC. s. *Calliopsis* Sweet  
**Euphoria** DC. s. *Nephelium* L.  
**Evosmia** Hb. Bpl. s. *Euosma* W.  
  
**Fagotriticum** Act. Stockh. s. *Fagopyrum* T.  
**Favonium** G. s. *Didelta* l'Hér.  
**Feea** Bory s. *Trichomanes* L.  
**Fernandezia** Lodd. s. *Lockhartia* Hook.  
**Fernandezia** Rz. Pv. s. *Dichaea* Lindl.

- Fernelia** Comm. s. *Coccoeypsëlum* P. Br.  
**Fisakaki** Kämpf. s. *Eurya* Thb.  
**Fischeria** G. Don s. *Codonopsis* Wall.  
**Fissilia** Lam. s. *Olax* L.  
**Fissurina** Fée s. *Graphis* Ach.  
**Flabellaria** Cav. s. *Hiraea* Jacq.  
**Flaveria** Juss. s. *Milleria* *Contra-  
yerva* L.  
**Flaveria** Lag. s. *Nauenburgia* W.  
**Flemingia** Roxb. s. *Millingtonia* Ham.  
**Floerkia** Nutt. s. *Nectris* Pursh  
**Flotovia** Spr. s. *Johannia* W.  
**Forgesia** Juss. s. *Desforgesia* Lam.  
**Fortunaea** Lindl. s. *Platycařya* Sieb. u. Zucc.  
**Franeoeria** DC. s. *Duchesnia* Cass.  
**Franklinia** Marshal s. *Gordonia* Ellis  
**Franseria** Cav. s. *Xanthium* L.  
**Fugosa** Juss. s. *Cienfuegosia* Cav.
- Gabertia** Gaud. s. *Grammatophyl-  
lum* Blum.  
**Galedupa** Lam. s. *Milletia* Wight u. Arn.  
**Garciana** Dietr. s. *Philydrum* Banks  
**Garuga** Roxb. s. *Kunthia* Dennst.  
**Gastrochilus** Don s. *Sarcochilus* R. Br.  
**Gaya** Spr. s. *Lasiopetalum* Sm.  
**Geissorhiza** R. Br. s. *Lapeyrousia* Gawl.  
**Gerardia** L. s. *Rehmannia* Bung.  
**Germanea** Poir. s. *Calceolus* Benth.  
**Geryonia** Schrk. s. *Bergenia* Mneh.  
**Glaucena** Burm. s. *Murraya* L.  
**Glechon** Spr. s. *Glecoma* L.  
**Globba** Spr. s. *Hura* Kön.  
**Glyce** Spr. s. *Koniga* R. Br.  
**Glycosmis** Corr. (-*osmida* Spr.) s. *Cookia* Sonner.  
**Gomphia** DC. s. *Correa* Sm.  
**Gomutus** Rumph. s. *Sagus* ds.  
**Gouania** DC. s. *Retinaria* G.  
**Grindelia** W. s. *Donia* Hook.  
**Griselinia** Forst. s. *Scopolia* ds.  
**Guaifera** Marcgr. s. *Icaco* Plum.  
**Guanabanus** Plum. s. *Canangha* Rumph.  
**Guapurium** Spr. s. *Klaprothia* H. B. K.  
**Guarea** L. s. *Eluteria* P. Br.  
**Guarea** Spr. s. *Epicharis* Blum.
- Guepinia** Desv. s. *Teesdalea* R. Br.  
**Gunthera** Reg. s. *Gutierrezia* Lag.  
**Gymnosporangium** Oerst. s. *Roestelia* Lk.  
**Gymnostömum** Hedw. s. *Schistostega* Web. u. M.
- Hallia** Thb. s. *Hedysarum* Thb. u. *Crotalaria* L.  
**Hamelia** Jacq. s. *Duhamelia* Pers.  
**Harrachia** Jacq. s. *Crossandra* Sm.  
**Hartmannia** Spach s. *Oenothëra* L.  
**Hartogia** L. s. *Bucco* Wendl. u. *Eriostëmon* Sm.  
**Hedwigia** Sw. s. *Knorria* Moç. Sess.  
**Heleochlōa** Host. s. *Crypsis* Ait.  
**Helicia** Lour. s. *Rhopala* G.  
**Hemizonia** Gray s. *Hartmannia* DC.  
**Heridium** Pers. s. *Hystrix* Spr.  
**Hermiōne** Haw. s. *Narcissus* L.  
**Herpestes** Pursh s. *Monnieria* Pers.  
**Heterandra** Sm. s. *Boronia* Sm.  
**Higginsia** (O'Higg.-) R. P. s. *Euosma* W.  
**Hipposëris** Cass. s. *Centroclinium* Endl.  
**Hoitzia** Spr. s. *Loeselia* L. u. *Can-  
tua* Juss.  
**Holmskioldia** Retz. s. *Hastingia* Sm.  
**Holoregmia** Nees s. *Martynia* L.  
**Homoplitis** Trin. s. *Pollinia* L.  
**Hoodia** Sweet s. *Scytanthus* Hook.  
**Hookeria** Kth. s. *Brodiaea* Sm.  
**Hoplismënus** P.-B. s. *Oplismënus* Kth.  
**Hornemannia** W. s. *Vandellia* L.  
**Huttia** aut. s. *Calectasia* R. Br.  
**Hydnocarpus** Vahl s. *Vareca* Roxb.  
**Hydrocarya** Spr. s. *Hedycarya* L.  
**Hydrogëton** Pers. s. *Ouvirandra* P.-Thou.  
**Hymenospëron** Spr. s. *Dioclea* Kth.  
**Hymenothecium** Lag. s. *Chrysurus* P.-B.  
**Hypaelyptum** Vahl s. *Hypoelytrum* Rich.  
**Hypoëstes** Hook. s. *Eranthëmum* R. Br.
- Jacapucaya** Marcgr. s. *Lecythis* Ollaria L.  
**Jaumea** Pers. s. *Kuhnia* L. f.  
**Ipomeria** Nutt. s. *Ipomopsis* Rich. u. *Gilia* R. u. P.

- Ipo-toxicaria** Pers. s. *Mithridatëa* Dietr.  
**Iroucana** Aubl. s. *Casearia* Jacq.  
**Isocarpa** R. Br. s. *Calea* ds.  
**Ivira** Aubl. s. *Sterculia* L.  
**Ixina** L. s. *Krameria* Löff.  
  
**Kosaria** Forsk. s. *Dorstenia* L.  
**Krigia** Schreb. s. *Hyosëris* L.  
  
**Labillardiera** R. u. S. s. *Billardiera* Sm.  
**Lablavia** Adans. s. *Lablab* Savi  
**Lagascëa** W. s. *Noccaea* Cass.  
**Lasthenia** Hort. s. *Monolopia* DC.  
**Lauremburgia** Berg. s. *Serpicula* L.  
**Lechea** L. s. *Gaura* Lam.  
**Legondium** Rumph. s. *Vitex* Ne-gundo L.  
**Legousia** Dur. s. *Prismatocarpus* P'Hër.  
**Leptanthus** Mchx. s. *Pontedëra* L. u. *Schollëra* W.  
**Leptocödon** G. Don s. *Codonopsis* Wall.  
**Leptoglossis** Benth. s. *Nierembergia* R. u. P.  
**Leptostegia** Don s. *Onychium* Kaulf.  
**Leptostemma** Blum. s. *Dischidia* R. Br.  
**Lessertia** DC. s. *Colutea* L.  
**Lidbeckia** Berg. s. *Cotula* L.  
**Lindelofia** Lehm. s. *Omphalödes* T.  
**Linkia** Pers. s. *Desfontainea* R. u. P.  
**Linnophila** R. Br. s. *Hottonia* L.  
**Linociera** R. Br. s. *Chionanthus* L.  
**Liriöpe** Lour. s. *Ophiopögon* Curt. u. *Sanseviera* Thb.  
**Lithagrostis** G. s. *Coix* L.  
**Lobularia** Hoffm. s. *Pulmonaria* ds.  
**Loxidium** Vent. s. *Swaintonia* Salisb.  
**Loxonia** Jack s. *Klugia* A. Juss.  
**Ludwigiaria** DC. s. *Ludwigia* L.  
**Luschia** Don s. *Cleyëra* Thb.  
**Lydaea** Mol. s. *Kageneckia* R. u. P.  
**Lygistum** L. s. *Petesia* L.  
  
**Macrostëma** Pers. s. *Calboa* Van Houtt.  
**Mahuria** Aubl. s. *Bonnetia* Schreb.  
**Malanea** Lam. s. *Cunninghamia* Schreb.  
**Mallingtonia** W. s. *Millingtonia* Roxb.  
  
**Manglietia** Burm. s. *Michelia* L.  
**Manulea** L. s. *Cheiranthus* L.  
**Marcetia** DC. s. *Rhexia* L.  
**Martia** Spr. s. *Udora* Nutt.  
**Matourea** Aubl. s. *Vandellia* L.  
**Mauria** Kth. s. *Cambessedea* W.  
**Mayëpe** Aubl. s. *Chionanthus* L.  
**Megastachya** R. u. S. s. *Sclerochlöa* P.-B.  
**Melichrus** R. Br. s. *Ventenatia* Cav.  
**Meliosma** Blum. s. *Millingtonia* Roxb.  
**Melistaureum** Forst. s. *Samyda* L.  
**Mentzelia** L. s. *Microsperma* Hook.  
**Mesosphaerum** P. Br. s. *Bystropögon* l'Hër.  
**Messerschmidia** L. s. *Tournefortia* L.  
**Meteorina** Cass. s. *Calendula* L.  
**Metnam** Forsk. s. *Passerina* L.  
**Meyëra** Spr. s. *Caesulia* Roxb.  
**Micadamia** R. Br. s. *Butyrospermum* DC.  
**Micrelium** Forst. s. *Eclipta* L.  
**Micrococcus** Cohn s. *Monas* Ehrbg.  
**Microcos** G. s. *Grewia* L.  
**Micropyrum** Gaud. s. *Nardurus* Rehb.  
**Microtea** Sw. s. *Schollera* Rohr.  
**Miegia** Pers. s. *Ludolfia* W.  
**Milnaea** Roxb. s. *Lansium* Blum.  
**Mindium** Juss. s. *Michauxia* l'Hër.  
**Misandra** Comm. s. *Gunnera* L. u. *Bonapartea* R. u. P.  
**Mnassium** W. s. *Rapatea* Aubl.  
**Mocanëra** L. f. s. *Visnea* Schreb.  
**Mocinna** Lag. s. *Galinsoga* R. u. P.  
**Modira canni** Rheed. s. *Hugonia* L.  
**Momisia** Dietr. s. *Celtis* T.  
**Monbretia** Bak. s. *Houttuynia* Thb.  
**Monerma** P.-B. s. *Lepturus* R. Br. u. *Nardus* Lob.  
**Monetia** Spr. s. *Camphorosma* L. f.  
**Monnina** Spr. s. *Jackia* Blum.  
**Monopsis** Salisb. s. *Holostigma* Spach  
**Monotöca** R. Br. s. *Styphelia* Sm.  
**Moquilea** Mart. s. *Dulacia* Neck.  
**Moschifëra** Mol. s. *Moscharia* R. u. P.  
**Mosigia** Spr. s. *Moscharia* R. u. P.  
**Mourera** Aubl. s. *Lacis* Schreb.  
**Mühlenbergia** Schreb. s. *Dilepörum* Mchx.  
**Mutella** aut. s. *Drummondia* DC.  
**Myconia** Lap. s. *Ramondia* Rich.  
**Myxotrichum** Kze. s. *Oncidium* Fr.

- Nacibea** Aubl. s. *Manettia* L.  
**Nama** Don s. *Hydrolea* Vahl.  
**Nasmythia** Huds. s. *Eriocaulon* L.  
**Natia** Adans. s. *Cenchrus* L.  
**Nematostigma** A. Dietr. s. *Libertia* Spr.  
**Nephrosperma** Balf. f. s. *Oncosperma* Blum.  
**Neuroplatyceros** Presl s. *Platyce-rium* Desv.  
**Nigrina** Thb. s. *Chloranthus* Sm.  
**Nivenia** Bak. s. *Witsenia* L.  
**Norna** Wahlbg. s. *Calypso* Salisb.  
**Nothoscorodum** Kth. s. *Millea* Cav.  
**Nothria** Berg. s. *Frankenia* L.  
**Nugaria** DC. s. *Nuga* L.  
**Nux americana** Comm. s. *Melicocca* Juss.  
**Nymphanthus** Lour. s. *Phyllan-thus* L.
- Obanna** Kämpf. s. *Erianthus* P.-B.  
**Ochrosia** Burm. s. *Cerbera* L.  
**Ocotea** Kth. s. *Nectandra* Berg.  
**Odonia** Bertol. s. *Collaea* DC.  
**O'Higginsia** R. u. P. s. *Euosma* W.  
**O'këa** aut. s. *Eriostëmon* Pers.  
**Omphalostigma** Griseb. s. *Petaso-stylis* Lindl.  
**Omphelandria** P. Br. s. *Omphalea* L.  
**Opoidea** Lindl. s. *Galbanum* Don  
**Ormocarpum** P. Br. s. *Müllera* L. f.  
**Ornithopodium** Bauh. s. *Ornithö-pus* L.  
**Orthopogon** R. Br. s. *Oplismenus* Kth.  
**Orthoscëlis** Spach s. *Heliophila* Lam.  
**Ortiga** Feuill. s. *Loasa* Adans.  
**Oscillatoria** Vauch. s. *Oscillaria* Bosc  
**Osterdikia** Burm. s. *Cunonia* R. Br.  
**Oudemansia** T. u. B. s. *Heliçtëres* Krz.  
**Outea** Aubl. s. *Macrobium* L.  
**Oxyria** Cambd. s. *Donia* R. Br.
- Pachÿne** Salisb. s. *Phajus* Lour.  
**Palovia** Aubl. s. *Dimorpha* Sm.  
**Panicastrella** Mehx. s. *Cenchrus* L.  
**Panke** Mol. s. *Gunnëra* R. u. P.  
**Papia** Mnch. s. *Orvala* DC.  
**Papularia** Forsk. s. *Trianthema* L.  
**Parivoa** Aubl. s. *Dimorpha* Sm.  
**Patma** Blum. s. *Rafflesia* Arnold
- Pavonia** Cav., R. Br. s. *Goethëa* Mart. u. *Guazuma* L.  
**Peetis** L. s. *Jacobaea* Plum.  
**Pedilea** Lindl. s. *Dienia* Lindl.  
**Pekea** Aubl. s. *Caryocar* L. u. *Rhi-zobölus* G.  
**Peltaria** L. s. *Heliophila* L.  
**Pelvu** Rheed. s. *Carreya* Roxb.  
**Pentaphylloides** Pluk. s. *Sibbaldia* L.  
**Perigara** Aubl. s. *Gustavia* L.  
**Periphragmos** R. u. P. s. *Cantua* Juss.  
**Periströphe** Nees s. *Justicia* Roxb.  
**Peroa** Pers. s. *Leucopögon* R. Br.  
**Perpensum** T. s. *Gunnëra* L.  
**Pfaffia** Spr. s. *Iresine* Spr.  
**Pharmacëum** L. f. s. *Loeflingia* L.  
**Phebalium** Vent. s. *Eriostëmon* Sm.  
**Phyllaurëa** Lour. s. *Codiaeum* Rumph.  
**Phyllöma** Haw. s. *Lomatophyllum* W.  
**Phrynum** W., Roxb. s. *Maranta* L. u. *Thalia* L.  
**Phycagrostis** autt. s. *Zostëra* L.  
**Pilosa** autt. s. *Heliophila* L.  
**Pinastella** Dill. s. *Hippuris* L.  
**Pineda** R. u. P. s. *Homalium* Pers.  
**Piperodendron** Heist. s. *Schinus* L.  
**Pitonia** DC. s. *Quinquina* Condam.  
**Plaso** Rheed. s. *Butea* Roxb.  
**Platëra** Roxb. s. *Hoppëa* Roxb.  
**Platycentrum** DC. s. *Davya* DC.  
**Platyçhylum** Delaun. s. *Goodia* Sa-lisb.  
**Plectanthëra** Mart. s. *Luxembour-gia* St. Hil.  
**Podothëca** Cass. s. *Podosperma* Lab.  
**Poivreä** DC. s. *Combrëtum* Lam.  
**Polemännia** s. *Uropetälum* Ker.  
**Polyactidium** DC. s. *Stenactis* Cass.  
**Pollichia** Schreb. s. *Neckeria* Gm.  
**Polyparea** Lour. s. *Houttuynia* Thb.  
**Polypëra** aut. s. *Polysaccum* DC.  
**Polyphragmon** Krz. s. *Helospöra* Jacks.  
**Polysiphonia** Spr. s. *Ceramium* Lyngb. u. *Hutchinsia* Ag.  
**Polystachia** Hook. s. *Cranichis* Sw.  
**Poppia** Hort. s. *Luffa* T.  
**Porçëlia** R. u. P. s. *Orchidocarpus* Mehx.  
**Portulacaria** Schreb. s. *Claytonia* L.  
**Posidonia** Kön. s. *Kernëra* W.  
**Pothos** Sims s. *Symplocarpus* Sa-lisb.

- Pourretia** R. u. P. s. *Guzmania* R. u. P., *Puya* Mol. u. *Bromelia* L.  
**Prescottia** Spr. s. *Microstylis* Nutt.  
**Procris** Comm. s. *Boehmera* Lk. (-ia Jacq.).  
**Psilothonna** E. Mey. s. *Gamolëpis* DC.  
**Psychotröphum** P. Br. s. *Psychotria* L.  
**Psygnium** Presl s. *Drynaria* Bory  
**Pterocephalus** Spr. s. *Knautia* palæst. L. f.  
**Pteronia** Röd. s. *Thalia* L.  
**Ptesia** Sw. s. *Ptesia* L.  
**Ptilomëris** Hort. s. *Shortia* Hort.  
**Pultenaea** Andr., Sm. s. *Ocylobium* Andr. u. *Mirbelia* Sm.  
**Pultenia** Andr. s. *Pultenaea*!  
**Purshia** DC. s. *Kunzea* Spr.  
**Putoria** Pers. s. *Ernodëa* Sm.  
**Pixidanthëra** Mchx. s. *Diapensia* L.
- Quinaria** Lour. s. *Cookia* Sonner.  
**Quiva** Cav. s. *Cupania* Plum.
- Racoubea** Aubl. s. *Homalium* Jacq.  
**Rafnia** Thb. s. *Crotalaria* L.  
**Randalia** Petiv. s. *Eriocaulon* L.  
**Randia** Houst. s. *Gardenia* L. f.  
**Rapourea** Aubl. s. *Camax* Schreb.  
**Razumovia** Spr. s. *Humëa* Sm.  
**Reboulia** Kth. s. *Trisëtum* Pers.  
**Renëalmia** R. Br. s. *Zerumbet* autt.  
**Renggeria** Meisn. s. *Schweiggera* Mart.  
**Resteria** Rumph. s. *Commersonia* Forst.  
**Retanilla** DC. s. *Molinaea* Comm.  
**Rhodëa** Endl. s. *Orontium* L.  
**Rhytidophyllum** Van Houtt. s. *Ophi-anthe* Hanst.  
**Robergia** Schreb. s. *Cnestis* Jacq. u. *Connarus* DC.  
**Rodriguezia** R. u. P. s. *Pleurothallis* R. Br.  
**Roeperia** Spr. s. *Roëlla* L.  
**Rourea** Aubl. s. *Cnestis* Jacq.  
**Rubioides** Soland. s. *Opercularia* Rich.  
**Rubiöla** T. s. *Crucianella* L.  
**Rumea** Poit. s. *Bessëra* Schult.  
**Rumia** Hoffm. s. *Cachrys* L.  
**Rumphia** Pers. s. *Tamarindus* Spr.
- Saccochilus** Blum. s. *Saccolabium* ds.  
**Saguërus** Roxb. s. *Sagus* Rumph.  
**Salmia** W. s. *Carlodovica* R. u. P.  
**Samara** L. s. *Memecylon* Burm.  
**Sampacca** Rumph. s. *Liriodendron* Liliifëra L.  
**Sanamunda** Breyn. s. *Passerina* L.  
**Santia** Savi s. *Polypögon* Desf.  
**Saouari** Aubl. s. *Caryocar villosum* Pers.  
**Sapröma** Brid. s. *Bruchia* Schwägr.  
**Scabrita (-tes)** L. s. *Nyctanthes* L.  
**Scaevöla** L. s. *Buglossum* Rumph.  
**Scalia** Sims s. *Podolëpis* Lab.  
**Schizodium** Lindl. s. *Disa* Berg.  
**Schmidelia** L. s. *Ornitröphe* Comm.  
**Schoepfia** W. s. *Codonium* Vahl  
**Schradëra** aut. s. *Croton* L.  
**Schufia** Spach s. *Fuchsia* Plum.  
**Sclerostylis** Blum. s. *Glycosmis* Corr.  
**Scleroxylon** W. s. *Sideroxylon* ds.  
**Securigëra** DC. s. *Securidaca* Mill.  
**Securilla** Pers. s. *Securidaca* Mill. u. *Bonaveria* Scop.  
**Sedoides** Herm. s. *Crassula centauroid.* L.  
**Seguine** autt. s. *Dieffenbachia* Schott.  
**Septas** cap. L. s. *Crassula umb.* Jacq.  
**Sessëa** R. u. P. s. *Cestrum* L.  
**Sethia** St. Hil. s. *Erythroxydon* L.  
**Simsia** R. Br. s. *Ximenesia* Cav.  
**Siphocampylos** Pohl s. *Centropögon* Benth.  
**Sirium** Roxb. s. *Santalum* L.  
**Sloanea** L. s. *Oxyandra* DC. u. *Echinocarpus* Blum.  
**Smegmadermos** R. u. P. s. *Smegmaria* W.  
**Solenandra** Vent. s. *Blandfordia* Andr.  
**Solenia** W. s. *Cyrtanthus* Schreb. u. *Posoqueria* Aubl.  
**Sonneratia** L. s. *Mangium* Rumph.  
**Sophronia** Lindl. s. *Sophronitis* ds.  
**Spadonisma** DC. s. *Moquinia* ds.  
**Spananthe** Jacq. s. *Hydrocotyle* W.  
**Sparganophörus** Lag. s. *Coelestina* Cass.  
**Spathiphyllum** Schott. s. *Stenospermatium* ds.  
**Spathularia** Pers. s. *Spatulëa* Fr.  
**Spermatura** Rehb. s. *Urosperma* Nutt.

- Spiranthēra** St. Hil. s. *Terpnanthus* Mart.  
**Sphaeralcēa** Spach s. *Malva* miniat. Cav.  
**Sphaerocarpa** DC. s. *Centropōgon* Benth.  
**Sphaerocarya** DC. s. *Retinaria* G.  
**Sphaerophysa** DC. s. *Colutea* casp. M. B.  
**Stackia** insignis autt. s. *Decaisnēa* Hook. f.  
**Stachelina** L. = *Centaurēa*, sect. *Cyānus* Rchb.  
**Stachelina** Crantz s. *Bartsia* L.  
**Stachelina** Walt. s. *Liātris* G.  
**Stadmannia** Spr. s. *Melicocca* Juss.  
**Staurophōra** W. s. *Lunularia* Mich.  
**Stemodiaera** P. Br. s. *Scordium* Sloan.  
**Stenhammēra** Rchb. s. *Pulmonaria* L.  
**Stereocaulon** Schreb. s. *Sphaerocephalus* Pers.  
**Steris** Burm. s. *Hydrolēa* Vahl  
**Stevensonia** H. Wendl. s. *Ver-schaffeltia* ds.  
**Sticta** Hoffm. s. *Pulmonaria* Hoffm.  
**Streptium** Roxb. s. *Blaeria* L. u. *Tortūla* Roxb.  
**Stroemia** Vahl s. *Cadaba* Forsk.  
**Stylis** Poir. s. *Stylidium* Sw.  
**Stylophōrum** Nutt., Spr. s. *Chelidonium* L. u. *Meconopsis* Vīg.  
**Stylosanthes** Schreb. s. *Hedysārum* hamat. L.  
  
**Tangu** Pluk. s. *Cyminosma* G. u. *Caryophyllus* aromatic. L.  
**Tambourissa** Bak. s. *Mithridatea* Comm.  
**Tapinia** Dietr. s. *Montbretia* Réd.  
**Tapogomea** Aubl. s. *Cephaelis* Sw.  
**Tasmannia** R. Br. s. *Wintēra* L.  
**Tatarica** Clus. s. *Crambe* T.  
**Telfel Tavail** Alp. s. *Cynanchum* viminalē L.  
**Tenorēa** Spr. s. *Buprestis* ds.  
**Tetragonocarpus** Comm. s. *Tetragonia* L.  
**Tetramerium** G. s. *Xora* Sw.  
**Tetrodontium** Brid. s. *Tetraphis* Hedw.  
**Teueris** u. *Teucropsis* Benth. s. *Teucrium* L.  
**Theodōra** Med. s. *Bonduc* Plum.  
**Thibandia** Hb. s. *Lussacia* Spr.
- Thlaspidioides** Barrere s. *Dodonaea* L. u. *Staphylo-dendron* Pluk.  
**Thomasia** Gay s. *Lasiopetalum* Sm.  
**Thyrsine** Gled. s. *Cytinus* L. u. *Hypocistis* T.  
**Tigarea** Pursh s. *Kunžēa* Spr.  
**Timbuleta** Forsk. s. *Dodartia* L.  
**Timonius** Bak. s. *Helospōra* Jacks.  
**Timonius** Rumph. s. *Erithālis* Forst.  
**Tittmannia** Rchb. s. *Vandellia* L.  
**Toddalia** Juss. s. *Scopolia* Sm.  
**Togularia** aut. s. *Ceranium* Reinw.  
**Tomex** L. s. *Callicarpa* L. u. *Kaempferā* Houst.  
**Trachylobium** aut. s. *Hymenaea* L.  
**Trachymene** Grah. s. *Hūgelia* Rchb. u. *Didiscus* DC.  
**Trachytella** DC. s. *Calligōnum* L.  
**Tragia** L. s. *Mercurialis* L.  
**Traunsteinēra** Rchb. s. *Nigritella* Rich.  
**Trembleya** DC. s. *Jacobia* ds.  
**Tribrachia** Lindl. s. *Bolbophyllum* P.-Thou.  
**Trichogyne** DC. s. *Ifloga* Cass.  
**Trichophyllum** Nutt. s. *Helenium* Spr.  
**Trichostōmum** Hedw. s. *Ceratōdon* Brid.  
**Trieyla** Lam. s. *Bougainvillēa* Comm.  
**Trigōnis** Jacq. s. *Cupania* L.  
**Trioptēris** Banks s. *Hiraea* Jacq. u. *Tetraptēra* Cav.  
**Tripterella** Elliot s. *Burmannia* L.  
**Trisetaria** Poir. s. *Trisetum* Pers.  
**Tromsdorffia** Mart. s. *Liebigia* Endl.  
**Trophis** L. s. *Bucephālum* Plum.  
**Turbith** Tausch. s. *Libanotis* Scop.  
**Turnēra** L. s. *Chamaecistus* Sloan.  
**Turpinia** Vent. s. *Dalrymplea* Spr.  
**Turpinia** Spr. s. *Poiretia* Vent.
- Ubiun** Rumph. s. *Stemōna* Lour.  
**Uricia** Hortul. s. *Lepechinia* W.
- Verēa** W. s. *Crassula* *Cotylēdon* Jacq. u. *Kalanchoē* Adans.  
**Vermicūla** Col. s. *Scleranthus* L.  
**Villanova** Lag. s. *Parthenium* L. u. *Unxia* W.  
**Villaresia** F. Müll. s. *Chariessa* Becc.  
**Viminaria** Lk. s. *Daviesia* Sm.

- Viraya** Gaudich. s. *Leptorrhynchus* Benth.  
**Vouapa** Aubl. s. *Macrolobium* L.  
  
**Walkera** W. s. *Meesia* Hedw.  
**Walkeria** Ehret. s. *Nolana* L. u. *Teganum* Schmidel  
**Wallisia** Schwägr. s. *Schlimmia* Planch.  
**Wallrothia** Roth s. *Vitex* L.  
**Wangenheimia** Mnch. s. *Cynosurus* L.  
**Warneria** Mill. s. *Hydrastis* L.  
**Weinmannia** Cunn. s. *Caldcluvia* G. Don  
  
**Wendlandia** W. s. *Cocculus* DC.  
**Wickstroemia** Schrad. s. *Haemochäris* Sal. u. *Gordonia* Spr. (*Lindleya* Nees).  
**Willdenowia** Thb. s. *Restio* L.  
**Willughbeia** Roxb. s. *Fagraea* Thb.  
**Winterana** Soland. s. *Wintëra* L.  
  
**Ximenia** Poir. s. *Balanites* DC.  
**Xylosma** Schreb. s. *Myroxylon* L. f.  
  
**Zaleya** Burm. s. *Trianthema* L.  
**Zaluzania** aut. s. *Zamia* L.  
**Zornia** Gm. s. *Dicerma* DC.  
**Zygotrichia** Brid. s. *Tortula* Hedw.
-

## B. Deutsch-, Trivial- und Fremdnamen der technischen, merkantilen und besonders wichtigen sonstigen Pflanzen und ihrer Produkte nach wissenschaftlicher Benennung.<sup>1)</sup>

- Aaspflanze** Stapelia.  
**ABC-Pflanze** Spilanthes Acmella.  
**Achiar** (köstl. Konfekt aus Wurzelspross.) Bambusa arundinacëa.  
**Abthon** (Erauenhaar) Trichomänes.  
**Acajou** (echte) Anacardium orientale, (Mahagoni) Swietenia, (falsche) Strychnos Nux vomica.  
**Ackernuss** (Erdkastanie) Bunium Bulbocastanum.  
**Adamsapfel** Citrus Limetta.  
**Adlerholz** Aquilaria, (echtes) Aloëxylon, (unecht.) Excoecaria Agalöchum.  
**Advokatobaum** Persëa gratissima.  
**Affenblatt** Uvularia.  
**Affengesichtbaum** Rottlera s. Croton.  
**Afrikaner** Tagëtes patula.  
**Agrume** Citrus decumana, medica u. aurantium.  
**Ahlbeere** (Alantb. Mej.) Ribes nigrum.  
**Ahle** (Ahlkirsche) Prunus Padus.  
**Alber** (e. abele-tree) Populus (Pappel).  
**Alereobaum** Fitzroya patagonica.  
**Alhenna** Lawsonia alba u. inermis.  
**Alkana** Anchusa tinctoria, (echte) Alhenna.  
**Almrausch** Rhododendron ferrugineum.  
**Aloëholz** Aloëxylon (s. Adlerholz).  
**Alpbalsam** (Alpenröschen) s. Almrausch.  
**Alpenbitter** (Iva) Achillea moschata.
- Alpranke** (Bittersüss) Solanum Dulcamara.  
**Amarant-Cayenneholz** Nissolia.  
**Amarelle** Cerasus acida.  
**Ameisenbaum** Cecropia u. Triplaris americ.  
**Amelkorn** (Blicken) Oljra latifolia.  
**Amerikagrass** Stenotaphrum s. Americanum complanatum.  
**Ammern** (Emmer, Ehmer) Triticum dicoccum u. Oljra.  
**Ammoniakpflanze** Dorëma armenica.  
**Amstel** (Wielandskr.) Thalictrum.  
**Ananaskirsche** Physalis s. Atröpa edulis.  
**Angelikabaum** Aralia spinosa.  
**Angosturarinde** Galipea officinalis.  
**Angurien** (Wassermelone) Cucumis Citrullus.  
**Anis** Pimpinella Anisum.  
**Anke** Pinguicula.  
**Ankerblume** Rhexia.  
**Anthophyllus** Offiz. (Mutternelke) Eugenia Caryophyllus.  
**Antillen-Ebenholz** Byra Ebum.  
**Antoniblüh** Philadelphus Coronarius.  
**Antscharbaum** (-gift) Antiaris Toxicaria.  
**Apfel** (amerikan.) Pirus coronaria L.  
**Apfelmelone** Cucumis Dudaim.  
**Apostemkraut** Knautia (Scabiosa) arvensis.  
**Arabisch-Gummi** Acacia arabica, gummifera etc.

1) Der Kürze wegen sind nur die der Erklärung bedürftigsten aufgenommen.  
D. Verf.



- Arbe** (Arve) *Pinus Cembra*.  
**Arbuse** (fr. arbouisse) s. Angurien.  
**Arghel-Blätter** *Solenostemma Arghel*.  
**Arlitze** (Elzbeere) *Sorbus torminalis*.  
**Armleuchterbaum** s. Ameisenb.  
**Arrow-Root** (ostind.) *Dioscorca*, (tahit.) *Tacca*, (westind.) *Maranta arundinacea*.  
**Asa foetida** *Ferula* s. *Scorodosma Asa foetida*.  
**Asand** (Stinkasand) s. eb.  
**Aschitze** *Sorbus Aria* u. *Aucuparia*.  
**Atlasholz** *Ferolia guianensis*.  
**Augenwurz** *Athamanta*.  
**Austerbaum** *Rhizophora Mangle*.  
**Ayrshire-Rose** (Schling-) *Rosa repens* s. *capreolata* u. *rubifolia*.
- Bacille** (Meerfenchel) *Crithmum maritimum*.  
**Badeschleim** *Oscillatoria*.  
**Badian** (Sternanis) *Illicium anisatum*.  
**Bajonettblume** *Yucca*.  
**Bärentatze** *Clavaria Botrytis*.  
**Balsam** (arab.) *Amýris Kataf*, (Copaiva-) *Copaifera* off., (Gilead-) *Balsamodendron gileadense*, (Meca-) *B. Opobalsamum*, (peruvian.) *Myrospermum*, (Tolu-) ebenso.  
**Balsamapfel** (Springgurke) *Momordica Elaterium*.  
**Balsamholz** (peruv. Balsam) *Myroxylon peruiferum*.  
**Balsampflaume** *Myrobalanus* s. *Spondias*.  
**Balsternaken** (Pastinak) *Pastinaca*.  
**Bambuspalm** (stiellose Wein-) *Raphia*.  
**Banane** (Pisang) *Musa*.  
**Bandgras** *Phalaris arundinacea picta*.  
**Baniane** *Ficus indica* u. *benjamina*.  
**Barille** *Salsola Kali* u. *Soda*.  
**Bartsch** (Bärenklau) *Acanthus* u. *Heraclum*.  
**Bartgerste** *Hordeum Zeocriton*.  
**Barthengel** (Frauenbiss etc.) *Teucrium*.  
**Batate** (echte) *Batatas*, (falsche) *Helianthus tuberosus*.  
**Batava** (Palmwein) *Oenocarpus Batava* Mart.
- Bathengel** (Gamander - Ehrenpreis) *Veronica Chamaedrys*.  
**Batunge** (Vatunge) *Betonica L.* (*Stachys* Bet.).  
**Bauernrose** (Gicht-) *Paeonia*, (Centifolie) *Rosa Cent.*  
**Bauernschminke** *Lithospermum arvense*.  
**Baumbine** (Palmgras) *Prionium*.  
**Baumcactus** *Peireskia*.  
**Baummoos** *Thamnum*.  
**Becherfarn** *Trichomanes*.  
**Behennüsse** (-öl) *Guilandina Moringa*.  
**Beisskohl** (römisch-) *Beta Cicla*.  
**Benzoe** (echte) *Styrax Benzoin*.  
**Bergamotten** (Citronen) *Citrus medica*.  
**Bergthee** *Gaultheria*.  
**Bernitze** (Himbeere) *Rubus idaeus*.  
**Bernsteinbaum** *Pinites succinifer*.  
**Bertram** (deutsch., s. g. Dorant) *Achillea Ptarmica*, (gemeiner, s. g. Mutterkr.) *Chrysanthemum Pyrethrum*.  
**Bertramswurz** *Anacyclus* u. *Pyrethrum*.  
**Besinge** (Knöppel-) *Fragaria collina*.  
**Betelnüsse** *Arca Catéchu*.  
**Bethlehemstern** *Ornithogalum*.  
**Bettlersläuse** *Torilis Anthriscus* u. *Galium Aparine*.  
**Bettstroh** (Frauen-) *Galium verum*.  
**Beutling** *Pleurospermum*.  
**Bezette** *Croton tinctorium*.  
**Biberbaum** *Magnolia*.  
**Bickbeere** (Heidel-) *Vaccinium Myrtillus*.  
**Bienenheide** (Sumpfporst) *Ledum palustre*.  
**Bilimbi** od. **Blingingbaum** *Averrhoa Bilimbi*.  
**Bigarrado** (Warzen-Pomeranze) *Citrus aurantium vulgare*.  
**Birzstrauch** (Wachsbeer-) *Myricaria*.  
**Bitterholz** *Quassia amara* u. *Xylopicron*.  
**Bitterlinge** *Polygalae*.  
**Bitterpilz** (Dickfuss) *Bolétus pachypus*.  
**Bitterschwamm** (Schwefelkopf) *Hypophoma fascicularis*.  
**Blacke** *Homogyne*.  
**Blaugummibaum** (Fieber-) *Eucalyptus globulus*.

- Blauholz (Campeche-)** *Haematoxylon campechianum*.  
**Bläuling** *Amethystea coerulæa*.  
**Blicken** (Amelkorn) *Olyra latifolia*.  
**Block-Ingwer** *Amomum Zerumbet*.  
**Blumenkohl** *Brassica oleracea botrytis*.  
**Blutholz** s. Blauholz.  
**Blutwurz** *Tormentilla*.  
**Boa-** od. **Bohon-Upas** *Antiäris toxicaria* (Antschar).  
**Bocksdorn** *Astragalus* u. *Lycium* (Teufelszwirn).  
**Bockskraut** *Androsaemum hircinum*.  
**Bocksweizen** *Atraphaxis*.  
**Bohnenkapper** *Zygophyllum Fabago*.  
**Bolle** (Sommerzwiebel) *Allium Cepa*.  
**Borstenglocke** *Campanula Cervicaria*.  
**Botrys mexicana** Offiz. = *Chenopodium ambrosioides*.  
**Bouquetwicke** *Lathyrus latifolius*.  
**Bourbonthee** *Angraecum*.  
**Brachschötchen** *Calepina*.  
**Brasilienbaum** *Melastoma Acinodendron*.  
**Brasilienholz** (rot.) *Caesalpinia brasiliensis* u. *echinata*, (gelb. od. braun.) *C. Sappan*, (ostind.) *Pterocarpus Draco*.  
**Bratenkraut** (Garten - Thymian) *Thymus vulg.*  
**Brätling** (Milchpilz etc.) *Galorhoeus*.  
**Brauerkraut** (Sumpfporst) *Ledum palustre*.  
**Braunholz** *Caesalpinia Sappan*.  
**Bräunewurz** *Asperula cynanchica*, (Bräunenblume) *Prunella*.  
**Brautpflanze** *Talinum*.  
**Brechhülse** *Ilex vomitoria*.  
**Brechnuss** *Strychnos nux vomica*, *Jatropha* u. *Janipha*.  
**Brechwurz** *Cephaelis* s. *Ionidium Ipecacuanha*.  
**Breiapfel** *Achras Sapota*.  
**Brennbohne** *Mucuna*.  
**Brennpalme** *Caryota urens*.  
**Brennwinde** *Loasa*.  
**Brocoli** (Spargelkohl) *Brassica olerac. asparagoides*.  
**Brotnussbaum** *Brosimum Alicastrum*.  
**Brombeerraute** *Vepris*.  
**Bruchkraut** *Herniaria* u. *Sanicula*.  
**Brunnenbaum** *Tetracera potatoria*.  
**Brustbeere** *Sebestena* u. *Zizyphus vulg.*  
**Buceoblätter** *Diosma* (Barosma).  
**Bufbohne** (Sau-) *Vicia Faba*.  
**Büffelgras** *Aristida purpurea*.  
**Büffelhornholz** *Burchellia capensis*.  
**Bügelholz** *Celastrus*.  
**Bügelholzbirne** *Salacia*.  
**Bulte** *Ballota*.  
**Büngel** *Callitriche*.  
**Büschelglocke** *Campanula glomerata*.  
**Bunke** (Silbergras) *Weingärtneria* s. *Corynephorus*.  
**Burgel** *Peplis*.  
**Butterbaum** *Bassia butyracea* (Pilippe, *Pentadesma butyr.*), (**Sudan-**) *Vitellaria paradoxa* u. *Micadania* s. *Butyrospermum Parkii*.  
**Butterblume** *Caltha*, *Ranunculus* u. *Ficaria*.  
**Butterfass** (gross.) *Nuphar lutëum*.  
**Butter-** od. **Ölnuss** *Juglans cinerea* u. *Rhizobolus* s. *Pekea butyrosa*.  
**Butterpilz** *Bolëtus lutëus*.  
**Butter-** od. **Schmeerwurz** *Pinguicula*.  
**Byzantinernuss** (-hasel) *Corylus Colurna*.  
**Cacaomalve** *Abroma*.  
**Cacaopflaume** *Icacina* (Icaco).  
**Caesumniarwurz** (Block-Ingwer, s. d.).  
**Cajaputölbaum** *Melaleuca Leucadendron*.  
**Caina-** (**Cahinea-**) Wurzel *Chiococca anguifuga* etc.  
**Calabasse** *Cucurbita Lagenaria*.  
**Cambogia-** od. **Cambodscha-** Stalagmit *Xanthochymus*.  
**Camote** (Batate, s. d.).  
**Campecheholz** s. Blauholz.  
**Canariengras** (-samen) *Phaläris canariensis*.  
**Cantaluppe** (Prescott) *Cucumis Melo* var.  
**Caoutschukbaum** *Siphonia elastica* s. *Hevea guianensis*, (ostind.) *Urceöla* s. *Tabernaemontana elast.* u. *Ficus elast.* u. *religiosa*.  
**Cap-Eisenholz** *Gardenia*.  
**Capuzinerpulver** *Veratrum Sabdilla*.  
**Caraghen** *Sphaerococcus crispus*.

- Carabou** s. Nimbobaum.  
**Cardobenediktenkraut** Centaurēa Benedicta.  
**Cardun** od. **Cardy** (Chardonna) Cynāra Carduncūlus.  
**Carfiol** (Blumenkohl, s. d.).  
**Cascarillenrinde** Clutia Eluteria.  
**Cassavebrot (-wurz)** Dioscorēa u. Jatrōpha Manīhot.  
**Cassonade** (Moscovade) Sacchārum.  
**Cayennekirsche** Eugenia Michellii Lam.  
**Cayennepfeffer** Capsicum baccatum.  
**Ceder (Libanon-)** Pinus Cedrus L., (rote od. virginische) Juniperus virginiāna,  
**Cedernholz (Cigarrenkisten-)** Cedrēla odorata.  
**Cedrat-Citron** Citrus medīca.  
**Cedronbohne** Simarūba ferruginā.  
**Centumnodia** Offiz. = Polygonum aviculare.  
**Chamburu** (gift.) Carīca digitata.  
**Champagnerröschen** Rosa pulchella (R. provincialis v.)  
**Champignon** Psalliota s. Agaricus campestris.  
**Chinaäpfel** (Apfelsinen) Citrus aurantium sinensis.  
**Chinabeere** Sarcocēphalus.  
**Chinagrass** Urtica nivēa u. Boehmeria utilis.  
**Chinarinde** (echte) Cinchona officin., (unechte) s. Chinawurzel, (bras.) Evodia febrifuga.  
**Chinarose** Hibiscus rosa chinensis.  
**Chinawurzel** Smilax China.  
**Chokoladenbohne** TheobromaCacāo.  
**Chokoladenstrauch** Ribes aurēum.  
**Christblume** Hellebōrus niger.  
**Christusauge** Aster alpinus.  
**Christusdorn** Paliūrus (Rhamnus s. Zizyphus) spina Christi u. Gleditschia triacantha.  
**Christuspalme** (Wunderbaum) Ricinus communis.  
**Christwurz** (Niess-) Hellebōrus.  
**Cibebe** (Zibebe, grosse Rosinen) Vitis vinifera.  
**Cigarrenkistenholz** s. Cedernholz.  
**Cigarrenpalme (Roll-)** Licuāla.  
**Cinae** (sc. semina) Offiz. Artemisia contra etc.  
**Citron** Citrus medīca.  
**Citronenkraut** Melissa offic. u. Artemisia Abrotānum (Stabwurz).  
**Citronenstrauch** Lippia citriodōra (Verbēna triphyllus).  
**Coca (-blätter)** Erythroxyllon Coca.  
**Cocoholz** Swartzia tomentosa.  
**Coko** (Kalo etc.) Caladium esculentum.  
**Colombowurz** Menispermum palmatum (Cocculus palmatus).  
**Coloquinte** Cucumis Colocynthis.  
**Colsat** fr. = Kohlsaar Brassica campestris.  
**Condori-** od. **Corallenholz** Adenanthēra Pavonia u. Erythrina Corallodendron.  
**Contrayerva** Dorstenia Contrayerva u. Milleria Contr.  
**Copaivabalsam** Copaifera.  
**Copalbaum** (echter, ostind.) Vateria indica, (unecht. od. Copalgummi) Rhus Copallinum, (amerik.) Hy-menaea.  
**Corallenbäumchen (-kirsche)** Solanum Pseudo-Capsicum.  
**Corallenholz** s. Condoriholz.  
**Corallenschwamm** s. K.  
**Cubacedernholz** s. Cedernholz.  
**Culilawarinde** (unecht. Zimmet) Cinnamōmum syntoc s. spurium.  
**Curaregiftbaum** Hippomāue Manicella u. Strychnos Tiente etc.  
**Cussave** s. Cassavebrot.  
**Cymbelblume** Nolana, -kraut Linaria Cymbalaria u. Cephalanthēra.  
**Cypressenkraut** Santolina Chamaecyparissus.  
**Dammaraharz** Pinus Dammara (Agāthis).  
**Darrgras** Holcus u. Hierochlōa.  
**Dattelpflaume** Diospyros Ebēnum.  
**Deckschimmel** Trichoderma.  
**Degent** (schwarzer, Birkenrindenöl, Oleum rusci Offiz.) Betula alba.  
**Delehpalme** Borassus Aethiopum.  
**Denkmein** (Gedenkemein) Ompalodes verna.  
**Dintenbaum** (ostind.) Semecarpus.  
**Dochtmalpighe** Thryallis.  
**Dohr** (Löwenzahn) Leontōdon.  
**Donnerkraut** Sedum Telephium.  
**Donrian** (Flöhkraut) Pulicaria.  
**Doradille** Ceterach officinarum.  
**Dorant** Achillēa Ptarmica u. Antirrhinum.  
**Dornkirsche** Zizyphus Jujuba.

- Dötterlein** (Finkensamen) *Neslea*.  
**Drabe** (Wassernuss) *Trapa*.  
**Drachenblut** *Pterocarpus Draco* u. *Calāmus Dr.*  
**Drachenzurz** *Arum Dracuncūlus* u. *Calla palustris*.  
**Dragon** (Esdragon) *Artemisia Dracuncūlus*.  
**Drehling (-wurz)** *Spiranthes*, (Austernpilz) *Pleurōtus ostreatus*.  
**Drehstamm** *Kielmeyera*.  
**Dreifaltigkeitsblume** *Trientalis europaea* u. (Stiefmütterchen) *Viola tricolor*.  
**Drosselbeere (Vogel-)** *Sorbus Aucuparia*.  
**Drosswurz** *Scrophularia*.  
**Drunt** (Leinkraut) *Linaria*.  
**Dubenwok** (Schafthalm) *Equisētum*.  
**Duhn** (Pinselgras) *Penicillaria*.  
**Dumpalme (Ast-)** *Hypphaena*.  
**Dungras (Woll-)** *Eriophōrum*.  
**Durchwachs** *Bupleurum*.  
**Durian** (Zibethbaum) *Durio Zibethinus*.  
**Dürlitze** (Herlitzte, Cornelkirsche) *Cornus mas*.  
**Dürrbusch** *Xerophyta* u. *Xerothermum*.  
**Durrha** (Sorgho, Mohrrirse) *Sorghum vulgare*.  
**Duvok** s. *Dubenvok*.  
**Ebenholz** (schwarz.) *Diosp̄ros Ebēnum*, (Madagascar-) *Milletia leucantha*, (westind.) *Aspalāthus Ebēnus* (Amerimnon Eb.).  
**Eberich** (Weidenröschen) *Epilobium*.  
**Eberraute (-reis, Stabwurz)** *Artemisia Abrotānum*.  
**Eberwurz** (Karlsdistel) *Carlina*.  
**Edelpilz (Stein-, Herrn-)** *Bolētus edulis*.  
**Edelweiss** *Gnaphalium Leontopodium*.  
**Egelfelberich** *Lysimachia Nummularia*.  
**Ehegras** *Apluda*.  
**Elmer** (Emmer) s. *Ammern*.  
**Eibencypresse** *Taxodium*.  
**Eichenholz** (afrik.) *Oldfieldia*.  
**Eichhase** *Polypōrus umbellatus*.  
**Eierbaum** *Hernandia ovigera*.  
**Eierfrucht (-pflanze)** *Solanum Melongēna* s. *insanum* (Trongum hortense).  
**Eierschwamm** *Cantharellus cibarius*.  
**Einblatt** *Parnassia palustris*.  
**Einknolle** *Monorchis*.  
**Einkorn (St. Peters-)** *Triticum monococcum*.  
**Eintagblume** *Lysimachia nemorum* u. *Tradescantia virginica*.  
**Eisenhart (-kraut)** *Verbena*.  
**Eisenholz** (asiat.) *Metrosidēros vera*, (austral.) *Stadmannia australis* u. (Schwarzholz) *Acacia Melanoxylon*, (Cap-) *Gardenia Rothmanni*, (Ceylon-) *Mesua ferrēa*, (Cochinch-) *Baryxylum rufum*, (Jamaika-) *Fagāra Pterōta*, (Java-) *Cryptocarya ferrēa*, (indisch.) *Manglilla Chrysophyllum* u. *Sideroxylon*, (Intsi-) *Acacia Intsia*, (- Isle de France od. Bourbon) *Cossinia borbonica*, (Maba-) *Ferreola Maba* s. *buxifolia*, (weiss.) *Sideroxylon cinerēum*.  
**Eiskraut** *Mesembryanthemum crystallinum*.  
**Elemiharz** *Am̄yris elemifera* (Icariba) u. *Icaica*.  
**Elephantenapfel** *Feronia elephantum*.  
**Elephantenbaum** *Phytelēphas* od. *Elephantusia*.  
**Elephantenfuss** *Testudinaria elephantipes*.  
**Elephantenläuse** *Anacardium orientale*.  
**Elephantenrüssel** (Gemshorn) *Martynia*.  
**Elfenbein** (vegetabil.) *Phytelēphas macrocarpa* u. *Manicaria saccifera* (Pilophōra).  
**Eller** (Erle) *Alnus*.  
**Else** (Eller, Erle) s. eb.  
**Elsbeerbaum** (Arlesbeerb.) s. *Arilitze*.  
**Elsebeere** (Traubenkirsche) s. *Ahle* (Ahlkirsche).  
**Emmer** (Ehmer) s. *Ammern*.  
**Enfer** (Ingwer) *Zingiber officinale*.  
**Engelsblume** *Trollius*.  
**Engelwurz** *Angelica* u. *Archangelica* (Erzengelw.), auch *Gentiana cruciata* (Sibyllen-).  
**Englisches Gewürz** *Myrtus Pimenta*.  
**Englischer Spinat** *Rumex Patientia*.  
**Entwin** (Gicht- od. Zaurrübe) *Bryonia*.

- Enzian** (weisser) *Laserpitium latifolium*.  
**Erdbeerbaum** *Arbutus* u. *Benthamia*.  
**Erdbirne** (Topinambur) *Helianthus tuberosus*.  
**Erde** (japanische) *Mimosa Catēchu* (Terra s. *Succus Catechu* Offiz.).  
**Erdeichel** *Arachis hypogaea* u. *Lathyrus tuberosus*.  
**Erdkastanie** *Carum* s. *Bunium Bulbo-castānum*.  
**Erdmandel** *Cypērus esculentus*.  
**Erdmäuse** s. Erdeichel.  
**Erdnuss** s. Erdeichel u. Voandzoua s. *Glycine subterranea*.  
**Erne** *Lavatēra*.  
**Escariol** = breitblättr. *Endivie*.  
**Eschlauch** (Schalotte) *Allium ascalonicum*.  
**Esdragon** s. Dragon.  
**Esparterogras** (Halfa) *Macrochlōa*.  
**Esicot** (Schusserbaum) *Gymnocladus*.  
**Essigbaum** (Essig- od. Hirschkolbe) *Rhus typhina*.  
**Essigrose** (Zucker-) *Rosa gallica*.  
**Espeln** (welsche) *Azarölus*.  
**Estragon** s. *Esdragon*.  
**Faamblätter** (Bourbonthee) *Angraecum*.  
**Fadenblatt** *Zannichellia*.  
**Fadenseide** (Flachsseide) *Cuscūta*.  
**Fallkraut** *Arnica montana*.  
**Faseln** *Dolichos* u. *Phaseolus* (Bohne).  
**Fassholz** *Bauhinia*.  
**Faulbrand** (Schmier-) *Urēdo sitophila*.  
**Federharzbaum** s. *Caoutschukb.*  
**Feigbohne** *Lupinus* u. *Thermopsis* s. *Podalyria* (Fuchsbohne).  
**Feigwurz** (Feigwarzenkr.) *Ficaria ranunculooides*.  
**Feinchen** (Feinstrahl) *Stenactis*.  
**Felbrich** (Gilbweiderich) *Lysimachia*.  
**Feldohmkrant** *Aphānes arvensis*.  
**Feldsalat** (Nisschen, Nissel etc.) *Fedia* s. *Valerianella olitoria*.  
**Feldspinat** *Blitum bonus Henricus*.  
**Fenechelholz** *Laurus Sassāfras*.  
**Fennich** *Panicum* u. *Setaria* (Borstengras), welscher *F. Panicum italicum*.  
**Fernambukholz** *Caesalpinia echinata*.  
**Festblume** *Ketmia rosēa*.  
**Festholz** (Wagen-) *Visnea Mocanēra*.  
**Fettbaum** *Sapium*.  
**Fettmännchen** od. **Schmalzkraut** s. *Feldsalat*.  
**Feuerblume** (Klatschrose) *Papāver Rhoeas*.  
**Feuerkraut** (*Herba ignis* Offiz.) *Baeomyces ignifērus*.  
**Fenerschwamm** (Zunder-) *Polypōrus igniarius*.  
**Ficatin** (Rosen-Sissuholz) *Dalbergia latifolia*.  
**Fieberbaum** (blauer) *Eucalyptus globūlus*.  
**Fieberholz** *Swietenia febrifuga*.  
**Fieberkraut** (Helmkr.) *Scutellaria* u. (Mutterkr.) *Matricaria Parthenium*.  
**Fiebernuss** *Ignatia amara*.  
**Fieberrinde** s. *Chinarinde*.  
**Fingerpilz** *Verpa* u. *Xylaria* (Holzp.).  
**Finkensamen** *Neslea*.  
**Fioringras** *Agrostis alba* s. *stolonifera*.  
**Firnissbaum** (Hindostan. Kheu) *Melanorrhoea usitata*.  
**Firnissumach** *Rhus Vernix*, (japan.) *Rhus vernicifera*.  
**Fischfänger** *Piscidia Erythrina*.  
**Fischkörner** (Kokkels-) *Anamirta Cocculus*.  
**Fischtöter** s. *Fischfänger*.  
**Fisetholz** (Fustel-, Fustik-) *Rhus Cotinus* u. *Broussonetia tinctoria*.  
**Flaschenbürste** (Schönfaden) *Callistemon*.  
**Flatterrose** s. *Essigrose*.  
**Fleischblume** *Sarcanthemum*, (*Kukkslichtnelke*) *Lychnis flos cuculi*.  
**Flieder** *Sambucus*, (spanisch.) *Syringa*.  
**Fliegenfalle** *Apocynum androsae-mifolium* u. *Dionaea*.  
**Fliegenholz** *Quassia amara*.  
**Fliegenpilz** (-schwamm) *Amanita muscaria*.  
**Flittergras** (Liebes-) *Eragrostis*.  
**Flöhkraut** *Erigēron*, (-Knöterich) *Polygonum Persicaria*, (-Alant) *Inula Pulicaria*.  
**Flohsamen** *Plantago Psyllium* u. *arenaria*.

- Flohtöter** Pyrethrum.  
**Fluttgras** *Glyceria fluitans*.  
**Forle** (Föhre, Kiefer) *Pinus silvestris*.  
**Franzosenholz** (Pocken-, lignum sanctum) *Guayacum officinale*.  
**Franzosenkraut** *Erigéron canadense* u. *Galinsoga parviflora*.  
**Frauenbiss** (Bathengel etc.) *Teucrium*.  
**Frauenhaar** (-gras) *Gynerium*, (-farn) *Adiantum Capillus Veneris* u. *Trichomanes*, (Zartriet) *Isolepis gracilis*.  
**Frauenminze** *Tanacetum Balsamita*.  
**Frauenstroh** *Galium verum* (Labkraut).  
**Frauenthräne** *Ophrys muscifera* etc.  
**Freisamkraut** (Stiefmütterchen) *Viola tricolor*.  
**Friedlos** (Gilbweiderich) *Lysimachia vulg.*  
**Frieslein** *Tunica*.  
**Froschlattich** (Laichkr.) *Potamogeton*.  
**Frühmorchel** (Stock-) *Helvella*.  
**Fuchsbohne** *Podalaria s. Thermopsis*.  
**Fuchshirse** (welsch. Fennich) *Panicum italicum*.  
**Fünfling** *Spergella nodosa*.  
**Fungus chirurgorum** Offiz. (Bovist) *Lycoperdon*.  
**Fungus melitensis** Offiz. (Hundsruete) *Cynomorium coccineum*.  
**Fustelholz** (Fustik-) *Broussonetia tinctoria*.  
**Futterhahnenkopf** (Esparsette) *Onobrychis*.  
**Futternessel** *Trophis s. Bucephalon*.  
**Futtertrespel** *Festuca gigantea* (Bromus gig.).  
  
**Galei** (Geisraute) *Galēga*.  
**Galgant** *Alpinia Galanga*.  
**Gallertflechte** *Collēma* u. *Leptogium*.  
**Gallertmoos** s. Caraghen.  
**Gambianuss** (Erdmandel) *Arachis hypogaea*.  
**Gambirstrauch** *Nauclea Gambir* u. *Uncaria*.  
**Gambohanf** *Galphimia Hibiscus*.  
**Gamsennach** *Azalea procumbens*.  
**Ganiterbaum** *Elaeocarpus*.  
**Gänserich** (Gänsekr.) *Potentilla anserina*.  
**Gartenrapunzel** *Oenothera biennis*.
- Gartheil** (Stabwurz etc.) *Abrotanum*.  
**Gauchblume** *Orchis militaris*.  
**Geferkraut** *Polycnemum*.  
**Geier** (Gersch etc.) *Aegopodium Podagraria*.  
**Geiferwurz** Pyrethrum.  
**Gelbbeeren** (Dinte-) *Rhamnus catharticus*.  
**Gelbholz** *Caesalpinia Sappan*, *Rhus Cotinus*, *Broussonetia tinct.* u. *Xanthoxylon*, (Cumberland-) *Virgilia*, (Stachel-) *Toddalia*.  
**Gelbkraut** *Reseda luteola*.  
**Gelbmilcher** *Xanthe*.  
**Gelbschote** (chines.) *Gardenia grandiflora*.  
**Gelbwurz** *Xanthe*, *Xanthorrhiza*, *Lilium Martagon*.  
**Gelenkwurz** *Convallaria Polygonatum*.  
**Gerbermyrte** (-strauch) *Coriari myrtifolia*.  
**Germisell** *Berberoa*.  
**Gessel** (Feigwurz, s. d.).  
**Getreidebrand** *Uromyces*.  
**Getreiderost** *Puccinia graminis*.  
**Gewürz** (engl.) *Eugenia s. Myrtus Pimenta*.  
**Gewürzdlolde** *Sison Amomum*.  
**Gewürznelke** (-näglein) *Eugenia caryophyllata* od. *Caryophyllus aromaticus*.  
**Gichtbeere** (Ahl-, Alant-, s. d.).  
**Gichtschwamm** *Amanita phalloides*.  
**Giersch** s. Geier.  
**Giftbaum** s. Antschar, (surinamischer -) *Tephrosia*.  
**Giftheil** *Aconitum Anthora*.  
**Giftlilien** *Colchicaceae*.  
**Giftmischer** *Antidesma*.  
**Giftstiller** (-mischer, s. eb.).  
**Gifttäubling** (Speiteufel) *Russula emetica*.  
**Giftwicke** *Coronilla varia*.  
**Gilbkraut** *Glaucium*.  
**Gilbwurz** *Amomum Curcuma*, *Asphodelus*.  
**Gilgen** (Kraftblume) *Panacratium*.  
**Gillen** *Anthemis*.  
**Gilzgras** *Sesleria*.  
**Ginsengwurz** (Panacee) *Panax Ginseng*.  
**Gletsch** (Wachtelweizen) *Melampyrum*.  
**Glinze** *Ranunculus*.  
**Glockenheide** *Erica carnea*, *Tetralix* etc.

- Glockenrebe** *Cobaea scandens*.  
**Glotzblume** s. Engelsblume.  
**Glucke** *Sparassis crispa*.  
**Götzenholz** *Kigelia*.  
**Goldbart** *Pollinia gryllus*.  
**Goldorange** *Aucuba japonica*.  
**Goldwurz** (Schöllkr.) *Chelidonium*,  
 (Türkenbund) *Lilium Martagon*.  
**Gonne** (Gänsekresse) *Arabis*.  
**Gottheil Prunella**, (Gnadenkr.) *Gratiola offic.*  
**grains d'Avignon** *Rhamnus infectorius*.  
**gramen majus** Offiz. (Sandsegge)  
*Carex arenaria*.  
**Granatillbaum** *Croton Tiglium*.  
**granum Paradisi** Offiz. *Amomum gr. Par.*  
**Gränke** (Torfheide) *Andromeda*.  
**Grante** *Arctostaphylos* (Bärentraube).  
**Grasgummibaum** *Xanthorrhoea arborea*.  
**Grasrost** s. Getreiderost.  
**Graswurz** (Quecke) *Triticum repens*.  
**Greisenbart** *Tillandsia*.  
**Greiskraut** *Senecio* u. *Erigeron*.  
**Grenadillen** *Passiflora edulis* u. *quadrangularis*.  
**Grenadillenholz** *Xylocarpa Granatum*.  
**Crete** (faule) *Sium Falcaria* (Falc. Rivini).  
**Greusel** (Flutquendel) *Montia*.  
**Grieholz** (blaues Sandel-) *Guilandina*.  
**Grieswurz** *Cissampelos Pareira* (P. brava).  
**Grindkraut (-rose)** *Scabiosa*.  
**Grindwurz** (Sauerampfer), *Rumex Acetosa*.  
**Guakobaum** (Stinkapfel) *Crataeva gynandra*.  
**Guatemalagrass** s. Teosinte.  
**Guernsey-Lilie** *Nerine* s. *Amaryllis sarniensis*.  
**Guianagrass** *Pariäna*.  
**Guiana-Seifenbaum** *Talisia*.  
**Gujavenbaum** (Guy-, Kuj-) *Psidium*.  
**Guineagrass** (gross. Fennich) *Panicum maximum*.  
**Guineakorn** s. Durrrha.  
**Guineapfeffer** *Hablitzea* (Habzelia).  
**Gummi animae** Offiz. *Hymenaea Courbaril*.  
**Gummi arabicum** Off. *Mimosa nilotica* W. u. *Acacia arab.*, *gummifera* etc.  
**Gummibaum** *Ficus elastica* u. *australis*.  
**Gummiguttbaum** (*gummi guttae* Offiz.) *Stalagmites cambogioides* u. *Hebradendron*.  
**Gummiguttstrauch** *Vismä*.  
**Gummi Kino** *Pterocarpus senegalensis*.  
**Gummilackbaum** *Ficus religiosa* u. *Aleurites laccifera*.  
**Gummi Myrrhae** (Myrrhe) *Amÿris Katak.*  
**Gummi (Senegal-)** *Acacia senegalensis* W.  
**Gummi-Traganth** *Astragalus creticus*.  
**Gundram (-tram, Gundermann)** *Glechöma*.  
**Gurkenbaum** *Parmentiera*.  
**Gurkenkraut** *Borago officinalis*.  
**Gutta-Gambir** *Nauclea Gambir*.  
**Gutta-Percha** *Isonandra Gutta*.  
**Guyavebaum** s. *Gujavenbaum*.  
**Haargurke** (Stichling) *Sicyos angulata*.  
**Haberwurz (Hafer-)** *Scorzonera* u. *Tragopogon*.  
**Habichtspilz** (Hirschschwamm) *Hydnum imbricatum*.  
**Hadjilidj-Gewürz** *Balanites aegyptiaca*.  
**Hagedorn** (Hagen) *Crataegus Oxycantha*.  
**Halde** (Flutstengel etc.) *Zanichellia*.  
**Halfa** (Esparterograss) *Macrochloa tenacissima*.  
**Hallimatsch** *Armillaria mellä*.  
**Hammelmöhre** (Pastinak) *Pastinaca sativa*.  
**Hauf** (virginischer) *Acnida cannabina*.  
**Hanfblume** *Phelipaea* s. *Orobanche*.  
**Hanfnessel** *Urtica cannabina* u. *Galeopsis Teträhit*.  
**Hanftod** s. *Hanfblume*.  
**Harfenstrauch** (Mottentod) *Plectranthus*.  
**Harmelraute** *Peganum Harmala*.  
**Harnkraut** (Bruch-) *Herniaria*.  
**Hartholzbaum** (Hopfenbuche) *Ostrya*.  
**Hartriegel** *Cornus* u. *Ligustrum*.

- Härtling** Hypoxis.  
**Harzllilie** Xanthorrhoea.  
**Hasehisch** (Molak) Cannabis sativa.  
**Hasenglöckchen** Endymion s. Agra-  
 phis.  
**Hasenkohl** Oxälis Acetosella.  
**Hasenpfüthen** Trifolium Lagopus.  
**Haspel** (Meerzwiebel) Scilla.  
**Hechel** Scandix, (Hau-) Ononis.  
**Hederich** Raphanistrum, Erysimum  
 u. Sinäpis arvensis.  
**Heidecker (-egger)** Tormentilla.  
**Heilglöcklein** Cortüsa Matthioli.  
**Heiligenpflanze** Artemisia Santo-  
 lina.  
**Heilwurz** Athamanta Libanotis.  
**Heister** (fr. hêtre) Carpinus.  
**Hemlockstanne** (Schierlings-) Abies  
 Tsuga.  
**Henna** (Alhenna, s. d.).  
**Herkuleskolben** Treisia clava,  
 (-keule) Lagenaria vulg. var. cla-  
 vata.  
**Herlitz** (Durlitze, Cornelkirsche)  
 Cornus mas.  
**Hermel** Anthémis.  
**Herrnpilz** s. Edelpilz.  
**Herz** (thränendes, -blume) Dicentra  
 s. Dielytra u. Capraria s. Teedia.  
**Heuschreckenbaum** (Locust-) Hyme-  
 naea Courbaril, (s. g.) Robinia  
 Pseud-Acacia.  
**Hexenzwirn** Lycium barbärum,  
 (-strang, Teufelszwirn) Clemätis  
 Vitalba.  
**Hickorynussb.** Carya alba, amara etc.  
**Himmelfahrtsblume** Gnaphalium  
 dioecum.  
**Himmelsleiter** Polemonium coeru-  
 lëum.  
**Himmelsschlüssel** Primula veris.  
**Hirschbrunst** Elaphomyces.  
**Hirschschwamm** s. Habichtspilz.  
**Hirsengras** Holcus Sorghum u. Mi-  
 lium.  
**Hirtennadel** (Reiherschnabel) Ero-  
 dium cicutarium.  
**Hirundinaria** Offiz. = Cynanchum  
 Vincetoxicum.  
**Hisparilla** Ernodäa.  
**Hockenblatt** Streptopus amplexi-  
 folius.  
**Hohllauch** (Winterzwiebel) Allium  
 fistulosum.  
**Hohlwurz** Corydälis cava u. Aristo-  
 lochia.  
**Holzäpfel** (neuholl). Xylomelum.
- Holzbalsam** Xylosma.  
**Holzblatt** Xylophylla.  
**Holzpilz** Xylaria.  
**Honigäpfel** (Johannis-) Malus prae-  
 cox Pall.  
**Honigblume** Melianthus major etc.  
**Hörlitze** s. Herlitz.  
**Hornbaum** (Hainbuche etc.) Car-  
 pinus Betulus.  
**Hornfruchtstrauch** Thamnäa.  
**Hornschwingel** Ceratochlöa s. Bro-  
 mus unioloides.  
**Höswurz** Gymnadenia (Orchis, Sa-  
 tyrium etc.).  
**Hundebeere** Lonicera nigra.  
**Hundetrage** (Gundelrebe) Glechöma  
 hederacea.  
**Hundsgras** (Knaul-) Dactylis.  
**Hundskohl** Apocynum u. Mercuria-  
 lis Cynocrambe s. perennis.  
**Hundswolle (-würger)** Apocynum.  
**Hundswurz** Anacamptis pyrami-  
 dalis.  
**Husarenknopf** (Parakresse) Spi-  
 lanthes.  
**Hygrometer-Griffel** Erodium grü-  
 num.
- Jakobslauch** (Winterzwiebel) Allium  
 fistulosum.  
**Jakobsllilie** Sprekelia formosissima.  
**Jakobsstab** Asphodëlus luteus.  
**Jakobszwiebel (-lauch, s. d.).**  
**Jagarazucker (-palme)** Borassus  
 flabelliformis.  
**Jamaika-Pfeffer** Myrtus Pimenta.  
**Jambusenbaum** Eugenia Jambos.  
**Jasmin** (deutsch.) Philadelphus Co-  
 ronarius, (Cap-) Gardenia florida,  
 (Carolina-) Gelsemium.  
**Javabalsam** Protium javan. (Amÿris  
 Protium).  
**Jehovahblümchen** Saxifraga punc-  
 tata u. umbrosa.  
**Je länger je lieber** (Geisblatt) Loni-  
 cera Caprifolium.  
**Jerichorose** Anastatica hierochun-  
 tica.  
**Jerusalemblume** Lychnis chalde-  
 donica.  
**Jerusalem-pflaume** (violette) Pru-  
 nus domestica var.  
**Jesuitenpulver** (Chinarinde) Cin-  
 chöna off.  
**Jesuitentheee** Chenopodium ambro-  
 sioides.



- Ignose** (Yamswurz) *Dioscorëa alata*.  
**Ignatiusbohne** *Strychnos Ignatii*.  
**Immenbaum** (Feldilme) *Ulmus campestris*.  
**Immergrün** (Sinn-) *Vinca*, (Steinbrech-) *Aizoon*, (- kriechendes) *Epigaea repens*.  
**Immerschön** (Sand-) *Helichrysum* s. *Gnaphalium arenarium*.  
**Immortelle** *Gnaphalium*, *Helichrysum*, (Strohbl.) *Xeranthemum*, (rote) *Gomphrena*.  
**Indig** (echter) *Indigofera*, (deutsch.) *Isätis tinctoria*, (roter, s. g. *Persio*) *Lecanora tartaria*.  
**Insektenpulver** (pers. etc.) *Pyrethrum rosëum*.  
**Instrumentenholz**. *Maurocenia*.  
**Johannisblutkr.** *Scleranthus perennis*.  
**Johannisbrot** s. *Sodbröt*.  
**Johannislauch** s. *Hohllauch*.  
**John** (langer) *Triplaris americana*.  
**Irländisches Moos** s. *Caraghen*.  
**Juckhaarbohne** *Dolichos puriens* (*Strizolobium*).  
**Judasbaum** *Cercis Siliquastrum*.  
**Judasohr** *Exidia auricula Judae*.  
**Judenbart** *Diptera sarmentosa*.  
**Judendorn** *Zizyphus Lotus* u. *Jujuba*, auch *Rosa canina*.  
**Judenmanna** *Alhagi*.  
**Judennuss** *Staphylea pinnata*.  
**Judenpappel** *Kerria japonica*.  
**Jujubenbaum (-dorn)** *Zizyphus Jujuba*.  
**Jungfernkraut** (s. g. *Metterich*) *Matricaria Parthenium*.  
**Jungfernmilch-Pfl.** *Benzoïn officinale*.  
**Jungfernrebe (-wein)** *Ampelopsis quinquefolia*.  
**Jüngling** *Athanasia*.  
**Jute** *Corchorus textilis* s. *capsularis* u. *olitorius*, auch *Hibiscus* s. *Abelmoschus tetraphyllos*.  
**Juvia-Nüsse** (bras., Rahm-) *Bertholletia excelsa*.  
**Iva** (Alpenbitter) *Achillea moschata*.  
**Ivenblatt** *Melissa officinalis*.  
**Ixiole** *Trichonema*.
- Käsebaum** *Bombax*.  
**Kahm** *Ulvina*.  
**Kaiserling (-schwamm)** *Amanita caesarea*.
- Kajaputölb.** s. *Cajaput*.  
**Kalabasse** s. *Calabasse*.  
**Kalliaturoholz** *Pterocarpus Draco*.  
**Kalo** (Tarro) *Colocasia*, *Caladium esculentum*.  
**Kameelheu** (Blumenbinse etc.) *Butomus umbellatus*.  
**Kampher** (Kamfer) *Laurus* s. *Persëa Camphora*.  
**Kandel** (Teichrose) *Nymphaea*.  
**Kaneelzimmt** *Winterania Canella*.  
**Kannenkraut** *Equisetum arvense*.  
**Kanonienbaum** *Cecropia*.  
**Kaoutschukb.** s. *Caoutschuk*.  
**Kappengras** *Zizania*.  
**Kappern** *Capparis*, (deutsche) *Caltha palustris*.  
**Kapura** (Sumatra-Kampher) *Dryobalanops Camphora*.  
**Kapuzinerpilz** *Bolëtus scaber*.  
**Karambolabaum** *Averrhoa*.  
**Kari-kari** (Beissbeere) *Capsicum annuum*.  
**Karse** *Lepidium*.  
**Kartoffelbovist** *Scleroderma*.  
**Kartoffelfäule** *Fusisporium solani*.  
**Kartoffelkrankheit** (Trockenfäule) *Peronospora infestans* s. *effusa*.  
**Kartoffelkrätze** *Protomyces solani*.  
**Kari-kari** (Speise) s. *Kari-kari*.  
**Kassavi** s. *Cassavebrot*.  
**Kastoröl** *Ricinus communis*.  
**Katechu** (vgl. japan. Erde) *Arëca Catechu*.  
**Katzenbaldrian** *Valeriana officinalis*.  
**Katzeneier** *Bovista* (*Lycoperdon*).  
**Katzenklee** (Hasenpfötchen, s. d.).  
**Katzenkorn** (Mäusegerste) *Hordëum murinum*.  
**Katzenkraut (-gamander)** *Teucrium Marum*, auch *Nepëta Cataria*.  
**Katzenpfötchen** *Gnaphalium* s. *Antennaria* (*Pes Cati*).  
**Katzensteert** *Equisetum arvense*.  
**Katzenräubling** *Sedum acre* (*Vermicularis*).  
**Kaublattbaum** *Erythroxylon Coca*.  
**Kaupflanze** s. *ABC-Pfl.*  
**Keileken** (Holder) *Sambucus nigra*.  
**Kelchblumenstrauch** *Calycanthus*.  
**Kelke** *Tofieldia*.  
**Kelp** *Fucus serratus* etc.  
**Kerbelrübe** *Chaerophyllum bulbosum*.  
**Kerbuzel** (Gemüse-Portulak) *Portulaca oleracea*.

- Kermesbeere** (-saft, granum u. succus Chermes Offiz.) *Quercus coccifera* (Kermeseiche).
- Kermesspinat** *Phytolacca esculenta*.
- Kern-Eisenholz** *Metrosideros*.
- Kettenhülse** (Schnur-) *Sophora japonica*.
- Keulenbaum** *Casuarina* u. *Scytalia*.
- Keusehlamm** *Vitex agnus castus*.
- Kieher** (-erbse) *Cicer*, *Lathyrus* u. *Oröbus*.
- Kiebitz** *Fritillaria Meleagris*.
- Kiebitzfett** *Pinguicula*.
- Kieckbeere** (Galle) *Juniperus communis*.
- Kieselholz** (Antillen-) *Acacia Sideroxylon*.
- Kilte** (Nachtviole) *Hesperis*.
- Kino** (-Gummi) *Drepanocarpus* s. *Pterocarpus senegalens.* (erinacä) u. *Orucaria*, (Kinobaum) *Eucalyptus resinifera*.
- Kirsche** (amerik.) *Malpighia glabra*, (Kirschpflaume) *Prunus cerasifera* (*Myrobalanus Hort.*).
- Klasper** (Täschelkraut) *Thlaspi*.
- Klättertopf** (Klapper) *Rhinanthus* s. *Alectorolophus*.
- Klebe** (Krebsdistel) *Onopordon*.
- Kleberich** (Pechnelke) *Viscaria* (*Lychnis V.*).
- Kleber** (Klebkraut) *Galium Aparine*.
- Klebglocke** *Eutoca viscida* (*Cosmanthus v.*).
- Kleeseide** *Cuscüta Epithymum*.
- Kleetenfel** *Orobanche minor*.
- Kleiderbaum** (Platane) *Platanus vulgaris* Spach.
- Kleiderbesen** s. *Durrha*.
- Kleppel** *Knautia* s. *Scabiosa arvensis*.
- Klettenwurzel** (Spitzklette) *Xanthium*.
- Kletterrose** *Atragene*.
- Kleber** (Honigklee) *Melilotus*.
- Klingholz** *Baphia nitida*.
- Klisse** s. *Klettenwurzel*.
- Klöwen** (Klaunzwiebel) s. *Hohlauch*.
- Knackbeere** *Paederia*.
- Knackelbeere** *Fragaria viridis* s. *collina*.
- Knebel** (Mastkraut) *Sagina*.
- Knebelbart** *Hugonia Mystax* u. *Aegoceras*.
- Knoblauchbirne** *Crataeva Tapia*.
- Knopfkraut** *Galinsoga*.
- Knopfwurz** (Kugeldistel) *Echinops*.
- Kölbel** (Wiesenknopf) *Sanguisorba*.
- Kölle** (Bohnenkraut etc.) *Saturcja*.
- Kölute** (Schönminze) *Calamintha*.
- Königin der Nacht** *Cereus grandiflorus*.
- Köuigsholz** s. *Tembesubaum*.
- Königsrinde** s. *Chinarinde*.
- Königsstab** s. *Jakobsstab*.
- Königsthee** *Xenopoma*.
- Köhl** (caraibischer) *Caladium esculentum*, (römisch.) *Beta Cicla*.
- Köhlportulak** *Portulaca oleracea*.
- Köhlrabi** *Brassica oleracea gongyloides*.
- Köhlreps** *Brassica Napus* s. *campestris*.
- Köhlrübe** (Erdkohlraube) *Brassica Napus esculenta* s. *rapifera*.
- Kohlfaat** (fr. colsat) s. *Köhlreps*.
- Kökkelskörner** *Menispermum* s. *Anamirta Cocculus*.
- Kolbenbaum** s. *Essigbaum* (*Hirschkolbe*).
- Kollerwurz** (gelbe Nixblume) *Nuphar lutëum*.
- Kölmar** (Gauchheil) *Anagallis*.
- Kolumbinfarbe** *Rocella tinctoria*.
- Kopfbeere** (Brechwurz) *Cephaelis*.
- Kopfkraut** *Galinsoga* u. *Viborgia*.
- Köpernikel** *Meum Mutellina*.
- Körfel** *Chaerophyllum*.
- Kornährenholz** (*Palmyra*-) *Sebipira*.
- Kosten** (Ferkelsalat) *Hypochoeris*.
- Kotbaum** *Comocladia*.
- Krähenaugen** *Strychnos nuxvomica*.
- Krämpelpilz** *Rhymovis*.
- Kraftwurzel** s. *Ginseng*.
- Kraumetsbeere** *Juniperus communis*.
- Kranichbeere** (Moos-) *Vaccinium Oxycoccus*.
- Kratzbeere** (Bocks-) *Rubus caesius*.
- Kräuselbeere** (Stachel-) *Grossularia*.
- Krebswurz** (Natter-) *Polygönum Bistorta*.
- Kreen** (Meerrettig) *Armoracia* (*Cochlearia*).
- Kreiken** (Kriechen etc.) *Prunus insititia*.
- Kreissig** *Barbaraea*.
- Kremling** *Galorrhoeus*.
- Kreupelwollpilz** *Zasmidium*.
- Kren** (russ. chren) s. *Kreen*.
- Kreuzholz** (*Mistel*) *Viscum*.

- Kreuzstrauch** *Baccharis*.  
**Kriechen** s. Kreiken.  
**Krönlein** (Kronwicke) *Coronilla*.  
**Kronsheere** (Preissel-) *Vaccinium vitis Idaea*, (amerik.) *V. Oxycoccos*.  
**Kropfkraut** (Braunwurz) *Scrophularia*.  
**Krösling** (Mousseron) *Agaricus prunulus* s. *Collybia esculenta*.  
**Krötengras** *Triglochin*.  
**Krötenschwamm** *Coprinus fimetarius*.  
**Krullfarn** *Adiantum*.  
**Krümling** (Knorpelsalat) *Chondrilla*.  
**Krummholz** *Pinus pumilio*.  
**Kruphohle** (Zwerg-) *Phaseolus vulgaris nanus*.  
**Kubehen** (Schwanzpfeffer) *Piper Cubeba*.  
**Kuhbaum** *Galactodendron utile*.  
**Kuhblume** *Caltha pal.* u. *Taraxacum offic.*  
**Kuhkrätze** *Mucuna urens*.  
**Kuhpilz** s. Edel- (Stein- etc.).  
**Kujavenbaum** s. Gujavenb.  
**Kümmelraute** *Jambolifera*.  
**Kümmerring** *Melothria cucumerina*.  
**Kukuksblume** *Lychnis flos cuculi*, *Fumaria bulbosa*, *Orchis morio* u. a.  
**Kukukskresse** = Wiesenschaumkraut.  
**Kukukspilz (-speichel)** *Spumaria*.  
**Kukuruz** (Welschkorn) *Zea Mäys*.  
**Kunigundenkraut** (Wasserdost) *Eupatorium*.  
**Kunkelrübe** s. Kerbelrübe.  
**Kuntschut** *Sesamum orientale*.  
**Kupferkenle** (Kolbe) *Typha latifolia*.  
**Kurkume** (Gilbwurz) *Amomum Curcuma* s. *Curc. longa*.  
**Kusso** *Brayera anthelmintica*.  
**Kutte** *Cotoneaster*.
- Lablab** *Dolichos Lablab*.  
**Lachenknoblauch** *Teucrium Scordonium*.  
**Lachenriet** *Scirpus* s. *Trichelostyles*.  
**Lackmus** *Croton tinctorium*, (-flechte) *Rocella tinctoria*.  
**Lakritzensaft** (*succus Laquiritiae*) s. sogl.  
**Lakritzenstranch** (Süßholz-) *Glycyrrhiza*.
- Lactucarium** (Gift) *Lactuca virosa*.  
**Lambertsness** *Corylus tubulosa*.  
**Landmanns Spieknarde** s. Kreuzstrauch.  
**Latsche** (Knieholz, Krumm-, s. d.), (Stechsalat) *Lactuca sativa*.  
**Laubenbohne** *Teramnus*.  
**Laubheide** *Clethra alnifolia*.  
**Lauchhederich (-kraut)** *Alliaria offic.*  
**Läusekörner** (Kokkels-, s. d.) u. *Delphinium Staphisagria*.  
**Läusesamen (-salbe, -pulver)** *Veratrum Sabadilla*.  
**Lawrancerose** (Liliput-) *Rosa minima*.  
**Lazarobirne** *Pirus Pollveria* L.  
**Lebensbaum** *Thuja* s. Biöta.  
**Leberbalsam** *Erinus alpinus* u. *Agerratum*.  
**Lederapfel** (Rabau, Reinette etc.) *Pirus Malus* var.  
**Lederzucker** (Althäa-Paste) *Althaea officinalis*.  
**Leimbaum** (vegetab. Leim) *Combrätum obtusifolium*.  
**Leinwandbaum** *Lagetta*.  
**Leistenholz** s. Kreuzstrauch.  
**Lenne** (Lönne, Spitzahorn) *Acer platanoides*.  
**Lettich** (Huflattich) *Tussilago*.  
**Leuchterbaum** *Rhizophora Mangle*.  
**Leuchterblume** *Ceropegia*.  
**Lianen** *Asclepiadaceae*, *Paulliniaceae* etc.  
**Lichte** (Lichtnelke) *Lychnis* s. *Melandyrum*.  
**Liebe (brennende -)** *Lychnis chalcidonica*.  
**Lieber'scher Thee** (herba *Galeopsisidis* Offiz.) *Galeopsis ochroleuca* s. *grandiflora*.  
**Liebesapfel** (Tomate) *Solanum Lycopersicum*.  
**Liesch (-gras, Lische)** *Phleum*, (Blumen-, Wasser-) *Butömus*, (Fass-) *Sparganium*, *Typha* u. *Sagittaria*.  
**lignum sanctum** s. Franzosenholz.  
**Lilak** *Syringa vulgaris*.  
**Lilaschwamm** *Cortinarius traganus*.  
**Liliputrose** s. Lawrancerose.  
**Limette** (Limone) *Citrus medica* *Limetta*.  
**Liquiritiae** (sc. *radix* u. *succus*) s. *Lakritzen-*.  
**Litschiplaume** *Dimocarpus Litchi*.

- Loenstbaum (-holz)** *Hymenaea Courbaril*.  
**Lönne** s. *Lenne*.  
**Lohblüte** *Aethalium septicum* s. *flavum*.  
**Lontar** (Fächelpalme) *Borassus flabelliformis*.  
**Lorbeerkirsche** = *Kirschlorbeer* (*Lauro-Ceräsus*).  
**Lorbeermyrte** *Tristania*.  
**Lorbeerrose** (*Oleander*) *Nerium*.  
**Lorbeersehneeball** *Viburnum Tinus*.  
**Lorbeerweide** *Salix pentandra*.  
**Lorchel** *Helvella*.  
**Lotuspfl.** (ägypt. Bohne) *Nymphaea Lotus*, (ostind.) *Nelumbium speciosum*.  
**Lotusstrauch** (*Lotophagendorn*) *Zizyphus Lotus*.  
**Loxarinde** s. *Chinarinde* *Cinchona offic.*  
**Ludwigsblume** *Ketmia liliiflora* Hort.
- Maba** (Ölpalme) *Elaeis guineensis*.  
**Maba-Eisenholz** *Ferreöla Maba*.  
**Macassarölbaum** *Schleichera trijuga*.  
**Maceronkraut** (*Myrrhen-*) *Smyrnum*.  
**Macis** (*Muskatenblume*) *Myristica moschata*.  
**Mädchenblume** s. *Jungfernkraut*.  
**Maderaholz** (-*mahagoni*) *Laurus indica*.  
**Mädesüss** *Spiraea Ulmaria* u. *Filipendula*.  
**Maguayholz** *Fourcraea gigantica*.  
**Mägdeheil** (gross.) *Senecio nemorensis*, (klein.) *Sen. vulgaris*.  
**Magnatentrüffel** *Rhizopogon magnatum*.  
**Mahagoniholz** (echtes) *Swietenia Mahagoni*, (falsches) s. *Maderaholz*, (afrik.) *Khaga senegalensis*.  
**Maitrank** s. *Waldmeister*.  
**Malabar-Malve** *Urera*.  
**Malaccabohne** (-*nuss*) *Anacardium orientale*.  
**Malagnetta-Pfeffer** *Amomum Malaguetta*.  
**Maldivische Nuss** *Lodoicea Sechellarum*.  
**Maludenwurz** *Conioselinum tataricum*.  
**Mammibaum** *Mammea americana*.
- Mammuthsbaum (-kiefer)** *Sequoia* s. *Wellingtonia californica*.  
**Mancinellenbaum** *Hippomane Mancinella*.  
**Mandarin-Orange** *Citrus nobilis*.  
**Mandarienen-Thee** *Xenopoma*.  
**Mandeln** (grüne) *Pistacia vera*.  
**Mandioccamehl** (*Maniok*) s. *Cassavebrot*.  
**Mangofruucht** (-*pflanze*) *Mangifera indica*.  
**Mangostane** *Garcinia Mangostana*.  
**Manilabanf** *Musa troglodytarum textaria*.  
**Maniok** *Jatropha Manihot*.  
**Manna** (*Briançon-*) *Larix decidua* s. *Pinus Larix*, (-*Esche*) *Fraxinus Ornus*, (-*gras*, -*grütze*) *Glyceria fluitans*, (-*klees*, *Wüstenmanna*) *Hedysarum Alhagi*, (-*Tamariske*) *Tamaria gallica*.  
**Mannbaum** *Melia Azadirachtha*.  
**Männertreu** *Omphalodes verna* u. *Veronica Chamaedrys*.  
**Manschettenpilz** *Amanita vaginata*.  
**Marasche** (*Maraschino*) *Ceräsus acida*.  
**Marbel** (*Hainsimse*) *Luzula*.  
**Marienbalsamb.** *Chloromyron verticillatum*.  
**Marienblatt** *Tanacetum Balsamita*.  
**Marienblümchen** (*Masliebchen*) *Bellis perennis*.  
**Marienglocke** s. *Mariette*.  
**Mariengras** s. *Bandgras* u. *Holcus odoratus*.  
**Marientröpfchen** (*Bluts-*) *Dianthus carthusianorum*.  
**Mariette** *Campanula Medium*.  
**Markgrafepulver** *Paeonia officin.*  
**Marmeladendosenb.** *Duroia eriopila* s. *Genipa Merianae*.  
**Maronen** (*Kastanien*) *Castanea vesca*.  
**Maronenpilz** *Bolëtus badius*.  
**Maruru** *Victoria regia*.  
**Masakna** *Sorghum cernuum*.  
**Maskenblume** *Mimulus*.  
**Mastixb.** *Pistacia Lentiscus* u. *Schinus Molle*.  
**Mastixkraut** (*Katzen-*) *Teucrium Marum*.  
**Mate** (*Paraguay-Thee*) *Ilex paraguariensis*.  
**Maulbeerfeige** *Ficus Sycomorus*.  
**Maulwurfskraut** *Euphorbia Lathyris*.

- Mäusedarm** (Vogelmeier) *Stellaria media*.
- Maye** (Wasser- od. Ruchbirke) *Betula odorata*.
- Meccabalsam** *Amŷris Balsamodendron Opobalsamum*.
- Mechoacamawurzw** *Convolvulus Mechoacanna*.
- Meergras** (Mooskraut) *Selaginella*.
- Meerhirse** *Lithospermum*.
- Meerlattich** (s. g. Watt) *Ulva lactuca*.
- Meerwatt** *Bryopsis*.
- Megelkraut** (Bibernelle) *Poterium Sanguisorba*.
- Mehlbeere (-birne)** *Sorbus Aria*.
- Mehlkraut** (Wiesenkönigin) *Spiraea Ulmaria*.
- Mehltau** *Erysibe communis*.
- Meier** (Meierich, -kraut) *Stellaria media*, (Waldmeister) *Asperula odorata*.
- Meister** *Asperula*.
- Meisterwurzw** *Astrantia major* u. *Imperatoria*.
- Melonenbaum** *Carica Papaya*.
- Menderle** *Eranthemum*.
- Merian-China** *Meriana* s. *Tocoyena*.
- Meteorpapier** *Conferva rivularis*.
- Meter** *Melissa*.
- Metterich** s. *Jungfernkraut*.
- Miere** (rote) *Alsine rubra* etc., (Vogel-) *Stellaria media*.
- Milchbaum** s. *Kuhbaum*.
- Milchbuschsalat** *Taraxacum offic.*
- Milchglöckchen** *Leucojum vernum* u. *Campanula rotundifolia*.
- Millgras** (Hirse) *Milium*.
- Milzwurzw** *Blechnum Spicant.*
- Mirabelle** *Prunus syriaca*.
- Mohar** (Guineagrass, s. d.).
- Mohrhirse** s. *Durrha*.
- Molak** s. *Haschisch*.
- Moltebeere** *Rubus Chamaemorus*.
- Moluchiagewürzw** *Corchorus olitorius*.
- Molukken-Croton** *Croton Tiglium*.
- Mombiupflaume** *Spondias* s. *Myrobalanus Mombin*.
- Monatsrose** *Rosa damascena* s. *semperflorens*.
- Mönchs-Rhabarber** *Rheum raphaniticum*.
- Mongrovebäume** *Rhizophoreae*.
- Monke** (Schafrapunzel) *Jasione*.
- Moorkönig** (Läusekraut) *Pedicularis palustr.*
- Moorsimse** *Rhynchospora*.
- Moos** (amerik.) *Tillandsia*, (isländ.) *Cetraria*, (schwed.) *Lecanora tatar.*, (indisch.) *Moxa*.
- Moosbeere** *Vaccinium Oxycoccus* u. *macrocarpum*.
- Mooskraut** s. *Meergras*.
- Morelle** s. *Marasche*.
- Morgenblatt** s. *Marienblatt*.
- Morgenröschchen** *Silene Armeria*.
- Moscatello** *Cucumis Melo* var.
- Moschusblume (-pflanze)** *Mimulus moschatus*.
- Moschuskraut** *Adoxa moschatellina*.
- Moschuswurzw** (Sunn) *Sumbulus moschatus*.
- Mostrich** (fr. moutarde) *Sinapis nigra* etc.
- Mottenkönig (-tod)** *Plectranthus* s. *Ocimum*.
- Mottenkraut** *Chenopodium Botrys*, *Ledum palustre*, *Tinearia* s. *Helichrysum creticum*.
- Moxa** (Hüftwolle d. Japanesen) *Artemisia vulg.*
- Müllen** *Vitex*.
- Mummel** (Nixblume) *Nuphar*.
- Mundubi** *Arachis hypogaea*.
- Münzkraut** (Pfennig-) *Lysimachia Nummularia*.
- Muscardine** (Seidenraupenpilz) *Botrytis Bassiana*.
- Muskatnuss** *Myristica moschata* s. *officin.*
- Muspflanze** s. *Moluchiagewürzw*.
- Musseron** (Krösling, fr. mousseron od. muceron) *Agaricus prunulus* (*Collybia esculenta*).
- Mutterkorn** (Secale cornutum Offiz.) *Sclerotium clavus*.
- Mutternelke** (Gewürz-) *Caryophyllus aromaticus* s. *Eugenia Caryophyllus*.
- Mutterwurzw** *Ostericum palustre* (*Angelica pratensis*) und *Mëum*.
- Myrrhenkraut** *Smyrniun perfoliatum* s. *Dioscoridis*.
- Myrrhenstrauch (-Gummi)** *Amŷris* *Kataf* s. *Balsamodendron myrrha* Ehrbg.
- Nabelkraut** *Omphalodes* u. *Cotyledon Umbilicus*, auch *Hydrocotyle*.
- Nachthyazinthe** (Tuberos.) *Polianthes tuberosa*.
- Nagasbaum** (ceyl. Eisenholz) *Mesua ferræa*.

- Nagelbohne** *Dolichos* u. *Unguicularia*.  
**Nagelkraut** *Hieracium Pilosella*, *Paronychia* u. *Polycarpon*.  
**Näglein** *Syringa*, (Gewürz-) s. Mutternelke.  
**Nanibaum** (asiat. Eisenholz) *Metrosideros vera*.  
**Nanking - Baumwolle** *Gossypium religiosum*.  
**Napoleonsweide** (Trauer-) *Salix babylonica*.  
**Nardoo** (Nahrung d. Neuholländ.) *Marsilea salvatrix*.  
**Natte** mehrere Kirschensorten.  
**Nezerkorn** (Mohrhirse) s. Durrha.  
**Nelkenöl** s. Mutternelke.  
**Nelkenpfeffer** (Jamaika-, s. d.).  
**Nepenthe antiquorum** s. Haschisch.  
**Nepete** *Nepeta*.  
**Neroli-Öl** (*oleum neroli* Offiz.) *Citrus aurantium* (flores).  
**Nesselthee** (obsol.) (flores *Urticae mortuae* Offiz.) *Lamium album*.  
**Neunkraft** (Pestilenzwurz) *Tussilago Petasites* L.  
**Nicke** (Nicksalat) *Prenanthes*.  
**Niesekraut** *Ptarmica*.  
**Nil-Lilie** *Nelumbium speciosum*.  
**Nimbobaum** *Olea malabarica*.  
**Nissel** (Nisschen etc.) s. Feldsalat.  
**Nixblume** s. Mummel.  
**Nixkraut** *Najas*.  
**Nolde** *Sherardia*.  
**Nopal** *Cactus Opuntia* (Op. *coccinellifera*).  
**Norfolkfichte** *Araucaria excelsa*.  
**Nusskiefer** (Pinie) *Pinus Pinä*.
- Oca (Oka)** *Oxalis tuberosa*.  
**Ochsenauge** (Wiesen - Wucherbl.) *Chrysanthemum Leucanthemum*.  
**Ochsenbrot** *Theobroma* s. *Bubroma Guazuma*.  
**Ohmkraut** *Alchemilla Aphanes* L.  
**Oleaster** (Ölweide) *Elaeagnus*.  
**Olibanum** (Weihrauch-Wachholder) *Juniperus lycina* L.  
**Ölbeerbaum** = Traubenkirsche, *Prunus Padus*.  
**Ölnuss** (Butter-) *Juglans cinerea*.  
**Ölsenich** *Peucedanum palustre* s. *Thysselinum* (*Selinum*) pal.  
**Ölweide** s. Oleaster.  
**Opfersilje** s. Ölsenich.  
**Opium** *Papaver somniferum*.  
**Orakelblume** *Thespis*.
- Orseille** (-Erde) *Lecanora parella*, (Lackmus-) *Roccella tinctoria*.  
**Osagendorn (-orange)** *Maclura aurantiaca*.  
**Oskar** *Calotropis procera*.  
**Osterblume** (weisse u. gelbe) *Anemone nemorosa* u. *ranunculoides*, u. *Narcissus Pseudo-Narc.*  
**Ostheimer Kirsche** *Prunus Chamaecerasus*.  
**Ostritz** (Meisterwurz) *Imperatoria*.  
**Oswego-Thee** *Monarda didyma*.  
**Otterwurz** = Natterwurz *Polygon. Bistorta*.  
**Ottig** s. Kunigundenkraut.  
**Oxelbirne** *Sorbus intermedia* s. *scandica*.
- Pack-Choi** (Schangton-Kohl) *Brassica chinensis* var.  
**Packmoos** s. amerikan. Moos = *Tillandsia*.  
**Padmapflanze** s. Nil-Lilie.  
**Päde** (Quecke) *Triticum repens*.  
**Palisanderholz** *Jacaranda brasiliensis*.  
**Pallisadenholz** *Camax fraxinea*.  
**Pallisadenpalme** *Euterpe*.  
**Palmgras** s. Baumbinse.  
**Palmilie** *Yucca*.  
**Palmweide** (Sohl-) *Salix caprea*.  
**Palmyrabholz** *Sebipira*.  
**Pampasgras** (Frauenhaar) *Gynerium argentum*.  
**Panacee** s. Ginsengwurz.  
**Panamaholz (-rinde)** *Quillaja saponaria*.  
**Panke** *Panke tinctoria*.  
**Pantoffelblume** *Cypripedium Calceolus*.  
**Pantoffelholz** *Quercus Suber*.  
**Pantoffelehen** *Calceolaria* u. *Aquilegia*.  
**Papageiholz** *Fissilia psittacorum*.  
**Papau** *Asimina*.  
**Papierblume** *Xeranthemum annuum*.  
**Papierlilie** *Papiria* s. *Gethyllis*.  
**Papierstrauch** (ostind.) *Scaevola*.  
**Pappelrose** (Rosenpappel) *Althaea rosea* u. *Malva Alcea*.  
**Paprika** (span. Pfeffer) *Capsicum annuum*.  
**Paradiesapfel** s. Liebesapfel, (Johannisapfel) *Pirus Malus praecox*.  
**Paradiesblume** *Melia Azederach*.

- Paradiesfeige** s. Banane.  
**Paradieskörner** *Amōmum granum paradisi*.  
**Paraguay-Thee** s. Mate u. Cassīne Gongonha.  
**Parakresse** (Fleckblume) *Spilanthes*.  
**Parasolpilz** *Agaricus* s. *Lepiōta procera*.  
**Pareira brava** Offiz. s. Grieswurz.  
**Parmaine** = Reinettenapfel.  
**Passecarne-Gemüse** *Lacis foeniculacēa*.  
**Pasteke** (Wassermelone) *Cucūmis Citrullus*.  
**Pasternak** s. Balsternaken (*Pastinak*).  
**Paternosterbaum (-erbse)** *Melia Azedarach* u. *Epicharis* Blum., (-strauch) *Abrus precatorius* u. *Cedrela*, auch *Osteospermum*.  
**Patschouly** *Pogostemon Patchouly*.  
**Pavettastrauch** *Rutidēa coriacēa*.  
**Pecco-Thee** *Thea sinensis* Sims  
**Pechtanne** (Edel- etc.) *Abies pectinata*.  
**Peitschencactus** (Schlangen-) *Cereus flagelliformis*.  
**Peltsche** *Coronilla Emērus*.  
**Pelzsame** *Tarchonanthus*.  
**Pentaphyllum** Offiz. = *Potentilla reptans*.  
**Peperlepeb** s. Kerbelrūbe.  
**Pepperling** (Milchpilz) *Galorrhoeus*.  
**Perdrigon** (Damastpflaume) *Prunus domestica* var.  
**Perette** *Citrus Limetta*.  
**Perlenschwamm** *Amanita rubescens*.  
**Perllauch (-zwiebel, Porrée)** *Allium Porrum*.  
**Perlmoos** s. Caraghen.  
**Persio** (roter Indig) *Lecanōra tartarēa*.  
**Perubalsam** *Myroxylon peruiferum*.  
**Peruspinat** *Chenopodium Quinoa*.  
**Pestilenzwurz** (Pest-) *Tussilago Petasites*.  
**Peterskorn** (Ein-) *Triticum monococcum*.  
**Peterskraut** (Wand- etc.) *Parietaria*.  
**Petersilje** (*Pedarsil* Karl's d. Gr.) *Petroselinum sativum*.  
**Peterstrauch** (Schnee- od. Wachsbereen-) *Symphoria* s. *Symphoricarpus*.  
**Petsai** (Schangtonkohl) *Brassica chinensis*.  
**Pfaffenkappe** (Kapuzinerkresse) *Tropaeolum*.  
**Pfaffenkind** *Arum maculatum*.  
**Pfaffenschuh** (Frauen-) *Cypripedium Calceolus*.  
**Pfahlrohr** *Arundo Donax*.  
**Pfauenzerste** *Hordēum Zeocorithon*.  
**Pfebe** (Melone) *Cucūmis Melo*.  
**Pfefferbaum** (Klosterpfeffer) *Vitex agnus castus*.  
**Pfefferkraut** (Bohnen-) *Saturēja*, (Kresse) *Lepidium*.  
**Pfefferling** (Pfefferling) *Merulius Cantharellus*, *Bolētus piperatus* u. *Galorrhoeus*.  
**Pfefferriesel** (Pfaffenhütchen) *Evoñymus*.  
**Pfefferstrauch** (Kellerhals etc.) *Daphne Mezerium*.  
**Pfefferwurz** (Kalmus) *Acōrus Calāmus*.  
**Pfeifenbinse** *Molinia coerulēa*.  
**Pfeifenkopfstrauch** *Aristolochia Siphon*.  
**Pfeifenstrauch**, s. eb. u. *Philadelphus Coronarius*.  
**Pfeilgift** (Wurare) *Paullinia* s. *Cururu scandens*.  
**Pfeilrohr** s. Pfahlrohr.  
**Pfeilwurz** (arrow-root) *Maranta arundinacēa*.  
**Pfennigkraut** *Thlapsi arvense*, (Münz-) *Lysimachia Nummularia*.  
**Pferdebohne** *Vicia Faba minor*.  
**Pferdesaat** *Oenanthe*.  
**Pfefferling** s. Pfefferling.  
**Pfingstrose** (Puttenie, Gichtrose) *Paeonia officinalis*.  
**Pflanzenpilz** *Clitopilus*.  
**Pichurienbohne** *Nectandra Puchury*.  
**Pilau** (Reis) *Oryza sativa*.  
**Pilgerflasche** *Lagenaria* var. *Gurda*.  
**Pillenbaum** *Cleome*.  
**Pinangnuss** *Arēca Catēchu*.  
**Piniennuss** *Pinus Pinēa*.  
**Pinke** (Nelkengras) *Statice Armeria*.  
**Pisang** s. Banane.  
**Pium** (neuseeländ.) *Dacrydium cupressinum*.  
**Pockenholz** s. Franzosenholz.  
**Pockenwurz** *Smilax China*.  
**Pohon Upas** s. Boa od. Bohon-Upas.  
**Polierblattb.** *Trachytella aspera* (*Calligonum* asp.).

- Polstermoos** s. amerik. Moos, *Tillandsia*.
- Pomacocoholz** (Cayenne-Eisenholz) *Swartzia tomentosa*.
- Pomadenkraut** *Unxia camphorata*.
- Pompelmus** (Pumpelmus) *Citrus decumana*.
- Pomponrose** (Provencer-) *Rosa centif. var. provincialis* Mill.
- Ponceau** (Klatschrose etc.) *Papaver Rhoeas*.
- Porrée** *Allium Porrum*, vgl. *Perilla*.
- Porselein** *Honckenya s. Halianthus peplodes*.
- Portulakspinat** *Sesuvium*.
- Porzellanbaum** *Portulacaria*.
- Porzellanblümchen** *Saxifraga umbrosa, (-blume) Hoya carnosa*.
- Porzellanthee** *Lithospermum officinale*.
- Prairiegras** *Spartina cynosuroides*.
- Prairierose** *Rosa setigera* Mchx.
- Preißel** *Vaccinium*.
- Preißelbeere** *Vacc. vitis Idaea*.
- Prescott** s. *Cantaluppe*.
- Presiljenkraut** *Ocimum*.
- Pressheide** *Sympiëza*.
- Priestley's Materie** *Protococcus viridis*.
- Puffbohne** *Vicia Faba (F. vulgaris)*.
- Pulque** (Getränk aus d. Gipfelsprosse) *Agave mexicana*.
- Pulverflasche** *Lagenaria vulg. var. pyrotheca*.
- Pulverholz** (Faulbaum) *Rhamnus Frangula*.
- Pumpelmus** s. *Pompelmus*.
- Purgierbaum** *Croton Tiglium*.
- Purgierkörner**, s. eb.
- Purgierkraut** (Gnaden-) *Gratiola officinalis*.
- Purgiernuss** *Glycine subterranea*.
- Purgierpflaume** *Spondias Myrobalanus*.
- Purgierraute** *Crocea latifolia*.
- Purgierstrauch** *Daphne s. Thymelaea*.
- Purgierwinde** *Convolvulus Scammonia*.
- Purpurrose** s. *Essigrose*.
- Putennie** s. *Pfingstrose*.
- Quantel** *Amelanchier*.
- Quecke** (Queckengras) *Triticum repens*.
- Quellenbaum** *Phytocrëne gigantea* etc.
- Quellgras** *Catabrosa s. Glyceria aquatica*.
- Quellmoos** (Hüll-) *Fontinalis*.
- Quercitronholz** *Quercus discolor s. tinctoria*.
- Quinoapflanze** s. *Peruspinat*.
- Quinquina Piton** *Cinchona floribunda*.
- Quitscheren** (Quitze, Vogelbeere) *Sorbus Aucuparia*.
- Quittenmispel** *Cotoneaster vulgaris*.
- Rabau** s. *Lederapfel = Reinette*.
- Radieschen** *Raphanus sativus Raddiola*.
- Raffel** (Nelkenwurz) *Gëum urbanum*.
- Rahl** = *Raden Agrostemma Githago*.
- Rahle** *Teesdalëa*.
- Rahmapfel** (Flaschen-) *Anona*.
- Rahmbeere** (Bocks-) *Rubus caesius*.
- Rahmnüsse** (brasil.) *Bertholletia excelsa*.
- Rambourapfel** = *Reinette* u. *Pfundapfel*.
- Ramée** (Ramie, engl. *Chinagrass*) *Boehmeria utilis s. Catirus ramiflorus*.
- Rampe** (Rempe etc.) *Diploaxis*.
- Rampen** (Knoblauchskraut) *Alliaria officinalis*.
- Ramsch** (Bärenlauch) *Allium ursinum*.
- Ramsel** *Polygala*.
- Ramselwurz** s. *Rampen*.
- Rande** *Linnaea*.
- Ranunkelstrauch** *Kerria japonica (Corchorus jap.)*.
- Rapontika** s. *Rhapontikwurz*.
- Raps** (Reps, Rüb- od. Kohlsaart) *Brassica Napus*.
- Rapüntchen** (Rapünzchen) s. *Feldsalat*.
- Rapunzel** *Phyteuma, Fedia s. Valerianella* u. *Campanula Rapunculus*.
- Raspelbaum** *Flindersia*.
- Raspelstrauch** *Tetracëa*.
- Rasselblume** *Catananche coerulëa*.
- Rasselbüchse** *Hura crepitans*.
- Rasselhülse** *Psophocarpus*.
- Rasselnuss** *Hernandia sonora*.
- Ratanhiawurzel** *Krameria triandra*.
- Rauhbeere** (Rauch-) *Ribes Grossularia*.



- Raupengras** *Joachimia* s. *Beckmannia erucaeformis*.  
**Raupenklee** *Scorpiurus vermiculatus*.  
**Rauschbeere** *Empetrum* u. *Vaccinium uliginosum*.  
**Rauschhülse** *Strizolobium* s. *Dolichos pruriens*.  
**Ravennagrass** (Zucker-) *Erianthus Ravennae*.  
**Raygras** (engl.) *Lolium perenne*, (franz.) *Arrhenatherum*, (ital.) *Lolium italicum*.  
**Rebenpilz** (Weinstockschimmel) *Oidium Tuckeri*.  
**Rebling** (Wildrebe) s. *Jungfernrebe*.  
**Reelsaft** *Achillea Millefolium*.  
**Regenrose** (Ringel-) *Calendula* s. *Tripteris*.  
**Reiglise** (Althäe) *Althaea officinalis*.  
**Reiherbusch** s. *Flaschenbürste*.  
**Reineclaud** *Prunus insititia italica*.  
**Reinette** *Pirus Malus dasyphylla*.  
**Reischker** s. *Reizker*.  
**Reisebaum** (Wander-) *Urania speciosa* s. *Ravenalia*.  
**Reisgerste** *Hordëum Zeocrithon*.  
**Reismelde** s. *Peruspinat*.  
**Reispapierpfl.** (chines. Reis-) *Aralia papyrifera*.  
**Reithgras** (Schilf) *Calamagrostis arundinacea* s. *silvatica*.  
**Reizker** *Russula* u. *Galorrhoeus insulsus* etc.  
**Remontanterosen** *Rosa hybrida* Hort.  
**Remontantenelke** *Dianthus semperflorens*.  
**Rempe** (Hundsrauke) *Erucastrum*.  
**Remse** *Hutchinsia*.  
**Renntiermoos (-flechte)** *Cladonia rangiferina*.  
**Resina elastica** Offiz. (Federharz) s. *Caoutschuk*, *Res. Guajacis Ligni sancti* = *Guajacum* off., *Res. Sandarac* = *Thuja articulata*.  
**Rhabarber** (Mönchs-Rh.) *Rhëum Rhaponticum*.  
**Rhapontikwurzel** *Oenothera biennis*.  
**Rhodiserholz** *Aspaläthus Ebënus*.  
**Riechkraut** *Unxia camphorata*.  
**Riesenbaum** *Adansonia*.  
**Riesenkamm** (Süssdolde) *Myrrhis odorata*.  
**Riet** (Riedgras) *Carex*, *Riet Heleo-*
- chäris* u. *Scirpus*, (Rieth, Schilfrohr) *Phragmites*.  
**Rindgras** (Vieh-) *Poa*.  
**Rindgift** *Bucida*.  
**Ringpilz** *Psalliota*.  
**Rips** (Reps, Raps) *Brassica Napus*.  
**Rispelgras** *Poa*.  
**Ritschgras** *Koeleria*.  
**Ritterkreuz** *Horminum pyrenaicum*.  
**Ritterschwamm** *Tricholöma*.  
**Roccambolle** (Rocken-) *Allium Ophioscorödon*, *Schlangenlauch*.  
**Rocket** (Meersenf) *Cakile*.  
**Rodel** (Läusekraut) *Pedicularis*.  
**Röhrenmanna** *Ornus europaea*.  
**Römersalat** (Strunk-) *Lactuca sat. romana*.  
**Rosarium** = *Rosengarten*.  
**Rose** (japan.) *Camellia jap.*, (*Jericho-*, s. d.).  
**Rosenapfel** *Jambusa vulg.* u. *Dillenlia*.  
**Rosenholz** *Cytisus canariensis*, (*Ficatin-*, s. d.).  
**Rosenlorbeer** = *Oleander Nerium Oleander*.  
**Rosenwurz** *Rhodiöla*.  
**Rosinen** (Cibeben, Korinthen) *Vitis vinifera*.  
**Rosmarinapfel**, *Sorte v. Traubenapfel Diel-Lucas*.  
**Rosoffenichel** *Phellandrium* u. (*Sau-*) *Peucedänum*.  
**Roskopfstaude** *Carlina acaulis*.  
**Rosskümmel** *Phellandrium* u. *Siler*.  
**Rossmalve (-pappel)** *Malva sylvestris*.  
**Rossmünse (-minze, Ziest)** *Stachys*.  
**Rosswiecke** *Astragaloides*.  
**Rost** *Coniomycetes* (Staubpilze, *Aecidium*, *Puccinia* etc.).  
**Rotang** (Palmried) *Calämus Rotang*.  
**Rotbuche** (Wald-) *Fagus sylvatica*.  
**Rotdorn** *Crataegus Oxyacantha flore rubro*.  
**Rotholz** (afrik.) *Baphia nitida*, (*Bra-*) *silien-*, s. d.).  
**Rotrindenholz** *Samadëra indica*.  
**Rottanne** *Pinus Abies L.* s. *Abies excelsa* Rich.  
**Rotwurz** *Tormentilla*.  
**Roucou** *Bixa Orellana*.  
**Rousselette** = *Birnsorte*.  
**Rübe** (weisse, Wasser-, Stoppel-, Teltower) *Brassica Rapa esculenta*.  
**Rübenkohl** (Rübsamen, Rübsen)

- Brassica Rapa oleifera s. campestris.  
**Ruckel** Bellidiastrum.  
**Ruhrbirne** Pirus s. Sorbus torminalis.  
**Ruhrkraut** Gnaphalium u. Inula dysenterica.  
**Ruhrrinde** Simaruba officinalis.  
**Ruku** s. Roucou.  
**Runkelrübe** Beta, (Zucker-) Beta Cicla.  
**Ruzelblume** Aletris.  
**Russling** s. Lohblüte.  
**Russtaun** Cladosporium Fumago, (Schwärze) Stemphylium ericetorum.  
**Rotabaja** (schwed. Kohlrübe) Brassica Napus var.  
**Ryegrass** s. Raygrass (e. rye-grass).
- Sabadillsamen** Veratrum Sabadilla.  
**Sabinebaum** (Sade-, Seven-) Juniperus Sabina.  
**Sabudu** Sorghum saccharatum.  
**Sadebaum** s. Sabineb.  
**Sämsblätter** (Sennes-) Cassia Senna.  
**Säckelblume** (Seckel-) Ceanothus.  
**Saftgrün** (Kreuzdornbeere) Rhamnus catharticus.  
**Sagapenum** (Teufelsdreck) Ferula persica.  
**Sagobaum** Caryota urens, (-farn) Cycas u. Zamia, (-palme) Sagus farinifera etc., (Portland-Sago) Arum maculatum.  
**Sagueer** (Zuckerpalme) Arenga.  
**Salap** (Salep) Orchis Morio etc., (tahitisch.) Tacca.  
**Salbenbaum** Amyris u. Myroxylon.  
**Salbenschwamm** s. Lohblüte.  
**Salbnuss** (Behen-) Guilandina Moringa.  
**Salde** Ruppia.  
**Salholz** (ostind. Dammar-) Shorea robusta.  
**Salme** (Keilmelde) Obione.  
**Salweide** (Sohl-) s. Palmweide.  
**Salzbinse** Triglochin maritimum.  
**Salzmiere** s. Porselein, Honckenya s. Halianthus.  
**Salzpungen** Samolus Valerandi.  
**Sambac** (arab. Jasmin) Jasminum Sambac.  
**Sammettelblume** Tagetes.  
**Sammetgras** Lagurus.  
**Sammettelke** Lychnis Coronaria L.
- Sammettelblume** Althaea officinalis.  
**Sandaracharz** Thuja articulata.  
**Sandbeere** (Bärentraube) Arbutus s. Arctostaphylos uva ursi.  
**Sandbüchsenbaum** Hura crepitans.  
**Sandelholz** (rot.) Pterocarpus santalinus, (gelb.) Santalum album, (Senegal-) Drepanocarpus senegal., (weiss.) Siritium.  
**Sand-Luzerne** Medicago falcato-sativa.  
**Santelholz (-baum)** s. Sandel.  
**Sapfel** Isnardia.  
**Sapotillbaum** s. Breiapfel.  
**Sappanholz** Caesalpinia Sappan.  
**Sarana** (essb. Serenna) Liliun kam-schatcense.  
**Sargasso** Sargassum bacciferum.  
**Saribupalme** Corypha rotundifolia.  
**Sarsaparill** (Sassa-) Smilax Sarsaparilla.  
**Sassafras** Laurus Sassafras.  
**Satanspilz** Bolëtus sanguineus s. Satanas.  
**Satinetholz** Ferolia guianensis s. Chloroxylon Swietenii.  
**Saubere** Solanum nigrum.  
**Saubrot** (Erdscheibe) Cyclamen.  
**Sauer (-klee)** Oxälis.  
**Sauerdatteln.** Tamarindus.  
**Sauerwurz** Calymenia s. Oxybaphus l'Hér.  
**Saufenchel** (Ross-) Peucedanum.  
**Saug** (Bienen-) Lamium.  
**Saul** s. Salholz (Schiffsholz.).  
**Saupilz** (Schuster-) Bolëtus luridus.  
**Saurebe** Solanum Dulcamara.  
**Sauwurz** Bryonia alba.  
**Savoyerkohl** (Wirsing) Brassica oler. sabauda.  
**Scarlet-Pelargonien** Pelargonium inquinans, zonale u. Blendlinge beider.  
**Schabenkraut** Verbascum Blattaria.  
**Schabziegerklee** Trifolium coeruleum s. Trigonella (Melilotus) coer.  
**Schachblume** (Kaiserkrone) Fritillaria.  
**Schachtkohl** (Spurre) Holostëum umbellatum.  
**Schafenther** Bolëtus ovinus.  
**Schafkraut** (Scharf-, Schärfling) Asperugo procumbens.  
**Schakarillrinde** Croton Eluteria.  
**Schamblume** Clitoria.  
**Schamkraut** Chenopodium Vulvaria s. olidum.

- Schangtonkohl** s. Petsai.  
**Scharbockskraut** s. Feigwurz.  
**Scharfblatt** Xyris.  
**Scharlacheiche** s. Kermesbeere (-eiche).  
**Scharlachkraut** (Scharlei) *Salvia Hornūm*.  
**Scharte** (blaue) *Serratula tinctoria*, (gelbe) *Genista tinct.* (Färbeginster).  
**Scheiberich** (Sumpfschirm) *Helosciadium*.  
**Scheidenflie** *Xiphidium*.  
**Scheinbeere** (canad. Bergthee) *Gaultheria*.  
**Schellackbaum** *Croton lacciferum*, *Ficus religiosa* u. *indica*.  
**Schellbaum** *Ahovia major* (*Cerbera Ahovia*).  
**Schellenblume** *Adenophora* s. *Campanula*.  
**Schelmenkraut** *Gentiana asclepiadæa*.  
**Scherbet** *Trinia*.  
**Scheuerkraut** *Equisetum hiemale*.  
**Schierlingstanne** s. Hemlockstanne.  
**Schiffcheublume** *Lembotropsis*.  
**Schildblume** *Chelone*.  
**Schimmel** *Hyphomycetes* (*Mucor* u. *Ascophora*).  
**Schirmpalme** *Corypha* u. *Livistona*.  
**Schirmtanne** *Sciadopitys*.  
**Schlafkraut** *Teuerium Chamaedrys*.  
**Schlaflinse** (Blasenstr.) *Colutea*.  
**Schlaugenäglein** s. Scharfkraut.  
**Schlangenaectus** s. Peitschencact.  
**Schlangengiftkraut** *Monnieria trifolia*.  
**Schlangengras** *Plantago coronopifolia*.  
**Schlaugenholz** *Strychnos colubrina* u. *Ophioxylon* s. *Tiovanna*.  
**Schlangenkraut** *Calla palustris*.  
**Schlangenmoos** *Lycopodium clavatum*.  
**Schlangenwurz** (ind.) *Ophiorrhiza Mungos*, (virgin.) *Serpentaria*, (Natter-) *Polygonum Bistorta*.  
**Schlauchfaden** (Schimmel) *Ascophora mucedo*.  
**Schleimapfel** *Crataeva Marmelos*.  
**Schleimling** *Tremella Nostoc* L.  
**Schlenderstendel** *Vanda*.  
**Schlinge** *Viburnum*, (Baum-) *Periplota*.  
**Schlingrose** *Rosa repens* s. *caprolata* u. *rubifolia*.
- Schlippen** (Natterwurz) *Polygonum Bistorta*.  
**Schlutte** (Judenkirsche) *Physalis Alkekengi*.  
**Schmack** (Sumach, Gerber-) *Rhus Coriaria*.  
**Schmalzblume** *Caltha palustris*.  
**Schmalzkraut** s. Feldsalat.  
**Schmalzflug** (Butterpilz) *Bolëtus lutëus*.  
**Schmeerwurz** (Stick-) *Tamus communis*.  
**Schmelche** s. Pfeifenbinse.  
**Schmergel** s. Feigwurz.  
**Schmerle** (Kopfriete) *Schoenus*.  
**Schmerflug** *Bolëtus granulatus*.  
**Schmiele** (Schmielenhafer) *Aira flexuosa*.  
**Schmierbrand** *Urëdo sitophila* u. *Tilletia*.  
**Schminkbeere** (Erdbeerspinat) *Blitum*.  
**Schminkbohne** *Phaseolus vulgaris*.  
**Schminke** (Steinsamen) *Lithospermum*.  
**Schminkläppchen** s. Bezetten.  
**Schminkwurz** *Anchusa tinctoria*, *Henna* u. *Polygonatum*.  
**Schmirbel** s. Schminkbeere.  
**Schmeckensamen** *Cochlospermum* s. *Wittelsbachia*.  
**Schnee** (roter) *Protococcus nivalis*.  
**Schneebeerenstrauch** s. Peterstr.  
**Schneeflockenbaum** *Chionanthus*.  
**Schneeholder** s. Peterstrauch.  
**Schueerose** *Rhododendron ferrugineum*, (Christblume, s. d.).  
**Schnellephen** (Sommer-) *Mikania scandens* od. *Senecio mikanoides*.  
**Schnurhülse** *Sophora japonica*.  
**Schönfaden** s. Flaschenbürste.  
**Schönfuss** *Bolëtus calopus*.  
**Schönebe** *Eccremocarpus*.  
**Schotendorfbaum** (Gummii-) *Acacia arabica* etc., (gemeiner) *Robinia Pseud-Acacia*.  
**Schotenweiderich** (Weidenröslein) *Epilobium*.  
**Schraubenbaum** (-palme) *Pandanus*.  
**Schraubenmalve** *Helictëres*.  
**Schriftblume** *Grammanthes gentianoides*.  
**Schulmeisterpilz** s. Parasolpilz.  
**Schüchel** (Schotenklee) *Lotus*.  
**Schuppenapfel** *Anona*.  
**Schuppenschwamm** *Pholiota mutabilis*.

- Schusserbaum** *Gymnocladus* s. *Guilandina*.  
**Schüsselflechte** *Parmelia*.  
**Schnesterpilz** s. Saupilz.  
**Schüttgelb** *Genista tinctoria*, *Rhamnus catharticus* u. *Betula pubescens*.  
**Schwalbenwurz** *Asclepias* u. *Cheilonium*.  
**Schwammkürbis** *Luffa*.  
**Schwabenblume** (Wasserviole etc.) *Butōmus umbellatus*.  
**Schwanzpfeffer** (*Cubebe*) *Saururus*.  
**Schwarzbeere** = Heidelbeere.  
**Schwarzerle** (Faulbaum) *Rhamnus Frangula*.  
**Schwarzkümmel** (echt.) *Nigella*, (falsch.) *Agrostemma Githago* s. *g. Raden*.  
**Schwarzmundbeere** *Melastoma malabathricum* etc.  
**Schwarztanne** s. Rottanne.  
**Schwarzwurz** (Hafer-, s. d.), (Beinwell, *Consolida major* Offiz.) *Symphytum officinale*.  
**Schweifekopf** *Hypholoma fascicularis*.  
**Schweinegummi** *Marila racemosa* etc.  
**Schweinekraut** s. Schlangenkraut.  
**Schweinesalat** *Aposëris* od. *Hypoëris*.  
**Schwimmblatt** *Salvinia natans*.  
**Schwindelkörner** *Coriandrum sativum*.  
**Schwindelkraut** *Doronicum Pardalianches*.  
**Schwingel** (-gras) *Festuca*. (Manna-) s. Fluttgras, (-schilf) *Scolochloa festucacea*.  
**Sclerotien** = Hartpilze.  
**Sebesten** *Cordia Sebestena*, (-baum, Holder) *Sambucus nigra*.  
**Seebälle** *Zostera marina* (Seegras).  
**Seegras** (unecht. Rosshaar, fr. crin végétal) *Chamaerops humilis*, (Seebälle, s. eb.).  
**Seelenholz** (mexik.) *Xylostemum mexicanum*.  
**Seetranbe** *Ephedra* u. *Coccoloba uvifera*.  
**Seewier** s. Seebälle.  
**Seide** (Flachsseide) s. Fadenseide.  
**Seidelbeere** *Solanum Dulcamara*.  
**Seiden-Eisenholz** *Sersalisia*.  
**Seidengras** *Yuca*.  
**Seidenstrauch** *Asclepias syriaca*.  
**Seiffenschwamm** *Tricholoma saponaceum*.  
**Semde** (Schnabelsamen) *Rhynchospora*.  
**Semen** *Cataputiae minoris* Offiz. = *Euphorbia Lathyris*, - *Cataputiae majoris* Off. = *Ricinus communis*, - *Coccognidii* Off. = *Daphne Mezeremum*, - *Cocculi* Off. = *Menispermum Cocculus*, - *Contrae* s. *Cynae* Off. = *Artemisia judaica* s. *contra*.  
**Semmelpilz** *Polyporus confluens*.  
**Semust** *Lycopodium Selago*.  
**Senegal-Gummi** *Acacia senegalensis*.  
**Senegawurz** *Polygala Senega*.  
**Senfkraut** (Barbenhederich) *Barbarea*.  
**Sengel** *Aposëris*.  
**Sennesblätter** *Cassia Senna*, (unechte) *Bauhinia porrecta* (*Sennae spuriae* Off.).  
**Senwurz** *Senecio*.  
**Serbet** (verdünnt. Veilchensyrup) *Viola odorata*.  
**Serblensalat** (Wurmsamen) *Artemisia contra*.  
**Serenna** s. *Sarana*.  
**Serge** (Pfefferkraut) *Saturcja*.  
**Serradella** *Ornithopus sativus*.  
**Sermel** (Milchkraut) *Glaux*.  
**Sesam** (orient.) *Sesamum orientale*.  
**Sevenbaum** s. *Sabinebaum*.  
**Sheabanm** (Butterb.) *Micadania* s. *Butyrospermum*.  
**Sibyllenwurz** (Sybillen-) *Gentiana cruciata*.  
**Siebengezeit** *Melilotus coeruleus* s. *Schabziegerklee*.  
**Siegmarswurz** *Malva Alcea*.  
**Siegwurz** (Allermannsharnisch) *Gladiolus communis*.  
**Silberbaum** *Elaeagnus argentea* u. *Protëa*.  
**Silberblatt** *Lunaria*.  
**Silberfarn** *Gymnogramma*.  
**Silberfichte** (-baum) *Protëa*.  
**Silberregen** (Traubenkirsche etc.) *Prunus Padus*.  
**Silberscharte** *Jurinëa*.  
**Silberwurz** *Dryas octopetala*.  
**Silling** (Zaunlilie) *Anthericum*.  
**Simarube** *Quassia Simaruba*, (-baum) *Bursëra gummifera*.  
**Siriblätter** (Kaupfeffer) *Piper betle*.  
**Sissuholz** s. *Ficatinholz*.

- Sitter** (Sumpfwurz) *Epipactis*.  
**Skaumonium** *Convolvulus Scammonia*.  
**Skorpioneschwanz** *Heliotropium*.  
**Sodbrod** (Johannis-) *Cerantonia Siliqua*.  
**Sodomsapfel** *Solanum Sodomaeum*.  
**Sohlweide** s. Palmweide.  
**Sojabohne** *Dolichos hispida* s. Soja.  
**Sommereiche** *Quercus pedunculata*.  
**Sommerepheu** s. Schnellepheu.  
**Sommerlinde** (holländ.) *Tilia grandifolia*.  
**Sommerrebe** *Vitis Labrusca*.  
**Sommerthürchen** *Leucocjum vernum*.  
**Sommerwurz** (Ervenwürger) *Orobancha*.  
**Sonche** (Saudistel etc.) *Sonchus*.  
**Somengüsel (-rösch)** *Helianthemum (Cistus)*.  
**Sonnenwurz** s. Sommerwurz.  
**Sorgho** s. Durraha.  
**Spaltglocke** *Scävola*.  
**Spanisches Rohr** *Calämus Rotang*, (falsches) *Arundo Donax*.  
**Spargelbohne (-erbse)** *Lotus* s. *Tetragonolöbus siliquosus*.  
**Spargelkohl** s. Brocoli.  
**Spargelsalat** *Lactuca angustana*.  
**Sparz** s. Spargelbohne.  
**Specklilie** *Lonicera Periclymënum*.  
**Speckmelde** *Mercurialis annua*.  
**Speerwurzel** *Valeriana*.  
**Speierling** (Sperberbaum) *Sorbus s. Cornus domestica*.  
**Speitenfel** *Agaricus emeticus (Russula em.)*.  
**Speiwurzel** *Pyrëthrum*.  
**Spelle** *Moehringia*.  
**Sperkling** *Spergularia*.  
**Sperwe** = Rosskastanie.  
**Spettel** (Leimkraut) *Silëne*.  
**Sperapfel** s. Speierling.  
**Spike** (Spiköl) *Lavandula Spica*.  
**Spillbaum** (Spindel-) *Evonymus europaeus*.  
**Spille** od. **Spilling** (catalonische Pflaume) *Prunus lutëa*, (Kriecher) *Prun. insititia*.  
**Spinat** (gem.) *Spinacia oleracëa*, (neuseeländ.) *Tetragonia expansa*, (engl.) *Rumex Patientia*.  
**Spinning** *Scheuchzeria*.  
**Spinnenkraut** *Anthericum* s. *Phalangium*.  
**Spitzblume** *Ardisia*.
- Spitzenbaum** *Lagetta lintearia*.  
**Spitzmorebel** *Morchella conica*.  
**Spleisse** *Lobelia*.  
**Sporkelblume** (Knoten-) *Leucocjum vernum*.  
**Spornblume** *Centranthus (Valeriana rubra etc.)* u. *Tropaeolum*.  
**Spreublume** (Stroh-) *Xeranthënum*.  
**Spurre** s. Schachtkohl.  
**Spritzgurke** (Spring-) *Momordica Elaterium*.  
**Stabwurz** (Eberraute etc.) *Artemisia Abrotänum*.  
**Stachelkausel** *Urëna*.  
**Stachelsamen** *Acanthospermum* s. *Xanthioides*.  
**Staubflechte** *Lepraria Jolithus etc.*  
**Ständling** *Liparis*.  
**Stäubling** (Bärlapp) *Lycopodium*, (Bovist) *Lycoperdon*.  
**Standich** *Kochia*.  
**Stechkörner** *Carduus Marianus (semina etc.)*.  
**Stechkraut** (Mariendistel) s. eb. u. *Silybum Marianum*.  
**Stechwinde** *Smilax Sarsaparilla*.  
**Steckenkraut** *Ferula*.  
**Steinbeere** (Brom-, Him-) *Rubus*.  
**Steineiche** (Winter-) *Quercus Robur L. s. sessiliflora Sm.*  
**Steineppich** *Bubon macedonicum*.  
**Steinklee** *Melilotus* u. *Trifolium repens*.  
**Steinmispel** *Cotoneaster vulgaris (Mespilus Cot. L.)*.  
**Steinmorehel** (Speise-) *Helvella esculenta*.  
**Steinmuss** *Pterocarya* s. *Parinarium*.  
**Steinpilz** s. Edelpilz.  
**Steinrösch** (Zeiland) *Daphne Cneorum*.  
**Steinsalat** (Hasenlattich) *Phoenixopus muralis*.  
**Steinweichsel** (Weichselholz) *Prunus Mahaleb*.  
**Stellmacherholz** *Trichoclädus crinitus*.  
**Stelzenbaum** s. Leuchterbaum.  
**Stendeln** *Orchidëae*.  
**Stephanskörner** *Delphinium Staphisagria*.  
**Sternanis** *Illicium anisatum* od. *Skimunia fragrans*.  
**Sternblume** *Aster*, *Narcissus poeticus*, *Stellaria*.

- Sterndistel** *Centaurēa Calcitrāpa*.  
**Sterndolde** (Strenze) *Astrantia*.  
**Sternglocke** *Campanūla patūla*.  
**Sternhyazinthe** (Zille etc.) *Scilla bifolia*.  
**Sternkopf** s. Grindrose.  
**Sternschnuppe** s. Schleimling.  
**Stichling** s. Haargurke.  
**Stiekwurz** s. Schmeerwurz.  
**Stielmuss** (Süss-) *Hedycarya*.  
**Stielpfeffer** *Piper Cubēba*.  
**Stinkapfel** *Crataeva Papia*.  
**Stinkasant** *Ferula Asa foetīda*.  
**Stinkbaum** *Foetīdia mauritiana* u. *Anag̃yris*.  
**Stinkbohne (-frucht)** *Scorodocarpus* s. *Ximenia*.  
**Stinkholz** *Olax zeylanica*.  
**Stinkkraute** *Ticorēa foetīda*.  
**Stinkwacheloder** s. *Sabinebaum*.  
**Stocklack** *Croton laccifērum*.  
**Stockmorehel** s. Frūhmorchel.  
**Stockrose** (s. g. Gartenmalve) *Althaea rosēa* s. *Malva arborēa*.  
**Stockschwamm** s. Schuppenschw.  
**Storax** *Styrax officinalis*.  
**Strandkiefer** *Pinus halepensis*.  
**Strandling** *Corrigiōla litoralis* u. *Litorella lacustris*.  
**Strausskirsche** *Solanum*.  
**Streitkolbenbaum** *Casuarīna*.  
**Strenze** s. Sterndolde.  
**Strickgras** (Seil-) *Restio*.  
**Strohblume** *Xeranthēmum*, (Immortelle) *Gnaphalium* u. *Helichrysum*.  
**Strunksalat** (Römer-) *Lactuca sat. romana*.  
**Strunkschwamm** s. Glucke.  
**Stückelalgen** *Diatomēae* (*Bacillaria* etc.).  
**Studentenblume** *Syringa*, *Dianthus barbatus*, *Tagētes* u. a.  
**Studentenkrant** *Chenopodium scoparium* (*Kochia scop.*).  
**Studentenmelke** (Bart-) *Dianthus barbatus*.  
**Studentenröschen** (Herzblatt) *Parnassia palustris*.  
**Stundenblume** *Hibiscus* s. *Ketmia Trionum*.  
**Succade** *Citrus decumāna*.  
**Südseemyrte** *Leptospermum scoparium*.  
**Süssholz** (*radix Laquiritiae*) *Glycirrhiza glabra*.
- Süssklee** (Manna-) *Hedysārum Alhagi*.  
**Sumpfeeder** *Taxodium* s. *Cupressus distīcha*.  
**Sumpfheide** *Erica Tetrālix*.  
**Summ** *Sumbūlus moschatus* u. *Crotalaria juncēa*.  
**Suppenlauch** (Schnitt-) *Allium Schoenoprāsūm*.  
**Sybillenwurz** s. *Sibyllenwurz*.  
**Sycomore** *Ficus Sycomōrus*, (-Platane) *Platānus*, (unechte S.) *Melia Azedarach*.  
**Tabak** *Nicotiana Tabācum* etc.  
**Tabakir** (Bambuszucker) *Bambusa arundinacēa*.  
**Tabakspfeife** *Aristolochīa Siphon*.  
**Tabakswurz** *Levista (-stia)*.  
**Tabascher** s. *Tabakir*.  
**Tacamahac-Harz** *Elaphrium* u. *Inophyllum*.  
**Tafelfichte** *Myrrhis odorata*.  
**Tafeltuchbaum** *Ricinus Mappa*.  
**Talgbaum (-beerenb.)** *Stillingia sebifera* u. *Croton sebifērum*.  
**Talglorbeer** *Tetranthēra* s. *Litsēa citrifolia*.  
**Tangu-Gewürznelke** *Jambolifera pedunculata*.  
**Tapioeca (-oka)** *Jatropha Manihot*.  
**Tarant** *Sweetia*, (blauer) *Gentiana Pneumonanthe*.  
**Tarro** (Kalo, Colo) *Caladium esculentum* s. *Colocasia esculenta*.  
**Tartar** *Crambe tatarica*.  
**Tartschenflechte** *Cetraria*.  
**Tassenblume** *Scyphanthus elegans*.  
**Taubenäpfel** = zugespitzte Rosenäpfel.  
**Taubeere** s. *Kratzbeere*.  
**Täubling** s. *Speiteufel*.  
**Tauche** (Seekanne) *Limnanthēmum* etc.  
**Tausendschön** (Masliebchen) *Bellis perennis*, (Bartnelke) *Dianthus barbatus*, auch *Amarantus* u. *Polygala*.  
**Teakholz** (afrik.) *Oldfieldia*, (ind.) *Tectonia*.  
**Teckholz** s. eben.  
**Teltower Rūbe** *Brassica Rapa esculenta teltoviensis*.  
**Tembesubaum** (Königsholz) *Fagraea* (Fragr.) *peregrina*.  
**Teosinte** (Guatemalagrass) *Euchlaena gigantēa* s. *Reana luxurians*.

- Terpentin** (gem.) *Pinus sylvestris*, (Bordeaux-) *Pinus Pinaster*, (venetian.) *P. Larix*, (attisch. od. franz.) *P. halepensis*, (canad.) *Abies canadensis*, (cypr. od. von Chios) *Pistacia Terebinthus*, (strassb.) *Pinus Picēa* s. *Abies pectinata*.
- Tertianfieberkr.** (*Tertianaria*) *Scutellaria galericulata*.
- Teufelsabbiss** *Scabiosa Succisa* L.
- Teufelsauge** *Adonis*.
- Teufelsdorn** *Tribulus terrestris*.
- Teufelsdreck** *Ferula Asa foetida*.
- Teufelshand** *Lycopodium Selago*.
- Teufelskrallen** *Phyteuma spicatum*.
- Teufelspuppe** s. *Schlutte*.
- Teufelswiru** *Lycium barbārum*.
- Thee** (chines.) *Thea chin.*, (Blankenheimer, s. Lieber'scher), (mexik.) *Chenopodium ambrosioides*, (kuril.) *Epilobium angustifol.*, (*Sideritis herba Off.*) *Stachys Ochroleuca*, (*Sideritis herb. flore luteola Liv.*) *Stachys recta*, (Paraguay-) s. *Mate*.
- Theemyrte** *Leptospermum scoparium*.
- Theerose** *Rosa fragrans* Röd. u. *indica Thea* Hort.
- Theriaki** (d. Opiumfresser) *Papāver somniferum*, (*Theriakwurz.*) *Valeriana Phu*, (echte) *Archangelica officinalis*.
- Thränenschwamm** (Haus-) *Merulius lacrymans*.
- Threm** (Trehm) *Platanthēra* (Breitkölbchen).
- Timotheusgras** *Phlēm pratense*.
- Tintenbeere** *Ligustrum vulgare*.
- Tintenholz** (indian.) *Terminalia Catappa*.
- Tintenwurz** *Morinda royoc*.
- Toddy** (Blütenspindel-saft) *Kokos-* u. *Fächerpalmen*.
- Totenbeinbaum** s. *Stinkapfel*.
- Totenblume** *Calendula off.* u. *Ta-gētes*.
- Tolldocke** *Isopȳrum thalictroides*.
- Tollkorn** (Tammel-) *Lolium temulentum*.
- Tolte** (Milchsalat, -distel) *Mulgedium*.
- Tolubalsam** *Myroxylon toluiferum*.
- Tomate** s. *Liebesapfel*.
- Tongabohne** (Tonka-) *Dipteryx Tonga* etc.
- Tonkaythee** = chines. Thee, schlechteste Sorte.
- Topfbaum** *Lecȳthis Ollaria*.
- Topflorbeer** s. *Talglorbeer*.
- Topinambur** (Erdbirne, s. d.).
- Tournesol** *Croton tinctorium*.
- Träubel** (Traubenhyaicinthe) *Muscari*.
- Traubenbaum** *Coccolōba*.
- Traubeneiche** s. *Steineiche*.
- Traubenpilz** s. *Rebenpilz*.
- Traubenschimmel** *Botrytis*.
- Tremse** (Flockenblume) *Centaurēa*.
- Trespe** (Dord) *Bromus*, (canad.) *B. purgans*.
- Tresterschimmel** *Stemphylium*.
- Trenkraut** (Wand-, Glas-) *Parietaria*.
- Trichterling** *Clitocybe*.
- Triftwurz** (Rapunzel, s. d.).
- Tripmadam** *Sedum reflexum* u. *album*.
- Troddeblume** *Soldanella alpina*.
- Trollblume** s. *Engelsblume*.
- Trommelbaum** *Mithridatēa* s. *Am-bōra*.
- Trompetenbaum** *Cecropia* u. *Bignonia Catalpa*.
- Trompetenblatt** (Wasserkrug) *Sarracenia*.
- Trompeten-Jasmin** *Tecōma*.
- Trompetenzunge** *Salpiglossis*.
- Trossnarzisse** (Dolden-) *Narcissus Tazetta*.
- Trunkelsbeere** *Vaccinium uliginosum*.
- Tubanbaum** s. *Gutta-Percha*.
- Tube** (weisse) *Polyanthes tub.*, (blaue) *Agapanthus umbellatus*.
- Tuneserblume** s. *Afrikaner*.
- Tupelbaum** *Nyssa aquatica*.
- Turbanheliotrop** *Tiaridium* s. *Heliotr. indicum*.
- Turbankapsel** *Tiarella*.
- Turbithwurz** s. *Turpethrinde*.
- Turnip** (Weissrübe etc.) *Brassica Rapa*.
- Turpethrinde** *Convolvulus* s. *Ipomoea Turpethum*.
- Tusearora-Reis** *Hydropȳrum palustre*.
- Uchtblume** *Bulbocodium*.
- Ullneo** (peruv. Nahrungsmittel) *Tropaeolum tuberosum*.
- Uniformstrauch** *Amorpha*.

- Unser-Herrgotts-Bärtlein** *Spiraea Ulmaria*.  
**Unter-Artischoke** s. Erdbirne.  
**Unter-Kohlrabi** *Brassica Napus* s. Napobrassica.  
**Upasbaum** s. Boa- od. Bohou-Upas, (-strauch, Upas Tieute) *Strychnos Tieute*.  
**Urinkraut** *Phyllanthus Urinaria*.  
**Urkorn** s. Schnee (roter).
- Vanille** *Epidendron Vanilla* (V. aromatica).  
**Veil (gelbe Viole)** *Cheiranthus Cheiri*.  
**Veilchenmoos** (-stein) *Lepraria Jolithus*.  
**Veilchenwurz** *Viola* (*Jonidium* s. *Pombalia*) *Ipecacuanha*, (florent.) *Iris florentina*.  
**Venusfliegenfalle** *Dionaea muscipula*.  
**Venskamm** (Nadelkerbel) *Scandix pecten*.  
**Vennsspiegel** *Campanula* (*Specularia* s. *Prismatocarpus*) *Speculum*.  
**Vereinsblütler** *Compositae*.  
**Vergissmeinnicht** *Myosotis palustris* etc., (Garten-) s. Denkmein, (Männertreu) *Veronica Chamæadrys*.  
**Vermainkraut** (Vernein-) *Thesium*.  
**Vexernelke** (Sammet-, s. d.).  
**Victoriastaude** (-stengel) *Rhœum undulatum*.  
**Vierling** *Moenchia*.  
**Vietsbohne** *Phaseolus vulgaris*.  
**Visetholz** s. Fisetholz.  
**Vogelkopf** *Passerina*.  
**Vogelpfeffer** *Ornithrophe* s. *Schmidelia*.  
**Vogelpflaume** s. Ahle.  
**Vollfarn** *Ceterach officinarum* (*Grammitis C.*).
- Wabel** (Wachsblume) *Cerinte*.  
**Wachs** (japan.) *Rhus succedana*.  
**Wachsbaum** *Myricaria*.  
**Wachsbeerentrauch** s. Peterstr.  
**Wachsblume** *Cerinte* u. *Hoya carnosa*.  
**Wachspalme** *Ceroxylon andicola*.  
**Wachspflanze** *Asclepias* u. *Hoya*, (ägypt.) *Secamone*.  
**Waid** (s. Indig, deutsch.).  
**Walch** (wilder Weizen) *Aegilops*.
- Waldmeister** (Maitrank) *Asperula odorata*.  
**Waldvöglein** *Cephalanthëra* (*Serapias* etc.).  
**Waldwolle** s. Wiesenwolle (Wollgras).  
**Waldwurz** (Fichtenspargel) *Monotropa Hypopitys*.  
**Walpurgiskraut** *Osmunda regalis* u. *Botrychium Lunaria*.  
**Wampee** *Cookia*.  
**Wandelblume** *Cineraria*, (Widerstoss) *Silene inflata*.  
**Wandelklee** *Hedysarum* s. *Desmodium gyrans*.  
**Wandelröschen** *Lantana Camara*.  
**Wanderbaum** *Urania speciosa*.  
**Wanzenkraut** *Actaea Cimicifuga* u. *Ledum palustre*.
- Warzenbrand** *Aecidium*.  
**Warzenkraut** *Zacintha verrucosa*.  
**Wasserbaum** *Tetracera potatoria*.  
**Wasserbirke** s. Maye.  
**Wasserfäden** (-heede) *Conferva*.  
**Wasserhelm** *Utricularia*.  
**Wasserklette** s. Pestilenzwurz.  
**Wasserknoblauch** *Teucrium Scordium*.  
**Wasserkrug** s. Trompetenblatt.  
**Wasserliesche** *Alismacæe*.  
**Wasserlölch** (-reis) *Zizania aquatica* s. *Hydropyrum esculentum*.  
**Wasserpest** *Elodea canadensis* etc.  
**Wasserreis** s. (-lölch).  
**Wasserriemen** s. Seebälle (-gras).  
**Wasserschere** *Stratiotes aloides*.  
**Wasserwegerich** (Froschlöffel) *Alisma Plantago*.
- Wasserzinken** (Igellock) *Ceratophyllum*.  
**Watt** *Ulva lactuca*.  
**Wantistrauch** *Broussonetia papyrifera*.  
**Wegtritt** (Vogelknöterich) *Polygonum aviculare*.  
**Weiberkrieg** (Hauhechel) *Ononis spinosa*.  
**Weichselholz** (-kirsche) s. Steinweichsel.  
**Weihnachtsrose** s. Christblume.  
**Weihrauch** (echt. indisch.) *Juniperus Lycia*, (gem.) *Abies excelsa* (*Pinus Abies L.*).  
**Weihsprossen** (Eisenkraut, -hart, s. d.).  
**Weinblume** (Nachtkerze) *Oenothera*.



- Weinpalme** *Mauritia vinifera*, *Borassus flabelliformis*, *Raphia* s. *Sagus vinifera* u. *Oenocarpus*.
- Weinraute** *Ruta graveolens*.
- Weinrose** *Rosa rubiginosa*.
- Weissceder** *Libocedrus*.
- Weissebern** (Masholder) *Acer campestre*.
- Weisstanne** (Edel-) *Abies pectinata* (*Pinus Picea* L.).
- Weissviole** *Arabis alpina*.
- Weisswurz** *Convallaria Polygonatum*.
- Wiedich** (Brachschötchen, s. d.).
- Wergtang** *Sphacelaria Scoparium*.
- Weterröschen** s. Stundenblume.
- Weymouthskiefer** *Pinus Strobilus*.
- Wicke** (ewige) *Lathyrus latifolius*, (span.) *L. odoratus*.
- Widerstoss** *Statice* u. *Silene inflata* etc.
- Widerthon** *Polytrichum*.
- Wielandskraut** (Wiesenraute) *Thalictrum*.
- Wier** s. Seegrass (-bälle).
- Wiesengeld** s. Pfennigkraut (Münz-).
- Wiesenhafer** (franz. Raygr., s. d.) u. (Hafergr.) *Avena pratensis*.
- Wiesenkohl** *Cirsium oleraceum*.
- Wiesenkönigin** s. Mädesüss.
- Wiesenwolle** (Wollgras) *Eriophorum*.
- Wilhelm** (wohlriech.) *Dianthus prolifer* s. *Tunica prolifera*.
- Windapfel** *Melodinus*.
- Windfahne** (-halm) *Apocynum spica venti*.
- Windhafer** (Flug-) *Avena fatua*.
- Windsbock** (Repsdotter, Hederich) *Rapistrum* s. *Myagrum perenne*.
- Winke** (Sinngrün) *Vinca*.
- Winteraster** *Pyrethrum* s. *Anthemidis artemisifolia*.
- Winterbeere** *Prinos verticillata*.
- Winterblume** *Gnaphalium arena-rium*, *Gomphrena* u. *Eranthemis hiemalis*.
- Wintereiche** s. Steineiche.
- Wintergrün** (Sinn-) *Vinca*, u. *Pyrola* (*Piröla*).
- Winterheliotrop** *Tussilago* s. *Nardosmia fragrans*.
- Winterkraut** s. Speckmelde.
- Winterkresse** *Erysimum Barba-raea* L.
- Winterlevkoje** *Matthiola incana*.
- Winterlinde** (Stein-) *Tilia microphylla* s. *parvifolia*.
- Winterling** *Eranthemis* s. *Helleborus hiemalis*.
- Winterrinde** (Wintere) *Drimys Winterana* (*Wintera aromatica* Off.) u. *Canella alba* s. *Winterana* G. (*Winterania Canella* L.).
- Wirrschwamm** *Daedalea quercina*.
- Wirsing** s. Savoyerkohlrabi.
- Witschen** *Aspalathus*.
- Wittweublume** *Vidua* s. *Scabiosa atro-purpurea*.
- Wolfsbeere** (Ein-) *Paris quadrifolia*.
- Wolfsrauch** *Lycoperdon*.
- Wolfswurz** *Aconitum Lycoctonum*.
- Wollblume** *Verbascum* u. *Anthyllis*.
- Wucke** (Wuke) s. Unter-Kohlrabi.
- Wunderblumenstrauch** *Pisonia*.
- Wunderklee** (Stein-) *Melilotus officinalis*.
- Wundkraut** *Sedum Anacampseros* s. *rotundifolium*, (heidn.) *Solidago Virgaurea*.
- Wurara-Pfeilgift** *Paullinia australis* s. *toxicaria*.
- Wurmfarn** *Aspidium Filix mas*.
- Wurmoos** (-knotentang) *Sphaerococcus* s. *Ceramium Helminthochortos*.
- Wurmkraut** (Rainfarn) *Tanacetum vulgare*.
- Wurmlattich** *Virca* s. *Helminthia echioides* (*Picris ech.*).
- Wurmsamen** (Zittwer, semina Cinae Off.) *Artemisia judaica* L. (*Contra* u. *vermifuga*) u. *A. Santonica* (*Santonicae*, *Contrae* s. *Cynae semina* Off.).
- Wurstkraut** *Origänum Majorana*.
- Wurzelbaum** *Rhizophora Mangle*.
- Würger** (Hunds-) *Cynanchum*.
- Würzkraut** *Satureja Thymbra*.
- Wüsten-Manna** *Tamarix gallica*.
- Yamswurzel** *Dioscorea sativa* u. *bulbifera*.
- Yukkawurzel** (Stärke-) *Jatropha Manihot*.
- Zahnbaum** (ägypt.) *Ximenia* s. *Balanites aegypt.*
- Zahnkorallen** s. Pfingstrose.
- Zahnwehholz** (Gelb-) *Xanthoxylon* s. *Fagara piperita*.

- Zapfenfarn** (Sago-) *Zamia lanuginosa*.  
**Zapfenholz** (Faulbaum) *Rhamnus Frangula*.  
**Zapfenkraut** s. Affenblatt.  
**Zauke** (Maiblume) *Convallaria majalis*.  
**Zaun-Ananas** *Bromelia Pinguia*.  
**Zäunling** (Geisblatt) *Lonicera*.  
**Zaunrebe** (Wild-) s. Jungfernrebe.  
**Zebraholz** *Omphalobium Lambertii*.  
**Zedrach** *Melia Azadirachtha*.  
**Zehrwurz** *Arum maculatum* u. *Caladium esculentum*.  
**Zeiland** (Seidelbast etc.) *Daphne*.  
**Zellernuss** *Corylus tubulosa*.  
**Ziegenbart** *Spiraea Aruncus* u. *Sp. Ulmaria*, (Korallenschwamm) *Clavaria*.  
**Ziegenlippe** *Bolētus subtomentosus*.  
**Zier** (Schminkwurz) *Anchusa tinctoria*.  
**Zigeeuerkraut** *Lycopus europaeus*.  
**Zille** (Meerzwiebel) *Scilla*.  
**Zimmetbaum** (Ceylon-) *Laurus* s. *Persca Cinnamomum*, (Cassien-) *Persca Cassia*.  
**Zimmeterdbeere** *Fragaria elatior*.  
**Zindel** *Cicendia*.  
**Zinken** s. Wasserzinken.  
**Zinnkraut** (Scheuer- etc.) *Equisetum arvense*.  
**Zipollen** (Sommerzwiebel) *Allium Cepa*.  
**Zitteralge** s. Schleimling.  
**Zittwer** (deutsch.) *Acorus Calamus*, (-Ingwer) *Amomum Zedoaria*.  
**Zittwersamen** s. Wurmsamen.  
**Zittwerwurzel** (Block-Ingwer, s.d.)
- Zottelblume** (Zotten-) = Bitterklee (Fieber-).  
**Zuckererbse** *Pisum sativum arvense*.  
**Zuckerpflaume** *Hedycera* s. *Licania*.  
**Zuckerrose** s. Essigrose.  
**Zuckerrübe** *Sium Sisarum*, (Runkel-) *Beta vulgaris rapacea* u. *B. Cicla rapacea*.  
**Zuckertanne** *Pinus Lambertiana*.  
**Zuckerwurzel** (-rübe) *Sium Sisarum* u. *Pastinaca sativa*.  
**Zunderholz** *Agave americana*.  
**Zunderschwamm** *Polyporus igniarius* u. *fomentarius*.  
**Zürbelkiefer** (-tanne) *Pinus Cembra* (Zutsche).  
**Zutsche**, s. eben.  
**Zwang** (Krähenfuss) *Coronopus*.  
**Zweckenbaum** s. Zapfenholz.  
**Zweiblatt** *Listera bifolia* u. *Majanthemum bifolium*.  
**Zwergglocke** *Wahlenbergia hederacea*.  
**Zwerg-Levkoje** *Cheiranthus* s. *Matthiola fenestralis*.  
**Zwergnispel** *Cotoneaster* u. *Pirus Chamaemespilus*.  
**Zwenke** *Bromus* s. *Brachypodium*.  
**Zwetsche** (-tschge) *Prunus domestica* s. *oconomica*.  
**Zwiebelbaum** (Madagascar-) *Vanuateria*.  
**Zwiesel** *Turgenia*.  
**Zwillingspflaume** *Dimocarpus Litchi* s. *Sapindus edulis*.  
**Zwirnölse** *Xysmalobium* s. *Asclepias*.  
**Zymbelblume** *Nolana*.  
**Zymbelkraut** s. Cymbelkr.

### III. Botanische Litteratur.

#### a. Die Autoren nebst Personalien und wichtigsten Werken.

- Abel**, Reiter u. Abel, Besch. d. in Deutschl. seltner wildwachs. u. einiger naturalis. Holzarten, Stuttg. 1803. — *Abēla* Salisb.
- Ach.** = **Acharius**, schwed. Bot., † 1819, schr. *Methōdus Lichēnum*, *Lichenographia* etc. — *Acharia* Thb.
- Adams**, russ. Bot. u. Reis. in Sibirien 1800 u. Kaukasus 1805—06. — *Adamsia* Fisch., Willd.
- Ad.** = **Adanson**, franz. Bot. u. Reis., † 1806, schr. *Hist. d. l. Bot. et plan des familles natur. etc.* — *Adansonia* L.
- Afz.** = **Afzelius**, schwed. Prof. u. Reis. in Sierra Leone, † 1837, *Afz. u. Elgenstierna, Genera plant. Guineensium*, Upsalae 1801. — *Afzelia* Sm. Ehrh.
- Ag., Agd.** = **Agardh**, C. A., schwed. Prof. u. Bischof, † 1859, *Dispositio Algarum Sueciae*, 1810—12, *Lehrb. d. Botanik*, Kopenh. 1831—32 u. a. — *Agardhia* Spr. — **Agardh**, D. G., *Theoria systematis pl.*, Lundae 1858.
- Ahnfelt**, Nils Otto, schwed. Bot., *Genera plant. Guineensium etc.* 1804. — *Ahnfeltia* Ag.
- Ait.** = **Aiton**, Aufs. d. Kew-Gärten bei London, † 1793, *Hortus Kewensis*, Ed. II., 1814. — *Aitonia* L. f.
- Albertini** v. aus Neuwied, † 1831, *Dissert. üb. Pilze, Alb. u. Schweiniz, Conspect. fungorum in Lusatae superioris agro Niskiensi cresc.*, 1805. — *Albertinia* Spr., -niēae DC.
- Aldrovandi**, Ulyss., Prof. z. Bologna, † 1605, *Dendrologiae libri II*, 1690; *Pomarium curiosum*, Bononiae 1692. — *Aldrovanda* Monti.
- Alfd.** = **Alefeld**, Dr., Arzt u. Bot. z. Nied.-Ramstadt (Gr. Hessen), † 1865, schr. *üb. d. Fam. d. Pyrolaceen*, Halle 1856, *Bienenflora Deutschl.'s*, 1863; *landw. Flora*, Berl. 1866.
- All.** = **Allioni**, Prof. zu Turin, † 1804; *Rariorum Pedemontii stirpium specimen*, 1755; *Flora Pedemontana*, 1785 u. a. — *Allionia* L.
- Alpin**, Prosper (Alpinus), Reis. im Orient, † 1617. *De plantis Aegypti*, Vened. 1592. — *Alpinia* L.
- Ammann**, J., *Stirpium rarior. in imper. Rhuteno etc. Petropoli*, 1739. *Ammania* L. — **Ammann**, A., *die Pflanzenkrankh.*, Stuttg. 1867.
- Anderson**, mehrere engl. Bot., **Anderson Thom.**, *Dir. d. bot. Gart. in Calcutta*, schr. *Fl. Adenensis* 1860, *Ceylon Acanthaceae etc.*, **And.**, Will., *Bot. d. Cook'schen Expedition.* — *Andersonia* R. Br. — **And.**, James, † 1809 in Madras.

- Andersson**, N. J., schr. Monogr. *Andropogonearum* (I. Anthistiriäe), Holmiae 1856, Mon. *Salicum* etc. Holm. 1867 u. a.
- Andreä** (*Andraea*), J. G. R., Apoth. in Hannover, † 1793, Briefe aus d. Schweiz m. Kupf., Zürich etc. 1776. — *Andraea* Hedw.
- Andr.** = **Andrews**, H., Pflanzenmaler in Lond. The botanist's repository etc. 1799—1811. — *Andrewsia* Spr. — **Andrews**, C., *Geranium*, a Monogr. London 1805—06.
- Andr.** = **Andrzejewsky**, russ. Bot., Prof. in Wilna, † 1868, *Czackia*, genre determ. etc. 1818, *Diction. glossologiae bot.* 1827 u. a. — *Andreoskia* DC.
- Angreville**, J. E. d', schr. *La flore Vallaisanne*, Genève 1863.
- Ant.** = **Antoine**, Franz, Dir. d. k. k. Gart. z. Schönbrunn, schr. die Coniferen, Wien 1840—47, d. Wintergarten etc. 1852. — *Antonia* Endl.
- Arn.** = **Arnott** (**Walker-Arnott**), Prof. z. Glasgow, † 1868, *Tent. method. muscorum*, 1825; *Pugillus plant. Indiae orient.*, 1836. — *Arnottia*, Rich. — **Arnott**, A., neue indische Pfl. — **Arnott**, G., üb. *Torreya*.
- Arrabida**, Antonio de, Bisch. in Brasil., schr. *Fl. Fluminensis* (Fl. v. Rio-Janeiro).
- Arrude**, de Camara, schr. 1810 üb. brasil. Pflanzen. — *Arrudca* Camb.
- Ascherson**, Ferd. Mor., Prof. in Berlin, schr. *de fungis venenatis*, Berolini 1828, *pharmaz. Bot. in Tabellen* 1831. — **Ascherson**, P. u. Kanitz, *Catal. pl. Serbiae, Bosniae etc. Claudiopoli* (Klausenburg) 1877. — **Ascherson**, P. Fr. Aug., *Custos d. k. Herbar. z. Berlin*, schr. *Fl. d. Prov. Brandenb. etc.*, Berl. 1866.
- Askenasy**, E., Prof. in Heidelb., schr. üb. *Pfl.-Physiologie in d. bot. Zeitg.* 1877, *Beitr. z. Kenntniss d. Chlorophylls*, u. a.
- Asso**, Ignacio, span. Bot., schr. *Pl. hispanisium Epistölæ, Zaragossæ* 1793 (Briefe an Clusius). — *Assonia* Cav.
- Athanasius**, E., schr. *Hist. radicis Scillae marinae, Halae* 1794. — *Athanasia* Cass.
- Aubert**, C. M., Aubert du Petit-Thouars, s. *Pet.-Thou.* — *Aubertia* Bory.
- Aubl.** = **Aublet**, franz. Bot. u. Reis. in Guiana, † 1778, schr. *Hist. des pl. d. l. Guiane Franç.*, 1775. — *Aubletia* Schreb. L. f. etc.
- Aubenton** s. Daubenton.
- Auer**, A., schr. d. Entdeckung des Naturselbstdrucks, Wien 1854.
- Awd.** = **Auerswald**, Bernh., Lehr. u. Mykologe in Leipzig, † 1870, A. u. Rossmässler, *bot. Unterhalt. etc.*, Lpz. 1858, A. *Anleit. z. Botanisieren*, Lpz. 1860.
- Babington**, Prof. z. Cambridge, schr. *Fl. Bathoniensis* 1834, *Manual of brit. bot. Lond.* 1843, *Primitiae Fl. Sarnicae* (Fl. d. engl. normänn. Canalinseln, 1839).
- Bachmann** s. Rivinus.
- Bail**, schr. *Mykolog. Studien, d. wichtigst. Sätze d. neueren Mykologie*, Jena 1861 u. a. m.
- Bak.** = **Baker**, J. G., *Syst. Iridearum*, 1877, *Fl. of Mauritius and t. Seychelles*, Lond. 1877; *bed. Liliaceen-Kenner in Kew bei London*.
- Balf.** = **Balfour**, J. H., a manual of bot., *illustr. etc.*, Lond. 1851, t. botanist's companion with a glossary of bot. terms, *Edinb.* 1860. — *Balfouria* R. Br., *Balfourodendron* (g. n.). — **Balfour f.**, J. B., aspects of t. phaenogam. veget. of Rodriguez, *Linn. Soc.*, 1876, accounts of some exper. on *Dionaea*, *Edinb.* 1876.
- Baranetzky**, Prof. in Kiew, üb. *tägl. Periodicität im Wachstum d. Internodien u. a.* (*Bot. Zeitg.* 1877 etc.).
- Barckhausen**, G., *Fasc. Plant. ex Flora comit. Lippiaci, Goetting.* 1775. — *Barckhausia* Mnch.

- Barker-Webb**, schr. m. Berthelot Hist. nat. des Iles Canaries etc., Paris 1835—41. — *Barkeria* Lindl.
- Barnéoud**, Monogr. d. Plantaginées, Paris 1845, B. u. Brongniart, Mém. sur l. fam. des Rhannées, Par. 1826, u. a.
- Barrelier**, Jacq. (Barrelierus Jacobus) Barrelieri Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observ., Parisiis 1714. — *Barleria* L.
- Bartling**, Fr. G., Prof. in Götting., † 1875, B. u. Wendland, Beitr. z. Bot. 1824—25. — **Bartling**, Fr. Th., Ord. nat. plant. 1830. — *Bartlingia* Rehb.
- Barton**, Benj. Smith, Prof. in Philadelphia, † 1815, Fl. Virginica, Elements of Botany u. a. — *Bartonia* Pursh. — **Barton**, J., lecture sur la géogr. des plant., trad. p. Marschall, Brux. 1829.
- Bartsch**, schr. Fl. d. Umgeg. v. Ohlau in Schlesien, Ohlau 1854. — **Bartsch**, Joh. von Königsberg, Bot. u. Reis. in Surinam, † 1738. — *Bartschia* L.
- Bary** s. de By, **de Bary**, H. A., s. 1872 Prof. in Strassb., ber. Kryptog., s. 1867 Red. d. Bot. Zeitg., schr. naturw. Elementarb. d. Bot., Strassb. 1878 u. v. a.
- Batalin**, Gegner Darwin's, schr. üb. Mechanik d. Bewegung insektenfress. Pfl. (in d. Flora 1877).
- Bateman**, James, schr. Orchidaceae of Mexico and Guatemala, 1873—43, u. a. — *Batemania* Lindl.
- Batsch**, Prof. in Jena, † 1802, schr. Elenchus Fungorum 1783—89, Dispos. Gen. pl. Europae, Jenae 1794, Bot. für Frauenzimmer, Weimar, 3. A. 1804, u. a. — *Batschia* Melx., Thb.
- Battarra**, J. A., † 1789, schr. Fungorum agri Ariminensis Hist., Faventiae 1755. — *Battarra* Pers.
- Bauhin**, Casp. u. Joh., Brüder, Bot. d. 16. Jahrh.'s, schr. Kräuterbücher, unvollend. C. Bauhinus, Prodrum. theatri bot., Basil. 1671, J. Bauhin, Hist. plant. univers., lang nach s. Tod! — *Bauhinia* L., Plum.
- Baumgarten**, Bot. u. Reis. in Siebenbürgen, Arzt, † 1843, schr. Fl. Lipsiens. etc., Lips. 1790, Enumer. stirpium Transsilvaniae indigen. 1816. — *Baumgartenia* Spr.
- Beal**, amerik. Bot., schr. Carnivorous plants (Proceed. of t. Amer. Assoc. 1876).
- Beauv.** (P.-B.) s. Palisot de Beauvais.
- Beccari**, O., bot. Reis. in Borneo u. Sumatra, schr. Malesia raccolta etc. alle piante dell' Archipelago Indo-Malese e Papuano, Genova 1877 u. Beitr. im Giornale bot. Italian.
- Béchamp**, Prof. d. Chemie in Montpellier, üb. Gährungs- u. Seidenraupenpilze in Comptes rendues s. 1865.
- Bechstein**, Forstrat in Meiningen, † 1822, schr. Forstbotanik, 5. A., 1843.
- Beckmann**, Joan., Lexicon botanicum, Göttingen 1801. — *Beckmannia* Host.
- Beilschmied** s. Wickstroem.
- Bellardi**, Prof. in Turin, † 1826, schr. De Mimosa sentiente, 1764, Appendix ad Fl. Pedemont. 1792. — *Bellardia* All.
- Bellenden-Ker**, schr. Iridearum genera, Brux. 1827. — *Bellendēna* R.Br., Keria DC.
- Beltramini** de Casati, schr. i licheni Bassanesi etc., Bassano 1858.
- Bemmelen**, J. A. v., schr. Repertorium annuum liter. Botanicae period., Harlem 1873.
- Bennet**, John Jos., Vice-Präs. d. Lond. Linn. Soc., schr. Pl. javanicae etc. 1838. — *Bennetia* Gray.
- Benth.** = **Bentham**, G., Präs. d. Lond. Linn. Soc., schr. Labiatarum

- Gen. et Spec. 1832—36, Fl. Hongkong. Lond. 1861, handb. of t. brit. Fl. 1865, **B. u. Hooker**, genera plantar., Lond. 1862—67. — *Benthamia* Lindl., *A. Rich.*
- Berg**, O., Florae Brasil. Myrtographia, Lips. 1858, - mantissa I u. II ad revisionem Myrtacearum Americ., Hal. 1859—60.
- Berg.** = **Bergius**, Prof. in Stockh., † 1790, schr. Descr. plant. ex Capite Bonae spei, 1767.
- Berk.** = **Berkeley**, engl. Kryptog., **B. u. Broome**, viele mykolog. Beitr. in Zeitschr., z. B. essb. Pilze v. Feuerland, Introd. to crypt. bot., Lond. 1857, brit. Fungi etc. — *Berkeleya* Grev.
- Berlandier**, J. L., † 1851 in Mexiko, schr. Grossulariae etc., Genf 1828. — *Berlandiera* DC.
- Bernh.** = **Bernhardi**, Prof. in Erfurt, † 1850, schr. Catal. pl. Horti Erfurt. 1799, Anleitung etc. 1804 u. a. — *Bernhardia* W.
- Bertoloni**, Prof. in Bologna, † 1869, schr. Fl. ital. 1838—54, Fl. ital. cryptog. 1858—67. — *Bertolonia* Spr., DC.
- Besler**, Bas., Apoth. z. Nürnberg, † 1629, schr. Hort. Eystettens. (bisch. Gart. z. Eichstädt), Norimb. 1613. — *Besleria* L.
- Besser**, W. v., Prof. z. Krzeminec in Volhynien, † 1842 als Dir. in Kiew., schr. Primitiae Fl. Galiciae Austriae utriusq., 1809. — *Bessera* Spr. u. *Besseria* Schult.
- Betke**, E. F., Animadvers. bot. in Valerianas, Rostocki 1826, Monogr. d. Brombeerstr. Mecklenburgs, 1850. — *Betkea* DC.
- Biasoletto**, Dr., schr. üb. Hydrodictyon, Rapport s. l. travaux d. l. sect. bot. des naturalistes à Pise, u. a. — *Biasolettia* Koch.
- Bieb.** **M. B.** = **Marschall v. Bieberstein** (Biberstein), russ. Bot., † 1826, Pfl. d. Kaukasus u. Südrusslands. — *Biebersteinia* Steph., DC.
- Bigelow**, Prof. z. Boston (N.-Amer.), Florula Bostoniens. 1814, American Medical Bot. 1817—21. — *Bigelovia* Sm., DC., Nees.
- Billardier**, J. J. (vgl. Labillardier), Icones plant. rarior. Syriae etc. Dec. I, Paris 1791. — *Billardiera* (-deria) Sm.
- Billot**, C., schr. Annotations à la Flore d. l. France et d. l'Allemagne, Haguenau 1855. — *Billotia* Collad.
- Bischoff**, G. W., Prof. in Heidelb., † 1854, schr. d. Kryptog. Deutschlands 1828, Lehrb. d. Bot. 1834—40, Handb. d. bot. Terminologie u. Systemkunde 1844, u. a. — *Bischofia* Blume.
- Bivona-Bernardi**, Antonio, † 1834 in Messina, schr. Sicular. plant. Centuria I et II, Stirpium rar. Siciliae etc. 1813—16. — *Bivonaea* DC., -vonina (-nēa) Spr., Raf. u. *Bernardia* Mich.
- Blackwell**, J., schr. Collect. stirpium etc., 5 B. — *Blackwellianum* herbarium emend. et auct., Norimb. 1757—73.
- Blandow**, Apoth. z. Waren (Mecklenb.), † 1810, schr. Mecklenburgs Moose, 1809. — *Blandovia* W.
- Bl. Fing.** = **Bluff u. Fingerhuth**, Compend. Flor. German. 1825—33.
- Blume**, Dr. C. L., Prof. z. Leyden, schr. Mus. bot. Lugduno-Batav. 1849—56, Neesia, gen. pl. javan. 1834, Rumphia s. comment. bot. de plantis Indiae Orient., Lugd.-Bat. 1836, Fl. Javae etc., Brux. 1829. — *Blumēa* DC., -mia Spr.
- Blytt**, Prof. z. Christiania, † 1862, schr. mit A. de Candolle üb. d. Einwander. d. alpinen Pfl. nach d. Eiszeit (t. immigration of t. Norwegian Flora etc.), Christiania 1876. — *Blyttia* Endl., Walk.-Arn.
- Boccone**, S. P., schr. Icon. et descr. rarior. plant. Siciliae etc. (52 T.), Oxford 1674 (Museo di piante rare della Sicil., Malta etc., Venetiae, ed. II, 1697). — *Bocconia* L., Plum.
- Boerhave**, Prof. z. Leyden, † 1738, schr. Index pl. . . in horto academ. 1710 u. Index alter etc. 1720. — *Boerhavia* L.

- Böhm, J.**, Pfl. Physiol. z. Wien, schr. üb. Chlorophyll 1857, Ursache d. Saftsteigens 1863, Stärkebildg. 1876 etc.
- Böhmer**, Prof. z. Wittenberg (Boehmērus), schr. Fl. Lipsiae indigēna, Lips. 1750, de pl. fasciatis 1752, Lexic. rei herb. cont. etymologiam nominum, Lips. 1802. — *Boehmeria* Jacq. (-ra Lk.).
- Bojer**, Wenzel, von Prag, † 1865 auf Mauritius, schr. Hort. Mauritianus, 1837. — *Bojeria* DC.
- Boissier**, Edm., Genfer Patrizier, Reis. im Orient, B. u. E. u. F. **Buhse**, Aufz. d. in Transkauk. u. Persien ges. Pfl., Moskau 1860 (in De Cand.'s Prodromus). — *Boissieria* Domb.
- Bolle**, Dr. C., Vors. d. Vereins f. Gartenbau in Preussen, Herausg. d. „Deutscher Garten“, Monatsschr., Berlin. — *Bollēa* Rehb. f.
- Bolton**, Jam., Bot. in Edinb., schr. Filices brit., Leeds 1785, Hist. of fungusses (deutsch v. Willdenow) 1795—1820. — *Boltonia* Schreb., l'Hér.
- Bongard** u. C. A. Meyer, Verz. d. am Saisang-Nor u. Irtisch ges. Pfl., Petersb. 1841, B. Monogr. des Espèces d'Eriocaulon du Brésil, Petersb. Akad. 1831. — *Bongardia* Rauw.
- Bpl.** = **Bonpland**, Aimé, franz. Bot. u. Reis. (Begl. v. A. v. Humboldt 1799), † 1858, schr. Plant. équinoxiales réc. au Mexique u. Monogr. des Mélastomes. — *Bonplandia* W. u. Ztschr. *Bonplandia*, v. Seemann, Hannov. 1853—59.
- Borkhausen**, Assess. d. Ob.-Forst-Coll.'s z. Darmst., schr. Forstbot. od. Beschr. d. in Hess.-Darmst. wachs. Holzarten, Frankf. 1790, Rhein. Museum 1793, Bot. Wörterb., 2 B., Giess. 1797. — *Borkhausia* Böhm. (-senia Fl. Wett.).
- Boreau**, Alex., von Saumur, schr. Fl. du Centre d. l. France, 3. Aufl. 1857, u. a. — *Boreaua* Spach.
- Bornet**, Prof. z. Cherbourg, Kryptog., B. u. Thuret, Recherch. s. l. fécond. des Floridées 1867 u. s. l. gonidiès des lichens (Ann. d. Scienc. nat. XVII).
- Bory de St. Vincent**, franz. Bot. u. Reis., schr. Exped. scient. de Morée, 1832, nouv. Fl. du Peloponnèse et des Cyclades, 1838. — *Borya* W., Lab., R. Br.
- Borszczow**, E., d. pharmaz. wicht. Ferulaceen d. casp. Wüste, etc., Untersuchungen üb. d. Gummiharze *Asa foetida*, *Ammoniacum* u. *Galbanum* (8 kol. T.), Petersb. Akad. 1860, d. arabo-casp. Calligoneen (ds. 1860).
- Bosc**, Prof. z. Paris, schr. Mém. s. quelques espèces de champignons d'Amer. 1814, s. l. diff. esp. de chênes etc. en France 1808. — *Boscia* Lam., Thb.
- Bosch**, R. B. van den, schr. Hymenophyllacēae Javanicāe, Amsterd. Akad. 1861. — *Bosquicā* Bak.
- Bosse**, Oldenb. Hofgarten-Insp., † 1864, schr. Vollst. Handb. d. Blumen-gärtnererei, 3. A., Hannov. 1859, u. a.
- Bot. Reg.**, Botanisches Register (botanical register), angef. v. Bell.-Ker, fortgef. v. Edwards u. Lindley, Lond. 1815—47.
- Bouché**, P. Fr., Garten-Bes. z. Berlin, † 1856, schr. Garteninsekten, 1833 u. 34, d. Zimmer- u. Fenstergarten, 5. A., Stuttg. 1821, Gartenbotanik; **Bouché**, P. Fr. u. C. **Bouché**, d. Blumenzucht etc., 2. A., Berl. 1854/56.
- A. Br.** = **Braun**, Alex., Geh. Reg.-Rat, Dir. d. k. bot. Gartens, Prof. in Berlin, † 1877, schr. Vieles üb. Kryptogamen, Pfl.-Physiol., Verjüngung in d. Natur u. a. m. — *Braunia* Schimp.
- Brefeld**, Docent d. Bot. z. Würzburg, schr. Pilze etc. — *Brefeldia* Rostaf.
- Bretschneider**, E., schr. Botanicum Sinicum, notes on etc., Lond. 1882, u. a.

- Breyn(e)**, Jak., schr. Exoticar. plant. Centuria etc., Gedani 1678; Breynii Prodröm. rar. pl., Gedani 1739. — Breynia Plum., Schreb.
- Bridel-Brideri**, S. El. v., † 1828, schr. Muscologia recentiorum etc., Gothae 1797—1822, Bryologia universal., Lips. 1826/27. — Bridelia W.
- Brignoli** a Brunnhof, Prof. z. Modena, † 1857, schr. Horti Mutinensis Hist. 1842, Catal. pl. etc. 1817, u. a. — Brignolia Bertol.
- Brongniart**, M. A. Th., Prof. z. Paris, † 1876, schr. Hist. des végët. fossiles, 1828—44, chronol. Übers. d. Vegetationsperioden etc. (deutsch v. K. Müller, Halle 1850), Enumér. des genres de plantes, Par. 1859. — Brongniartia H. B. K.
- Broome** s. Berkeley.
- R. Br. = Brown**, Robert, d. grösste Bot. Englands, schr. Vermischte bot. Schriften (deutsch v. Nees), Fl. Novae-Hollandiae, Lond. 1810, u. a. m. — Robertia DC., Mer.
- P. Br. = Browne**, Patrik, irisch. Bot., schr. Pfl. von Jamaika. — Brownea L., Jacq.
- Bruch**, Apoth. z. Zweibrücken, † 1847, **Br.** u. **Schimper**, Bryologia europaea, 1837 f. — Bruchia Schwägr.
- Brückmann**, F. E., schr. notae et animadv. in Bauhinii prodrömum, Wolfenbütt. 1737, - idem in Pisonis et Bontii libros de Indiae etc., das. 1737, - idem in Ruppü Fl. Jenens., - Konokarpodendron (Artischoke) u. a.
- Brunfels**, O., aus Mainz, † 1534 in Bern, d. erste deutsche Bot., Herb. vivi Icones 1530. — Brunfelsia L.
- Buch**, Leop. v., schr. allgem. Übers. d. Flora auf d. canar. Inseln, Berl. 1819.
- Buchanan**, später Lord Hamilton, schott. Bot. u. Reis. in Indien. — Buchanania Roxb., Spr.
- Buchenau**, Fl. v. Bremen, 1877, Flora der Maulwurfshügel u. a.
- Buek**, M. D., Med.-Assess. z. Frankf. a. O., † 1856, schr. Index gen. et spec. ad Decandolli Prodrömum etc., Berol. 1840 u. 42. — Buekia Kth.
- Bulliard**, Pet., franz. Pilzforscher, † 1793 z. Paris, schr. Fl. Paris. 1776—80, Hist. d. pl. vénén. d. l. France, Diction. d. l. Bot., 1797. — Bulliarda DC., Neck.
- Bunge**, A. v., Enum. pl. Chinae borealis, Petersb. 1838, Plantar. Mongholico-Chinens. Dec. I, Anabasearum Revisio, Petersb. 1862, u. a.
- Burm.** = **Burmam**, Joh., Linné's Patron, schr. Fl. Zeylanica (The-saurus zeyl.), Amsterd. 1737, Rar. African. plant. Decades X, Amstelod. 1738, u. a. — **Burmam f.**, Prof. in Amsterd., schr. Fl. Ind. m. Prodröm. 1734—93, Fl. Capens., Lugd. Bat. 1768. — Burmannia L.
- Buxbaum** aus Merseburg, Reis. in Kleinasien, Akad. in Petersb., schr. Plantar. minus cognit. Centuriae, compl. plantas circa Byzantium, 1728—40. — Buxbaumia Hall., L.
- By de** s. Bary de.
- Cäsalpinus**, Andr., Prof. z. Pisa, päbstl. Leibarzt etc., † 1603, schr. de plantis libri XVI etc. — Caesalpinia L.
- Camb.** = **Cambessèdes** von Montpellier, † 1863, schr. Enumer. plant. quas in Balearibus etc., 1827, u. a. — Cambessedia DC. (-ea Kth.).
- Camerarius**, Joachim, schr. Hort. medicus et philos. etc., Francof. 1588, Matthioli Kreutterbuch, neue Aufl.; — Opuscula botanici argumenti, ed. J. Chr. Mikau, Prag 1797. — Cameraria L.
- Campdera**, schr. Monogr. du genre Rumex, Paris 1819. — Campderia Bull., Lag.
- Cand.** = **Candolle**, de, s. DC. de Candolle.



- Carlowitz**, G. Frhr. v., k. Kammerh. in Dresden, schr. Modifik. d. v. Truchsess. Kirschen-Systems 1819, Catalog d. Dresdener Obstbaumschule. — *Carlowitzia* Mnh.
- Carmichaël**, schott. Bot., † 1827, schr. *Fl. insulae Tristan da Cunha*. — *Carmichaëlia* R. Br.
- Carr.** = **Carrière**. M. E. A., Chef des Pépinières im naturh. Museum v. Paris, Red. d. *Revue horticole* etc., schr. *Traité général des Conifères*, Paris 1860.
- Carter**, Reis. im Somali-Land (Afr.), Entd. von *Boswellia*-Arten in d. sechziger Jahren.
- Casearius**, Joh., Mission. in Cochinchina (17. Jahrh.), schr. d. Text zu d. ersten Bänden d. *Hort. malabaricus*. — *Casearia* Jacq.
- Caspary**, R., Prof. d. Bot. z. Königsberg, schr. de nectariis, Bonn 1848, üb. d. Flora v. Preussen, 1863, üb. Blütensprossen auf Blättern, 1874, u. a. — *Casparya* Kth.
- Cassebeer**, schr. *Entwicklung d. Laubmoose*, Frankf. 1823. — *Cassebeera* Kaulf.
- Cass.** = **Cassini**. Henri, franz. Bot., schr. *Synanthereen*, 1826—31. — *Cassinia* R. Br.
- Car.** = **Cavanilles**, Prof. d. Bot. z. Madrid, † 1804, schr. *Monadelphiac classis Dissertt. X, Icones et descr. plantar. etc.*, 1791—1801. — *Cavanillca* Gm., Thb., *Cavanillesia* Rz. Pv.
- Catesby**, M., schr. *Hortus Britanno-Americanus (trees, shrubs etc.)*, Lond. 1763, *Naturg. v. Carolina* etc. — *Catesbaea* Gron., L.
- Celakowski**, Pfl.-Physiolog, schr. z. B. üb. terminale Ausgliederg., Prag 1875, üb. *Asclepias* etc., 1877, u. a.
- Celsius**, Olaus, schr. *Hierobotanicon*, Upsaliae 1745—47. — *Celsia* L.
- Cesati**, Bar. v., Prof. in Neapel s. 1868, C., *Passerini* u. *Gibelli*, *Compend. de Flora italiana*, Mail. s. 1869. — *Cesatia* Endl.
- Chabräus**, Herausg. von J. Bauhin's *Hist. pl. univers.*, 1650—51 (vgl. Bauhin). — *Chabraea* DC.
- Chaix**, Dom., † 1800, Pfarr. bei Gap (Dauphinée), schr. *Fl. d. Dauphinée*. — *Chaixia* Lap.
- Cham.** = **Chamisso**, Adelb. v., Dicht. u. Bot., † 1838 als Custos d. bot. Inst.'s zu Berlin, schr. *Übers. d. nützl. u. schädli. Gew. etc.*, 1827. — *Chamissoa* H. B. K.
- Champin**, Aimé, der Weinstock, seine Kultur u. Veredelung, deutsch v. Dr. L. Rösler, Wien 1882.
- Chaptal**, Comte de, Rozier etc., *Traité théor. etc. sur la cult. de la Vigne*. — *Chaptalia* Vent.
- Chavannes**, Ed., *Introd. à la Flore helvétique de Mr. Gaudin*, 1830; *Monogr. d. Antirrhinées* 1833.
- Cherler**, *Prodrömus Hist. plant. universalis J. Bauhini*, 1619; *Bauhinus, J., et Cherler, hist. pl. univ., rec. Chabraeus et Graffenried* (3 vol. c. m. fig.), Ebrodun. 1650—51. — *Cherleria* L.
- Chev.** = **Chevalier**, † 1840 z. Freiburg i. Br., schr. *Hist. des Graphidées* 1824, *Fungor. et Byssor. illustr.* 1837. — **Chevallier**, A., schr. *du Café* etc., Paris 1862. — *Chevallieria* Gaud., *Chevalliera* Beer.
- Choisy**, Prof. in Genf, schr. versch. *Monogr. u. Plantae javanicae* etc., 1858. — *Choisia* Spr. (-sya Kth.).
- Christ**, J. L., *Handb. d. Obstbaumzucht*, Frankf. a. M. 1797, *Pomol. Handwörterb.*, Lpz. 1802 u. a., † 1813. — *Christia* Mnh.
- Cienkowski**, L., Prof. z. Charkow, schr. üb. *Myxomyceten*, *Monaden*, *Rahmhaut* etc. — *Cienkowskia* Rostaf.
- Clayton**, J., schr. *Fl. virginica*, Ed. Gronovius, Lugd.-Bat. 1762. — *Claytonia* L.

- Clusius** (de l'Ecluse, Charles), Prof. d. Bot. z. Leyden, † 1609, schr. Hist. plantar. rarior., 1601. — *Clusia* L.
- Clutius** (Auger od. Oulger Cluyt), Aufs. d. bot. Gart. z. Leyden, † 1650, schr. Hist. nucis medicae Maldivensium (Borassus flabelliformis). — *Clutia* Boerh., *Cluytia* Ait.
- Coëmans**, Eug., Abbé in Gent, Paläontolog, schr. Monogr. du genre *Pilobölus*, Brux. Acad. 1861.
- Cohn**, F. J., Prof. z. Breslau, ber. Pfl.-Physiol. u. Kryptog., schr. de cuticula, Vrat. 1850, Wachst. d. Pfl., 1850, Haush. d. Pfl., Lpz. 1854, die Menschheit u. d. Pflanzenwelt, Bresl. 1851, s. 1870 Beitr. z. Biologie d. Pfl.
- Colebrooke**, engl. Beamt. in Ostind., schr. Fl. v. Indien, Terebinthineen etc., † 1837 in Lond. — *Colebrookia* Rxb., Sm., Ham., Don.
- Colla**, A., schr. Plantae rarior. in region. Chilens. a Bertero delectae, Taurini. — *Collaea* DC., Spr.
- Colladon**, Arzt u. Bot. z. Genf, † 1862, schr. Hist. nat. des Casses et des Sénéés etc., 1816. — *Colladonia* DC.
- Colonna**, Fab. (Columna), schr. Phytobasanos (Pfl.-Probierstein), Neap. 1592. — *Colonna* Cav., -něa Buchoz u. *Columnēa* L., Plum.
- Commelyn** (-lin), Kasp., Prof. d. Bot. z. Amsterd., † 1731, schr. Fl. Malabarica 1696, Horti med. Amstel. pl. rarior. et exot., Lugd.-Batav. 1706. — *Commelĭna* L.
- Comm.** = **Commerson**, franz. Bot. u. Reis. in Madagaskar, † 1773 auf Isle de France. — *Commersonia* Forst.
- Cooper**, Dan., schr. Fl. metropolitana, Lond. 1833—35. — *Cooperia* Hook.
- Corda** von Prag, ber. Mykolog, Reis. in Texas, † 1849, schr. Icones Fungorum etc., 1837—54, Deutschl.'s Algen, Nürnberg. 1839, Prachtflora europ. Schimmelbildungen, Lpz. u. Dresd. 1839, u. a. — *Cordaea* Nees.
- Cornu**, franz. Mykolog, schr. Monogr. d. Saprolegnien (Ann. d. Scienc. nat. 1872). — *Cornuvia* Rostaf.
- Cornutus**, J., schr. Canadensium plant. historia, Par. 1635. — *Cornutia* L.
- Corr.** = **Correa** de Serra, port. Bot., † 1823, schr. Observat. carpologicae, 1809. — *Corrēa* Sm.
- Coss. Germ.** = **Cosson** u. **Germain**, schr. Observ. s. q. plantes critiques des environs de Paris, 1840.
- Coulter**, Thom., irisch. Arzt in Genf u. Reis. in Mexiko, † 1843 in Dublin, schr. Mém. s. l. Dipsacées, 1823. — *Coulteria* Kth.
- Courtois**, Prof. in Lüttich, schr. Expos. organor. propag. etc., Gaadae 1822. — *Courtoisia* Rehb. (-sēa Kth.).
- Cramer**, J. Chr., schr. Dispos. Syst. plantarum, Marb. 1803.
- Crantz**, Prof. d. Bot. in Wien, † 1799, schr. Stirpes austr. 1762—67, Class. Umbelliferar. emend. 1767, Cl. Cruciformium, Lpz. 1769. — *Crantzia* Vahl, Nutt. u. Scop.
- Cratevas** (-teuas), Rhizotome od. Wurzelsammler, wahrsch. um 100 v. Chr., Fragmente, herausg. v. Anguillara, u. ein klein. ungedr. Werk. — *Crataeva* L.
- Cuming**, Hugh, Reis. in Süd-am. u. auf d. Philippinen, Samml. neuer Orchideen u. Cacteen etc., † 1865 z. London. — *Cumingia* D. Don.
- Cunningham**, A., Samml. für d. Kew-Gärten, in Neuholl. ermord.; schr. üb. d. Vegetat. v. Neuholland, Fl. ins. Novae Zeelandiae Praecursor etc. — *Cunninghamia* Rich., Schreb.
- Cupani**, F. F., schr. Hort. catholicus principis Catholicae, ducis Misilmeris etc., Neap. 1696. — *Cupania* L., Plum.

- Curtis**, W., Apoth. in London, † 1799, schr. Fl. Londinensis 1777—98, t. bot. Magazine, fortg. v. d. Gebr. Hooker, 1787—1870, British grasses etc. — *Curtisia* Ait.
- Cusson**, Pierre, Prof. z. Montpellier, † 1783, schr. Umbelliferen u. a. — *Cussonia* Thb.
- Cürrie**, P. F., schr. Anleit. d. wildwachs. Pflanzen zu bestimmen, Gör-litz 1823.
- Cyrillo**, Domen., Prof. z. Neapel, schr. Pl. rar. regni Neapolit. fasc. I, Napoli 1788.
- Cyrillus**, Patriarch v. Alexandrien, † 444, schr. de plantar. et animalium proprietate liber nunc primum in lucem editus, Romae 1590. — *Cyrilla* L.
- Dahl**, A., † 1789, schr. Observ. bot. circa syst. veget. divi a Linné, Havniae 1787. — *Dahlia* Cav.
- Dalechamps**, J., schr. Hist. nat. plant. in libros XVIII digesta, Lugd. 1587. — *Dalechampia* L.
- Dampier**, W., Weltreis. u. Samml., schr. in Ray's Hist. plantarum, 1704. — *Dampiera* R. Br.
- Darwin**, Erasm., Arzt etc., schr. Phytonomia etc., 1800. — *Darwinia* Rudg. — **Darwin**, Charles, † 1882, ber. engl. Naturf., Begründ. d. Descendenz-Theorie, schr. on t. origine of species, 1859, Befrucht. d. Orchideen etc. durch Insekten, 1862, Klimmpflanzen, 1865, Variieren durch Domestikation, 1868, u. a. m.
- Daubenton** (d'Aubenton), † 1800, Prof. zu Paris, schr. m. Desfontaines Beob. d. endogenen Wachstums d. Dattelpalme. — *Daubentonia* DC.
- de By** = **de Bary**, s. *Bary*.
- Decsn.** = **Decaisne**, Dr. M. J., Prof. am Jard. des Plantes in Paris, Morren u. Decsn., üb. japan. Pfl. in Gent, Loranthaceen, Brux. 1840, Sur le *Dioscorea batatas*, 1855, Jardin fruitier du Museum (pomol. Prachtw.) u. a. — *Decaisnea* Hook. f.
- DC.** = **de Candolle**, Aug. Pyrame, Prof. z. Genf, ber. Gründ. eines neuen Syst.'s, † 1841, schr. Prodrömus syst. natur. Regni Vegetab. I—XVI, 1824—64. **DC.** u. **Duby**, Bot. gallica, 1830. **DC.** u. **Rédouté**, pl. crasses, Mem. s. l. Crassulacées, 1828, u. a. — *Candollea* Lab., Rich. — **A. DC.** = **de Candolle**, Alphonse, Sohn, Prof. in Genf, Forts. d. Prodrömus, 1841—64, Introd. à l'étude etc. (deutsch von Bunge), 1844, Géographie bot. etc. u. a.
- Delarbre**, Abbé, schr. Fl. der Auvergne, 2. A., 1800, † 1841. — *Larbræa* St. Hil.
- Delessert**, franz. Bot., † 1847, schr. Icones selectae plantar. etc., 1820 bis 1846. — *Lessertia* DC.
- Delile**, franz. Bot. b. Bonaparte's Exped. n. Ägypten 1798, schr. üb. d. Pfl. Ägyptens (Ann. de l'Acad. Par.). — *Delilia* Spr.
- Delise**, † 1841, schr. Hist. des Lichens. — *Delisaea* (-sea) Spr.
- Delpino**, F., schr. Rivista bot. dell' anno 1877, Milano 1878.
- Denham**, Major u. Capt., Clapperton, Narrative of travels (Anhang v. R. Brown), Lond. 1826. — *Denhamia* R. Br.
- Dennstedt**, schr. Schlüssel zu d. Hort. ind. Malabaricus (dreif. Register), Weimar 1818.
- de Not.** = **de Notaris**, Guis., s. 1872 Prof. in Rom, schr. Micromycètes etc., Musci italici etc. — *Notarisia* Colla.
- Deppe**, Ferd., † 1828 in Mexiko, **Schiede** u. **Deppe**, Plantae Mexicanae. — *Deppæa* Cham., Schldl.

- Desf.** = **Desfontaines**, René, franz. Bot. u. Reis. in Algier, † 1833, schr. Fl. atlantica etc., Choix de plant. d'instit. de Tournefort 1808, Hist. d'arbres et d'arbrisseaux, Par. 1809, u. a. — *Desfontainia* (-nesia) R. P.
- Desm.** = **Desmazières**, franz. Bot., † 1862, schr. Agrostographie du Nord de la France, üb. Pilze, 1826, u. a. — *Desmazierella* Libert.
- Desv.** = **Desvaux**, Prof. z. Angers, † 1856, schr. Journal de Bot. appliq. à l'agric., pharmacie etc., 1813—14, Fl. d'Anjou, 1827, u. a. m. — *Desvauxia* R. Br.
- Dickson**, engl. Kryptogamist, schr. Fasc. Plant. cryptog. Britanniae, 1785—1801. — *Dicksonia* l'Hér.
- Dieffenbach**, E., Weltreis., schr. travels in New-Zealand w. contr. to theology, botany etc., Lond. 1843. — *Dieffenbachia* Schott, Endl.
- Dierbach**, Prof. in Heidelb., † 1845, schr. Fl. Heidelbergens., 1819—20, Fl. mythologica, 1833, u. a.
- D.**, **Dietr.** = **Dietrich**, D., Prof. z. Jena, schr. Laubmoose v. Deutschl., 1823 f., Fl. Jenensis 1826, Filic. Jen. 1827, Synops. plant., Vimaræ 1839—52 (5 B.). — **Dietrich**, F. Gottl., schr. Vollst. Lexik. d. Gärtnererei m. Vorrede v. Sprengel, Weimar 1802—18, Nachtr. bis 1840. — *Dietrichia* Tratt. — **Dietr.**, A., Linné's Spec. plant. 5. A. (bis *Dianthia*), Berl. 1831—33, Fl. regni Borussiae (12 B.), Berl. 1833—44, Bot. f. Gärtnererei (3 B.), Berl. 1837—39.
- Dill.** = **Dillen** (Dillenius), † 1747, deutsch. Bot. in Engl., schr. Hort. Elthamens. 1732, Moose etc. — *Dillenia* Thb.
- Dillwyn**, engl. Confervenkenner, schr. Brit. Confervæ, Lond. 1809. — *Dillwynia* (-winia, -nea) Sm.
- Diosc.** = **Dioscorides**, Pedanos, griech. Nat. u. Arzt, † 64 n. Chr., schr. Materia medica. — *Dioscorca* Plum., L.
- Dippel**, L., Prof. am Polytechn. z. Darmst., schr. d. Mikroskop u. seine Anwend. etc., Braunschw. 1867—72, d. Entstehung d. Milchsäuregefäße, Rotterd. 1865 (gekr. Preisschr.), d. Blattpfl. etc. 2. A. 1882, u. a.
- Ditmar**, Senator in Rostock, schr. Pilze in Sturm's Flora v. Deutschl. 1817. — *Ditmaria* Spr.
- Dodoens** (Dodonaeus), Rembert, Leibarzt Kais. Maximil. II., † 1585, schr. Cruydeboek m. Kupfern, umgearb. Hist. stirpium. — *Dodonaea* L. (-nea Plum.).
- Don**, D. u. G. **Don**, erst. Bibliothekar d. Linné'schen Ges., † 1841 (— *Donia* R. Br.), d. letzt. engl. Bot. u. Reis., † 1856. — **D. Don**, schr. Prodr. Fl. Nepalensis u. a. — **G. Don**, *Dichlamydeae* plant. 1831—38. — *Donia* Hook.
- Donati**, ital. Bot., † 1763, schr. üb. venetian. Pflanzen. — *Donatia* Forst.
- Donn**, J., schr. Hort. Cantabrigiensis etc., London 1815.
- Downing**, Landsch.-Gärtner u. Pomolog in Nordamer., † 1853, schr. the fruits and fruit-trees of America, N.-York, 2. A., 1878.
- Dozy**, F., Muscor. frondos. novae spec. ex Archipel. Indico et Japonia, Lugd.-Bat. 1844. — **D. u. Molkenboer**, Fl. crypt. v. Nederland, 1845.
- Drejer**, † 1842 in Kopenh., schr. Fl. excurs. Hafniensis 1838, Symbolæ Caricologiae 1844 u. a.
- Dryander**, schwed. Bot., Biblioth. von Sir J. Banks, † 1810 in London, schr. Cat. bibl. nat. Josephi Banks, Lond. 1796—1800. — *Dryandra* L., Thb., R. Br.
- Duchesne**, Prof. z. Paris, † 1827, schr. Man. bot. d. pl. utiles 1764, Hist. d. Fraisiers, 1766. — *Duchesnea* Sm.
- Dufour**, franz. Arzt u. Bot., † 1865, schr. s. l. champignons comestibles etc. — *Dufourea* Ach.
- Duhamel** du Mouceau, franz. Nat., † 1781, schr. Traité des arbres fruitiers, Par. 1768. Deutsch: Pomona gallica, Nürnberg. 1771—83, auch

- neu von Poiteau u. Turpin 1808—35, l. phys. d. arbres, u. a. — *Duhamelia* Pers., *Hamelia* Jacq.
- Dum.** = **Dumont** de Courset, fr. Gartenautor, schr. le botaniste cultivateur etc., 1802. — *Coursetia* DC. — **Dumont** d'Urville, schr. Enum. pl. in insulis Archipelagi et Oriente lectar., Par. 1822. — *Dumontia* Lamx. Ag.
- Dumortier**, belg. Bot. in Tournai, schr. Florula belg. 1827, Syllabus Jungermanniarum, 1831, Observ. s. l. Graminées belg., Tourn. 1823. — *Dumortiera* Nees.
- Dunal**, Prof. z. Montpellier, schr. Solaneen, Cistineen etc. in De Candolle's Prodrumus, Mon. d. Anonacées, 1817 u. a. — *Dunalia* Spr.
- Duperrey**, schr. Voyage autour du monde p. Duperrey etc., Par. 1828. — *Duperreya* Gaud.
- Durante**, Cast., schr. Herbario nuovo, Veneti 1636, Hortulus sanitatis, in's Teutsche, Frankf. 1609. — *Duranta* L.
- Durieu** de Maisonneuve, Dir. d. botan. Gart. in Bordeaux, schr. Fl. d'Algerie, Catal. d. grains etc. dans l. jard. d. Bordeaux 1863—69, Plant. d. l. Gironde etc. — *Durieuia* Merat.
- Dur.** = **Duroi** (Du Roi), Arzt u. Dendrolog z. Braunschweig, † 1785, schr. d. Harbke'sche wilde Baumzucht etc., 1771—72 u. a. — *Duroia* L.
- d'Urville** s. *Dumont* d'Urv. — *Durvillaea* Bory.
- Duschak**, M., z. Botanik d. Talmud, Pest 1870.
- Duval-Jouve** J., Insp. Acad. Strassb., schr. üb. Equisetaceen u. Gramineen. — *Duvalia* Haw. — **Duval**, L. J., Herausg. von Richard, Analyse d. fruit, Par. 1808, Kryptog. d. Fl. v. Regensb., † 1828. — *Duvalia* Nees.
- Duvau**, A., Kunth's Freund, schr. üb. *Veronica* u. verwandte Sippen. — *Duvaua* Kth.
- Ebermayer**, Dr. E., Prof. in München, schr. Physiologische Chemie d. Pfl., Berl. 1882. I. B.
- E. Bot.**, Englische Botanik (Paxton's Magaz. of Botany, 1834—49).
- Ecklon**, Apoth. u. Reis. am Cap 1823—27, schr. m. Zeyher Enum. plant. Africae, † 1868. — *Ecklonia* Hornem.
- Edwards**, S., the botanical register, s. Bot. Reg., Lond. 1815 (78 col. Taf.). — *Edwardsia* Salisb.
- Ehrbg.** = **Ehrenberg**, Prof. in Berl., † 1876, schr. Sylvac mycol. Bero-linens. 1818, Passat-Staub etc., Nova gen. plant. u. a. — *Ehrenbergia* Spr.
- Ehrh.** = **Ehrhart (-hardt)**, Linné's Schüler, Apoth. in Hannov. u. Stockh., † 1795, schr. Beitr. z. Naturk. etc., 1787—92. — *Ehrharta* Sm., Thb., *Ehrhardia* Scop.
- Eichelberg**, naturgetr. Abbild. u. Beschr. aller in- u. ansländ. Gew. f. Handel u. Industrie (72 col. T.), Zürich.
- Eichler**, A. W., Prof. in Berl., Dir. d. k. bot. Gart., vollend. Martius Fl. brasiliens. s. 1840, schr. üb. Entw. d. Blatts, Marb. 1861, üb. Phanerog., Kiel 1878 n. A. Braun's Syst., Syllabus d. Vorles. üb. spez. u. mediz.-pharm. Bot., Berl. 1880. — *Eichleria* (g. n.).
- Elkan**, Arzt in Königsb., † 1851, schr. Monogr. Papaveracearum, Regio-mont. Borussiae, 1839.
- Elliot**, Steph., amer. Bot., schr. Botany of South-Carolina (Fl. Caroli-niens.). — *Elliotia* Nutt., Mühlbg.
- Ell. u. Sol.** = **Ellis u. Solander**, erst. Kaufm. in Lond., † 1776, schr. üb. Korallen. — *Ellisia* L. — **Ellis**, W., Mission. d. Südsee u. v. Mada-gask., führte *Orchid.* u. *Ouvirandra fenestralis* ein, † 1872.
- Glaser, Botan. Taschenwörterbuch. 27

- Elsner, M., schr. Synops. Fl. Cervimontanae (Hirschberg, Schles.), Vratisl. 1839. — *Elsneria* Walp.
- E. M. = Ernst Meyer, Prof. in Königsberg, † 1858, schr. Entwicklung d. Botanik etc., Königsb. 1844. — *Ernestia* DC.
- Ender, Regel u. Ender, Allgem. Gartenbuch, Zürich 1868.
- Endl. = Endlicher, Steph., Prof. etc. in Wien, ber. Gründ. eines nat. Systems, † 1849, schr. Fl. Posoniae 1830, Prodr. Fl. Norfolkicae 1832, Enchirid. bot. 1841, m. Fenzl Sertum Cabulicum u. a. — *Stephania* W., Lour.
- Engelmann, G. schr. t. Oaks of t. United States, t. American Junipers etc., St. Louis 1877, u. a. — *Engelmannia* Pfeif.
- Engler, A., Antherenbild. d. Metaspermen (Pringsh. Jahrb. 1875), Monogr. d. Araceen 1878, u. a.
- Eschweiler, Prof. z. Regensb., † 1831, schr. Syst. Lichenum etc., 1824, de fructu Rhizomorphae, 1822, u. a. — *Eschweilera* Mart.
- Esper, Prof. z. Erlangen, Entomolog etc., † 1810, schr. Icones Fuorum, Nürnberg. 1797—1802. — *Espëra* W.
- Ettinghausen u. Pokorny, schr. d. wiss. Anwend. d. Naturselbstdrucks. Wien 1856.
- Fabricius, Ph. K., Prof. z. Helmstädt, † 1774, schr. Primitiae Fl. Butibacensis, Wetzlar 1743, Enum. meth. pl. Horti med. Helmstadiensis 1759. — *Fabricia* G., Thb.
- Fechner, C. A., schr. Nanna od. üb. d. Seelenleben d. Pflanzen, Lpz. 1848, Z. Erklär. volkst. deutscher Pfl.-Namen, 1871. — **Fechner**, G. Th., schr. Einige Ideen z. Schöpfungs- u. Entwickl.-Geschichte d. Organismen, Lpz. 1873.
- Fée, Ant. Laur. Apoll., Prof. z. Strassb., † 1874, schr. Essai s. l. Cryptog. des écorces exot. offic., Par. 1824—37, Mémoir. lichénogr., 1838, s. l. fam. d. fougères 1844—66, u. a. — *Feaea* Spr. u. *Feea* Bory.
- Fenzl, Prof. in Wien, schr. Illustr. et descr. plantar. nov. Syriae et Tauri occid., 1843, Illustr. Bot., Pest 1857, u. a. — *Fenzlia* Benth., Arn.
- Ferrari, J. B. (Ferrarius), schr. Hesperides s. de malorum aureorum cultura, Romae 1646, de florum cult. libri IV, Rom. 1633, etc. — *Ferraria* L.
- Feuillée (Fevillée), L., franz. Jesuit, † 1732, schr. Pfl. v. Peru u. Chili, Arzneipfl. v. Peru etc., deutsch v. Huth, Nürnberg. 1756. — *Fevillëa* L.
- Ficinus, M., schr. de triplici vita etc., Salerni 1511. — **Ficinus**, H., schr. Fl. Dresdensis 1816, m. C. Schubert Fl. d. Geg. um Dresd. 1821—23. — *Ficinia* Schrad.
- Fiek, E., Fl. v. Schlesien pr. u. östr. Anteils, Bresl. 1881.
- Fingerhuth (s. Bluff u. Fing.), Arzt in Esch bei Euskirchen, schr. Tentam. Florulae Lichenum Eiffliae 1829.
- Fintelmann, Karl Jul., schr. Lehrb. für Obstbau u. Pomologie (in d. Handbibliothek f. Gärtner), Berl. 1839.
- Fischer, F. E. L. v., Prof. z. Petersburg, † 1854, schr. Sertum Petropolitenum 1846—69, üb. Balsampappeln, u. a. — *Fischëra* G. Don, Spr. u. Sw.
- Flk. = Floerke, H. G., Prof. z. Rostock, † 1835, schr. Deutsche Lichenen, de Cladoniis 1828. — *Floerkëa* Spr.
- Fl. Bat., Flora Batava s. Kops.
- Fl. Cestr., Flora Cestrice (v. Chester, Nordamer.) v. W. Darlington, Philad. 1837.
- Fl. Flum., Flora Fluminensis (v. Rio-Janeiro), v. Bisch. Antonio de Arrabida (s. Arrabida).

- Fl. Metrop.**, Fl. Metropolitana (Fl. d. Hauptstadt, nämll. London, s. Cooper Dan.), Lond. 1833—35.
- Fl. Mex.**, Fl. Mexicana v. Moçino u. Sessé, s. d.
- F. M.** = **Friedr. Meyer**, Prof. z. Götting., s. Meyer.
- Fl. Per.**, Fl. Peruviana v. Ruiz u. Pavon, s. d.
- Fl. Wett.**, Flora (ökon.-techn.) der Wetterau, v. Gärtner, B. Meyer u. J. Scherbius, Frankf. a. M. 1799—1801.
- Flügge**, Arzt in Hamburg, † 1816, schr. üb. Gräser u. Plan d. bot. Gart. b. Hamb. 1810. — Flueggēa W., Rich.
- Focke**, W. O., Arzt in Bremen, schr. üb. d. Kartoffelkrankh. in J. 1845, Brem. 1846, Pflanzen-Mischlinge, Berl. 1881, üb. d. Begriff Species u. Variet., Jena 1875, u. a. — Fockēa Endl.
- Fontenelle**, Julia de, schr. m. H. Tollard Manuel de l'arboriste etc., Paris 1824. — Fontenellea St. Hil.
- Forsk.** = **Forskäl**, Pet., dän. Reis. in Arabien, Prof. in Kopenhagen, † 1763, schr. Fl. aegyptio-arabica, Ed. Niebuhr, Havniae 1775, Icones rerum nat. etc., 1776. — Forskaelia L.
- Forst.** = **Forster**, Georg, † 1794, u. J. R., Begleit. Cook's auf d. Weltreise, schr. Characteres generum plant. q. in itinere etc. collegerunt, Lond. 1776, Florula insular. austral., 1786, d. Brotbaum etc. — Forstēra L.
- Forsyth**, W., schr. a treatise of fruit-trees, Lond. 1833. — Forsythia Vahl.
- Fortune**, Rob., Samml. in Japan u. China für England 1843—62, verpfl. d. Thee an d. Himalaya etc. — Fortunēa Lindl.
- Fothergill**, J., Arzt in Upton, † 1789. — Fothergilla L.
- Fougeroux**, franz. Bot., † 1789, schr. Commentationes botanicae. — Fougeria Mnch., Fougerouxia DC.
- Fourcroy**, A. F., schr. Recherches s. l. pollen du Dattier d'Egypte. — Fourcroea Vent.
- Fraas**, K., Dir. d. Tierarzneischule in München, schr. Synops. plant. Florae classicae 1845, Wurzelleben d. Kulturpfl. etc., 1872, u. a.
- Francis**, schr. British Ferns etc., 1837, t. little Engl. Flora, 1839, Grammar of Botany, 1840.
- Frank**, Georg, Kräuter-Lexikon, 6. A., Lpz. 1766, urspr. Flora G. Franci, Argentor. 1685 (Lexic. pl. hactenus usual.).
- Frank**, A. B., Prof. in Berlin, schr. Beitr. in Cohn's Beitr., Pringsh. Jahrb., Herausg. v. Leunis' Synops., 3. A., etc.
- Fresenius**, Arzt u. Dozent am Senckenberg'schen med. Inst. z. Frankf. a. M., † 1866, schr. Mikroskop. Organismen, Taschenb. b. Excursionen, Flora v. Ägypt. u. Abessinien, u. a. — Fresenia DC.
- Fr.** = **Fries**, El. Magn., Prof. in Upsala, schr. Syst. mycolog. 1821—29, Elenchus fungorum, Lichenographiae Europae reform., Summa veget. Scandinaviae 1846—49 u. a. — Friesia Spr. — **Fr. f.** = **Fries**, Th., Sohn, Prof. in Upsala, bes. Lichenolog., schr. Lichenes arctoi etc., 86), Lichenogr. scand. seit 1871.
- Frölich**, Arzt z. Ellwangen, † 1841, schr. de Gentiana libellus 1796, Hieracium (in De Candolle's Prodromus) u. a. — Froelichia Juss., Vahl, Mart.
- Frühlingsblumen** von Aglaja v. Enders m. Einleit. v. Prof. Dr. Willkomm, 2. Lief. m. 71 Abb. (Farbdr.), Lpz. 1882.
- Fuchs**, L. v., schr. Effigies d. plant. etc., Lyon 1549, de hist. stirpium commentarii, Lugd. 1551. — Fuchsia Plum.
- Fuckel**, Apoth. z. Östrich a. Rh., ber. Kryptogamist, † 1876, schr. Enum. fungor. Nassoviae, 186), Symbolae mycologicae, 1869/70, u. a. — Fockelia Nitzschke.

- Fuhlrott**, C., schr. Jussieu's u. De Candolle's nat. Pflanzensyst., Bonn 1829.
- Fuller**, A. S., schr. Small Fruit Culturist, 1867, deutsch v. Hofgärtner H. Maurer in Jena (bespr. d. besten amerik. Obstsorten).
- Funk**, H. Chr., Apoth. z. Gefrees a. Fichtelgeb., † 1839, schr. Deutschlands Moose, Kryptog. d. Fichtelgebirges, 1806—38. — *Funkia* Spr.
- G.** = **Gärtner**, Jos., Prof. in Petersb., dann Arzt in Calw (Würtemb.), † 1791, schr. de fruct. et seminib. pl., Lpz. 1788—91, *Carpologia* s. descr. et icones etc., Lps. 1805. — Gaertnēra L., Lam. — **G. f.** = **Gärtner**, K. F., Sohn, † 1850, Arzt in Calw, schr. *Supplem. Carpologiae* u. a.
- Galeotti**, H. W., † 1858, Hauptred. d. *Journal d'Horticult. prat. d. l. Belgique*, **Martens** u. **Galeotti**, *Ericen* v. Mexiko.
- Grek.** = **Gareke**, Prof. u. Custos d. k. Herbariums z. Berlin, schr. *Fl. v. Halle*, 1848, *Fl. v. Nord- u. Mitteldeutschl.*, 14. A., 1882, j. Herausg. der *Linnaea*.
- Gardner**, G., schr. üb. *Peltophyllum* etc.
- Garidel**, P. J., schr. *Hist. nat. des plant. q. naissent en Provence*, Aix 1715. — *Garidella* L.
- Garovaglio**, S., schr. *Alcuni discorsi sulla botanica*, Pav. 1862.
- Gaudichaud**, Beaupré, franz. Bot. u. Reis. um d. Welt m. L. de Freycinet, † 1864, schr. *Bot. du voyage autour du monde par Vaillant 1836/37*, Par. 1840. — *Gaudichaudia* H. B. K.
- Gaud.** = **Gaudin**, Pred. z. Noyon, Cant. Waadt, † 1833, schr. *Agrostologia helvetica*, Paris 1811, *Synops. Fl. helvet.*, 1836 (herausg. v. Monnard). — *Gaudinia* P.-B.
- Gauthier**, Hugues, Arzt in Quebec, schr. *Catal. des pl. usuelles de la France*, 1760. — *Gaultheria* L.
- Gawl.** = **Gawler** s. *Bellenden-Gawler-Ker*.
- Gay**, Claude, Mitgl. d. Instituts z. Paris, † 1874, schr. *Hist. física y política de Chile* etc. et *Atlas*, 1845—53. — *Gaya* Kth., Spr., *Gaud.* — **Gay**, Jacq., † 1864, schr. *Monogr. der Büttneriaceen, Xeranthemum* etc.
- Geiger**, Prof. in Heidelberg, † 1836, schr. *Pharmazeut. Bot.* (2. A., Nees v. Esenb. u. Dierbach, 1839/40), de *Calendula* off., 1818. — *Geigēra* Less. (-ia Griseb.).
- Gemmari**, P., schr. *Cryptog. vasculares Ligusticae*, 4. A., Turin 1856.
- Germain** (s. Cosson), *Germain de St. Pierre*, Art in Paris, schr. *Guide de Botaniste*, 1852, *Nouv. Dictionn. de Bot.*, 1870, u. a. — *Germaea* Lam.
- Gesner**, Conr., Arzt in Zürich, † 1565, ber. *Bot. d. Mittelalters*, schr. *Hist. plant., de raris et admirandis herbis, de Stirpium collectione*, u. a. — *Gesnēra* L. (-ria Pers.).
- Geyer**, K. Andr., durchforschte 1834—45 d. Flora d. nordamer. Union, red. in Meissen d. *Chronik d. Gartenwesens*, † 1853.
- Geyler**, Th., s. 1867 Dozent am Senckenberg-Inst. zu Frankf. a. M., schr. üb. *Sphacelarien* etc. (*Pringsh. Jahrb.* 1865) u. a.
- Gibelli** (s. Cesati), Assist. am bot. Garten z. Pavia, schr. *Sugli org. reprod. del gen. Verrucaria*, Milano 1865.
- Gihoul**, L., schr. *Culture forestière des arbres résineux conifères* etc., Bruxelles 1847.
- Gilibert**, J. Em., Prof. z. Wilna, dann in Lyon, schr. *Fl. lithuanica inchoata* etc., Grodno 1781, *Exercit. phytologica*, Lugd. Gallor. 1792, u. a. — *Gilibertia* Gm.



- Gillen**, Arn. (Gillenius), schr. Hortus etc., Cassellis 1627 u. 32. — *Gillenia* Mnch.
- Gillies**, schott. Arzt u. Bot. zu Mendoza in Chili. — *Gilliesia* Lindl.
- Gingins** de Lassaraz, Bar. v., schr. *Violariées* (in Soc. nat. II, Genève 1823), Hist. nat. des Lavandes, Genf 1826. — *Ginginsia* DC.
- Giseke**, P. D., Prof. z. Hamburg, † 1796, schr. Index Linnaeanus etc., *Icones plant.* — *Gisekia* L.
- Gleditsch**, J. G., Prof. z. Berlin, † 1786, schr. *Methodus fungorum*, Berol. 1753, *Bot. medica* u. a. — *Gleditschia* L.
- Glehn**, P. v., schr. Verz. d. im Witim-Olemkaland von Poljakow u. Bar. v. Maydell ges. Pfl. (Act. Hort. Petropol. 1876).
- Gloxin**, B. P., Arzt in Colmar, schr. *Observationes bot.*, Strassb. 1785. — *Gloxinia* l'Hér.
- Gm.** = **Gmelin**, Sam. Gottl., Prof. z. Petersb., Reis. mit Pallas 1763—74 durch d. russ. Reich, † 1774 in d. Krim, schr. *Hist. fucorum* 1768, *Reise durch Russl.* 1774. — **Gmelin**, Ph. Fr., † 1768, Prof. z. Tübingen, schr. *Otia bot.*, Tüb. 1760. — **Gmelin**, J. G., Prof. in Petersburg u. Reis. nach Kamschatka, † 1755 in Tübingen, schr. *Fl. sibirica*, 1747—49, *Reise durch Sibirien*, 1733—43, u. a. — *Gmelina* L. — **Gmelin**, Joh. Fr. (Sohn v. Ph. Fr.), Prof. in Göttingen, † 1804, Herausg. v. Linné's Werken u. *Onomatologia bot.*, 1772—78 (10 T.). — **Gmelin**, C. Chr., Arzt z. Karlsruhe, † 1837, schr. *Fl. Badensis, Alsatica* etc., 1805—26, 4 B.
- Gochnat**, Fr. C., schr. *Tentamen medico-bot. de Cichoriaceis*, Argentor. 1808. — *Gochnatia* H. B. K.
- Goebel**, Fr., Pharmaz. Waarenkunde (m. Ill.), Eisenach 1827—30. **G.** u. **Kunze**, dass. m. Kupf., 1827—34.
- Godet**, Bot. z. Neufchatel, Reis. im Kaukasus, schr. *Fl. du Jura* 1853, *Pl. vénénées du cant. d. Neufchâtel.* — *Godetia* Lindl., Spach.
- Goepfert**, H. R., Prof. in Breslau, ber. Paläontolog, † 1884, schr. foss. Farne, foss. Fl. d. Gypsform., Tertiär-Fl. v. Schlesien, üb. d. Riesen d. Pflanzenreichs, Berl. 1869, d. foss. Coniferen, 1850, u. a. — *Goepertia* Schldl.
- Goethe**, W., schr. *Mith. aus d. Pflanzenwelt* (Acta Leopold. 1827/28).
- Goiran**, A., schr. *Nomi volgari adoperati in Italia a designare le principale piante di bosco*, Verona 1877.
- Good.** = **Goodenough**, Dr. Sam., engl. Bot., † 1827, schr. *Observ. on t. brit. Fuci*, 1795. — *Goodenia* Sm., *Goodenovieae* R. Br.
- Gordon**, G., Oberaufs. d. Vers.-Stat. Chiswick, schr. üb. Coniferen (the Pinetum), 1858, m. Nachtr. 1862. — *Gordonia* Ellis.
- Gottsche** (s. Lindenbergl), Arzt in Altona, schr. m. *Lindenbergl* u. *Nees Synopsis Hepaticarum*, 1844—47. — *Gottschca* Nees.
- Gouan**, Prof. d. Bot. z. Montpellier, † 1821, schr. *Fl. Mospellensis*, Lugd. 1765, *Hort. reg. Mospelliensis*, 1768, *Illustr. et observat. bot.*, 1773, u. a. — *Gouania* Jacq.
- Grabowski**, Apoth. in Schlesien, † 1842, schr. m. *Wimmer Fl. Silesiae* 1827—29, *Fl. v. Oberschles.*, 1843. — *Grabowskia* Schldl.
- Grah.** = **Graham**, John, † 1839 in Bombay, schr. *Catal. of t. pl. growing in Bombay* etc., 1839. — **Graham**, Rob., Prof. in Edinburg, † 1845, schr. *Fl. v. Schottland.* — *Graemia* (*Grahamia*) Hook., *Menziesia* *Grahamia* Hook.
- Gray**, Asa, Prof. z. Cambridge in Nordamerika, schr. *Elements of bot.*, 1836, *Bot. of t. United-States*, 1845, u. a. — *Asagraea* Lindl.
- Grev.** = **Greville**, Rob. Kaye, engl. Krypt., mit Hooker *Icones Filicum*, 1826—31, *Scottish Cryptog. Flora*, Edinb. 1822—29, *Algae brit.*, *Fl. Edinensis* u. a. — *Grevillea* R. Br. — **Greville**, Charl., engl. Blumist d. vor. Jahrh.'s, † 1809.

- Grew**, Nehem., schr. t. anatomy of plants, Lond. 1682. — *Grewia* Juss. — **Grew**, Algae brit., 1830.
- Griffith**, W., Arzt in Ostind., Forscher in Indien u. Afghanistan, gab heraus *Icones plant. Asiaticarum* (üb. 600 Taf.), Calcutta 1847—54. — *Griffithia* Ag. u. *Larix Griffithii* Hook.
- Grindel**, schr. Pharmaz. Bot. 1802, bot. Taschenb. f. Liv-, Cur- u. Esthland, Riga 1803. — *Grindelia* W.
- Grisebach**, Prof. z. Göttingen, schr. Gen. et Spec. Gentianearum, 1839, Grundr. d. syst. Bot., Götting. 1854, Fl. of t. brit. West-India, Catal. pl. Cubensium, Spicilegium Fl. Rumelicae et Bithynicae, Braunsch. 1843, u. a.
- Gronovius**, Senator z. Leyden, † 1762, schr. Fl. virginica, Lugd.-Bat. 1762, Fl. orientalis. — *Gronovia* L.
- Günther**, Joh. Chr., † 1833 in Breslau, schr. m. Wimmer u. Grabowski Fl. v. Schlesien. — *Guntheria* Spr., *Günthera* Andrz.
- Guépin**, Jean Pierre, Arzt in Angres, schr. Fl. de Maine et Loire m. Suppl. I u. II, 1850—56. — *Guepinia* Fr.
- Gümbel**, Th., schr. d. Moosflora der Rheinpfalz etc., Landau 1857 u. Herbar. vivum muscorum et lichenum etc.
- Guettard**, Et., franz. Pfl.-Physiolog, schr. Observ. sur l. plant., Paris 1747, üb. Lebenskraft etc., 1748. — *Guettarda* L.
- Guilandinus** s. Wieland.
- Gunner**, Prof. d. Bot. in Kopenh., † 1773, schr. Fl. Norvegica, Nidrosiae et Hafniae 1766—72. — *Gunnera* L.
- Gussone**, Giov., Prof. in Neapel, † 1866, schr. Florae Siculae Prodr. 1827/28, Plantae rariores etc., 1826 u. a. — *Gussonia* Spr.
- Haenke**, Thadd., aus Böhmen, Reis. in Südam., Mexiko, auf d. Philip-pinen etc., † 1817 in Bolivia; Presl's Reliquiae Haenkeanae etc., Prag 1826 f. — *Haenkea* Salisb.
- Hagen**, C. G., Prof. in Königsb. 1749—1829, schr. Preussens Pfl., Kön. 1818 (*Chloris borussica*, Regiom. 1819). — *Hagenia* Lam., Eschw.
- Hales**, Steph., † 1768, schr. 1727 d. ber. Statik d. Gewächse. — *Halesia* L.
- Hall**, H. C. v., Elementa botanices, Groningae 1834.
- Haller**, Albr. v., Prof. in Göttingen 1736—39, k. brit. Leibarzt etc., † 1777 in Bern, schr. Fl. jenensis H. B. Ruppil aucta etc., Jen. 1745, Enum. plant. Horti Goett. 1753, Biblia bot., Zürich 1771—72, *Icones pl. Helvet.*, Bern 1795, u. a. — *Halleria* L. — **Haller** f., † 1823 in Bern, schr. Tentam. Synopsis Potentillarum, Bern 1820.
- Hallier**, E., Prof. in Jena, Herausg. v. W. Koch's Taschenb. d. deutsch. u. schweiz. Flora (7. umg. A., Lpz. 1878), d. pflanzlichen Parasiten d. menschl. Körpers, 1866, Phytopathologie, 1868, Schlechtendal's Flora v. Deutschl., 5. A., 1880.
- Ham.** = **Hamilton**, W. Lord (s. Buchanan), schott. Bot. u. Reis. in Westind., schr. Prodr. plant. Indiae occident., Lond. 1825, üb. Hort. Malabarius. — *Hamiltonia* Roxb. — **Hamilton**, Arth., schr. üb. *Scutellaria*, 1832.
- Hampe**, E., schr. Relation üb. d. v. Beyrich in Nordamer. gesamm. Laubmoose, Handb. f. pharmaz. Bot., Nürnberg. 1804. — **Hampe**, Apoth. z. Blankenburg am Harz, *Icones musc. nov. etc.*, Bonn 1844, Fl. herecynia, Halle 1873.
- Hampel**, W., gr. Schaffgott'sch. Gart.-Insp. z. Koppitz, schr. d. moderne Teppichgärtnerei, Berl. 1880.
- Hanstein**, Joh. v., Prof. in Bonn, † 1880, schr. üb. Keimentw., Rinde, *Marsilia* u. a., Herausg. d. „Bot. Abhandl.“.

- Happe**, A. F., schr. Conspect. praecipuar. plant. earumq. florum et fructuum etc., Berol. 1790—94.
- Hartig**, Th., Forstr. u. Prof. z. Braunschweig, ber. Pfl.-Physiolog. — **Hartig**, Rob., Prof. z. Neust.-Ebersw., schr. d. Krankheiten d. Waldbäume, 1874.
- Harting**, Pieter, Prof. in Utrecht, schr. Anatomie d. Cacteen, Kartoffelkrankh., 1851, u. a.
- Hartinger**, A., Atlas d. Alpenflora, Wien 1883, 17. Lief.
- Hartmann**, K. J., schwed. Arzt u. Bot., † 1849, schr. Handbok i Skandinav. Flora, 1829, 9. A. 1864, Svensk och Norsk Exc. Flor., 1846. — **Hartmannia** DC., Spach.
- Hartweg**, K. Th., v. Karlsr., Reis. in Mex. 1836—40, Insp. d. Schwetzing. Gart., Bentham's Plantae Hartwegianae. — **Hartwegia** Lindl.
- Hartwig**, J., Garteninspector in Weimar, d. illustr. Hausgärtner, 10. A. 1885.
- Harvey**, W., Prof. d. Bot. in Dublin, † 1866, schr. Nereis Boreali-Amer., Washington 1852—57, Thesaurus Capensis, 1859—63, u. a.
- Hassearl (-karl)**, Jul. C., aus Cassel, für Holland Leit. d. bot. Gart. z. Buitenzorg auf Java, siedelte dort s. 1854 d. Chinabaum an, schr. Pl. javanicae, Filices jav. Horti Bogotiensis descr., Amstelod. 1858, Commelinaceae indicae etc., Vindob. 1870.
- Haw. = Haworth**, Adr. Hardy, engl. Bot., † 1833, schr. üb. Saftpfl., Norimb. 1819, Monogr. Narcissorum, 1831. — **Haworthia** Duv.
- Hayne**, Prof. d. Bot. in Berl., † 1832, schr. Dendrol. Fl. d. Gärten Berlins, 1822, Arzneigew., Berl. 1843—46, u. a. — **Haynea** Spr., W.
- Hedw. = Hedwig** aus Siebenbürgen, Prof. z. Leipzig, schr. classische Schriften üb. Moose, Filicum genera etc., Lips. 1799, u. a. — **Hedwigia** Ehrh.
- Heer**, Osw., Prof. z. Zürich, Paläontolog, † 1883, schr. Urvelt der Schweiz, 1864, 2. A. 1879, Pfahlbauten, d. Tertiär-Fl. d. Schweiz, Fl. foss. arctica u. a.
- Hegetschweiler**, schr. Beitr. z. Aufzähl. d. Schweizerpfl., Zürich 1831, Fl. d. Schweiz (fortg. v. Osw. Heer), † 1839. — **Salix Hegetschweileri** Heer.
- Heiberg**, 1866—68 Red. d. dän. Botanisk Tidsskrift, † 1875, schr. Diatomacæae danicae, 1863.
- Heister**, Prof. d. Bot. z. Helmstädt, † 1758, schr. Indices plantar. etc., Systema pl., 1748, u. a. — **Heisteria** L.
- Heller**, schr. Fl. Wirceburgensis, Würzb. 1810—11. — **Helleria** Mart.
- Henckel** v. Donnersmark, schr. Nomenclat. bot., Halle 1821. — **Henckelia** Spr.
- Henderson**, E. G., Patriarch d. Handelsgärtn., † 1880, 94 J. alt. — **Henderson**, J., engl. Bot., † 1866. — **Hendersonia** Berk.
- Henkel**, J. B., Prof. z. Tübingen, † 1871, schr. m. Hochstetter Synops. d. Nadelhölzer, Stuttg. 1865. **Henkel**, J. Fr., schr. Flora Saturnizans, d. Verwandt. d. Pfl. u. d. Mineralr.'s, Lpz. 1755.
- Henslow**, schr. on the origin of the prevailing systems of phyllotaxis (Linn. Soc. I. 2). — **Henslowia** Hook. f., **Henslovia** Planch.
- Herb. = Herbert**, W., engl. Pfarr. u. Bot., † 1847, schr. Amaryllideen. — **Herbertia** Sweet.
- Herbich**, Fr., schr. Stirpes rarior. Bucovinae, Stanislawow, 1853, Fl. d. Bukowina, Lpz. 1859. — **Herbichia** Zawadski.
- Herit. od. l'Hér. = l'Héritier**, Bot. u. Inst.-Mitgl. z. Paris, † 1800, ermord., schr. Stirpes novae, Geraniologia 1788, Sertum anglie., 1788, u. a. — **Heritiera** Ait., Schrk.
- Herm. = Hermann**, P., Prof. in Leyden, Reis. auf Ceylon, † 1695, **Hermannia** Paradisus Batavus etc., Lugd.-Bat. 1705. — **Hermannia** L.

- Heufler**, L. v., d. Hypneen Tirols, Wien 1860. — *Heufferia* Awd.
- Heyder**, Ed., ält. Rath etc., rief d. Pomol. Institut. v. Proskau u. Geisenheim ins Leben. — *Heyderia* C. Koch.
- Heynhold**, Nomenclator bot. hortensis, 2 B., Lpz. 1840 u. 46.
- Hil.** od. **St. Hil.** = **Saint-Hilaire**, A. de, fr. Bot. u. Reis. in Brasil., schr. Voyage dans l. distr. des diamans du Brésil etc., Paris 1833 — *Hilairia* DC., *Hilaria* H. B. K.
- Hill**, John, engl. Arzt u. bot. Autor in Lond., † 1775, schr. Hort. Kewensis 1768, Herbar. brit., 1769, u. a. — *Hillia* L., Jacq.
- Hirschfeld**, Prof. in Kiel, schr. d. ber. Theorie d. Gartenkunst, 1777 bis 1782, Handb. d. Fruchtbaumzucht, Braunschw. 1788. — *Hirschfeldia* Mnch.
- Hochstetter**, W., Univ.-Gärt. in Tübingen, schr. m. Henkel üb. Coniferen. — *Hochstetteria* DC.
- Hoffm.** = **Hoffmann**, G. F., Prof. z. Götting., dann Staatsr. in Petersburg, † 1826, schr. Enum. Lichēnum, Deutschlands Flora, 1791 f., Vegetabilia cryptog., Erlang. 1787—90. — *Hoffmannia* Sw., W. — **Hoffmann**, Herm., Prof. in Giessen, namh. Mykolog, schr. Mykol. Ber. 1870—71, Index fungorum, 1863, üb. therm. Constanten etc., 1875, Lehrb. d. Bot., Darmst. 1857, u. a.
- Hoffmg.** = **Hoffmannsegge**, Graf v., in Dresden, † 1849, schr. m. Link Fl. portugaise, Berl. 1809—40. — *Hoffmannseggia* Cav.
- Hofmeister**, W., Prof. in Heidelb., dann Tübing., † 1877, namh. Pfl.-Physiolog, mit Irmsch, Pringsheim u. J. Sachs Herausg. d. Handb. d. physiol. Bot., schr. Beitr. z. Kenntniss d. Gefässkrypt. (18 T.), Lpz., Allg. Morphologie etc., Lpz. 1868, u. a.
- Holmskiöld**, dän. Bot. aus Nyborg, † 1794, schr. Beata ruris otia fungis Danicis impensa, Havniae 1790—91. — *Holmskiöldia* Retz.
- Hook.** = **Hooker**, W. J., s. 1839 Dir. d. Kew-Gärt. b. London, † 1865, schr. Niger-Flora, Lond. 1849, Fl. boreali-amer., Lond. 1829, Hooker u. Greville Icones Filicum, 1829—31, Hooker u. Taylor Muscol. brit. 2. A., 1827, Herausg. d. Lond. Bot. Magazine u. Journal of Botany. — *Hookeria* Sm. — **Hooker f.** Hooker, Jos. Dalt., Sohn u. Nachfolger d. vor. in Kew, Reis. im Himalaya, Hook. u. Thomson Fl. Indica, Lond. 1855, Introd. ess. on t. Fl. of New-Zealand, Lond. 1853, on t. bot. of t. antarctic voyage of t. ships Erebus u. Terror, Fl. Nova-Zelandiae, Lond. 1853, Fl. of India 1873, Synops. Filicum, 1874.
- Hoppe**, Prof. in Regensb., † 1846, Herausg. d. Regensb. Flora, schr. Caricologia germ. (in Sturm's Flora, Regensb.). — *Hoppēa* W. Rehb., Dietr.
- Hornemann**, Prof. in Kopenh., † 1841, schr. Fl. Dänemarks, Hort. bot. Hafniensis, 1813 f., Nomencl. Fl. Dan., u. a. — *Hornemannia* W.
- Hornschuch**, Prof. in Greifswald, schr. üb. d. Metamorph. nieder. Organismen, 1820. — *Hornschuchia* Blum.
- Horsfield**, Thom., schr. Pl. Javanicae rarior. etc., elabor. J. Bennett et R. Brown, Lond. 1838—52, üb. Rhus u. a. — *Horsfieldia* Blum.
- Hort.** = Hortulorum, kleiner od. gewöhnlicher Gärten.
- Hortulan.** = Hortulanorum der Gärtner.
- Hort. Kew.** = Hortus Kewensis, Pfl.-Catalog der Kew-Gärten b. London v. Hooker u. Walker-Arnott, 1847.
- Hort. Mal.** = Hortus Malabaricus (im 17. Jahrh. angef. v. Joh. Cassearius).
- Host**, Leibarzt z. Wien, † 1834, schr. Fl. austriaca, Icones graminum austr., Salix, u. a. — *Hosta* Jacq., *Hostea* W., *Hostia* Mnch.
- Houstoun**, W., Reliquiae Houstounianae s. plantar. in Amer. meridionali collectar. Icones, Lond. 1781. — *Houstounia* L.

- Houtt.** = **Van Houtte**, L., Herausg. d. Flore des Serres u. jardins de l'Europe, Gent, schr. pl. des serres et de pleine terre, Gand 1847, † 1876 in Gent.
- Houttuyn**, Arzt u. Bot. z. Amsterdam, schr. natürl. Gesch. d. Pfl., Tiere u. Miner. nach Linnaeus, 1774—83. — *Houttuynia* Thb., Schreb.
- How.** = **Howard**, John Elliot, schr. Illustr. of the Nueva Quinologie of Pavon, 1862. — *Howardia* Wedd.
- Hudson**, W., Apoth. in London, † 1793, schr. Fl. Anglica, 3. A., 1798. *Hudsonia* L.
- Hübner**, J. G., Pflanzenkunde, Potsd. 1867 (m. Holzschn.).
- Hügel**, K. Ans. Frhr. v., Reis. in Asien, schr. üb. Kaschmir u. d. Sihksreich, 1837—41, Enum. pl. Novae-Hollandiae, üb. d. Südsee etc., 1860, üb. Kabul etc., † 1872 in Brüssel. — *Huegelia* Rehb.
- Hb.**, **Humb.** = **Humboldt**, Al. v., ber. Naturf. u. Reis. in Asien und Amerika, † 1859, schr. Fl. Fribergensis etc., 1793, Pl. équinoxiales, 1805—18, Kosmos u. a. — *Humboldtia* Vahl, Rz. Pv.
- H. B. K.** = **Humboldt**, **Bonpland** u. **Kunth**, Synops. plantar. q. in itinere ad plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt A. de Humboldt et A. Bonpland von Kunth, Paris 1822.
- Jack**, W., schott. Bot. u. Reis. in Sumatra, † 1822, schr. Deser. of Malayan plants, 1820. — *Jackia* Walt. — **Jack** u. **Etheridge**, plants in the lower Old-Red etc., 1877.
- Jackmann**, James, Hand.-Gärtn. in d. Grafsch. Surrey, erzielte besondere Clematis-Varietäten u. Blendlinge.
- Jackson**, G., schott. Bot., schr. in Linn. Soc. Transactions. — *Jacksonia* R. Br.
- Jacq.** = **Jacquin**, Nic. Jos. Bar. v., österr. Arzt, Bot. u. Reis. in Westind., † 1817, schr. Observationes bot., 1764, Fl. austriaca, Hort. Vindobonensis, Icones plant. rar., Collectanea etc. — *Jacquinia* L.
- Jäger**, G. F., schr. üb. Missbildungen etc., Stuttg. 1814, de quibusd. Pini sylv. monstros, 1828, u. a. — *Jaegeria* H. B. K. — **Jäger**, A., musci cleistocarpi, St. Gallen 1869. — **Jäger**, H., u. **Beissner**, die Ziergehölze etc., 2. A., Weim. 1883.
- Jaubert**, Graf v., m. **Spach** Illustrationes plant. orientaliu. — *Jaubertia* Spach.
- Jaume**, St. Hilaire, schr. Pl. de la France déer. et peintes d'après nature, 1808. — *Jaumea* Pers.
- Ideler**, G. F., schr. wirthsch. Gärtnerei, 2. Th., Berl. 1798—99. — *Ide-leria* Kth.
- Jessen**, Prof. d. Bot. in Berlin, schr. deutsche Exc.-Flora, Hannover 1879, Bot. d. Gegenw. u. Vorzeit, Lpz. 1864, u. a.
- Johnson**, Thom., Herausg. von John Gerarde's „the Herball“, 1633. — *Johnsonia* R. Br.
- Irmisch**, schr. z. Morphologie d. Orchideen, 1853, Beitr. z. vergleich. Morphol. d. Pfl. (S T.), Halle 1854, u. a.
- Isnard** (Ant. Danty d'Isnard), Prof. z. Paris, † 1724. — *Isnardia* L., *Dantia* P.-Th., DC.
- Jühlke**, Franz, Hofgart.-Dir. in Berlin, Herausg. v. Schmidlin's Blumenzucht im Zimmer, 4. A., 1880, Garten-Buch f. Damen, 3. A., 1874, u. a.
- Jung**, Dr. Joach. (Jungius), in Lübeck 1587—1657. — *Jungia* G., L. — **Jung**, W., schr. Fl. d. Herzogt.'s Nassau, 1832.
- Jungermann**, Prof. in Giessen, schr. Fl. v. Altorf, 1615, Fl. v. Giessen, 1623. — *Jungermannia* L. u. Nees.

- Junghans**, P. C., *Icones plantar. offic. ad vitam impressae*, Halae 1788, *Icones pl. rar.* 1792. — *Junghansia* Gm. (nicht -hausia!).
- Junghuhn**, Fr., holl. Reis. in Java s. 1835, schr. *javan. Balanophoreen*, 1840, *Nova genera et species plant. Florae javanicae*.
- Juss.** = **Jussieu**. *Ant. Laur. de*, s. 1770 Prof. am Jardin de plantes z. Paris, ber. *Bot. u. Begründ. d. natürl. Syst.'s*, † 1836, schr. *Genera plant. secundum ord. nat. disposita* 1789, *Principes d. l. méth. nat. d. vég.* 1824, u. a. — *Jussiaea* St. Hil., *Jussieua* L., *Jussieuaea* Rottl. — **Jussieu**, Bernard de, 1699—1777, Onkel des vorig., s. 1759 im k. Gart. z. Trianon, *Zusammenstell. d. Pfl. darin in 65 Ord.* — **Juss.**, Joseph de, *Condamine's Reisebegleit. u. Samml. in Südamer.*, 1735. — **Juss.**, Antoine de, Arzt u. Prof. am bot. Gart. z. Paris, † 1758. — **Juss.**, Adrien de (**A. Juss.**), d. Brud. *Ant. Laur.'s*, † 1853, schr. *Euphorbiacearum genera* 1824, *Elementarcur.* 1840 (deutsch v. Schmidt), u. a.
- Kämpfer**, Engelbr., Leibarzt in Lippe, Reis. in Japan, † 1716, schr. *Amoenitatum exoticar. fasc. V*, 1712 (deutsch Lemgo 1717—19), *Icones select. q. in Japonia collegit etc.*, Lond. 1791. — *Kaempferia* L. (-ra Spr.).
- Kalm**, Pet., Linné's Schüler, Reis. in Nordamer., † 1779, Prof. z. Åbo in Finnland, schr. *Fata botanices in Finnland*, 1758, *Fl. fennica*. 1765, u. a. — *Kalmia* L.
- Kanitz**, A., schr. *Gesch. d. ungar. Bot. etc.*, Halle 1865, *Haynaldia* n. g. in *Magyar Növentanidapok*, 1877, u. a.
- Karsten**, H., schr. *Auswahl neuer etc. Gew. Venezuela's*, Berl. 1848, *Fl. Columbiae specim.*, Berl. 1858. — **Karsten**, P. A., schr. *Fungi novi Fennici*, Helsingfors 1868.
- Kaulfuss**, Prof. in Halle, † 1830, schr. *Enum. Filicum quas etc.*, 1824, d. Wesen d. Farnkräuter, Lpz. 1827, u. a. — *Kaulfussia* Blum., Nees.
- Kemmler**, C. A. (u. v. Martens), *Flora v. Württemberg u. Hohenzollern*, 3. A., 1883.
- Kerner**, J. S., schr. *gift. u. essb. Schwämme*, Stuttg. 1786. — *Kenera* Mea u. W. — **Kerner**, A., *Abbild. aller ökon. Pfl., Primulaceen d. östr. Alpen* (Östr. Bot. Zeit. 1875), *Gesch. d. Aurikel* u. a.
- Kew-Gardens** s. Hort. Kew.
- Kickx**, J., schr. *Récherches s. l. Flore cryptog. des Flandres*, Brux. 1840—55.
- Kieser**, D. G., *Elemente d. Phytotomie*, Jena 1815. — *Kieseria* Reinw.
- Kirschleger**, Prof. in Strassb., schr. *Fl. d'Alsace*, 1852—58, *Fl. vogéso-rhénane*, 1870, u. a.
- Kitaibel**, Prof. z. Pest, † 1818, schr. *Descr. et Icon. pl. rarior. Hungariae*, Wien 1803—12. — *Kitaibelia* W.
- Kittel**, M. B., *Taschenb. d. Flora Deutschlands*, 1837 u. 47. — *Kittelia* Rehb.
- Klatt**, F. W., schr. *Plantae Muellerianae*, Monogr. Gen. *Sisyrhinchium*, *Revisio Iridearum* (in d. *Linnaea*), 1864—66, u. a. — *Klattia* Bak.
- Klein**, J. H., dän. Reis. in Ostind., 1750—98. — *Kleinia* L. — **Klein**, J. Th., schr. *Dubia circa pl. marinas etc.*, Petrop. 1760. — **Klein**, M., schr. *Abh. üb. Ratanhia*, Stuttg. 1819, u. a.
- Klöbisch**, R., schr. *deutsche Waldbäume u. ihre Physiognomie*. (16 T., 88 Holzsz.), Leipzig 1857.
- Klotzsch**, Apoth. u. Custos d. k. Herbariums z. Berlin, † 1860, schr. *Begoniaceen etc.* (12 T.), Berl. 1855, *Herbar. vivum mycolog.* 1855—59, fortg. v. Rabenhorst, Klotzsch u. Garcke, d. bot. *Ergebnisse d.*

- Reise d. Prinz. Waldemar etc., Berl. 1862, u. v. a. — *Klotzschia Cham.*
- Knab**, Mich., Verw. d. Frhrn. v. Stieber in Vorchheim b. Nürnberg, schr. Hortopomologium od. Garten-Peltzbuch, 1620.
- Knapp**, Joh. Leonh., † 1845, Herausg. d. Journal of t. naturalist, Lond. 1819, schr. Gramina britann. 2. A. 1840. — *Knappia Sm.* — **Knapp**, Jos. Herm., schr. Prodr. Fl. Nitriensis, Vindob. 1865.
- Knaut**, Chr., Prof. z. Halle 1654—1716, schr. Method. pl. genuina, Lips. 1716. — *Knautia Coult.*
- Knight**, Thom. Andr., † 1838, Präs. d. Lond. Gartenb.-Ges., schr. üb. Degenerieren d. Obstsorten. — *Knightia R. Br.*
- Kniphof**, J. H., Botanica in originali s. Herbar. vivum. Centuria X., Halae 1763 (100 kol. Taf.).
- Knorr**, G. Wolfg., schr. Thesaurus rei bot. hortensiq., Norimbergae 1750—72. — *Knorria Sternb.*, Göpp.
- Knowles** u. Westcott, Herausg. d. Floral Cabinet, Lond. 1837—40, schr. t. Birmingham bot. garden, 1836—37.
- Kny**, L., Prof. in Berlin, schr. Pflanzenleben d. Meeres, Berl. 1875, Fl. d. ozean. Inseln, 1867, bot. Wandtafeln etc., 1876—85 (70 T. in Farbdr.), u. v. a.
- Koch**, W. D. J., Prof. z. Erlangen, † 1849, schr. Synops. Fl. germ. et helvet. od. Taschenb. d. deutsch. u. schweiz. Flora, Leipz. 6. A., 1865, Röhling's Fl. Deutschl.'s m. Mertens bearb. 1823—39 (5 B.), u. a. — *Kochia Roth.* — **Koch**, K. od. C., Prof. in Berlin, Reis. im Kaukasus, † 1879, schr. Hort. dendrolog. etc., Berl. 1873, Dendrologie etc., Erlang. 1869, d. bot. Gärt. Berlins, 1860, u. a.
- Koeler**, Prof. z. Mainz, schr. Descr. graminum, 1802. — *Koeleria Pers.*
- König**, Joh. Gerh., dän. Nat. u. Reis. in Ostind., † 1785 in Tranquebar. — *Koenigia L.* — **König**, Sam. Fr., de Lamio Plinii, Argentor. 1742. — **König**, Em., schr. regnum vegetabile quadripartitum, Basil. 1708. — **König**, K., Geistl., schr. Führer durch d. Pfalz, 1841.
- Kbr.** = **Körber**. Prof. z. Breslau, Kryptog., schr. Syst. Lichenum Germ., Bresl. 1855, Parerga lichenologica, 1855 u. 59, u. a. m.
- Körnicke**, Prof. z. Poppelsdorf b. Bonn s. 1867, schr. Mon. de Eriocaulaceis, Berol. 1856, Mon. Marantacearum, Mosk. 1859, Mon. d. Rapataceen (in d. Linnaea, 1872), u. a.
- Körte** s. Schweigger.
- Kohl**, schr. Taschenwörterb. d. bot. Kunstausrücke für Gärtner. Berl. 1883.
- Kops**, schr. mit Van Hall, Miquel etc., Fl. Batava etc., Amsterd. 1800—1860 (üb. 1000 kol. T.). — *Kopsia Blum.*, Dumart.
- Kosteletzky**, schr. Allg. mediz.-pharmaz. Flora (6 B.) Mannheim, Clavis analyt. in Floram Bohemiae phanerogamam, Prag 1824. — *Kosteletzkya Presl*, J. Eck.
- Kotschy**, östr. Reis. im Orient, schr. Vegetat. d. Isthmus v. Suez, Wien 1858, de plantis nilotico-aethiopicis Knoblecherianis, Wien 1864, plantae Binderianae nil.-aeth., Vienn. 1865, d. Libanon u. seine Alpenflora 1864, u. a. — *Kotschya Endl.*
- Kratevas** s. Cratevas.
- Krause**, Abbild. u. Beschr. aller Getreidearten, Leipz. 1834—37 (8 H.).
- Krebs**, J. L., vollst. Beschr. u. Abbild. d. sämmtl. Holzarten d. mittl. u. nördl. Deutschl.'s (139 kol. T.), Brschw. 1826—35.
- Krempelhuber**, A. v., Salinen- u. Forstmeist. z. München, schr. Lichenflora Bayerns 1861, Gesch. u. Liter. d. Flechten 1867—70, d. Flechten als Parasiten d. Algen (in der Flora, 1871), u. a.
- Kroker**, Ant. Joh., Arzt in Breslau, † 1823, schr. Fl. Silesiaca renovata 1787—1823. — *Krockeria Mnch.*

- Krombholz.** J. Vinc. v., † 1843 in Prag, gab heraus *Abbild. essb. u. schädli. Schwämme*, Prag 1831—47 (10 H., 2000 kol. Fig.).
- Krüger.** Dr. M. Sal., schr. *Bibliographia bot. od. Handb. d. bot. Literatur m. biogr. Skizzern*, Berl. 1841. — *Kruegeria* Neck.
- Küchenmeister.** Arzt in Dresd., schr. 2. Abt. d. menschl. Parasiten (pflanzl. Par.), Leipz. 1858.
- Kühn.** Jul., Prof. in Halle, schr. d. Krankheiten d. Culturgew., Berl. 1858, u. a.
- Kützting.** E. T., Prof. an d. Realsch. z. Nordhausen, namh. Algolog, schr. *Synops. Diatomacearum 1834, Algalum aq. dulc. Decas, Phycologia germ.*, 1816, Grundz. d. philos. Botanik, Lpz. 1851—52, u. a.
- Kuhn.** Adam, Bot. in Pennsylvanien, Linné's Schüler. — *Kuhnia* L. f. — **Kuhn.** Max, Bot. bes. Farnkenner z. Berlin.
- Kummer.** Paul, schr. Führer in d. Pilzkunde, Zerst 1871, *Kryptog. Charakterbilder*, 2. A., Halle 1883, *deutsche Blumenwelt in Charakterbildern*, 2. A., Halle 1883.
- Kth.** = **Kunth**, Prof. in Berlin, Assist. A. v. Humboldt's u. Bonpland's bei Herausg. d. in Amerika ges. Pflanzen, † 1850, schr. *Fl. Berlinens.*, *Handb. d. Bot.*, *Synops. Pl. aequinoct. orbis novi*, Par. 1822. — *Kunthia* Hb.
- Kuntze.** Dr. O., schr. „Um d. Erde“, Lpz. 1881, *Phytogeogenesis*, Lpz. 1884.
- Kze.** = **Kunze**, Prof. u. Dir. d. bot. Gart. z. Leipzig, † 1851, *Deutschland's Schwämme in getrockn. Exempl.* 1816, K. u. Schmidt, Mykol. Hefte 1817—23, *Anal. pteridographiae* 1837, d. Farnkr. in kol. Abb., 1840—51, *Schkuhr's Riedgräser* 1840—50, u. a. — *Kunzia* Spr.
- Kurz.** S., schr. *Forest Flora of British Burma* (*Asiat. Soc. of Bengal*, 1877), on *Pandanophyllum* etc., *Calcutta* 1863, *Sketch etc. of t. Nicobar Islands* 1875, t. forest of Pegu, 1875.
- Lab.** = **Labillardier**, J. Houtte de, bot. Reis. im Orient u. in Neuholland, † 1834, schr. *Icones pl. Syriae rar.*, 1791—1812, *Novae-Hollandiae plant. specimen. Sertum austro-caledonicum*, Par. 1824—25. — *Labillardiera* R. S., *Billardiera* Sm., -*deria* Spr.
- Lag.** = **Lagasca**, span. Bot., † 1839 zu Barcelona, schr. *Amenidades natur. de las Españas* etc., 1811, *Elenchus plant. etc.*, 1816, *Umbelliferae*, 1826, u. a. — *Lagascea* W., -*cia* Cav.
- Laharpe.** Pablo J. de, schr. *Monogr. d. Juncaceen*.
- La Llave.** span. Arzt u. Bot. in Mexiko, schr. mit Juan Lexarca *Novorum vegetab. descr.*, Mexici 1824/25.
- Lam.** = **Lamarek** (La Marck), J. B. v., *Nat. in Paris*, † 1829, schr. *Fl. Franç.*, *Hist. nat. d. vég.*, 1802, *Encycl. méth. botanique*, 1783 bis 1817 (13 B. m. Atl.). — *Lamarckia* Mch., *Rich.*, -*kea* Pers.
- Lamb.** = **Lambert**, Aylmer Bourke, schr. *Descr. of gen. Pinus*, Lond. 1803. — *Lambertia* Sm. — **Lambert.** G., schr. *de geogr. plant. in Wetteravia et Marchia Brandenb. indegenarum*, Berol. 1849.
- Lamx.** = **Lamouroux**, Prof. z. Caen, † 1825, schr. *Diss. s. plus. espèc. de Fucus*, 1805, *Thalassiophytes* etc., *Hist. d. polypes corallig. etc.*, 1816. — *Lamourouxia* H. B. K.
- Langsdorff** in Brasil., mit Fischer Reis. um d. Erde unt. Krusenstern, schr. üb. *Cainca-Wurzel* (*Chiococca scandens*). — *Langsdorffia* Mart., W.
- Lantzius-Beninga.** S., schr. d. unterscheid. Merkmale d. Pfl.-Fam. u. -Geschl. (I. Dially- u. Gamopetalen), Gött. 1866.
- Lap.** = **Lapeyrouse**, Ph. Picot (La Peyrouse) Bar. de, † 1818 in Toulouse, *Figures d. l. Fl. des Pyrénées* 1813 u. *hist. abrég. d. pl. des Pyrénées*, 1813—18. — *Lapeyrousia* Thb., *Gawl.*



- La R.** = **La Reina**, schr. Buch d. Tierheilkunde (Albeiteria), 2. A., 1552.
- Lasch**, Apoth. z. Driesen in d. Neumark, † 1863, sammelte Schwämme für Rabenhorst's Fungi europaei, mit Baenitz Herbarium norddeutsch. Pfl., 1860. — *Laschia* Corda.
- Lauche**, W., k. pr. Gart.-Insp. d. Gärtner-Lehranst. b. Potsdam, s. 1877 Geschäfts-f. d. deutsch. Pomol. Vereins, † 1883, schr. deutsche Pomologie u. deutsche Dendrologie, 2. A., 1883.
- Lawrence**, Marie, Pfl.-Malerin, a collect. of Roses from nature, 1796—99. — *Lawrencia* Lyngb. (*Laurencia*).
- Lawson**, J., schr. Diss. sistens Nihil officinale, Lugd.-Bat. 1737. — *Lawsonia* L.
- Laxmann**, Erich, Past. in Sibirien, dann Prof. u. russ. Hofrat, † 1796, schr. sibir. Briefe, Götting. 1769, Beitr. z. Flora u. Fauna Russlands (in Nov. comm. acad. Petropol.). — *Laxmannia* Forst., R. Br.
- Lebr.** = **Lebreton**, F. Man., schr. De botanica à l'usage des amateurs etc., Par. 1787. — *Lebretonia* Schrk.
- Lechenault** s. *Leschenault*.
- Lecoq**, Henri, Prof. z. Clermont-Ferrand, **L.** u. **Juillet** schr. Dict. rais. des termes de bot., 1831, **L.** u. **Lamotte** schr. Catal. rais. d. pl. vascul. du Plateau central d. l. France, 1847, u. a. — *Lecokia* DC.
- Ledebour**, K. F. v., Prof. z. Dorpat, † 1851 zu München, schr. (mit Meyer u. A. v. Bunge) Fl. altaïca, 1829—34, Icones Fl. ross., Fl. rossica, 1842—53. — *Ledebouria* Roth, Lk.
- Leers**, Apoth. z. Herborn im Nassau'schen, † 1774, schr. Fl. Herbornensis, 1775. — *Leersia* Sw., Sol.
- Lehm.** = **Lehmann**, J. C. G., Prof. in Hamburg, † 1860, schr. Monogr. gen. Prinnularum, 1817, Potentillar., 1820, Novarum Stirpium pugillus, 1828—57, Plantae novae in horto Hamb., u. a. — *Lehmannia* Spr. — **Lehmann**, C., schr. Plantae Preissianae s. Enum. pl. in tot. Australasia occid. collect. de L. Preiss, Hamb. 1844—48.
- Lej.** = **Lejenne**, Hospitalarzt in Verviers, † 1858, schr. Fl. des environs de Spa, 1811—13 (mit Lindenb.), mit Courtois Compend. Fl. belgicae, Leodii 1828—36. — *Lejeunia* Gottsch., Lindenb.
- Leitzgeb**, Prof. in Graz, schr. Pflanzenphysiologie, Lebermoose, Jena 1874, u. a.
- Lelieur**, Graf, Intend. d. Staatsgärten, † 1849 in Versailles, schr. Pomone française etc.
- Lem.** = **Lemaire**, Charl. Ant., Red. d. Jardin fleuriste u. Horticulteur Universel, Red. d. Illustr. horticole v. Ch. Verschaffelt, † 1871.
- Lenné**, Pet. Jos., Gen.-Dir. d. k. Gartens z. Berlin, Begründ. d. Lenné'schen Gartenschule, † 1866. — *Lennæa* Klotzsch.
- Leroy**, André, franz. Pomolog, Herausg. d. Dictionnaire de Pomologie s. 1866.
- Lerz**, schr. Handb. d. Gartenkunde (2 Th. in 4 B.), 5. A., Jena 1849.
- Leschenault** de la Tour, bot. Reis. in Südas. u. Südamer., † 1826 in Paris, schr. üb. d. Veget. v. Neuholl., Par. 1824 (in Peron's Voyage de decouvertes 1800—1804). — *Leschenaultia* R. Br.
- Less.** = **Lessing**, Chr. Fr., schr. Synops. gen. Compositarum, Berol. 1832, u. de gen. Cynarocephalorum, Berol. 1832, Synanthereen d. Berliner Herbarium. — *Lessingia* Cham.
- Lesson**, R. P., Naturf. b. d. antarkt. Exped. d. Capt. Duperrey 1826, schr. Fl. Rochefortine etc. — *Lessonia* Bory.
- Lestiboudois**, Fr. Jos., Prof. in Lille, † 1815, schr. Botanique belge, 1781, De viribus plant. Duaci (Douai), 1783. — *Lestiboudesia* P.-Thou.
- Leunis**, Joh., Prof. in Hildesheim, † 1875, Synops. d. Pfl., 3. A. v. A. B. Frank 1882.

- Lev.** = Leveillé, Arzt in Paris, † 1870, namh. Mykolog, Icones d. champignons de Paulet 1855 u. zahlr. Abh. über Pilze. — Leveillé Decsn.
- Lex.** = Lexarza s. La Llave.
- Leysser**, F. W. v., † 1815, schr. Fl. Halensis 1783—96, 2. A. — Leyssera L., Leyssera DC.
- Lib.** = Libert, Mar. Anna, Kryptog. z. Malmedy, † 1865, schr. Mém. s. des cryptog. observ. aux environs de Malmédy, 1826. — Libertia Spr. u. Libertella Desm.
- Liboschitz**, Arzt in Petersburg, † 1824 in Wien, schr. m. Trinius Fl. des environs de St. Petersb. et Moscou, 1811, Descr. de mousses etc., 1811.
- Libri de re rustica** (Cato, Varro, Columella, Palladius), Basel 1535.
- Lichtenstein**, schr. Index alph. gener. bot. quotquot a Willdenow in Spec. pl. et Persoonio in Synopsi pl. rec., Helmst. 1814.
- Liebe**, Th., schr. geogr. Verbreit. d. Schmarotzerpfl., Berl. 1862, Grundr. d. spez. Bot., Berlin 1866 etc.
- Liebig**, Lud. Leop., ber. Gärtn. in Dresden, † 1872, erzog mit Traugott Seidel zuerst Camellien, Azaleen, Rhododendron, Eriken etc. in Massen. — Liebigia Endl.
- Liebmann**, Reis. in Mexiko, Prof. in Kopenh., † 1856, schr. Mexicos Bregner, Kopenh. 1849, Mexicos Halvgraes (Cyperaceae), 1850, l. chènes de l'Amér. trop. (v. Oersted fortg.). — Liebmannia Menegh.
- Liegel**, Dr. G., Pomolog in Braunau (Oberösterr.), schr. syst. Anleit. z. Kenntn. d. Pflaumen, Passau 1847, u. a.
- Lightfoot**, John, Pfarrer z. Gotham (Engl.), † 1788, schr. Fl. Scotica, Lond. 1772. — Lightfootia Schreb.
- Liljeblad**, Sam., schwed. Bot., † 1815, schr. Utkast til en Svensk Flora etc., 1792, Coloniae pl. in Suecia, Upsal. 1819.
- Lindblad**, Adolf, Dozent in Upsala, schr. Synops. Fungorum in Suecia, 1853, Monogr. Lactariorum Sueciae, u. a. — Lindbladia Fr.
- Linden**, Jean Jules, v. Luxemb., Reis. u. Orchideen-Zücht. in Brüssel, s. 1870 Bes. d. Handelsgärtnerei v. Ambros. Verschaffelt in Gent. — Lindenia Benth.
- Lindenberg**, Amtm. z. Bergdorf, † 1851, L., Gottsche u. Nees v. Esenb., Synops. Hepaticarum, Hamb. 1844—47, Mon. d. Riccien, 1836, u. a. — Lindenbergia Lk.
- Lindl.**, Ldl. = Lindley, John, Prof. z. London, † 1865, schr. Synops. of t. Brit. Flora, 1829, t. fossil Fl. of Gr.-Britain, 1831—37, Sertum Orchidacearum, 1838, t. Flower-Garden, 1850—53, u. a. — Lindleya Hb. Kth., Nees.
- Lindsay**, Arzt in Dumfries, schr. a popular hist. of brit. Lichens, 1858, Contrib. to New-Zealand Botany, 1868. — Lindsaya Dry.
- Lk.** = Link, H. F., zuletzt Prof. in Berlin, † 1851, schr. Diss. bot., 1795, Element. philos. bot., Berl. 1837, Handb. d. nutz. etc. Gew., 1829—33, Icones pl. select. Horti Berol. 1820—28, Hort. reg. bot. Berol. 1827—33, u. v. a. — Linkia Mich.
- Linke**, J. R., schr. Analyt. Pflanzenschlüssel z. Bestimm. d. deutsch. Pflanzengeschlechter, Lpz. 1863. .
- L.** = Linné (Linnaeus), Karl Ritter v., ber. Prof. d. Naturg. u. Systemgründ. d. Bot. z. Upsala in Schweden, † 1778, schr. Systema naturae etc., 8. A. v. Gmelin, Lpz. 1788—93, Genera plantar., 8. A. v. Hänke 1791, Species plant., 4. A. v. Willdenow, Syst. vegetabilium, 16. A. v. Sprengel 1825—28, u. s. f. — Linnaea Gronov. — **L. f.** = Linné filius, Carl v., des vor. Sohn, schr. Decas I u. II plantar. rarior. Horti Upsal., Nova graminum genera, Method. muscor. ill., Ups. 1781.

- Lipp**, J. J., schr. *Εγγχειοιδιον βοτανικον*, Vindob. 1765.
- Lobel** (Lobelius), eig. Matth. de l'Obel aus Flandern, Bot. Jakobs I., † 1616 bei London, schr. *Plantar. s. Stirpium Hist.*, Antwerp. 1576, *Icones etc.* 1581. — *Lobelia* L.
- Lodd.** = **Loddiges**, Conr., ber. Züchter z. Hackney b. London, † 1820, Herausg. d. *Botanical Cabinet*, 1818—24. — *Loddigesia* Sims.
- Logan**, James, Statth. v. Pennsylvan., † 1736, schr. de plantar. generatione, Lugd.-Bat. 1739. — *Logania* R. Br.
- Loefling** (**Löffling**), schwed. Bot. u. Reis., † 1756, schr. *Iter Hispanicum*, Stockh. 1758. — *Loeflingia* L. — *Loefflingia* Röm.
- Loesel** (Loeselius), Joh., Prof. in Königsb., † 1655, schr. *Fl. prussica*, 1703, *Plantae in Borussia nascent.*, 1654. — *Loeselia* L.
- Loew**, E., d. bot. Unterr. an höher. Lehranstalten, Bielefeld u. Lpz. 1876, method. Übungsbuch, Berl. 1875, Artikel in d. *Centralorg. f. d. Interessen d. Realschulwesens in Berlin*, üb. 2 krit. *Hyphomyceten*, Berl. 1874, u. a.
- Lois.** = **Loiseleur-Deslongchamps**, Arzt in Paris, † 1849, schr. *Fl. gallica*, 1828, *Manuel d. plant. us. indigènes*, 1819, *Herbier général de l'amateur*, 1816—27. — *Longchampia* DC., *Loiseleuria* Desv.
- Lonicer** (*Lonicærus*), schr. *Kreuterbuch, künstl. Conterfeyung d. Bäume, Stauden, Kreuter etc.*, Item *Gethieren etc.*, Frankf. 1609, 2. A., 1630, Dasselbe herausg. v. Uffenbach, Ulm 1716 u. Augsburg. 1733. — *Lonicera* L.
- Lorentz**, s. 1870 Prof. z. Cordova in Südamer., schr. *Moosstudien, bryolog. Notizenb.*, üb. *Laubmoose etc.*
- Lorinser**, G. u. F., schr. *Taschenb. d. Flora Deutschl.'s u. d. Schweiz*, 2. A., Wien 1851, d. wichtigst. essb., verdächt. etc. *Schwämme*, 3. A., Wien 1881 (Dr. F. W. Lorinser).
- Load.** = **Loudon**, John Claud., schr. *Hort. britann.*, 3. A., 1839, *Arboretum u. Fruticetum brit.*, 1838, t. *Gardener's Magazine*, 1826—43. — *Loudonia* Ldl. — **London**, Mrs., the ladies' companion to the flower garden, Lond. 1849.
- Lour.** = **Loureiro**, portug. Mönch, schr. *Fl. cochinchinensis*, 1790. — *Loureira* Cav., *Lourea* Neck.
- Lowe**, Rich. Thom., schr. *Primitiae Faunae et Florae Maderae*, 1831, a *manuel Fl. de Madeira*, 1863. — *Lowea* Ldl. — **Lowe**, E. J., schr. *Ferns, brit. and exotic*, 1856—60, beautiful leaved plants, London 1864, u. a.
- Lozano**, Pedro, schr. *descripcion chorograf. del terreno, rios, arboles etc.*, del gran Chaco, Gualambo etc., Cordoba 1733. — *Lozania* Seb., Mut.
- Lucas**, Dr. Ed., ber. *Pomolog Deutschl.'s*, Vorst. d. *Gartenbau-Schule z. Hohenheim*, schr. d. *Lehre vom Obstbau*, 6. A., u. v. a.
- Ludwig**, Chr. Gottl., Prof. z. Leipz., † 1773, schr. *Definit. generum plant.*, ed. Böhmmer, Lps. 1769. — *Ludwigia* L. — **Ludwig**, Chr. Fr., Prof. in Leipz., † 1823, schr. de plant. munimentis, 1776, *Handb. d. Bot.*, 1800. — *Ludwigia* DC. (?)
- Luerssen**, Prof. z. Neust.-Eberswalde, schr. *Grundz. d. Bot.*, 1877 u. 1879, *Repetit. f. Studierende*, Lpz. 1877, Herausg. v. Rabenhorst's *Kryptogamenflora*, u. s. f.
- Lugo**, N. Benitez de, u. Germ. Wildpret, schr. *Catálogo de las plantas etc. de la Orotava en Teneriffé*, 1879. — *Lugoa* DC.
- Luizet**, Gabr., fr. *Pomolog u. Zücht.* (bes. *Pfirsiche*), schr. *Traité de cult. et de taille des arbres fruitiers*, † 1876.
- Luninitzer**, Steph., † 1806 z. Pressburg, schr. *Fl. Posoniensis*, 1791. *Luninitzera* Jacq., Willd.

- Lund**, Dr. P. W., schr. Bemerk. üb. Weg- u. Unkrautpflanzen Brasiliens, 1838 (in Kroyer's naturw. Tidsskrift, II. 1, 1838). — Lundia Schum., DC.
- Lyngb.** = **Lyngbye**, Pred. auf Seeland, † 1837, schr. Tent. Hydrophytologiae danicae, Kopenh. 1819. — Lyngbya Ag.
- Maack**, Dir. d. Gynn. z. Irkutsk, Reis. i. Amurland. — *Maackia amurensis* Rupr.
- Mackay**, Dr. J. T., Dir. d. bot. Gart. d. Trinity-College z. Dublin, † 1862, schr. Fl. hibernica 1825 u. 35. — *Mackaya* Arn.
- Magnol**, P. (*Magnolius*), schr. Hort. reg. Monspeliens., Monsp. 1697. — *Magnolia* L.
- Magnus**, P., Prof. in Berlin, schr. üb. d. Gatt. *Najas*, 1870, M. u. A. Braun üb. Adventivknospen an Blätt. (Verh. d. bot. Ver. d. Mark Brandenburg., 1874).
- Malpighi**, Marcell., ital. Arzt u. Bot., 1623—94, schr. Anatomie Plantar., Lond. 1675, Opera posthuma, Lond. 1697. — *Malpighia* L.
- Manetti**, Dir. d. bot. Gart. in Mailand. — *Manettia* L., Mut., *Manettia*-Rose (R. chin. Jacq. var.).
- Manger**, H. L., Pomolog u. Architekt Friedr.'s II. in Potsd., schr. Vollst. Anleit. z. syst. Pomologie 1780—83.
- Maregrav**, G., Ingenieur u. Reis. in Afrika, † 1644 in Guinea, Guil. Pisonis et G. *Maregravii*, Hist. nat. Brasiliae, Amstelod. 1684. — *Maregravia* (-fia) L.
- M. B.** = **Marschall v. Bieberstein**, s. *Bieberstein*.
- Marsh.** = **Marshal**, Humphrey, schr. Besch. d. wildw. Bäume u. Staudeng. in Nordamer., Lpz. 1738. — *Marshallia* Schreb.
- Martens**, G. v., Kanzl.-Rath in Stuttgart., schr. Monogr. d. Gartenbohnen, 1860, m. Schübler Fl. v. Württemb., 1834.
- Martin**, A., D. Pflanzennamen d. deutsch. Flora etym. erklärt, Halle 1851.
- Mart.** = **Martius**, C. F. Ph. v., aus Erlangen, Reis. in Brasil., dann Prof. in München, † 1868, schr. Hist. nat. Palmarum, 1823—50, Spix u. Mart., Reise in Bras. 1824—31, Fl. Brasiliens., 1837—40. — *Martusia* Schult.
- Mas**, Alphonse, Obstzücht. z. Bourg, † 1875, s. 1863 Herausg. d. pomol. Werkes le Verger, s. 1874 m. **Pulliat** v. le Vignoble.
- Mass.** = **Massalongho**, Prof. z. Verona, † 1860, schr. üb. Flechten u. foss. Pfl. — *Massalonghia* Kbr.
- Masson**, schwed. Reis. u. Samml. am Cap 1786—96 (Orchideen für Lindley), schr. *Stapeliae novae*. — *Massonia* L.
- Maurer**, L. H., Obstz. in Jena, schr. d. Beerenobst unsrer Gärten, Monogr. d. Stachelbeeren, Herausg. d. Cultur- u. Fruchtsträucher v. Fuller (— „d. Fuller Deutschlands“, Rümpler).
- Maximowicz**, russ. Reis. um d. Erde, s. 1853 Conserv. am bot. Gart. z. Petersb., schr. Diagn. plant. nov. asiat. (Mélanges biolog. 1877), Primitiae Fl. Annuensis (Petersb. Akad. 1858). — *Maximoviczia* Rupr.
- Mayer**, schr. *Pomona francoica* (d. Obstsorten Franksens, m. Abb.), 1750. — **Mayer**, J., schr. üb. einheimische Giftgew., üb. essbare Schwämme, Berl. 1801.
- Med.** = **Medicus**, F. K., Reg.-Rath u. Dir. d. Schwetzinger Gartens, † 1808, schr. Philos. Bot., Mannh. 1789—91, üb. Pfl.-Physiol. u. Anatomie, Lpz. 1803, Nordamerik. Bäume etc., 1792, u. a. m. — *Medicusia* Mnch. — **Medicus**, Dr. W., schr. unsre essb. Schwämme, 5. A., Kaiserslaut. 1884.

- Mejer**, Dr. L., in Hannover, schr. üb. d. Deutung d. Pflanzennamen (d. Natur, Halle, Nr. 52, 1881).
- Meisner**, C. Fr., Prof. in Basel, schr. *Plantar. vasc. genera etc.*, Lpz. 1837, Mon. gen. Polygoni, 1825, u. a. — *Meisneria* DC.
- Meister**, G., 1682—87, Reis. in Ostind. u. Japan, Samml. f. d. Prinzen v. Oranien, 1689 in Dresden, schr. *indianischer Kunst- u. Lustgarten*, Dresd. 1690. — *Meisteria* Scop.
- Meneghini**, Prof. z. Pisa, Algolog, schr. *Conspect. Algolog. Euganeae, Paduae 1837*, *Synops. Desmidiarum, Alge italiane e dalmatiche*, 1842—46, u. a.
- Mer.** = **Merat**, F., franz. Arzt u. Bot., † 1851, schr. *Nouv. Fl. des environs de Paris*, 6. A., 1841, *Révue de la Fl. Parisienne* 1843, *Elémens de bot.*, 6. A., 1829, u. a. — *Meratia* Lois., Cass.
- M. K.** = **Mertens u. Koch**, d. erste Prof. in Bremen, † 1831 (s. Koch, Prof. in Erlang.). — *Mertensia* H. B. K.
- Mett.** = **Mettenius**, Prof. z. Lpz., † 1866, schr. *Filices Horti bot. Lipsiens.* 1856, *Rhizocarpeen, Hymenophyllaceen etc.*
- Metzger**, Joh., Gart.-Insp. in Heidelb., dann Dir. d. Landw. Anstalt z. Karlsruhe, † 1852, schr. *Europäische Cerealien*, Mannh. 1824, *Landw. Pflanzenk.*, 1841, *Gartenbuch*, 5. A. 1876. — *Metzgeria* Raddi.
- Meyen**, Prof. in Berlin, † 1840, schr. *Neues Syst. d. Pfl.-Physiologie*, Berl. 1837—39, *Beitr. z. Bot. ges. auf d. Reise um d. Erde*, *Grundr. d. Pflanzengeogr.*, Berl. 1836, u. a. — *Meyenia* Benth.
- E. Mey.** = **Meyer, Ernst H. Fr.**, Prof. in Königsberg, † 1855, schr. *Preussens Pfl.-Gattungen etc.*, 1839, *Comment. de plant. Africae australioris*, ges. v. Drege, Lpz. 1835—37, *Gesch. d. Bot.*, 1854—57, u. a. m. — *Ernestia* DC. — **G. Mey.** = **Meyer, Georg F. W.**, Prof. in Göttingen, † 1856, schr. üb. Flechten, *Fl. hannoverana*, Götting. 1849. — **C. Mey.** = **Meyer, Carl Ant.**, Reis. in Sibir., dann Dir. d. Bot. Gartens z. Petersb., † 1855, schr. *Pflanzen am Kaukasus etc.*, 1831, *Fl. altaica*, *Fl. Prov. Tambow, Wiatka etc.* — *Meyera* Schreb. (-ia) DC.
- Mchx.** = **Michaux**, André u. Andr. François (Vater u. Sohn), franz. Reis., d. erst. † 1804 auf Madagaskar, schr. *Hist. d. chênes de l'Amérique u. Fl. boreali-americana*; **Mchx. f.**, schr. *Hist. des arbres forest. de l'Amér. septentr.*, Paris 1810—13. — *Michauxia* l'Hér. (Mchx. sen.).
- Mich.** = **Micheli**, Insp. d. Gr. Gartens z. Florenz, † 1737, d. grösst. Kryptog. s. Z., schr. *Nova pl. genera*, 1729, *Catal. pl. Hort. Florentini* (Op. posthum. 1748). — *Michelia* L.
- Michelis**, F., schr. d. *Gedanke in d. Gestaltg. d. Pflanzenreichs*, Bonn 1871.
- Miers**, J., Reis. in Südamer., † 1879, schr. *Neue Sippe Brasil.'s, do. Chili's, Cruikshanksia Miers u. a.* — *Miersia* Lindl.
- Mikan**, J. C., schr. *Delectus Flora et Faunae Brasiliensis*, Viennae 1825. — *Mikania* W.
- Mikosch**, schr. üb. *Knospendecken dicotyl. Hölzer*, Wien 1876, üb. *Chlorophyll*, 1878, u. a.
- Milde**, Prof. z. Breslau, † 1871, schr. *Mon. d. Equiseten*, Dresd. 1865, d. höh. *Sporenpfl. Deutschl.'s u. d. Schweiz, Farne etc.*, *Bryologia silesiaca od. Laubmoose Nord- u. Mitteldeutschl.*, Lpz. 1869, u. a.
- Mill.** = **Miller**, Ph., kenntnisr. engl. Gartenbot., † 1771, schr. *Darstell. d. Linné'schen Sexualsystems* (deutsch u. lat. v. Borkhausen, Frankf. 1804), t. *Gardener's Dictionary od. Gartenlexikon* (deutsch v. Huth, 2. A. 1769—76, 9. A. 1807). — *Milleria* L.
- Miltitz**, v., † 1840 in Dresden, schr. *Handb. d. bot. Litteratur*, 1829 (v. M. u. Reichenbach: *Bibliogr. bot.*).

- Miq.** = **Miquel**, Prof. in Utrecht, † 1871, schr. üb. jav., sumatr. u. jap. Flora, Genera Cactearum, 1837, d. Casuarineen in De Candolle's Prodrum, d. Chloranthaceen etc. in Martius' Fl. brasil., u. a. — **Miquelia** Nees.
- Mirbel** (Brisseau-Mirbel), fr. Pfl.-Physiol., † 1854, Mitarb. v. Lamarek (Naturg. d. Pfl.). — **Mirbelia** Sm.
- Moç.** = **Moçino** (u. Sessé), Bearb. d. Fl. Mexicana, † 1819. — **Mocinia** DC.
- Mneh.** = **Mönch** (Moench), Prof. in Marburg, † 1805, schr. Enum. pl. indig. Hassiae praesert. inferioris, 1777, u. a. — **Moenchia** Ehrh., Roth.
- Mössler**, Joh. Christ., schr. Taschenb. d. Bot., Hamb. 1805, Handb. d. Gewächskunde (3. A. v. L. Reichenbach, Altona 1833—34). — **Moesslerera** (-ia) Rehb.
- Mohl**, Hugo v., schr. Vermischte Schrift. bot. Inhalts, Tübingen 1845, Anat. u. Physiol. d. veg. Zelle, 1851, u. a. — **Mohlana** Mart.
- Molina**, J. Ign., Missionär u. Samml. in Chili, schr. Naturb. v. Chili (deutsch v. Brandis, 1786), Saggio sulla Storia nat. del Chili di G. J. Molina, 2. ed., Bologna 1810. — **Molina** Rz. Pr., **Molinia** Schrk.
- Mont.** = **Montagne**, Akad. in Paris, † 1866, schr. Fl. Boliviens., 1839, Cryptog. guyan., 1855, Sylloge cryptog. etc., 1856. — **Mont.** u. **Rob.** = **Montagne** u. **Robin**, Ch. (Prof. in Paris), **Sagra** u. **Montagne**, s. d. — **Montagnaea** (-tanoa) La Ll.
- Monti**, Gius., Prof. z. Bologna, schr. Catal. Stirpium agri Bononiensis Prodr., 1719. — **Montia** L.
- Moq.-Tand.** = **Moquin-Tandon**, Dr. Alfr., Zool. u. Bot. z. Paris, schr. Elém. d. tératolog. végét., 1841, Chenopodearum monogr., 1846. — **Moquinia** DC., A. Spr.
- Morandi**, J. B., schr. Hist. botanices practicae s. plantar. q. ad usum medicinae pertinent deser., Mediolani 1761.
- Morel**, Charl., schr. Orchideenkultur, Leyden 1856. — **Morelia** A. Rich.
- Moretti**, Gius., Prof. z. Batavia, † 1853 z. Pavia, schr. viele Monogr., il botanico ital., 1826, u. a. — **Morettia** DC.
- Morison**, Rob., Prof. z. Oxford, † 1683, schr. Hort. reg. Blesensis (Blois), 1679, Plant. hist. univ., 1680. — **Morisonia** L.
- Morren**, Charl. Fr. Ant., Prof. z. Lüttich, Herausg. d. Annales d. l. Soc. Royale d'Horticulture, mit Van Houtte in Gent Hort. belge bis 1839, s. 1851 Belgique horticole, † 1858. — **Morrenia** Lindl. — **Morren**, Ed., Prof. in Lüttich, Herausg. d. la Belgique hortic., Liège 1850—70, schr. üb. insektentötende Pfl. (in Bull. Acad. roy. Belge 1875), u. a.
- Mougeot**, A., schr. mit **Schimper** Monogr. des Plant. fossiles etc. des Vosges, Strassb. 1840. — **Mougeotia** Ag. u. Kth.
- Mühlenberg**, Geistl. in Pennsylv., † 1817, schr. Catal. Plant. Americ. septentr., 2. A. 1818. — **Muehlenbergia** Schreb.
- Müll.** = **Müller**, O. Fr., dän. Staatsr., † 1784, schr. Fl. Fridrichsdalina, Strassb. 1767, Mitarb. v. Oeder's Fl. danica. — **Muelleria** L. f. — **C.** od. **K. Müller**, Dozent z. Halle, Herausg. d. „Natur“, schr. Bot. Reisen um d. Welt, 2 B., Lpz. 1856/57, Buch d. Pflanzenwelt, 2. A. 1869, Synops. muscor. frondos., 1849—51, de Muscor. Ceylon. collectione, 1863, u. a. — **Herm. Müller**, Reallehrer z. Lippstadt, schr. Geogr. d. Laubmoose v. Westfalen, Blumenbefrucht. durch Insekten, 1873, u. a., † 1883. — **F. Müll.** = **Müller**, Ferd. Bar. v., Bot. z. Melbourne in Australien, schr. Fragm. phytogr. Australiae, Deser. notes on Papuan plants, Melbourne 1877, t. plants indig. to t. colony of Victoria, Melb. 1860—62, mit Bentham Herausg. d. Fl. australis (bereits 6 B.). — **N. J. C. Müller**, schr. Unters. üb. d. Molekular-

- kräfte im Baum (Heidelb. Bot. Unters., IV, 3—5), üb. Einwirk. d. Lichts u. d. strahl. Wärme etc., Heidelb. 1876. — **J. B. Müller**, schr. bot. prosod. Wörterb. nebst Charakter. d. wicht. nat. Pflanzenfam., Brilon 1840, Fl. Waldecens. et Itterensis, Brilon 1841, etc.
- Münchhausen**, O. v., Landdrost. in Kalenberg, † 1774, schr. d. Mutterkorn als Pilz, Hausvater für Baum-Gärtner etc., Hannov. 1765—74, 6 B. — Muenchhausia L., DC.
- Mulder, N.**, Catal. plant. prope urbem Leidam nasc., Lugd.-Bat. 1817.
- Munk**, d. elektr. u. Bewegungerssch. am Blatte d. Dionaea muscipula, Lpz. 1876.
- Munting**, de vera antiquor. herba britann., Amstelod. 1631, Aloidarium, 1680. — Muntingia L., Plum.
- Murr.** = **Murray**, Linné's Schüler, Prof. z. Göttingen, † 1791, schr. Prodr. design. stirpium, Goett. 1770, Opuscula, Apparatus medicaminum, 1772—96, 6 B., u. a. — Murraya L., Kön.
- Musaeum Zeylanicum** s. Catal. plant. in Zeylania sponte nascentium, Lugd.-Bat. 1726.
- Mutel, A.**, schr. üb. neue Orchideen, Fl. Française destinée aux herbarisations, Par. 1834—37.
- Mut.** = **Mutis**, Freund Linné's, Prof. in Madrid, † 1808 z. Santa-Fé in Südamer. — Mutisia L. f.
- Naccari**, Prof. in Chioggia, schr. Algologia adriatica, Bologna 1828, Fl. Veneta etc., Venez. 1826—28.
- Nägeli**, Dr. K., Prof. in Zürich u. s. 1857 in München, schr. Cirsien d. Schweiz, üb. Algen, Beitr. z. wiss. Bot. s. 1858; **N.** u. **Schwendener**, d. Mikroskop, Lpz. 1865—67, Bot. Mitteilungen, u. a. — Naegelia DC., Reg., Ldl.
- Nathusius**, Gottlob, ber. Obst- u. amer. Gehölzzüchter z. Althaldesleben b. Magdeburg. — Nathusia Hochst.
- Naud.** = **Naudin**, Charl., Mitglied d. Instituts in Paris, Gartenbau-Schriftst., schr. z. B. üb. Cucurbitac., 1860/61, Melastomacearum in mus. Paris. Monogr., 1849—53, mit **Decaisne** Manuel de l'amateur des jardins, 4 B.
- Naumburg**, Jos. Sam., Prof. z. Erfurt, schr. Lehrb. d. Bot., 1798. — Naumburgia Mch., W.
- Neandri**, Joh., Tabacologia, Lugd. Bat. 1626.
- Neck.** = **Necker**, Dr. N. J. v. (de Necker) von Lille, † 1793 in Mannheim, schr. üb. Moose, Elem. stirpium Palatinarum, 1768—69 collectarum, Elem. bot., 3 B., 1791. — Neckera Hedw.
- N.** ab **Es.** = **Nees v. Esenbeck**, Chr. Gottfr., Prof. in Bresl., † 1858, schr. üb. Algen u. Pilze, Farne, Lebermoose, mit Weihe d. deutsch. Brombeerstr., m. Walker-Armott u. De Candolle Fl. Peninsulae Ind. Orient. — **N. M.** = **Nees u. Martius**. — Esenbeckia St. Hil., Kth., Blum. — **Nees v. Esenbeck**, Th. Fr. L. jr., d. vor. Bruder, Prof. z. Bonn, † 1837, schr. Syst. d. Pilze, Plantae officinales fortg., Genera pl. Fl. German. fortg. v. Puterlick, **Nees v. Es.**, Th. u. **Sinning**, Samml. schön blüh. Gew. f. Blumen- u. Gartenfreunde (100 kol. Taf.), Düsseldorf. 1825. — Neesia Spr. (od. sen.?).
- Neill**, Dr. Patrick, Secr. d. Garten-Ges. z. Edinb., schr. üb. Algen, t. fruit-, flower- and kitchengarden, Edinb. 1840, † 1851. — Neillia D. Don.
- Neilreich, A.**, schr. d. Vegetationsverh. v. Croatien, Wien 1863, Nachtr. z. Fl. v. Nied.-Östr., Wien 1866, u. a.
- Nestler**, Prof. in Strassb., † 1832, schr. Index plant. in horto acad. Argentiniensi etc., 1818, u. a. — Nestlera DC.

- Neubert**, Dr. W., Bot. in Tübing. u. Stuttg., s. 1848 Herausg. d. Deutsch. Magaz. f. Garten- u. Blumenk. (üb. 33 Jahrg.).
- Neuenhahn**, d. Blumenzwiebelgärtner, 2 B., Lpz. 1804.
- Neuwied**, Max Prinz v., 1813 Reis. in Brasilien, schr. Reise nach Bras. v. 1813—17, Frankf. 1819 u. 20, Abbild. z. Naturg. Bras., Weimar 1823—31 u. Beitr. z. Nat. Bras., Weimar 1824—34.
- Newmann (Neumann)**, E., schr. Hist. of british ferns, Lond., 4. A. — *Neumannia* Brongn., Rich.
- Nicot**, Jean, franz. Gesandt. in Portugal, führte 1560 Samen u. 1564 das Rauchen d. Tabaks in Europa ein. — *Nicotiana* L.
- Niebuhr**, Karsten, mit Forskal Reis. im Orient, 1762—65, schr. Fl. aegypto-arabica, † 1815. — *Niebuhria* DC.
- Nieremberg**, Joh. Euseb., Prof. z. Madrid. † 1563, schr. Hist. naturae maxime peregrinae. — *Nierembergia* R. P.
- Nitschke**, Th., Prof. in Münster, schr. *Pyrenomycetes Germaniae*, Bresl. 1867—69, u. a. — *Nitschkea* Otth.
- Nitzsch**, C. L., schr. üb. Infusorien. — *Nitzschia* Hass.
- Niven**, Ninian, schr. t. visitor's companion to t. bot. gard. Glasnevin, Dublin 1838. — *Nivenia* R. Br., Becc.
- Nocca**, Domenico, Prof. z. Pavia, schr. *Ticinensis horti acad. pl. selectae*, Ticini 1800, u. a. — *Nocca* Cav., *Noccae* W., Rchb.
- Nöggerath** u. C. G. Nees v. Esenbeck, Rhizomorphen in d. Steinkohlenklüften, Nögg. üb. foss. Baumst., Bonn 1821.
- Noisette**, Ph., Obergärtin. z. Paris (Obstbau-Schule Fontenay-aux-Roses), schr. le Jardin fruitier, 1813 f., † 1849. — *Rosa Noisettiana* (sc. indica, Noisette-R.). — *Noisette*, Claude (Bruder), Gärtin. in Amerika. — *Noisettia* H. B. B.
- Noll**, F. C., d. Thal v. Orotava auf Teneriffa etc., Bresl. 1872.
- Nolte**, Prof. in Kiel, schr. *Novitates Fl. Holsaticae*, 1826. — *Zostera Noltei* Hornem.
- Nordmann**, A. v., schr. *Symbölae ad Cryptogamas Trans-Caucasi* 1849. — *Nordmannia* Fisch., Mey., *Abies* s. *Picea Nordmanniana* Loud.
- Nor.** = **Noronha**, span. Bot. u. Reis. n. d. Philippinen, † 1787 auf Isle de France, schr. Prodr. phytologicus ined. — *Noronhia* Thouars.
- Not.** = **de Notaris**, Gius., s. 1872 Prof. in Rom, † 1877, schr. *Syllab. muscorum* etc., 1838, *Fl. Ligustica* 1844, *Musci italici* 1863, *Desmidiaceae italiche* 1867, *Briologia italiana* 1869, u. a. — *Notarisia Colla* etc.
- Nutt.** = **Nuttall**, Prof. z. Philadelphia u. Reis. in Nordwest-Amerika, † 1859, schr. t. *Genera of N.-Americ. plants*, 1818, *N.-Amer. Sylva*, 1842—54. — *Nuttallia* Dicks.
- Nyl.** = **Nylander**, W., Prof. z. Helsingfors in Finnland, g. 1823, schr. Prodr. Lichenogr. Galliae et Algeriae 1857, *Lichenes Scandinaviae*, 1861, *Lich. Novae-Caledon.* 1868, u. a. — **Nylander**, A. E., schr. *Alands laf-vegetation* 1856, u. a.
- Nym.** = **Nyman**, C. F., schr. *Sylloge Fl. Europaeae, Oerebroae* 1854—65 (Örebro in Schweden).
- Oberdiek**, J. G. C., Pred. u. Superintend. z. Jeinsen (Hannov.), schr. (holländ.) üb. d. Erfrieren d. Obstbäume etc. (deutsch 1872), Beitr. z. Hebung d. Obstkultur v. Oberdiek u. Lucas, 1875, u. a., † 1879.
- Oeder**, G. Chr. v., Landvogt in Oldenburg, † 1791, Herausg. d. *Fl. danica* 1761—1871 (16 B., wird fortg.), *Elementa botanicae* 1764—66. — *Oedera* Crantz.
- Oersted**, Andr. Sandöe, Prof. d. Bot. z. Kopenh., † 1872, schr. *Syst. d. Pilze, Lichenen u. Algen* (deutsch v. Grisebach u. Reinke, 1873),



Palmae centro-american., Kopenh. 1858, Myrtaceae centr.-amer., plantae novae cent.-am. etc.

- Oliver**, D., schr. Fl. of tropic Africa, Lond. 1877, Guide to t. roy. bot. gardens Kew, Lond. 1865, u. a. — Oliveriana (g. n.) Rchb. f.
- Oliv.** = **Olivier**, Prof. z. Aalfort, † 1814 z. Lyon, Reis. mit Brugière n. Ägypt. u. Persien, schr. Voyage dans l'Empire Othoman etc., 1801—07. — Oliviera Vent.
- Orbigny**, Alcide, schr. Voyage en l'Amérique mérid. pend. 1826—33 par Alcide d'Orbigny. — Orbignya Mart.
- Ort.** = **Ortega**, Casimir Gomez, span. Bot. u. Dir. d. bot. Gart. z. Madrid, † 1818, schr. Tabulae bot. 1773, u. a. — Ortega L. (-gia Löfl.). — **Ortega**, José, Apoth., † 1761.
- Osbeck**, Pehrson, schwed. Bot., Almosenier in Ostind. u. China, † 1805 Probst in Gothland, schr. Dag-bock ofve en ostindisk resa. — Osbeckia L.
- Otto**, K. Fr. Ed., g. 1812, Red. d. Hamb. Gart.- u. Blumen-Zeitg., Reis. n. Cuba etc., schr. Reise-Erinnerungen an Cuba, Nord- u. Südamer. 1838—41. — **Otto**, Christoph Fr., k. pr. Gart.-Dir. z. Berlin 1805—43, mit Dietrich Begr. d. Allg. Gartenzeitg., 1833, schr. Pl. rar. in horto Berolin. — Ottonia Miq., Spr., Ottoa Kth. — **Otto**, E. v., schr. Addidamente z. Flora d. Quadergebirgs in Sachsen, Lpz. 1854.
- Oth.** Gust., Pilzforsch. d. Schweiz. — Otthia Nitschke.
- O. W.** s. Wünsche.

- P.-B.** = **Palisot de Beauvais**, Akad. z. Paris, Reis. in Afrika u. Nordamerika, schr. Essay d. nouv. Agrostographie, 1812, Fl. d'Oware et de Bénin en Afrique, 1804—07, Muscologie 1822.
- Pall.** = **Pallas**, k. russ. Staatsr., † 1811 in Berlin, schr. Reise durch d. russ. Reich 1771—76, Fl. rossica 1784—1815, Specim. Astragalorum, 1802, u. a. — Pallasia L., Ait.
- Pancovii** Thom. herbarium portatile od. behendes Kräuter- u. Gewächsbuch, Cöln a. d. Spree 1673. — Pancovia W.
- Panz.** = **Panzer**, Arzt in Hersbruck, † 1829, schr. Revis. d. Gräsergatt. 1813, ostind. Brotbaum, Nürnberg. 1783. — Panzera W., Gm.
- Pappe**, Dr., schr. Synops. pl. phan. agro Lipsiensi indigenarum, Lpz. 1828. — **Pappe**, Dr. med. L. in Hamb., Capreisend. 1830—54, schr. Silva Capensis, a descr. of t. South-African forest-trees, Cape-Town 1854, **P.** u. **Rawson**, Synops. Filicum Afr. austr. 1858. — Pappae Eckl.
- Paracelsus** 1493—1541, eig. Theophrastus Bombastus v. Hohenheim, Paracelsi Theophr. paragraphorum libri XIV, Argentorati 1536. — Theophrasta (-stea) L.
- Parlatore**, Filippo, Prof. z. Florenz, schr. Rar. plant. in Sicilia etc., Fl. Panormitana 1839, Fl. italiana 1848—69, u. a.
- Parnell**, Rich., schr. t. grasses of Scotland, Edinb. 1842, t. grasses of Britain, 1845.
- Passerini**, Giov., Prof. in Parma, schr. Fl. Italiae superioris etc., 1844, Esposizione florale univ. di Amsterdam, Milano 1865, u. a., s. Cesati.
- Passow**, schr. d. Pflanze u. d. Luft, Stralsund 1861, Grundr. d. Bot., Strals. 1861.
- Pasteur**, Louis, Akad. z. Paris, schr. Gährungspilze etc. (in Comptes rendus u. Ann. de chimie).
- P. M. E.** = **Patze**, **Meyer** u. **Elkan**, schr. Flora d. Prov. Preussen, 1850 (Patze, C., Stadtrat in Königsb.).
- P. Br.** = **Patrick Browne**, irisch. Bot., † 1790 (schr. d. Pfl. v. Jamaika in t. civil and natur. history of Jamaica, 1756). — Brownea Jacq.

- Paullini**, C. F., schr. *Sacra herba s. nobilis Salvia descripta*, Aug. Vind. 1688. — *Paullinia* L.
- Pv.** = **Pavon** (Ruiz u. Pavon), Reis. in Peru u. Chili 1777—88, Herausg. d. *Flora Peruviana*. — *Pavonia* Cav.
- Paxton**, Jos., engl. Bot., schr. *A Pocket bot. dictionary*, 2. A., Lond. 1853, Herausg. d. *Magazine of Bot.* 1834—49 u. *Flower-Garden* 1850—52. — *Paxtonia* Lindl.
- Payen**, franz. Bot., schr. *sur la nature etc. de la Canne à sucre*. — *Payena* Kurz.
- Payer**, franz. Bot., schr. *Fam. d. Nitrariées, Morées et Anacardiées*, 1844, des *Ficoidées et d. Cactées*, 1851, *Bot. cryptog.*, Paris 1850.
- Pepin**, Pierre Denis, Ob.-Gärt. d. Par. Mus., schr. *Beitr. in Bon Jardiniér, Revue hortic. etc.*, † 1876.
- Pereboom**, N. E., schr. *Materia vegetabilis systemati pl.*, Lugd.-Bat. 1787/88.
- Perleb**, C. J., Prof. in Freiburg i. Br., schr. *de horto Friburgensi* 1829, *Lehrb. d. Naturg. d. Pflanzenreichs*, Freib. 1836, *Clavis classium etc.*, Friburg. 1838. — *Perlebia* Mart., DC.
- Perring**, W., Insp. d. Bot. Gart. in Berl., Mitherausg. d. *Gart.-Zeitg.* (Berl. 1885, IV. J.).
- P., Pers.** = **Persoon**, geb. z. Capetown, † 1837 z. Paris, Arzt u. Bot., schr. *C. a Linné Syst. Veget.*, *Syn. meth. fungorum*, Gött. 1801 etc. — *Persoonia* Sm., Mchx.
- Petermann**, W. L., d. Pflanzenreich in vollst. Besch. all. wicht. Gew. (282 T.), Lpz. 1857, *Taschenb. d. Bot.*, Lpz. 1842, *Deutschl.'s Flora* (100 T.), Lpz. 1846—49.
- P.-Th. od. Pet.-Th.** = **Petit-Thouars**, L. M. Aubert du, Dir. d. Baum-schule z. Paris, † 1831, schr. *Hist. d. végét. rec. dans l. îles austr. d'Afrique*, 1806, *Arbres fruitiers*, 1815, *les Orchidées d'Afr.*, 1822, u. a. — *Petitia* Schreb., Jacq., *Thouarsia* Vent., *Aubertia* Bory.
- Pet. gaz.** = **Petiver**, schr. *Gazophylacium („Schatzkammer“)* s. *Opera hist. naturalem spectantia*, Lond. 1764. — *Petivëra* (-ia) L., Jacq.
- Pfeffer**, Prof. in Tübing., schr. *Osmotische Unters.*, Lpz. 1877, *period. Beweg. d. Blattorg.*, Lpz. 1875, u. a.
- Pfeiffer**, Dr. L., Arzt u. Bot. z. Cassel, † 1878, schr. *Enum. diagn. Cactearum etc.*, Berol. 1837, *Fl. v. Niederhessen*, 1847—55, *Synonyma bot. generum etc. ad finem* 1858, *Kassel* 1870, *Nomenclator bot.*, 4 B., Kassel s. 1872.
- Planchon**, J. E., Prof. z. Montpellier, s. 1845 Herausg. d. *Flore des Serres et d. jardins de l'Europe*, Gand (Gent).
- Planer**, Prof. z. Erfurt, schr. *Fl. v. Erfurt*, Übers. v. Linné's *Gener. plant.*, 2 Th., Gotha 1785. — *Planëra* Gm., Mchx.
- Plenk**, J. J., Anfangsgr. d. bot. Terminologie, Wien 1798.
- Plinius** (C. Plinius secundus), † 79 n. Chr., röm. Naturf., schr. *Hist. naturalis*, 37 B. (herausg. v. Detleffen, Berl. 1866—71). — *Plinia* L.
- Plinius indicus** s. Rumpf (Rumphius).
- Plum.** = **Plumier**, Charl., franz. Reis. in Westind., † 1704 in Cadix, schr. *Filicetum amer.*, Paris 1703, *Plant. amer. quas olim Car. Plumierus detexit etc.* (herausg. v. Burmann, Amsterd. 1755—60). — *Plumiera* T. (-meria) L., Pers.).
- Pöpp.** = **Pöppig**, Dr. Ed. Fr., Reis. u. Prof. in Leipzig, † 1868, schr. *Nova gen. et spec. pl. q. in regno Chilensi etc. legit Ed. Poeppig et cum Steph. Endlicher descr.*, Lps. 1835—45, 3 B.
- Pohl**, deutsch. Bot. u. Reis. in Brasil., dann Prof. in Wien, † 1834, schr. *Tent. Fl. Bohemiae*, 1810—15, *Plant. Brasil. icon. et descr.*, Lpz. 1835—45, 3 B. — *Pohlia* Hedw., *Pohlana* Mart.

- Poir.** = **Poiret**, J. L. M., franz. Bot., † 1834 in Paris, schr. Voyage en Barbarie, 1789, Hist. philos. d. pl. d. l'Europe, 1825—29. — *Poirertia* Vent., Cav.
- Poit.** = **Poiteau**, M. A., franz. Zücht. u. Reis. auf St. Domingo, gründ. 1829 d. Revue horticole, Paris, Red. d. Ann. d. l. Soc. centr. d'Horticult., **P.** u. **Turpin**, Fl. Paris., 1808—13, **P.** u. **Risso**, hist. nat. des orangers, 1818—19, † 1854. — *Poitea* DC. (-tea Vent.).
- Pollich**, Arzt u. Bot. z. Kaiserslautern, † 1870, schr. Hist. pl. in Palatinatu etc., 1776/77, Gründ. d. Pfälz. Ges. Pollichia. — *Pollichia* L., Roth, Med.
- Pollini**, C. (Pollinius), schr. Fl. Veronensis, Veron. 1822—24. — *Pollinia* Spr.
- Pontedera**, J., schr. Anthologia s. de floribus natura l. III, Patav. 1720. — *Pontederia* L.
- Pott**, Hofr. in Braunschweig, † 1805, schr. Index herbarii mei vivi (herausg. v. Helwig, Braunschw. 1805). — *Pottia* Ehrh.
- Prantl**, Prof. z. Aschaffenburg, schr. Lehrb. d. Bot., Lpz. 1874 u. 76, Mitth. in Dr. Leimbach's deutsch. bot. Monatsschr. u. a.
- Pratt**, Anne, schr. t. flowering plants, ferns, grasses and sedges of Gr.-Britain (7 H.), Lond. 1861.
- Preiss**, Balth., Prof. in Prag, schr. Rhizographia, Prag 1823. — *Preissia* Nees.
- Presl**, Prof. in Prag, † 1852, schr. Deliciae Pragenses 1822, Reliquiae Haenkeanae, redig. Prag 1825. Fl. sicula, 1826, Tent. Pteridographiae, 1836, Hymenophyllaceae, 1843, Epimeliae bot., 1849, u. a. — *Preslea* (-laea) Mart., -lia Opiz.
- Preuss**, Apoth. u. Sanitätsr. z. Hoyerswerda, † 1855, schr. üb. Pilze in Sturm's Fl. Deutschl., Übers. untersucht. Pilze etc., Halle 1851. — *Preussia* Fuck.
- Pringsheim**, N., Prof. in Berl., Herausg. d. Jahrb. d. wiss. Bot. s. 1857, namh. Pfl.-Physiolog etc.
- Pritchard**, Steph. F., schr. alphab. list of indig. et exotic pl. at St. Helena, Capetown 1836. — *Pritchardia filifera* J. Lind.
- Pritzels**, Cust. d. k. Bibl. z. Berlin, † 1874, schr. Anemonar. Revis. 1842, Icon. bot. index etc., 1855, Thesaurus liter. bot. omn. gent., 2. A. 1872.
- Pulteney**, Rich., schr. Hist. and biogr. sketches of t. progress of Botany in England, Lond. 1790. — *Pultenaea* Sm.
- Pursh**, F., engl. Bot. u. Reis., † 1820 in Canada, schr. Fl. Americae septentrionalis, Lond. 1816. — *Purshia* Spr., DC.
- Pynaert**, Ed., belg. Gärtn. aus Gent, schr. Manuel d. l. cult. forcée des arbres fruitiers, 1861, Mitred. d. Fl. d. Serres, v. Abbé Dupuy's Abeille pomologique etc.
- Quer**, schr. üb. d. Literat. d. Botanik Spaniens, 1762. — *Queria* Löffl.
- Rbh.** = **Rabenhorst**, Ludw., ber. Kryptog. in Meissen, schr. Fl. lusat. 1839—40, üb. Algen, Moose, Lebermoose etc., z. B. in Deutschlands Kryptogamenflora (2 B., Lpz. 1844—53), Herausg. d. Hedwigia s. 1852. — *Rabenhorstia* Fr.
- Raddi**, Gius., ital. Bot. u. Reis. in Brasil., † 1829, schr. Jungermannioogr. etrusca, 1820, Pl. brasil. etc., I. Filices, 1824. — *Raddisia* u. *Raddia* Leand., *Raddiana* Raf.
- Rademacher**, Jac. Corn., schr. Naamenlyst der planten op het eiland Java, Batav. 1780—82. — *Rademachia* Thb.

- Radlkofer**, L., Prof. in München, schr. Krystalle pfl. u. tier. Ursprungs, Sapindaceen, 1875, d. Befrucht. d. Phanerogam., Lpz. 1856, u. a.
- Raf.** = **Rafinesque-Schmalz**, Prof. in Nordamer. u. Reis., † 1840, schr. Medic. Fl. of t. United-States, 1830, New Flora and Bot. of N.-Amer., 1836.
- Rafn.** dän. Bot., schr. Entwurf einer Pfl.-Physiologie, Kopenh. 1798 (deutsch v. Markussen). — *Rafnia* Thb.
- Ram.** = **Ramond**, Bar. v. (R. de Carbonnières), Prof. u. Staatsr., † 1827 z. Paris, schr. Observ. d. l. Pyrénées, 1789, Voyage au Sommet du Mont Perdu, 1807. — *Ramondia* Rich.
- Ratzeburg**, Prof. z. Neust.-Eberswalde, † 1871 z. Berlin, schr. d. Unkräuter v. Deutschl., 1859, (Brand u. Ratzeb.) die deutsch. Giftgew., 1838 (2. Abt. Kryptog. v. Phoebus). — *Ratzeburgia* Wall.
- Rauwolff**, Leonh., Arzt u. Reis. im Orient, schr. Fl. orientalis (Besch. d. Reise im Morgenland). — *Rauwolfia* L. u. D. Don
- Ray** (Wray) od. **Rajus**, engl. Pred. u. Naturf., † 1705, schr. Catal. pl. c. Cantabrigiam nasc., 1660, Pl. Angliae, 1670, Hist. plant., 1686—1704, Method. plant., gramin., juncor. etc., Lond. 1703. — *Rajania* L.
- R. Br.** = **Rob. Brown**, s. d.
- Ré**, Giov. Francesco, † 1833 in Turin, schr. le Iride coltivate, Padovae 1823, Fl. Segusiana, 1805, Fl. Torinese, 1825. — Rea Bert. u. Reana Brign. — **Ré**, Filippo, † 1817 in Reggio, schr. Saggio teoretico-pratico sulle malattie delle piante, 1807.
- Rebender**, C., schr. de olei resinaeq. proferendorum organis etc., Bonn 1865.
- Rehentisch**, Arzt z. Landsberg a. d. W., † 1810, schr. Prodr. Fl. neu-marchicae, 1804, Index pl. c. Berolin. nasc. 1805.
- Red.** = **Redouté**, Pierr. Jos., Cabinetsmal. Ludw. XVI, † 1840, schr. Liliacées, Par. 1802—07, **R. u. Thory**, l. Roses 1817—20, Choix d. plus belles fleurs, 1827, u. a. — *Redoutea* Vent.
- Reg.** = **Regel**, Dr. Ed. v., 1837—39 in Bonn, Fl. Bonnensis, 1842 in Berlin, dann Dir. d. bot. Gart. in Zürich, gab 1843 mit Osw. Heer d. Schweizer Gart.-Zeitschr., 1852 d. Gartenflora heraus, 1855 Dir. d. bot. Gartens in St. Petersburg (v. Trautvetter's Nachf.), schr. mit E. Ender Zimmergärtnerei 1863, m. Herder Index seminum q. hort. bot. imper. Petropol. etc. offert, 1860—62, Tent. Fl. ussuriensis, Fl. v. Ostsibir. u. Turkestan, Dendrologie Russl.'s, u. a. — *Regelia* Planch.
- Reichard**, Joh. Jac., Arzt u. Bot. z. Frankf. a. M., † 1789. — *Reichardia* Roth.
- Reichardt**, H. W., Cust. am bot. Cabin. z. Wien, schr. üb. Gefässbild. d. Farne, 1859. — **Reichardt**, Ed., de plantar. partibus anorganicis, 1856.
- Rehb.** = **Reichenbach**, G. Ludw., Prof. etc. z. Dresden, vorz. Florist, Gründ. eines Systems, Herausg. v. Mössler's Handb. d. Gewächsk., 2. A., 1827—39, schr. Iconogr. bot. 1823—32, u. a. — *Reichenbachia* Spr. — **Reichenbach**, A. L., schr. Bot. f. Damen, Lpz. 1854. — **Rehb. f.** = **Reichenbach filius**, H. Gust., s. 1864 Prof. etc. z. Hamburg, schr. Xenia orchidaceae od. Beitr. z. Orchideenkunde, Lpz. 1858, Beitr. z. syst. Pflanzenk., Lpz. 1871, u. a. — **Reichenbach, v.**, schr. d. Pflanzenwelt in ihrer Bezieh. z. Sensivität u. z. Ode, Wien 1858.
- Reimar (-us)**, Herm. Dietr., schr. Diss. animadv. quasd. de Opii etc. usu exhib. 1784. — *Reimaria* Flügge.
- Reinw.** = **Reinwardt**, Prof. z. Leyden, Reis. in Indien, † 1854, schr. üb. d. Veget. d. Inseln im indisch. Archipel, Berl. 1828. — *Reinwardtia* Spr., Dumort.
- Relhan**, R., schr. Fl. Cantabrigiensis, Cantabr. 1820. — *Relhania* Gm., l'Hér.

- Reneaulme**, Paul de (Renealmus), † 1624 in Blois, schr. Specim. Hist. plant., Parisiis 1611. — *Renealmia* R. Br.
- Req.** = **Requien**, Bot. in Avignon, z. B. Helxīne Req. — *Requienia* DC.
- Retz.** = **Retzius**, Prof. in Lund, † 1821, schr. Fl. Scandinaviae Prodr. Ed. 2, Lps. 1795. — *Retzia* L., Thb.
- Rheede**, Heinr. van Rheede tot Drakenstein, Gouvern. v. Malabar, schr. Hort. ind. malabar., Amsterd. 1678—1703. — *Van Rheedia* Plum., *Rheedia* Pers.
- Rich.** = **Richard**, L. Cl. Mar., Prof. d. Bot. z. Paris, für Ludw. XVI. Reis. u. Samml. in Guiana, † 1821, schr. Analyse du fruit 1803, Comment. de Coniferis et Cycadeis (publ. p. A. Richard, 1826), de Musaceis (do. 1831), Fl. boreali-amer. 1803, u. a. — *Richardia* Kth., Houst. — **Rich. f. od. A. Rich.** = **Achilles Richard** Sohn, Prof. z. Paris, † 1852, schr. Nouv. élém. d. bot. et physiol. vég. 1819 (deutsch v. Kittel), Botanique médicale 1823 (deutsch v. Kunze u. Kummer), Monogr. d. Orchidées (Herausg. von d. Vaters Werken).
- Risso**, J. A., Prof. z. Nizza, † 1845, schr. Hist. nat. de l'Europe mérid. 1826—28, (mit Poiteau) Hist. nat. des Orangers, Fl. de Nice, 1844, u. a.
- Rivière**, A., Chef d. Luxembourg-Gartens z. Paris, † 1877, schr. unvollend. ill. Werk üb. Obstbaumkultur, üb. Orchideen, u. a. — *Riveria* H. B. K.
- Riv.** = **Rivinus** (Bachmann), Prof. z. Leipzig, † 1723, schr. Introd. general. in rem herbar. 1690, Ordo plantar. 1690—99. — *Rivina* L. (-nia) Juss.
- Robin**, Jean, Henri IV. Gärtn., schr. mit Vallet 1608 le jardin du Roy très chretien Henri IV. — *Robinia* L. — **Robin**, Vespas. Sohn, Arborist am Jard. d. Plantes, schr. Enchiridion du Jard. royal, führte *Pseud-Acacia* Tourn. (*Robinia* L.) ein. — **Rob. u. Raf.** = **Robin** u. **Rafinesque**, schr. Fl. of Louisiana, N.-York 1817. — **Robin**, Charl., Prof. d. Med. z. Paris, schr. Hist. nat. d. végét. parasites sur l'homme et l. anim. vivantes, 1853.
- Rochel**, Ant., † 1847 in Graz, schr. Plantae Banatus rarae, 1828, u. a. *Rochelia* Lam., Don.
- Roehl.** = **Roehling (Röhling)**, Pfarr. z. Messenheim (Hessen), † 1813, schr. Fl. Deutschlands, 2. A., Frankf. 1812 (neu v. Mertens u. Koch, 3 A., 1823—39), Deutschl.'s Moose, Brem. 1800, u. a.
- R. S. od. R. u. Sch.** = **Römer**, J. J. u. **Schultes**, erst. Prof. in Zürich u. Landshut, † 1819, **R. u. Schultes**, Herausg. v. Car. a Linné Syst. veget., 16. A., 1817—30. **R. u. Usteri**, Magaz. f. Bot. 1785—90, **Römer**, J. J., Archiv f. Bot., 1796—1805, Fl. Europaea, Nürnberg. 1797, Collectanea ad rem bot. spect., Turici 1809. — *Roemeria* Med., Thb. — **Römer**, F. A., Bergr. z. Clausthal, schr. Algen v. Deutschl., 1845, Versteiner. d. Harzgeb.'s, 1843. — *Roemeria* Raddi.
- Roep.** = **Roeper (Röper)**, Prof. z. Rostock, schr. Enum. Euphorbiarum etc., 1824, zur Flora Mecklenburgs, 1843—44, Vorgefasste botan. Meinungen verteid., Rostock 1860. — *Roepera* A. Juss. (-ria) Spr.
- Roscoe**, W., Gelehrt. b. Liverpool, † 1831, schr. üb. Scitamineae, 1828. — *Roscoea* Sm.
- Rossmässler**, E. A., † 1856, schr. mikroskop. Blicke etc., Lpz. 1852, d. Wald (illustr. Werk), Lpz. 1863, u. a.
- Rostafinski**, Thom. v. aus Warschau, s. 1869 Prof. z. Strassb., schr. Syst. d. Mycetozoen, Strassb. 1873, Fl. Polonicae Prodr. 1873, u. a.
- Rostkovius**, Mediz.-R. in Stettin, schr. üb. Pilze in Sturm's Flora 1840, mit **Schmidt** Fl. Sedinensis, 1828. — *Rostkovia* Desv.
- Rostrup**, Seminarlehr. auf Fünen, schr. üb. Brandpilze, blütenlose Pfl. etc., m. Deichmann **Branth** Lichenes Daniae etc., 1870.

- Roth, A. W.**, Arzt z. Vegeſack b. Bremen, † 1834, ſchr. Bot. Abhandl., Nürnberg. 1787, Catalecta bot. etc., 1797—1806, Tentam. Fl. German. 1788—1800, Manuale bot. 1830, u. a. — *Rothia* Pers., Schreb., Lam.
- Rxb.** = **Roxburgh, W.**, Reis. in Ostind., Arzt u. Dir. d. bot. Gart. in Calcutta, † 1815, Oberbot. in Edinburgh, ſchr. Pl. of t. coast of Coromandel 1795—1819 (herausg. v. Banks), Fl. indica, 1832 (3 B.).
- Royle, John Forbes**, Dir. d. bot. Gart.'s z. Saharumpore in Ostind., dann Prof. in Lond., † 1858, ſchr. üb. indische Pfl., an essay on t. antiquity of Hindoo-medicine, Lond. 1837, on Caoutshouc and Sarsaparilla, Lond. 1838, u. a. — *Roylea* Wall.
- Rudbeck, O.**, ſchwed. Prof. d. Bot. in Upsala, ſchr. Propagatio plantarum, Ups. 1686. — *Rudbeckia* L.
- Rudolphi, Fr.**, ſchr. üb. Algen (in *Plantae Ecklonianae*). — *Rudolphia* W.
- Rücker, Sig.**, ber. engl. Blumist, bes. Orchideen, Camellien u. Azaleen, † 1875. — *Rückeria* DC.
- Ruëllius, J.**, ſchr. de natura stirpium, Fol., Basileae 1543. — *Ruëllia* L.
- Rümpſer, Th.**, Gen.-Secr. d. Gartenbau-Ver.'s z. Erfurt, ſchr. d. Zimmergärtnerlei, Berl. 1877, Vilmorin's Blumengärtn., 2. A., 1878, Ill. Gartenbau-Lexikon, Berl. 1880—82.
- R. P., Rz. Pv.** = **Ruiz u. Pavon** (s. Pavon), span. Bot., d. erst. † 1815 in Madrid, beide 1779—88 Reis. durch d. span. Amerika, ſchr. Quinologia 1792, Fl. Peruviana et Chilens., 1798—1802. — *Ruizia* Cav., Schreb., Pers.
- Rumpf (Rumphius)** aus Hanau, lang auf Amboina (Molukken), gen. *Plinius indicus*, † 1702, Burmann's Herbar. amboinense 1741—55 als dess. Nachlass. — *Rumphia* L.
- Rupp, Bernh.**, ſchr. Fl. Jenensis, Tref. 1718. — *Ruppia* L.
- Rupr.** = **Ruprecht, F.** aus Prag, Reis. im Kaukasus, 1860—61, dann Cust. etc. in St. Petersburg., † 1870, ſchr. Flores Samojedorum 1845, Algae Ochotenses 1850, Fl. ingrica 1860, u. a. — *Ruprechtia* E. Mey.
- Russell, Patrick**, Roxburg's Vorgäng. b. d. Exped. in Coromandel. — *Russelia* Jacq., Schreb. — **Russell, Lord John**, Herz. v. Bedford, legte an Arboretum Woburnense (bes. Weiden-Cultur). — *Bedfordia* DC.
- Saccardo, P. A.**, Herausg. d. *Michelia*, Commentar. mycol. etc. (Jahrg. 1874—82), Berlin.
- Sachs, Jul.**, s. 1868 Prof. z. Würzb., namh. Pfl.-Physiolog, ſchr. Lehrb. d. Bot., 4. A., Lpz. 1874, Gesch. d. Bot. 1875, Arb. d. bot. Institut. in Würzburg s. 1873, u. a.
- St. Hil.** = **Saint Hilaire** s. Hilaire.
- Sadler, J.**, ſchr. de Filicibus veris Hungariae, Transsylvaniae, Croatiae et Litoralis hung., Budae 1830. — *Sadleria* Kaulf.
- Sagra, Dir.** d. bot. Gart. in Havannah, u. **Montagne**, ſchr. üb. Pfl. v. Cuba in Hist. phys., polit. et natur. de l'île de Cuba p. Ramon de la Sagra etc., 1823—35 (bearb. v. A. Richard). — *Sagraea* DC.
- Sal.** = **Salisbury**, Rich. Anth. (eig. Markham), Gärtn. u. Mitgl. d. Linné'schen Ges. in London, † 1829, ſchr. Icones Stirp. rar., 1791, Paradisus Londinens. 1806—07, üb. Zapfenbäume etc., 1816. — *Salisburya* Sm.
- Sanio, Dr. C.**, Pfl.-Anatom, ſchr. Unters. üb. d. Epidermis u. Spaltzellen d. Equisetac., Halle 1858, üb. Holzzellen (Bot. Zeit. 1863), Florula Lycensis, Hal. 1858, u. a.
- Sassi, ital.** Prof. d. Bot., ſchr. üb. Lebermoose (*Dichlamys* etc.). — *Sassia* Mol., Juss.

- Sauvages**, Prof. z. Montpellier, † 1767, schr. Syst. d. Pfl. nach d. Blättern. — *Sauvagea* Neck., -vagesia Jacq.
- Savi**, Gaët., Prof. z. Pisa, † 1844, schr. Fl. Pisana 1798, *Materia med. veget. toscana*, 1805, *Bot. etrusca* 1808—25, *Fl. italiana* 1818—24, u. a. — *Savia* Raf.
- Schacht**, Herm., Prof. in Bonn, † 1864, *Lehrb. d. Pfl.-Physiol. u. Anatomie*, Berl. 1856—59, *d. Spermatozoïden im Pflanzenr.*, 1864, u. a.
- Schaeffer**, J. Chr., Superintend. z. Regensb., † 1790, *Fungor. Bavariae et Palatin. Icones*, 1762—74. — *Schaefferia* Jacq.
- Schärer**, Pred. in Belp (Cant. Bern), † 1853, schr. *Lichenum helvet. spicilegium*, 1823—42. — *Schaereria* Kbr.
- Schauer**, J. K., schr. *Chamaelauciae*, *Comm. bot. Vratisl.* 1841, de *Regelia*, *Beaufortia* et *Calothamno*, *Vrat.* 1843, u. a.
- Scheele**, Adolf, Pfarr. u. Bot. b. Hildesheim, † 1864, schr. *Fl. von Texas*.
- Scheidw.** = **Scheidweiler**, M. Jos., aus Köln, † 1861 z. Gent, 1838 *Red. d. Horticole belge*, schr. *les plantes et leur vie*, *Cours raisonné d'agricult. etc.*, Bruxell. 1841—43, *Bearb. d. Cacteen* u. a.
- Schenk**, A., Hofr., s. 1868 Prof. in Leipzig, schr. *mehreres üb. foss. Flora*, *Algolog. Mitteilungen*, *Fl. v. Würzburg*, 1848, u. a.
- Scheuchzer**, schweiz. Bot., schr. *Herbarium diluvianum*, Tiguri 1719, *Agrostogr. Helvet. Prodr.*, Zür. 1708, u. a. — *Scheuchzeria* L.
- Schiedé** u. **Deppe**, *Samml. v. Plantae mexicanae*, *besch. v. Schlechtendal* u. *Chamisso*, **Schiede** schr. *de plantis hybridis sponte natis*, Cassel 1825. — *Schiedea* Bartl.
- Schimper**, Prof. in Strassburg, † 1880, **Sch.** u. **Mugeot**, schr. *Mon. d. pl. foss. des Vosges*, *Strassb.* 1840, **Sch.** *Synops. muscorum europ.*, 1860, *Traité de palaeontologie végét.*, Paris 1869—74, u. a.
- Schinz**, S., *Primae lineae bot. ex tab. phytogr. J. Gesneri*, Zür. 1875.
- Schk.** = **Schkuhr**, Chr., *Univ.-Mechanik. z. Wittenberg*, † 1811, schr. *Enchiridion bot.*, 1805, *kryptog. Gewächse*, 1809, *Deutschlands Kryptogamen*, 1810—47, u. a. — *Schkuhria* Roth.
- Schidl.** = **Schlechtendal**, D. F. Leonh. v., Prof. etc. z. Halle, † 1866, schr. *Fl. v. Deutschl.*, Jena 1841—64, *Hort. Halensis*. 1841—53, *Fl. Berolinensis* 1823—24, mit v. Mohl *Herausg. d. Bot. Zeit.* — *Schlechtendalia* Less.
- Schleicher** in *Bex*, schweiz. Bot., schr. *Fl. d. Schweiz od. Catal. Pl. in Helvetia etc.*, 4. A., 1821. — *Schleichera* W.
- Schleiden**, M. J., Prof. z. Jena, dann Dorpat, s. 1866 *Staatsr. a. D. in Dresd.*, **Schl.** u. **Nägeli**, *Zeitschr. f. wiss. Bot.*, Zürich 1844—46, *Schl. üb. Ernähr. d. Pfl.*, 1846, *Grundr. d. Bot.*, 2. A., 1850, u. a. — *Schleidenia* Endl.
- Schlotheim**, E. F. v., *Kamm.-Präs. in Gotha*, † 1832, schr. *Petrefaktenk.*, 1820, *Nachtr. z. Petr.* 1822—23. — *Schlotheimia* Brid.
- Schmidel**, C. C., Prof. z. Erlangen, schr. *Dissertationes etc.*, *Icones plant. et analyses partium* (2. A. v. Bischoff), Norimb. 1782. — *Schmidelia* L.
- Schmidlin**, schr. *Blumenzucht im Zimmer*, 4. A., Berlin 1880 (*illustr. Prachtausg.*). Vgl. *Schülé* sen.
- Schmidt**, J. A., schr. *Anleit. z. Kenntn. d. natürl. Fam. d. Phanerogamen*, Stuttgart 1865, *Beitr. z. Flora d. Capoverdischen Inseln*, Heidelberg 1852. — **Schmidt**, Fr. Wilibald, Prof. in Prag, † 1796, schr. *Fl. bohemica inchoata*. — *Schmidtia* Tratt. — **Schm.** u. **Kze.** = **Schmidt** u. **Kunze**, schr. *Mykolog. Hefte*, 1817—23, u. *Deutschlands Schwämme etc.*, 1816—18. — **Schmidt**, F., *Reis. im Amurland* (bot. Teil) od. *Florula Amguno-Burejensis et Fl. Sachalina*, Petersb. 1868.

- Schmitz, J. Jos.**, Lehr. an d. Ritt.-Akad. z. Bedbury, † 1845, **Schm.** u. **Regel**, Fl. Bonnensis, 1841. — *Schmitzomia* Fr.
- Schnizlein, A.**, Prof. z. Erlangen, † 1868, schr. Fl. v. Baiern, 1847, Iconogr. famil. nat. regnia veget., Bonn 1843—70.
- Schoepf (Schöpfung), Joh. Dav.**, schr. *Materia med. americ. etc.*, Erlangae 1787. — *Schoepfia* Schreb., DC.
- Schomburgk, Sir Rob.**, engl. Reis. u. Consul in St. Domingo, dann Siam, Einführ. v. *Victoria regia*, † 1865 z. Berlin, schr. *Descr. of brit. Guiana*, 1840, Reis. in Guiana u. a., 1841. — *Schomburgkia* Lindl., DC.
- Schott, H. W.**, Dir. d. k. k. Gärten zu Schönbrunn, † 1865, **Sch.** u. **Endlicher**, schr. *Meletemata bot.* 1832, Sch. üb. Aroideen, Rutaceen u. Farne. — *Schottia* (-tia) Jacq.
- Schousboe**, dän. Bot. in Tanger, schr. *Pfl. v. Marokko*, 1791—93. — *Schousboea* W.
- Schouw, Prof.** in Kopenh., † 1852, schr. *Gründg. einer allg. Pflanzengeogr.* (deutsch Berl. 1823). — *Schouwia* DC.
- Schrad. = Schrader**, Prof. in Göttingen, † 1836, schr. *Sertum hannoveranum 1795—98*, Herausg. d. *Journals f. Botanik*, 1799—1810, Fl. germanica, Götting. 1806, *Spicileg. Fl. Germ.*, Hort. Goetting. 1809, *Anim. ad Floram Capensem*, 1832. — *Schradera* Vahl, Sw.
- Schrk. = Schrank**, P. F. v., Jesuit u. Prof. z. München, † 1835, schr. *Bair. Flora*, 1789, *Primit. Fl. Salisburgens.*, 1792, Fl. Monacens., 1811—18, u. a. — *Schrankia* W., Scop.
- Schreb. = Schreber**, J. C. Dan. v., Prof. z. Erlangen, † 1810, schr. *Beschr. d. Gräser m. Abb.*, 1769—1810, *Spicileg. Fl. Lipsicae*, 1771, *Linnaei genera plant.*, 1789—91. — *Schrebera* L., Roxb.
- Schubert (Edel u. Roth)**, schr. *Plantar. species q. per Aegyptum, Arabiam et Syriam coll.* (v. A. Schenk in Würzb., 1840), *Naturgesch. d. Pflanzenreichs in kolor. Bildern* (v. Hochstetter bearb.). — *Schubertia* Mart., Mirb.
- Schübler, Gust.**, Prof. in Tübingen, † 1834, schr. *Characteristica Cerealium*, 1818, üb. *Agrikulturchemie* (2. A., 1833), **Sch.** u. **Martens**, Fl. v. Württemberg, 1834, u. a. — *Schueblers* (-ia) Mart.
- Schüle, W. sen.**, Dir. d. k. Gartenbau-Schule Hohenheim, schr. 3. Ausg. v. *Schmidlin's wicht. Futter- u. Wiesengräsern*. — **Schüle, W. jr.**, s. 1879 *Dir. d. k. Obst- u. Gartenbau-Schule z. Grafen-Brumath*, *Red. d. Zeitschr. f. Wein-, Obst- u. Gartenbau*.
- Schult. = Schultes**, Prof. in Landshut, † 1821, schr. *Österreichs Fl.*, 1814, *Baierns Fl.*, 1811, R. u. S. (Römer u. Schultes), 16 A. v. *Linné's Syst. veget.* — *Schultesia* Mart., Spr.
- Schultz, C. Fr.**, Arzt z. Neubrandenburg, † 1765, schr. *Prodr. Fl. Stargardiens.*, Berl. 1816—19. — *Schultzia* Spr. — **Schultz, C. H.**, gen. *Schultzenstein*, Prof. z. Berl., Förd. d. Gartenbaus, † 1871, schr. *Nat. d. lebenden Pflanze*, 1825—28, *Tanacetaceae*, 1844, *Pfl.-Physiol.*, z. B. *neues Syst. d. Pfl.-Morphologie*, 1847, u. a. — **Schultz, C. H.**, gen. *Bipontinus*, Arzt u. Bot. in Deidesheim (Rheinpfalz), † 1867, schr. *Anal. Cichoriacearum Palatin.*, 1841, u. a. — **Schultz, Fr. W.**, Brud. d. vor., Arzt in Weissenburg, † 1869, schr. *Fl. d. Pfalz etc.*, *Grundz. d. Phytostatik etc.* (*Pollichia*, J. 1863).
- Schulzer v. Müggenburg**, österr. Hauptm. in Slavonien, schr. *Icon. Hymenomyc. Hungariae*, 1874, **Sch.**, **Kanitz** u. **Knapp**, schr. d. bish. bekannt. *Pfl. v. Slavonien*, 1866. — *Schulzeria* R. S.
- Schum. = Schumacher**, Prof. in Kopenh., † 1830, schr. *Kjovenhanske Fl.*, 1804, *Medicinsk Plantelaere*, 1825—26.
- Schwägrichen**, schr. *Hist. muscor. hepaticor. Prodr.*, Lps. 1814, *Specim.*



- muscor. frondos. I, Berlin 1830, Herausg. v. Winkler's Giftgew. Deutschlands, Leipz. 1854. — *Schwaegrichenia* Spr.
- Schwalbe**, C. G., schr. de China officinarum, Leyd. 1715. — *Schwalbea* L.
- Schweigger**, de plantar. classificatione nat., Regiomontani 1820. — *Schweiggera* Spr., (-ia) Mart.
- Schweinfurth**, G., schr. novae species aethiop., Flora der Soturba an der nubischen Küste, 1868.
- Schwendener**, s. 1867 Prof. in Basel, jetzt z. Berl., schr. Unters. üb. Flechten-Thallus, 1860, Algentypen d. Flechten-Gonidien (neue Flecht.-Theorie), 1869, **S.** u. **Nägeli**, Mikrosk. 1865—67, Neue mechanische Theorie d. Blattstellung, Lpz. 1878, u. a.
- Schweykert**, J. M., Catal. pl. horti bot. Carlsruhani etc., Carlsru. 1791. — *Schweykerta* W.
- Scop.** = **Scopoli**, zul. Prof. z. Pavia, † 1788, schr. Fl. carniolica, 2. A., 1772, Fundament. bot., Viennae 1786, Deliciae Flor. et Faun. Insubrica, 1786—88. — *Scopolia* (-la) Jacq., L. Sm., Forst., *Scopolina* R. S.
- Scott**, J., schr. Orchardist, 2. A., Lond.
- Secretan**, L., Landammann v. Waadt, † 1839 z. Lausanne, schr. Mycogr. Suisse, 1833.
- Seemann**, Dr. Berth. aus Hannover, Gärt. u. Reis., 1863 Red. d. Journ. of Botany in Lond., † 1872 in Centr.-Amer., Herausg. d. Bonplandia, Hannov. 1853—62, schr. d. Palmen, 2. A., 1863, Fl. Vitiensis 1865—68, u. a.
- Seguerii** bibliogr. bot. Access. **Brumaldi** bibl. bot., 3 p., Hag.-Comit. 1770.
- Seliger**, schles. Pfarr. u. Bot., † 1812, schr. Bryologie. — *Seligeria* Schimp.
- Sendtner**, Prof. z. München, † 1859, schr. d. Solaneen (in Martius' Fl. brasil.), üb. d. klimat. Verbreit. d. Laubmoose durch d. östr. Küstenländer, üb. d. Vegetationsverh. Südbayerns etc. — *Sendtnera* Endl.
- Senebier**, J., schr. Physiologie végétale, Genève 1801. — *Senebiera* Poir.
- Ser.** = **Seringe**, Prof. z. Lyon, † 1858, schr. (in de Cand.'s Prodr.) Aconitum etc., Mélanges bot., Genève 1824—26, Elémens d. Bot., üb. Cerealien (in Fl. d. jard. et des grand. cultures, Lyon 1845—49), u. a. — *Seringea* (-ia) Gay, Spr.
- Sessé**, Dr. Mart., Mitherausg. d. Fl. mexicana (v. Moçino u. Sessé), mex. Botaniker. — *Sesséa* R. P.
- Seub.** = **Seubert**, Hofr. u. Prof. am Polytechn. z. Carlsruhe, † 1878, schr. Fl. azorica, 1844, Elatinear. Monogr., 1845, Lehrb. d. gesamt. Pflanzenk., 5. A., 1870, schr. in Martius' Fl. brasil. u. a.
- Shaw**, Thom., Geistl. u. Reis. in Nordafr., † 1751, Prof. z. Oxford, schr. Pfl. d. Levante etc., Oxf. 1733. — *Shawia* Forst.
- Sheppard**, schr. on trees, their uses and biography, Lond. 1848. — *Sheppardia* Nutt.
- Sibth.** = **Sibthorp**, John, Prof. z. Oxford, † 1796, schr. Fl. graeca, Lond. 1810—40 (durch Smith herausg.), Fl. Oxoniens. 1794. — *Sibthorpha* L.
- Sickler**, J. V., schr. d. Teutsche Obstgärtner od. gemeinnütz. Magaz. d. Obstbaues, Weimar 1794—1804 (22 B. m. kol. Taf.).
- Siebold**, Ph. Fr. v., ber. Ethnogr. u. Erforsch. d. japan. Reichs, † 1866 z. München, schr. Synops. plant. oecon. regni japonici, 1827, Fl. japonica, 1835—44 (mit Zuccarini).
- Siegesbeck**, Dr. J. G., Prof. in St. Petersburg., schr. Botanosophiae verioris brev. sciagraphia, Petrop. 1737. — *Siegesbeckia* L.

- Simler**, R. Th., Leitfaden f. d. bot. Formenlehre, Zür. 1871, bot. Taschenbegleiter d. Alpenclubisten, Zür. 1871.
- Sims**, John, engl. Bot. z. London, † 1838, setzt. d. bot. Magazin v. W. Curtis fort bis 1826. — *Simsia* R. Br.
- Sinning**, s. Nees v. Esenbeck, Th.
- Sismonda**, E., Elementi di storia nat. Botanica, Torino 1858.
- Sloane**, H., schr. Catal. pl. ins. Jamaicae, Lond. 1696. — *Sloanea* L.
- Smee**, Alfr., Besuch. ber. Gewächsh., schr. My Garden (viel übersetzt), Abh. üb. d. besten Obstsorten Englands, 1874, † 1877.
- Sm.** = **Smith**. Jam. Edw., Präz. d. Linné'schen Ges. z. London, † 1828, schr. Plant. icon. hactenus ineditae etc., 1789—91, Bot. Gramm. z. Erläut. d. Jussieu'schen Systems, Weimar 1822, (mit Sowerby) Engl. Bot., 1790—1814, Fl. britica, Exotic Bot., u. a. — *Smithia* Ait., Schreb., Dry. — **Smith**, W., Prof. in Cork, † 1857, schr. Synops. of t. brit. Diatomaceae, Lond. 1853—56.
- Sol.** = **Solander**, Biblioth. am Brit. Mus. z. London, † 1782, schr. (m. Ellis) üb. Corallen. — *Solandra* L., Sw.
- Solms-Laubach**, Herm. Graf zu, s. 1879 Prof. d. Bot. in Göttingen, bed. Mykol. u. Bryol., schr. de Lathraeae positione etc., 1865, Tent. Bryologiae Algarviae, 1868, üb. monocot. Embryone etc., 1878, u. a.
- Sonder**, Med.-R. in Hamb., schr. Fl. Hamburg. 1851, d. Algen d. trop. Australiens 1871, (m. Harvey) Fl. Capens.
- Sonnerat**, fr. Reis. in Ostind., † 1814, schr. Voyage à la Nouv. Guinée, do. aux Indes orient. et à la Chine, 1806. — *Sonneratia* L. f., DC.
- Sowerby**, Jam., engl. Maler u. Naturf., † 1822, lief. Engl. Bot. or col. fig. (Text v. Smith), t. Ferns of Gr.-Britain (Text v. Ch. Johnson), Grasses of Gr.-Brit., u. a. — *Sowerbaea* Sm.
- Soyer-Willemet**, Oberbibl. z. Nancy, † 1867, schr. Observ. sur quelq. pl. de France, 1828, Abhandl. in Mém. d. l. Soc. nat. de Nancy. — *Soyeria* Monn.
- Spach**, Ed., schr. (mit d. Grafen Jaubert) Illustr. plantar. oriental., Revis. Populorum, do. Grossulariae, do. gen. Acerum et sp. Hippocastani 1834 (in Ann. d. Sc. nat.). — *Spachea* A. Rich.
- Spenner**, Prof. z. Freiburg i. Br., schr. Fl. Friburgens., 1825—29, Handb. d. angew. Bot., 1834—36, u. a. — *Spennera* DC.
- Spiegel**, A. (Spigelius), schr. Isagoges in rem herbar. libri II, Lugd.-Bat. 1633. — *Spigelia* L.
- Splittgerber**, F. L., schr. Observ. de Bignoniaceis surinam., Amsterd. 1841, Obs. de Voyria, Enum. Filicum etc. Surinamens. etc.
- Sporleder**, F. W., schr. Verz. der in d. Grafsch. Wernigerode wildw. Phanerog. u. Gefässkrypt., Wernig. 1868. — *Sporledera* Hemp.
- Spr.** = **Sprengel**. Curt (Konr.), Prof. etc. z. Halle, † 1833, schr. Anleitung z. Kenntn. d. Gew., Halle 1802—04, Hist. rei herbar., 1807—08, Gesch. d. Bot., 2 T., Altenb. u. Lpz. 1817/18, Plant. umbellif. Prodr. 1813, Linnaei Syst. Veget. 16. A., Spr. (Schrader u. Link), Jahrb. d. Gewächsk., 1818—20, Fl. Halens., 1832, u. a. m. — *Sprengelia* Sm.
- Spring**, Dr. A. F., Prof. in Lüttich, † 1872, schr. Monogr. d. Lycopodiacees 1842 u. 49 (Bearb. ders. in Martius Fl. bras.).
- Spruce**, R., Palmae Amazonicae (Linn. Soc. Journal).
- Stackhouse**, John, engl. Bot., † 1819 z. Bath, schr. Nereis brit., 2. A., Oxf. 1816. — *Stackhousea* (-ia) Sm.
- Steetz**, J., schr. Enum. Compositarum q. in Australia annis 1838—41 colleg. L. Preiss, üb. d. Tremandreen etc., Hamb. 1853.
- Steph.** = **Stephan**. Fr., Prof. in Moskau, † 1817, schr. Enum. Stirpium agri Mosquensis 1792, Icones pl. Mosq. 1795. — *Stephania* W., Lour.
- Stephenson**, J. u. Churchill, J. M., schr. Medical botany (new ed. by Burnett, Lond. 1834—36).

- Sternb.** = **Sternberg**, Graf v., Vorst. d. k. Böhm. Ges. d. Wiss., † 1838, schr. Revis. Saxifragarum, Geognost.-bot. Darstell. d. vorweltl. Flora, 1820—28. — **Sternbergia** Waldst., Kit.
- Stedel.** E. Th., † 1856, schr. Nomencl. bot., Ed. 2, Stuttg. u. Tübing. 1840/41. — **Stuedelia** Spr. — **Stuedel**, E. G., schr. Synops. pl. glumacearum, Stuttg. 1855/56.
- Stev.** = **Steven**, Univ.-Kanzl. in Moskau, † 1863, schr. Verz. d. Pfl. auf d. taur. Halbinsel, Mosk. 1857. — **Stevenia** Adams.
- Stoll**, Oesterr.-Ungar. Pomologie, I u. II, Äpfel u. Birnen, Wien 1883 (80 Farbdr.-Abb.).
- Strasburger**, Ed., s. 1869 Prof. in Jena, j. Bonn, schr. üb. Azolla, d. Coniferen u. Gnetaceen, 1872, d. Angio- u. Gymnosperm., Jena 1879, u. a. m.
- Strumpf**, Ferd. L., schr. d. officin. Gewächse in d. nat. Pflanzenfamilien, Berl. 1840. — **Strumpfia** Jacq., Schreb. (-phia Pers.)
- Sturm**, Jak., Entomolog. u. Bot., Herausg. v. Deutschlands Flora in Abbild. n. d. Nat., Nürnberg. 1798—1855. — **Sturm f.** Joh. W. Sohn, setzte d. Werk fort (Mitarb. v. Martius), † 1865. — **Sturmia** G., Hoppe, Rehb.
- Suard**, franz. Bot., schr. Catal. d. pl. vascul. du dép. d. l. Meurthe, Nancy 1843. — **Suardia** Schrk.
- Suck.** = **Suckow** (Succovius), s. 1774 Prof. in Heidelberg, † 1813, schr. üb. Calamiten, Ökonom. Botanik, 1777, Anfangsgr. d. theor. u. angew. Bot., 2. A., 1797, u. a. — **Succovia** Mnch. (-ovia Med.). — **Suckow**, Fr. W. L., Arzt u. Cust. d. Museums in Mannheim, schr. Fl. Mannhemiens., 1821.
- Sullivant**, Bryolog. z. Columbus (Ohio), † 1873, schr. Musci Alleghanienses 1846, Icones muscorum, d. Moose in Ch. Wilke's Unit. States Exploring Expedition, 1859, Musci Cubenses etc., New-York 1861.
- Sulzer** s. Kalchbrenner. — **Sulzeria** R. S.
- Suter**, schr. Fl. Helvetica, Turici 1802. — **Sutera** Roth, (-ia DC.).
- Sw.** = **Swartz**, Olof, schwed. Bot. u. Reis. in Westind., † 1818, schr. Nova gen. et sp. plant. etc., 1788, Icones pl. incognit. Fl. Indiae occidentalis, 1797—1806, Summa veget. Scandinaviae, 1814, u. a. — **Swartzia** W., (-zia Rehb.).
- Sweert**, schr. Florilegium, tract. de floribus et aliis Indicis plantis, Francof. 1612. — **Sweetia** L.
- Sweet**, Rob., engl. Bot., schr. Geraniaceae, Lond. 1820, Hort. suburb. Londinens. 1818, Hort. britannicus, 3. A. v. G. Don 1839, Fl. australasica 1827/28. — **Sweetia** DC.
- Tabernaemontanus** (v. Bergzabern), Jac. Theod., Arzt u. Bot., † 1590, schr. Kräuterbuch m. viel. Abb. — **Tabernaemontana** L.
- Targioni-Tozzetti**, Bot. in Florenz, † 1783, schr. Fl. v. Italien, 1763. — **Targionia** Mich.
- Taschenberg**, schr. Handb. d. bot. Kunstsprache, Halle 1843, u. a.
- Tausch.** = **Tauscher**, Ign. Fr., Prof. in Prag, † 1848, schr. Herb. Fl. Bohemicae univ., Hortus Canalius, 1823, Pl. select. Fl. Bohem., 1837. — **Tauscheria** Fisch.
- Taylor** s. Hooker. — **Tayloria** Hook. — **Taylor**, Thom., Bot. in Nordamer., schr. de Marchantieis.
- Ten.** = **Tenore**, Michele, Prof. in Neapel, † 1861, schr. Fl. Napolitana, 1811—38, u. v. a. — **Tenorea** Bert. (-ia Spr.).
- Thal.** Joh., Arzt in Nordhausen, schr. Sylva Hercynia u. Hort. medic. et philos., † 1583. — **Thalia** L., Schreb.
- Théis**, A. de, schr. glossaire de botanique etc., Paris 1810.

- Th. Fr.** s. Fries, Th. Magn. Sohn, Fr. f.
- Theophrastus** von Eresus, ber. griech. Philosoph etc., † 288 v. Chr. z. Athen, Theophrasti Eresii de histor. plantar. libri X (zuerst Amsterd. 1634). — Theophrasta (-stea) L.
- Thevenot**, übers. 1695 des Indienfahrers Kosmas „christl. Topographie“ aus d. 6. Jahrh. — Thevenotia DC.
- Thom.** = **Thomas**, Eman. nebst Brüdern, Schweizer Sammler z. Haller's Zeiten, schr. Catal. d. pl. suisses q. se vendent chez Em. Thomas à Bex (Cant. de Vaud), 1818. — **Thomasia** Gay. — **Thomas**, O., schr. Guide pratique de pomologie etc., Nancy 1876.
- Thomé**, Prof. Dr., Lehrb. d. Bot., Braunschw. 1872 u. 76, d. Flora v. Deutschl., Oesterr. u. d. Schweiz in Wort u. Bild (3 B., 600 T.), Gera 1885.
- Thomson**, Rob., schr. Catal. of fruits cultiv. in t. Garden of t. Hortic. Soc. of London etc., † 1869. — **Thomsonia** Wall.
- Thory**, s. Redouté. — **Thory**, Claud. Ant., schr. Hist. de Grosseillers, Par. 1829, Monogr. s. l. genre Rosier 1820, u. a.
- Thou.** = **Thouars (Du Petit-Thouars)**, s. Pet.-Th. — **Thouarsia** Vent.
- Thouin**, André, Prof. d. Agrikult. z. Paris, † 1824, schr. s. l. cult. d. Dahlia, 1804, Cours d. cult. et d. naturalisation d. végétaux, 1827. — **Thouinia** Poit.
- Threlkeld**, Dr. med. u. Bot. z. Dublin, schr. Synops. Stirpium Hibernicorum, † 1728. — **Threlkeldia** R. Br.
- Thb.** = **Thunberg**, ber. schwed. Bot. u. Reis. in Ceylon, Japan etc., 1743—1828, Schül. u. Nachfolg. Linné's z. Upsala, schr. Fl. japonica, 1794—1805, Fl. Capens. 1807—13. — **Thunbergia** L.
- Thuret** s. Bornet. — **Thuret**, Gust. z. Antibes, † 1875, Entd. d. Geschlechtigk. d. Tange, schr. s. l. Fécond. d. Fucacées, 1853—57.
- Thurmann**, J., schr. Essai de Phytostatique appliqué à la chaine de Jura, Bern 1849; dessen Boden-Nomenclatur.
- Tiedemann**, F., Gesch. des Tabaks u. andr. ähnl. Genussmittel, Frankfurt a. M. 1854. — **Tiedemannia** DC.
- Timm**, J. C., schr. Fl. Megapolitanae Prodr., Lips. 1788. — **Timmia** Hedw.
- Tineo**, V., schr. Catal. pl. horti reg. Panormit., 1827, Pl. rarior. Siciliae etc., Panorm. 1846.
- Tode**, Pred. u. Bot. im Mecklenburgischen, † 1797, schr. Fungi Mecklenb. selecti 1790—91. — **Todea** W.
- Tommassini**, Ritter v., k. k. Hofr. z. Triest, schr. Fl. v. Südistrien (Östr. Bot. Zeit. 1873). Sulla veget. dell' isola di Veglia, Triente 1875. — **Tommassinia** Bertol.
- Tornabene**, Fr., schr. Ricerche bibliografiche sulle opere botaniche del secolo XV, Catania 1840.
- Torr. Gr.** = **Torrey**, John u. **Gray**, Asa (s. Gray), **Torr.**, J., schr. a Fl. of t. north- and middle section of t. United States, 1824, u. v. a. — **Torreya** Van Houtt., Spr., Raf.
- T. od. Tourn.** = **Tournefort**, ält. franz. Bot. u. Reis., 1656—1708, Vorarb. Linné's, schr. Institutiones rei herbariae (ed. A. de Jussieu, Lugd. 1719), Hist. d. pl. d. Paris (2. A. v. Jussieu, 1725), Elémens de Bot. 1797, Voyage du Levant, 1717, u. a. — **Tournefortia** W., R. Br., Hook.
- Tragus (Bock)**, Hier., † 554, einer d. ält. deutsch. Bot., schr. New Kreuterbuch etc., Strassb. 1551. — **Tragia** Plum.
- Trattinick (-nik)**, L., Prof. in Wien, schr. d. essb. Schwämme Österreichs, Wien 1809, Archiv d. Gewächsk., Wien 1812—14, Genera pl. method. nat., Wien 1802, u. a. — **Trattinickia** Pers., W., Mart.

- Trautvetter (-wetter)**, E. G., schr. *Salicetum* Comment., 1836, Middendorfs Reise in Nordsibir. 1843—44. — **Trautvetter**, E. R. v., schr. *Plantar. messes a. 1874 in Armenia a Radde et in Daghestania a Becker factas commentatus est Trautv.*, *Plantae Sibir. boreal. a Czekanowski et F. Mueller a. 1874—75.*
- Trentepohl**, Pred. im Oldenburgischen, schr. *Beitr. zu Roth's Catalecta bot. u. Bot. Bemerkungen.* — *Trentepohlia* Mart., Roth, Ag.
- Trev.** = **Treviranus**, zul. Prof. in Bonn, † 1864, schr. *üb. Pfl.-Physiologie* (z. B. *Phys. d. Gew.*, Bonn 1835—38). — *Trevirania* W.
- Trevisan**, Vict., Graf in Venetien, Akad. zu Padua, schr. *Lichenotheca Veneta* s. 1869, *Prosp. della Fl. Euganea*, 1842, u. a.
- Trew (Treu)**, Chr. Jak., Arzt in Nürnberg., schr. 1769 *Hort. nitid. superbiens floribus etc.*, Norimb. 1750—72, *Pl. select. quar. imagines Ehretius Londini pinx.*, Norimb. 1750—73. — *Trewia* L.
- Triana**, J. et J. E. **Planchon**, schr. *Prodr. Florae Novo-Granatensis*, Par. 1862.
- Trin.** = **Trinius**, Frhr. v., † 1844 als Staatsr. z. Petersburg, bes. *Agrostograph*, schr. *Fundam. Agrostogr.* 1820, *Species graminum etc.*, 1828—36, u. a. — *Trinia* Hoffm.
- Triumfetti**, J. B., schr. *de ortu et vegetatione plantarum*, Romae 1685. — *Triumfetta* L.
- Tschudi (-dy)**, v. u. Sohn, Schweiz. Nat., schr. *de Coniferis.* — *Tschudya* DC.
- Tul.** = **Tulasne**, L., Ren. u. Charl., Gebrüd. im Dep. Indre et Loire, erst. Naturalist am Mus. z. Paris b. 1872, schr. *üb. Leguminosen u. zahlr. mykol. Abh.* — *Tulasnodea* Fr.
- Turezaninow**, N., schr. *Fl. Baicalensi-Dahurica*, 1835, *Animadversiones etc.*, 1858. — *Turezaninovia* DC.
- Turner**, W., engl. Arzt, schr. *neues Herbarium*, 1551. — *Turnera* L. — **Turner**, Dawson, reich. Bankier z. Yarmouth, † 1856, schr. *Synops. of t. brit. Fuci, Muscol. hibern. spicilegium.*
- Turpin**, fr. Pflanzenmaler, † 1840 zu Paris, lief. *Cactées* 1830, *Fl. usuelle*, 1834, *Iconogr. végét.* 1841, u. a. — *Turpinia* H. B. K., Vent.
- Turra**, Antonio, ital. Bot., schr. *Istoria del arbore della China*, *Fl. italicae Prodr.*, Vened. 1780. — *Turraea* L.
- Tuss.** = **Tussae**, F. Rich. de, fr. Bot., schr. *Fl. Antillarum*, Par. 1808—26, 4 B. — *Tussacia* Rehb.
- Uechtritz**, R. v., schr. *d. wicht. Ergebnisse d. Durchforsch. d. schles. Phanerogamen-Flora im J. 1876.*
- Ulloa**, A. de, schr. *Physik. Nachrichten von Süd- u. Nordamer.*, Lpz. 1781. — *Ulloa* Pers.
- Ulrich**, W., *Internationales Wörterb. d. Pflanzennamen*, Lpz. 1872 (lat., deutsch, fr. u. engl.).
- Unger**, Prof. in Wien, † 1870, schr. *Synops. plantar. fossil.*, Lips. 1845, *Gen. et spec. pl. foss.*, Wien 1840, mit St. Endlicher *Grundz. d. Bot.*, Wien 1843, *d. Pfl. u. d. Luft*, Wien 1853, *d. versunk. Insel Atlantis, d. phys. Bedeut. d. Pflanzenkultur*, Wien 1860, u. a.
- Ungnad**, Chr. Sam., schr. *de Malo persica*, Frankf. a. O. 1757. — *Ungnadia* Endl.
- Urville** s. *D'Urville.* — *Urvillaea* H. B. K.
- Usteri**, P., Herausg. d. *Annalen d. Bot.*, Zürich 1791—95, u. a. m. — *Usteria* W.

- V.** = **Vahl**, Mart., Linné's Schüler, Prof. in Kopenhagen, † 1804, schr. *Symbolae bot.* 1790—94, *Eclogae americ.* 1796—1807, *Enum. plant.* 1804—06. — *Vahlia* Thb., Schreb.
- Vaill.** = **Vaillant**, Seb., fr. Bot. u. Reis., Prof. z. Paris 1714, schr. *Bot. Parisienne* (300 Fig. p. Aubriet), Par. 1727. — *Vaillantia* R. S., DC.
- Valentini**, M. B., *Hist. simplicium reform. etc.*, acced. C. B. Valentini (fil.) *India literata*, Francof. 1716. — **Valentini**, Chr. B., *Tournefortus contract. etc.*, Lugd.-Bat. 1715. — Nach Jessen: **Valentini**, Bernh. 1657—1729, Prof. z. Giessen, schr. *Museum Museumum etc.*, Francof. a. M. 1704—14 (spät. lat. *Hist. simplic. reform. etc.*), *Prodr. Hist. nat. Hassiae, Gissae* 1707, u. a. — *Valentinia* Sw.
- Vand.** = **Vandelli**, Domin., portug. Bot., Prof. z. Lissabon, schr. *Pfl. v. Brasilien.* — *Vandellia* L.
- Van Houtte**, Herausg. d. *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, Gent, s. 1845, später *Planchon etc.*
- Van Hulle** von Gent, (mit Pynaert etc.) Herausgeb. d. *Bulletins mensuels du cercle d'Arboriculture en Belgique* s. 1855.
- Van Rheede** s. *Rheede*.
- Vater**, A., schr. *Catal. pl. Horti Wittenbergensis*, Wittenb. 1722. — *Vateria ind.* *Rheed.*
- Vaucher**, Pred. u. Prof. z. Genf, † 1841, schr. *Hist. d. Conferves d'eau douce*, 1803, *Monogr. d'Orobanches*, u. a. — *Vaucheria* DC.
- Veitch**, John Gould, schott. Gärtner u. Reis. in Japan u. Austral. bis 1866, führte neue Gartenpfl. ein, † 1870. — *Veitchia* u. *Colëus Veitchii*. — **Veitch**, James u. Söhne, Handelsg.-Firma in Chelsea (Engl.).
- Velley**, Thom., engl. Offizier, † 1806, lief. *Coloured figures of marine plants*, Bathon 1795. — *Velleja* Sm., Lab.
- Vent.** = **Ventenat**, Prof. in Paris, † 1805, schr. *Principes de Bot.*, 1795 (deutsch A. v. Haller, 1802), *Choix de pl. etc.*, 1803, *Jard. d. Malmaison*, 1803—04, u. a. — *Ventenata* Koel. (-tia) Sw., P. Br.
- Venturi**, Ant., schr. *studi micologici*, Brescia 1842, *i miceti dell'agro Bresciano*, Besc. 1845. — *Venturia* de Not.
- Verschaffelt**, Ch., Gart.-Liebh. in Gent, veranl. d. *Ersch. d. Illustration horticole* (redig. v. Lemoine), † 1880. — *Verschaffeltia* H., Wendl.
- Vesling**, schr. *Veslingii J. de plantis Aegypt. observ. ad Pr. Alpinum*, Patavii 1638. — *Veslingia* Fabr.
- Vest de**, schr. *Manuale bot.*, stirpes tot. *Germaniae phaneroz.*, Klagenfurt 1805. — *Vestia* W.
- Vicat**, P. R., schr. *Hist. d. pl. vénéneuses d. l. Suisse*, Yverdu 1776. — *Vicatia* DC.
- Vietz**, lief. *Abb. aller mediz.-ökon.-technol. Gewächse etc.*, 6 Bde., Wien 1800—6.
- Viguier**, A., schr. *Hist. nat. d. pavots et d'argémones*, Montpellier 1814. — *Viguiera* Kth. (-ia) Less.
- Vill.** = **Villars**, Dan., Arzt u. Prof. z. Strassb., † 1814, schr. *Hist. d. pl. du Dauphiné*, 1786—89, *Catal. d. pl. etc. de Strassb.*, 1807, u. a. — *Villarsia* Vent.
- Vilm.** = **Vilmorin**, L., fr. Gartenz., schr. *Essai d'un catal. méth. et synonyme des Froments*, Par. 1850, *Illustrierte Blumengärtnerei*, 2. Ausg. (m. II. Suppl.) v. Dr. Grönland u. Th. Rümpler, Berlin 1873. — *Vilmorinia* DC. — **Vilmorin** u. **Andrieux**, ber. Paris. Gärtner-Firma.
- Vis.** = **Visiani**, R. de, schr. *pianti fossili della Dalmazia*, *Recens. altera plantar. minus cogn. q. Hort. Patavinus colit*, 1858, *Pl. quaed. Aegypti et Nubiae*, Patavii 1836.

- Vittadini**, namh. Mykolog z. Mailand, † 1865, schr. Mon. Tuberacearum, 1831, do. Lycoperdineorum, 1842, Funghi mangerecci, 1835, u. a. — *Vittadinia* Rich.
- Viviani**, D., schr. Fl. Italicae fragmenta, Genuae 1808. — *Viviania* Cav., G. Don.
- Vöchting**, schr. üb. d. Bau d. Melastomaceae (Hansteins Abh. III), üb. Organbildung im Pflanzenr., Bonn 1878, u. a.
- Vogel**, B. C., schr. de gen. plant., Altorphii Noric. 1768, d. amerik. Agave, Nürnberg. 1800. — *Vogelia* Horn., Gm. — **Vogel**, Mart., Schül. v. J. Jung, gab dess. Botanico-physica heraus, 1678. — **Vogel**, Th., schr. (zu Meyen's Beitr.) üb. Leguminosen.
- Vogler**, nass. Hofr. z. Weilburg, † 1816, schr. üb. Farbpfl. (Krell'sche Annal. s. 1784). — *Voglera* Fl. Wett.
- Voigt**, F. G. u. F. S., schr. Handwörterb. d. bot. Kunstsprache, Jena 1803, Handb. d. prakt. Bot., Jena 1850. — *Voigtia* Spr.
- Voit**, Dr., Arzt u. Bryolog in Schweinfurt. — *Voitia* Hornsch.
- Volkamer**, schr. Fl. Norimbergensis, 1700. — *Volkameria* P. Br.
- Vriese**, G. H. de, schr. Plantae Preissianae, Amsterd. 1845, Pl. Indiae Batavae Orientalis, Lugd.-Bat. 1857, Goodenovieae 1854, u. a. — *Vriesia* Lindl.
- Wagner**, Herm., schr. Führ. ins Reich d. Kryptogamen, Bielefeld 1852, Malerische Bot., 2 B., Lpz. 1861, Deutsche Flora (nach Benthams Handb. d. brit. Fl.), 1869, u. a.
- Wahlbg.** = **Wahlenberg**, Prof. in Upsala, Thunberg's Nachf., † 1851, schr. Fl. lapponica, 1812, Fl. Carpathorum principal., 1814, Fl. suecica 1831—33, u. a. — *Wahlenbergia* Schrad., Dietr.
- W. K.** = **Waldstein u. Kitaibel**, Waldstein-Wartenberg Graf Ad., a. dess. Kosten d. Descr. et Icones plantar. rarior. Hungariae (s. *Kitaibel*) herauskamen. — *Waldsteinia* Kit., W.
- Waldner**, schr. Deutsche Farne, m. Berücks. angrenz. Gebiete (12. u. 13. H., Heidelb. 1883).
- Walker-Arnott**, G. A., Pugillus plantar. Indiae Orient., 1836, u. a., s. Arnott. — *Walkera* Schreb., (-ia) Ehret.
- Wall.** = **Wallich**, Nathanael, V.-Präs. d. Linné'schen Ges. z. London, schr. Tent. Fl. Nepalensis ill., Calcutta 1824—26, Pl. asiat. rarior., 1830—32. — *Wallichia* Roxb.
- Wallr.** = **Wallroth**, Arzt in Nordhausen, † 1857, schr. Rosae plantar. generis hist. succineta, Nordh. 1828, Fl. Cryptog. German. (in Bluff u. Fingerhuth's Fl. germ., 1831—33), Annus bot., 1815 (in Sprengels Fl. v. Halle), Beitr. z. Bot., Lpz. 1842, u. a. — *Wallrothia* Spr., Roth.
- Walpers**, Dozent zu Berlin, † 1863 (Selbstmord), schr. Repert. bot. syst., 1842—48 (später als Annales botanices syst.), Animadv. crit. in Leguminosae Capenses u. a.
- Walter**, Thom., Farmer in Carolina, schr. Fl. Caroliniana, Lond. 1788.
- Walther**, G. F., Prof. in Leipzig, † 1746. — *Waltheria* L., Spr.
- Warner**, Rob., schr. üb. d. Kultur der Orchideen. — *Warneria* Mill.
- Warszewicz**, J. v., poln. Flüchtling, Reis. f. Van Houtte in Gent s. 1850, † 1866, Insp. d. Bot. Gartens z. Krakau. — *Warszewiczella* Van Houtt.
- Watson**, P. W., engl. Bot., schr. Cybele brit., Lond. 1847—52, Dendrolog. brit., 1825, üb. d. geogr. Verbr. d. Gew. Gr.-Brit. (deutsch v. Beilschmied, Bresl. 1838). — *Watsonia* Mill. — **Watson**, H. C., üb. seltene brit. Pfl., 1835—37.

- Webb**, John, amer. Beerensamml. u. Culturist v. Cranberry (*Oxycocc. macroc.*) in N.-Amer. — *Webbia* DC.
- W. M.** = **Weber u. Mohr** (erst. Prof. z. Kiel, † 1823), bot. Taschenb., 1807, W., Hist. Musc. hepat., 1815, Hort. Kiliens., 1822. — *Webera* Hedw., Schreb.
- Weddel**, Hugh Algernon, Reis. in Peru u. Bolivia, schr. Mon. v. Cinchona, Fl. v. Süd-am., Alpenfl. d. Cordilleren u. a. — *Weddellia* Tul.
- Wedel**, G. W., schr. Opiologia, Jenae 1674, de Corchoro, Jen. 1695, de Oenanthe Theophrasti, 1710. — *Wedelia* Jacq.
- Weigel**, Prof. in Greifswald, schr. Observ. bot., 1762, Fl. Pomerano-Rugica, 1769. — *Weigela* Thb., (-ia) Pers., Schreb.
- Weihe**, Arzt z. Herford, † 1834, **W. N.** od. **W. E.** = **Weihe u. Nees v. Esenbeck**, d. deutsch. Brombeerstr., 1822—27, W., deutsche Gräser etc., 1823—30. — *Weihea* Spr., Eckl.
- Weinmann**, J. G., Apoth. z. Regensburg, schr. Phytanthozoa-Iconogr., Regensb. 1737—45. — *Weinmannia* L. — **Weinmann**, s. 1823 Gart.-Insp. z. Paulowsk b. Petersb., schr. Elenchus pl. hort. imp. Pawloskii et agri Petropolitani, 1824, Hymeno- et Gasteromycet., etc., 1836.
- Weis**, F. G., schr. Pl. cryptog. Florae Goettingensis, Gott. 1770. — *Weisia* Hedw.
- Weitenweber**, Arzt z. Prag, Red. d. Zeitschr. Lotos. — *Weitenwebera* Kbr.
- Wenderoth**, Prof. z. Marburg, † 1861, schr. Lehrb. d. Bot., 1821, Fl. Hassiaca, 1846, d. Pflanzengart. d. Univ. Marburg, 1850, u. a.
- Wendland**, J. Christoph, Gart.-Insp. zu Herrenhausen b. Hannover, † 1828, **W.** (u. **Schrader**) Sertum Hannoveran., Hort. Herrenhusanus 1789—1801, *Ericarum* Icon. et descr., 1793—1823, u. a. — *Wendlandia* W., Bartl. — **Wendland**, **H. Ludolf**, Sohn u. Nachf., † 1869, **W.** (u. **Bartling**), Beitr. z. Bot. 1824—25, Index Palmarum, 1854. — **Wendland**, **Herm.** (d. vorig. Sohn u. Nachf.), **H. Wendl.** (u. **O. Drude**), *Palmae australasiae* (Linnaea 1875).
- Westcott**, Freder. (s. Knowles), mit Knowles d. bot. Gart. v. Birmingham, 1723.
- Wibel**, Arzt z. Wertheim in Franken, schr. Primitiae Fl. Werthemensis, 1799. — *Wibelia* Pers., Röhl.
- Wickstroem**, schwed. Bot., schr. Jahresber. üb. d. Fortschritte d. Bot. (deutsch v. Beilschmied), 1820—46, **W.** och **N. J. Anderson**. Årsberättelse om bot. arbeten etc., Stockh. (Jahrg. 1837—56), Stockholms Flora, 1840. — *Wickstroemia* Schrad., Spr.
- Wiegand** s. *Wigand*.
- Wieland**, Melch. (*Guilandus*), Prof. z. Padua, † 1590, schr. De Stirpium aliquot nominibus vetustis epistolae, Basil. 1557, Papyrus, Vened. 1572. — *Guilandina* Juss.
- Wiesner**, J., Prof. in Wien, schr. üb. Chlorophyllbildung, Imbibitionswasser u. s. f., Wien 1875 f.
- Wigand**, Joh., Bischof v. Pommersanien 1540—87. — *Wigandia*, H. B. K. — **Wigand**, **Alb.**, s. 1851 Prof. in Marburg, schr. bot. Unters., d. Baum etc., Braunschw. 1854, Lehrb. d. Pharmakognosie, 2. A., 1872, üb. Darwinismus, Genealog. d. Urzellen, 1872, d. bot. Gart. z. Marb., 2. A., u. a. m.
- Wiggers**, Prof. d. Pharmazie in Göttingen, schr. Handb. d. Pharmakognosie, Gött. 1864. — **Wiggers**, **F. H.**, schr. Primitiae Fl. Holstatae, Kiel 1780. — *Wiggersia* Fl. Wett.
- Wight**, R., Dir. d. bot. Gart. z. Madras, schr. Contrib. to the Bot. of India, 1834, *Spicilegium Neilgherense*, Madras 1846—50, **W. u. Walker-Arnott**, Prodr. Fl. Peninsulae Indiae orientalis, Lond. 1834. — *Wightia* Spr.



- W.** od. **Willd.** = **Willdenow.** Prof. z. Berlin, † 1812, hervorrag. Botaniker, schr. Anleit. z. Selbststud. d. Bot. (4. A. v. Dietrich, 1832), Fl. Berolinensis Prodr., 1787, Hort. Berolin., 1816, Caricologia, 1805, Berlin. Baumzucht, Berl. 1811, u. a. — *Willdenowia* Thb.
- Willemet**, P. R., schr. Herbar. Mauritanum, Lpz. 1796. — *Willemetia* Neck., Gm., A. Brong.
- Willich**, J. Fr., schr. Scholia in Vergilii opuscula de re hortensi, Basel 1548. — *Willichia* L., Spr. — **Willich**, Chr. L., schr. Illustrat. bot., Gotting. 1766.
- Willkomm**, Moritz, s. 1873 Prof. in Prag, schr. Führer in's Reich d. deutsch. Pfl., Lpz. 1862, (m. Lange) Prodr. Fl. Hispanicae, Stuttg. 1877, Atlas d. Bot. 1873, u. a.
- Wilson**, W., engl. Bryolog, † 1871, schr. Bryologia brit., 3 A., 1855. — *Wilsonia* R. Br.
- Wimmer**, Fr., Schulr. u. Gymn.-Dir. z. Breslau, † 1868, schr. (m. Grabowski) Fl. Silesiae 1827—29, Salices europaeae 1866, d. Pflanzern., 9. A., Bresl. 1868, u. a.
- Winckler**, Ed., sämmtl. Giftgew. Deutschl.'s (96 kol. T.), Berl. 1832, Handb. d. pharmaz. Bot., Lpz. 1846. — **Winckler**, Emil, Gesch. d. Bot., Frankf. a. M. 1854.
- Wirtgen**, Rector u. bed. Bot. z. Coblenz, † 1870, schr. Fl. d. Reg.-Bez. Coblenz, 1841, Leitf. f. d. Unterr., 2. A., 1846, Fl. d. preuss. Rheinprov. 1857, Fl. d. preuss. Rheinlande 1870, u. a. — *Galium Wirtgenii* Schultz.
- Withering**, Arzt z. Birmingham, † 1799, schr. a bot. arrangement of t. veget. in Gr.-Britain, 5. A., 1812. — *Witheringia* l'Hér., Schreb.
- Wittmack**, Prof. in Berl., schr. Musa Ensete, Beitr. z. Kenntn. d. Bananen, Halle 1867, mit Perring Herausg. d. Gart.-Zeitg. s. 18:2, schr. üb. vergl. Kulturen m. nord. Getreide (Landw. Jahrb. 1876), üb. eine neue Ölsaart 1877, üb. Carica Papaya (Sitz-Ber. d. Bot. Ges., Berl. 1878), u. a. m.
- Wtst.** = **Wittstein**, schr. Etymolog. Handwörterb. d. Pflanzenk., Ausbach 1852, 2. A. Erlangen 1856.
- Wolf**, Casp. Fr., Prof. d. Akad. z. St. Petersburg., schr. Theoria generationis u. Nov. comment. acad. Petropolit., † 1794. — *Wolfia* Spr.
- Woods**, Jos., schr. Bemerk. üb. d. europ. Gräser (in Linn. Transactions, 1838), u. a. — *Woodsia* R. Br., Spr.
- Woronin**, M., russ. Bot., schr. üb. Synchronitium, üb. d. Bau des Stammes v. Calycanthus (Bot. Zeit.), u. a. — *Woroninia* Cornu.
- Wrangel**, F. A., schwed. Bot., schr. Abh. üb. Cardamine parviflora L., Stockh. 1823. — *Wrangelia* Ag.
- Wredow**, schr. Ökon.-techn. Flora Mecklenburgs, Lüneburg 1811, d. Gartenfreund (5. A. v. C. Helm, Berl. 1837). — *Wredowia* Eckl.
- Wright**, Will., schott. Arzt u. Bot., schr. A bot. account of t. Quassia Simaruba, Edinb. 1778. — *Wrightia* R. Br.
- O. W.** = **Wünsche**, Dr. O., Oberlehr. am Gymn. z. Zwickau, schr. Schulflorea v. Deutschl., Lpz. 1877, Excurs.-Fl. d. Königr. Sachsen, Lpz. 1869, Neubearb. v. Schmidlin's Anl. z. Bot., 3. A., 1882.
- Wulfen**, Francis Xavier de, Jesuit u. Prof. z. Klagenfurt, † 1805, schr. Cryptog. aquat. 1803, Pl. rar. descr. 1805. — *Wulfenia* L., Jacq.
- Wulff**, Joh. C., schr. Fl. borussica. — *Wulfia* DC.
- Wydler**, H. in Bern, De Candolle's Conservator, schr. üb. Blüten-Antholysen, Regensb. 1859, üb. dichasiale u. sympodiale Verzweig. vegetat. Achsen (Flora, 1876), u. a. — *Wydleria* DC., Lindl.
- Ximenes**, Jos., span. Apoth. — *Ximenesia* Cavend. — **Ximenes** (-nez), Franz, span. Mönch, schr. üb. mediz. Pfl. od. Quatro libro . . . que Fr.

Hernandez etc., Mex. 1605 (später Fr. Hernandez, Opera quum edita tum inedita etc., Madr. 1790). — *Ximenia* Schreb.

**Young**, Edw., schr. treatise on Opium, Lond. 1753, Farne von Wales. — **Young**, Arth., landw. Autor, † 1820, schr. Travels during 1787—89. *Youngia* Meyen, Cass.

**Zalheimb**, J., schr. de Saccharo deque viribus ejus atq. usu, 1772.

**Zaluzanski**, Adam, böhm. Bot. d. 16. Jahrh.'s, dess. Pfl.-Syst. in Zaluzanii Methodi herbariae libri tres, 1598 u. 1604. — *Zaluzanskia* Neck., *Zaluzania* Pers.

**Zanardini**, Giov., Mitgl. d. Instit. z. Venedig, schr. Synops. Algarum etc., 1841, Iconogr. phycolog. adriat. et mediterranea 1862—76, u. a. — *Zanardinia* Zanard.

**Zannichelli**, schr. istoria delle piante che nascono ne' lidi intorno a Venezia, Vened. 1735. — *Zannichellia* L.

**Zanoni**, G., schr. istoria botanica, Bologna 1675, Rarior. stirpium hist. ed. C. Montius, Bonon. 1742. — *Zanonia* L.

**Zenker**, Prof. in Jena, † 1837, schr. Fl. v. Thüringen 1836—48, merkantile Warenk. 1831—35, u. a.

**Zeyher**, bad. Geh.-Rat u. Dir. d. Schwetzing. Gart.'s, † 1843, s. Ecklon. — *Zeyhera* Spr., (-ia) Mart.

**Zimmermann**, F. J. v., schr. Grundr. d. Phytologie, Wien 1831.

**Zinn**, J. G., Prof. in Götting., schr. Catal. pl. Horti acad., Gött. 1757, Observ. bot., Gött. 1753. — *Zinnia* L.

**Ziz**, J. B., Hess. Darmst. Med.-R. z. Mainz, † 1829. — **K. Z.** = **Koch** u. **Ziz**, Samml. d. rhein. Flora s. Koch. — *Zizia* Koch.

**Zobel**, Prof. d. Forstsch. z. Weisswasser in Böhmen, † 1865, Bearb. v. Corda's Icon. fungorum, Prag 1854.

**Zoega**, J., schr. Fl. islandica. — *Zoega* L.

**Zollikofer**, schweiz. Bot., schr. Alpen-Flora, St. Gallen 1828. — *Zollikofera* DC.

**Zorn**, B., schr. Botanologia medicin. od. Anweisung u. s. w., Berl. 1714. — *Zornia* Gm.

**Zuccagni**, Attil., Gart.-Insp. z. Florenz, schr. Synops. pl. Horti Florentini, Florenz 1793. — *Zuccagnia* Thb., Red., Pers.

**Zucc.** = **Zuccarini**, Prof. z. München, † 1848, schr. Fl. d. Umgeg. v. München, 1829, Naturg. d. Pflanzenr.'s, 1843, Mitarb. v. Siebold's Fl. japonica. — *Zuccarinia* Blum., Spr.

**Zuchold**, E. A., schr. Additamenta ad Pritzeli's Thesaurum etc., 2 Fasc. 1852 u. 66.

**Zwackh**, W. v., schr. Enum. Lichenum Fl. Heidelbergensis 1862. — *Zwackhia* Kbr.

**Zwinger** (**Zvinger**), schr. Theatrum botanicum d. i. vollk. Kreuterbuch etc., Basel 1696. — *Zwingera* Schreb.

## b. Geographische Botanik oder die Autoren und botan. Werke nach den Ländern alphabetisch zusammengestellt.<sup>1)</sup>

### I. Europa.

- a) **Im Allgemeinen:** Batsch, Fries, Hepp, Nyman, Poirer, Risso (Süd-E.), Römer, J. J., Schimper, Wimmer.
- b) **Deutschland:** Abel u. Reiter, Albertini etc. (Lausitz), Alefeld, Ascher-son, F. A. (Brandenburg), Barkhausen (Lippe), Bartsch (Schles.), Bayrhofer (Taunus), Becker I (Plauen), Becker II (Mecklenb.), Berthold (Westf.), Besler (Bayern), Bischoff, Blandow (Meckl.), Bluff etc., Bönninghausen (Westf.), Böhmer (Sachs.), Boll (Meckl.), Bossler (Els.-Lothr.), Cafisch (Südostd.), Detharding (Meckl.), Dierbach (Heidelb.), Dietrich, A. (Preuss.), Dietrich, D. N. F., Dillen (Gies-sen), Döll (Baden), Dösch u. Scriba (Gr. Hess.), Ehrenberg (Berl.), Elsner (Schles.), Endlicher (Pos.), Fabricius (Gr. Hessen), Ficinus (Dresden), Fiek (Schlesien), Fingerhuth (Eiff.), Flörke, Fl. Wett. (Hessen), Flotow (Schlesien, Brandenburg, Pommern), Fuckel (Nas-sau), Fűrnrrohr (Regensburg), Funk, Garcke, Gmelin, F. Ch. (Baden), Göppert (Schles.), Grabowski u. Günther (Schlesien), Hagen (Pr.), Hallier-Koch, Hayne (Pr.), Hampe (Harz), Heller (Würzb.), Hepp (dsgl.), Hoffmann I u. II, Hoppe, Höfle (Bodens.), Hübener, Jessen, Jung (Nass.), Jungermann (Giess.), Kabath (Schles.), Karsch (Westf.), Kirschleger (Els.), Kittel, Koch, Körber, König, K. (Pfalz), Kreppehuber (Bayern), Kroker (Schles.), Kützing, Kunth (Berl.), Kunze, Lachmann (Braunschweig), Lambert (Brandenb.), Langenthal (Nordd.), Leers (Nassau), Leysser (Halle), Lösel (Pr.), Lumnitzer (Pos.), G. Meyer (Hannov.), A. Meyer (Oldenb.), Milde, Mönch (Hess.), H. Müller (Westf.), J. B. Müller (Waldeck), Murray, Necker (Mannh.), Nees u. Weihe, Nolte (Holst.), v. Otto (Sachs.), Patze etc. (Pr.), Pollich (Pfalz), Planer (Erfurt), Rabenhorst (Laus.), Ratze-burg, Rebentisch (Neumark), Regel (Bonn), Röhling, Römer, F. A., Röper (Meckl.), Rostkovius (Stett.), Roth, Rupp (Jena), Schäffer (Bay.), Schenk (Würzb.), Schkuhr, Schlechtendal (Halle etc.), Schmidt u. Kunze, Schmitz u. Regel (Bonn), Schneider (Laus., Magdeb.), Schnittspahn (Hess.), Schnizlein (Bay.), Schrader (Hannov), Schrank (Bay. etc.), Schreber (Leipz.), Schübler u. Martens (Württ.), Schultes (Bay.), Schultz (Stargard), Schultz, F. (Pfalz), Schummel (Schles.), Schwabe (Anh.), Schweykert (Carlsr.), Sendtner (Südbay.), Seubert (Südd.), Sonder (Hamb.), Sporleder (Harz), Spenner (Freiburg), Sprengels (Halle), Sturm, Suckow (Mannh.), Thomé, Timm (Meckl.), Tode (dsgl.), Uechtritz (Schles.), Valentini (Hess.), Vater (Wittenb.), Volckamer (Nürnb.), H. Wagner, Wallroth, Weber (Kiel), Weigel (Pomm.-Rüg.), Weihe u. Nees, Weis (Gött.), Wenderoth (Hess.), Wendland (Hann.), Wessel (Ostfriesl.), Wibel (Wertheim), Wiggers (Holst.), Willdenow (Berl.), Wimmer etc. (Schles.), Wirtgen (Rh.-Pr.), Wünsche (Sachs.), Wredow (Meckl.), Wulff (Pr.), Zenker (Thür.), Zeyher (Schwetzigen), Zinn (Gött.), Ziz (Rheinl.), Zuccarini (Münch.), Zwackh (Heidelb.).
- c) **Österreich-Ungarn:** Andrá (Banat, Siebenb.), Baumgarten (Siebenb.), Besser (Galiz.), Crantz, Dolliner (Nied.-Östr.), (Etinghausen (Tyr.), Herbig (Bukow.), Heussler (Tyrol), Host, Jacquin, Kalchbrenner

1) Das Nähere s. in dem Autorenverzeichnis.

- (Ung.), Kanitz (Donaul.), Kitaibel (Ung.), Knapp (dsogl.), Kosteletzky (Böhm.), Maly (Steierm.), Menyharth (Ung.), Neilreich (Croat.), Ott (Böhm.), Pohl (dsogl.), Pokorny, Presl. (Böhm.), Rochel (Banat), Sadler (Ung.), Schultes, Schulzer v. Muggenbourg (Ung.), Kanitz u. Knapp (Slavon.), Scopoli (Kärnth. etc.), Tausche (Böhm.), Thomé, Tommassini (Istr.), Trattinick, Visiani (Dalm.), Wahlenberg (Karpath.), Waldstein (Ung.).
- d) **Schweiz**: Andreaä, d'Angreville (Wallis), Chavannes, Christener, De Candolle, Ducommun, Gaudin, Godet, Gremlı, Haller, Heer, Hegetschweiler, Höfle (Bodens.), Koch-Hallier, Milde, Nägeli u. Schwendener, Schärer, Scheuchzer, Schleicher, Secretan, Suter, Thomas I u. II, Thomé, Vicat, Vogel, Zoilikofer.
- e) **Niederlande u. Belgien**: Boerhave (Nied.), Crepin (Belg.), Dumortier (Belg.), Hannon (dsogl.), Kickx (Fland.), Lejeune (Belg.), Lestiboudois (dsogl.), Libert (do.), Morren (do.), Westendorp (do.).
- f) **Dänemark**: Heiberg, Holmskiöld, Hornemann, Lyngbye, O. F. Müller, Oeder, Rostrup, Schumacher.
- g) **Skandinavien mit Lappland**: Acharius, Agardh, Blytt (Norw.), Düben u. Ihrmann (Schwed.), Fries I u. II, Gunner (Norw.), Hartmann (Schwed.), Liljeblad (dsogl.), Lindblad (do.), Nylander, Retzius, Swartz, Thedenius (Schwed.), Wahlenberg (Lappl.), Wahlberg (Gothenb.).
- h) **Grossbritannien**: Aiton, Babington (norm. Ins.), Bentham, Berkeley, Bolton, Curtis, Dickson, Dillen, Dillwyn, Don, Engl. Botany, Edwards (bot. Regist.), Endlicher (Norfolk), Francis, Goodenough, Grew, Greville (Schottl.), Hassall, Hill, Hooker u. Taylor, Howe (Derbysh.), Hudson, Knapp, Lightfoot (Schottl.), Lindley, Lindsay, Loudon, Lowe, Newman, Parnell (Schottl. etc.), Pratt, Ray (Rajus), Relham (Cambridge), Smith, W., Smith, J. E., Sowerby, Stackhouse, Symons (brit. Ins.), Threlkeld (Irl.), Turner, Watson, Wilson, Withering.
- i) **Frankreich**: Balbis, Barrelier, Bastard, Boreau, Bosc, Bulliard, Castagne, Chaix, Cosson u. Germain, de Candolle u. Duby, Delarbre, Desmazieres, Desvaux, Duhamel, Dujardin, Durieu, Garidel, Gauthier, Godet, Godron u. Grenier, Gouan, Guépin, Jaune St. Hilaire, Lamarck, Lapeyrouse (Pyren.), Lecoq, Lelieur, Leroy, Lesson, Loiseleur, Merat, Nylander (Gall. u. Algerien), Poiteau (Par.), Ramond (Pyren.), Soulavie (Südfr.), Soyer-Willemot, Suard, Thuillier (Par.), Tournefort, Vaillant, Ventenat (Malmaison), Vigneux (Par.), Villars (Dauph., Strasb.).
- k) **Spanien u. Portugal**: Asso, Barrelier, Bernal (Aragon.), Cambesedes (Balear.), Colmeiro, Figueiredo (Port.), Hoffmannsegge u. Link (Port.), Lagasca, Lapeyrouse (Pyren.), Loeffling, Ramond (Pyren.), Solms-Laubach (Algarvien), Webb, Willkomm u. Lange.
- l) **Italien**: Allioni (Piem.), Balbis (Turin), Barrelier, Battarra (Rimini), Bellardi (Piem.), Beltramini (Bassano), Bernardi (Sicil.), Bertoloni, Bivona-Bernardi (Sic.), Boccone (Sic. u. Malta), Brignoli (Modena), Cesati, Cupani, Donati (Venet.), Gasparrino (Palermo), Gennari (Ligur.), Gussone (Sic.), Meneghini (Eugan. etc.), Micheli (Florenz), Monti (Bologna), Moretti, Nozza (Tessino), de Notaris, Parlatore (Sic. etc.), Passerini (Ob.-It.), Presl (Sic.), Rè (Segus., Turin), Savi (Etrur.), Scopoli (Insubr.), Tenore (Neap.), Todaro (Palerm.), Trevisan (Venet.), Turra, Viviani, Zannichelli (Vened.), Zanardini (adr. u. Mittelm.), Zuccagni (Florenz).
- m) **Türkei, Griechenland u. s. f.** (Balkanhalbinsel): Ascherson u. Kanitz (Bosn., Serb. etc.), Bory de St. Vincent (Pelop., Cyklad.), Bux-

baum (Constantinop.), Dumont d'Urville (Archipel etc.), Kanitz (Bulg.), Olivier (Türk.), Sibthorp (Griech.).

- n) **Russland u. Kaukasusländer:** Adams (Sibir., Kauk.), Marschal von Bieberstein (Südr., Kauk.), Fischer, F. E. L. (Petersb.), Fischer v. Waldheim (Mosk.), Gilibert (Lith.), Gmelin, S. G. (Russl., Krim), Grindel (Ostseep.), Kalm (Finnl.), Karsten (desgl.), Kühlwein, Laxmann, Ledebour, Liboschitz (Petersb., Mosk.), C. A. Meyer (Kaukasus etc.), Pallas, Rostafinski (Polen), Stephan (Mosk.), Steven (Krim), Weinmann (St. Petersb.).

## II. Asien und indischer Ocean.

- a) **Orient (Levante) und Arabien:** Alpinus (Orient), Anderson (Aden), Billardier (Syr.), Boissier (Pers.), Botta (Yemen), Buhse (Armenien), Endlicher u. Fenzl (Kabul), Fenzl (Syr., Taurus), Forskål (Arab. etc.), Griffith, Gronovius (Orient), Labillardier s. Billardier, Olivier (Pers.), Shaw (Levante), Schubert (Arab. etc.), Tournefort (Levante), Trautvetter, E. R. v. (Armen., Kauk.).
- b) **Sibirien, Nordost- u. Centralasien:** Adams (Sib.), Bongard u. C. A. Meyer, Bunge (Altai), Glehn, A. v. Humboldt, Ledebour (Altai), Maximowicz (Amur), Regel (Turkest.), Ruprecht, Schmidt, F. (Amur), Trautvetter, E. G. (Nordsib.), Turezaniow (Baikal, Daurien).
- c) **Ostindien u. Sundainseln:** Anderson (Ceyl.), Arnott-Walker, Beccari (Malayen-Archipel), Bennett (Java), Blume (dsogl.), Bosch (dsogl.), Burmann, Colebrooke, Commelyn, Choisy (Java), Don D. (Nepal), Dozy (ind. Archipel), Dumont d'Urville (Ost. Archip.), Graham (Bombay), Hasscarl (Java), Hermann (dsogl.), Hooker, J. D. (Himalaya), Hooker u. Thomson (Ind.), Horsfield (Java), Houstoun (Süd-asien), Humboldt (Mitt.- u. Südas.), Jack (Sumatra), König, J. G. (Ostind.), Kops (Java), Kurz (Birma), Leschenault (Südas.), Miquel (Sundains. etc.), Moritz (Java), Museum Zeylanicum (Ceyl.), Nees, Walker-Arnott u. de Candolle (Ostind.), Reinwardt (ind. Archip.), Rheede (Ostind.), Roxburgh (dsogl.), Royle, Scheffer (Java), Sonnerat (Ostind.), Steetz (Südas.), Sweet (dsogl.), Thwaites (Ceyl.), Valentini M. B. (Ind.), de Vriese (Ostind., Java), Wallich (Nepal etc.), Wendland jr. (Südas.), Wight (Ind.), Zollinger (ind. Archip.).
- d) **Ostasien mit Philippinen und Molukken:** Bentham (Hongkong), Blanco (Phil.), Bretschneider (China), Dozy (Japan), Fortune (China, Japan), Hance (Hongkong), Kaempfer (Japan), Lehmann (Ostas.), Loureiro (Cochinchina), Maximowicz (Amurl.), Miquel (Japan etc.), Noronha (Phil.), Regel (Ussuri), Rumpf (Rumphius) (Mol.), Schmidt, F. (Amur), v. Siebold u. Zuccarini (Jap.), Sonnerat (China etc.), Suringar (Jap.), Thunberg (dsogl.), Zuccarini s. v. Siebold.
- e) **Indischer Ocean:** Balfour f. (Rodriguez), Bojer (Mauritius), Commer-son, Baker (Maurit. u. Seychellen), Duncan (Maurit.), Reichardt (Ins. St. Paul).

## III. Afrika nebst Inseln:

Afzelius (Sierra Leone), Alpin (Ägypt. etc.), Bergius (Cap), Burmann (Cap), Burmann f., Delile (Ägypt.), Durieu (Algerien), Ecklon u. Zeyher (Cap), Forskål (Ägypt. etc.), Foureroy (dsogl.), Fresenius (Ägypten u. Abyssmien), Hiern (trop. Afr.), Hooker, W. J. (Niger), Kirk (Südafrika), Kolbe (Cap), Kotschy (Ägypten), Nylander (Algerien), Oliver (trop. Afr.), Olivier (Ägypt.), Palisot de Beauvais (Oware u. Benin), Pappé (Cap), Petit-Thouars, Poirét (Berberei), Schmidt, J. A. (Capoverde), Schousboe (Marokko), Schrader (Cap),

Schubert (Ägypt. etc.), Schweinfurth (nub. Küste), Sonnerat (Guinea), Thunberg (Cap), Vesling (Ägypt.), Willemet (Marokko). — **Afrik. Inseln:** Baker (Seychellen), v. Buch (canar. Ins.), Carmichael (Tristan d'Acunha), Commerson (Madagaskar), Desfontaines (atl. Ozean), Lowe (Madeira), Lugo (Teneriffa), Petit-Thouars (afr. Ins.), Schmidt, J. A. (capoverd. Ins.), Seubert (Azoren).

#### IV. Amerika.

- a) **Südamerika:** Aublet (Guiana), Bancroft (dsgl.), Berg, O. (Bras.), Bonpland, Bosc, Colla (Chili), Feuillée (Peru, Chili), Fl. Peruviana v. Ruiz u. Pavon (do.), Gay Cl. (Chili), Gillies (do.), A. de St. Hilaire (Bras.), Hieronymus (Patagon.), Humboldt, Karsten, Leschenault, Lund (Bras.), Marcgrav (do.), Martius (do.), Michaux, Miers (Bras., Chili), Mikan (Bras.), Molina (Chili), Montagne (Bolivia, Guiana), Pöppig u. Endlicher (Chili), Pohl (Bras.), Raddi (do.), Ruiz u. Pavon (Peru, Chili), Schöpf, Schomburgk (Guiana), Spring (Bras.), Ulloa, Vandelli (Bras.), Wagoner (Venezuela).
- b) **Westindien u. Mittelamerika incl. Mexiko:** Amson, Bateman (Guatemala, Mex.), Bonpland, P. Browne (Jamaika), Desfontaines (atl. Ins.), Desportes (St. Domingo), Grisebach (Westind.), Hamilton (do.), Hartweg (Mex.), La Llave u. Lexarza (do.), Liebmann (do.), Humboldt, Bonpland u. Kunth (Mex. etc.), Plumier (Westind.), Sloane (Jamaika), Swartz (Westind.), Tussac (Antillen).
- c) **Nordamerika:** Amson, Arthur (Jowa), Barton (Virgin.), M. v. Bieberstein, Bigelow (Boston), Bosc, Catesby (Carolina), Clayton (Virg.), Desfontaines (atl. Ins.), Elliott (Carol.), Engelmann (Union), Asa Gray (Texas, Neu-Mex.), Gronovius (Virg.), Hampe, Harvey, Marshal, Medicus, Michaux, Mühlenberg, Nuttall, Pursh, Rafinesque, Richard, Robin u. Rafinesque (Louis.), Schöpf, Sullivant, Torrey u. Gray, Tuckermann, Ulloa, Walter (Carol.), Webb.

#### V. Australien und Südsee:

- R. Brown (Neuholl.), Dieffenbach (Neuseel.), Forster (Australoz.), Gris mit Brongniart (Neucaled.), Hombron u. Jacquinet (Südsee-Ins.), Hooker, J. D. (Neuseel.), Kny (Australozean), Labillardier (Neuh. u. Neucal.), Leschenault (Neuh.), Lindsay (Neuseel.), F. v. Müller (Austr. u. Papualand), Seemann (Fidschi-Ins.), Sonder (trop. Austr.).

### e. Spezialbotanik oder botanische Monographien, Dissertationen und andere Spezialschriften nach dem Inhalt alphabetisch geordnet.<sup>1)</sup>

Acanthaceae, Ceylon-, Anderson.  
 Acanthion u. Acanthus terms, Yates.  
 Acerum Revisio, Spach.  
 Achilleis, de -, Meckel u. Willdenow (1789).  
 Achlya prolifera, Pringsheim.

Aconiti generis Monogr., Reichenbach.  
 Aconito, de - observ., Koelle.  
 Aconitum, Seringe.  
 Aconitum, Esquisse d'une Monogr. du genre - (sans nom).

1) Das Nähere siehe in dem Autorenverzeichnis.

- Actinea**, Jussieu.  
**Adventivknospen**, Magnus u. A. Braun.  
**Aegagropila Sauteri**, Lorenz.  
**Agaricorum** Monogr., Persoon, — (nach d. Lamellen geordn.), Otto, J. G. (1816).  
**Agave americana**, Vogel, — (notes on -), Engelmann, G. (St. Louis 1875).  
**Agave et Fourcroya**, Zuccarini.  
**Agaven-Studien**, Koch, K.  
**Agrikulturpflanzen**, Ernährung der -, Walz.  
**Agrostographiae** fundamentum, Trinius.  
**Agrostographie** du Nord de la France, Desmazières.  
**Agrostogr.**, essai de nouv. -, Palisot-Beauvais.  
**Agrostographia** Helvet., Scheuchzer.  
**Agrostologie** helvet., Gaudin.  
**Akazie**, Cultur der -, J. G. Hess.  
**Algae** britann., Grew.  
**Algae** brit., fresh-water -, Hassall, — Cooke, M. C. (Lond., 13<sup>o</sup> kol. T.).  
**Algae japonicae**, Suringar.  
**Algae ochotenses**, Ruprecht.  
**Algarum** species, Kützing (Lips. 1849).  
**Algarum Sueciae** Dispos., Agardh.  
**Algarum** Synopsis, Zanardini.  
**Algarum unicellarum** g. n., A. Braun.  
**Alge**, eine neue parasitische, J. Kühn (Halle 1879).  
**Algen**, über einzellige -, Nägeli, — Neill, (Befr., Vermehr. etc. vieles) Pringsheim.  
**Algen** Deutschlands, Rabenhorst (Kryptog.-Flora, Lpz. 1844—53).  
**Algen** v. Deutschland, Römer, F. A.  
**Algen**, die - des süßen Wassers, Nees sr. (Hamb. 1814).  
**Algen**, die - in Plantae Ecklonianae, Rudolphi.  
**Algen**, die - des trop. Australiens, Sonder.  
**Algen**, mikroskopische -, Cohn, F. (viele Schriften).  
**Algenflora** v. Württemberg, Kirchner, O. (1880).  
**Algenkunde**, Beitr. zur -, v. Suhr.  
**Algensysteme**, neuere -, Nägeli.
- Algentypen** der Flechtengonidien, Schwendener.  
**Alge** italiche e dalmatiche, Meneghini.  
**Algologia** adriatica, Naccari.  
**Algologiam** etc. (Contributiones ad -) Reinsch (1875).  
**Algologische Mittheilungen**, A. Schenk (1857).  
**Algues**, Brébisson, — (Physiol. des -) Derbès u. Solier.  
**Allii** species, Treviranus.  
**Aloë**, amerikanische -, Major (Schlesw. 1668).  
**Aloës et Mesembryanthemi** Mon., Salm-Dyck.  
**Aloidarium**, Munting.  
**Aloide**, de -, de Bergen.  
**Alpenflora**, Atlas der -, Hartinger Ant. (Wien, I—XXVII).  
**Alpenflora** des Libanon, Kotschy.  
**Alsodeiarum** Ill. et Descr., Oudemans.  
**Amarantorum** Hist., Willdenow.  
**Amaryllideen**, Herbert.  
**Ammoniacum** et Asa foetida, Borszczow.  
**Amazonenpalmen**, Spruce.  
**Anabasearum** Revisio, Bunge.  
**Anacardiées**, Payer.  
**Ananascultur**, Gontois.  
**Anaphytose** (Pflanz.-Verjüngung), Schultz, C. H. (Berl. 1843).  
**Anatomie** d. Pfl. (gekr. Preisschr.) Rudolphi, — Grundzüge der -, Kieser.  
**Anatomy** of plants, Grew.  
**Anatomie** u. Physiologie d. Pfl., Schacht, — Unger (1855).  
**Andropogonearum** Mon. (Anthistirieae), Andersson.  
**Anemonearum** Revisio, Pritzel.  
**Anémones**, s. q. nouv. esp. des -, Jussieu.  
**Angio-** u. **Gymnospermen**, Strasburger.  
**Anonacées**, Dunal.  
**Antholysi**, de -, Engelmann, G. (Francof. 1832).  
**Anthospermeae**, Cruse.  
**Antirrhineae** (Mon.), Chavannes.  
**Antrocephalus** (Lebermoos), Lehmann.  
**Araceae** (Monogr.), Engler.  
**Armeriae**, de gen. -, Ebel, W. (Königsb. 1840).

- Aroideen**, Schott, — Petri, Fr. (Berol. 1863).
- Arbres et arbrisseaux**, Desfontaines.
- Arbres fruitiers**, Petit-Thouars.
- Arboriculture fruitière**, Pynaert.
- Arnicæ vires**, Collin.
- Artemisia glomerata**, Batka.
- Artemisiarum** Mon., de Besser.
- Artemisiis**, de -, Stechmann.
- Artischöke**, Brückmann.
- Arzneimittellehre** (Lehrb.); Buchheim, R. (Lpz. 1859), — (Grundzüge der -), Binz (3. A., 1879).
- Arzneigewächse**, Hayne.
- Arzneikräuter-Wiss.** (2. A., 1770), Schäffer.
- Arzney- u. techn.-wicht. Pfl. geschl.**, Berg, O. (Berlin 1845).
- Asa foetida et Ammoniacum**, Borszczow.
- Asaro**, de -, Scheffler.
- Ascomyceten**, Bauke (1877).
- Asperifoliae nuciferae**, Lehmann.
- Astragalorum** Spec., Pallas.
- Astrantia** (Mon.), Stur.
- Atropa Belladonna**, Thunberg u. Lindbohm.
- Aufstieg**, wirthsch. Bedeut. der -, Uhlrig, C. (Dresd. 1875).
- Aurikel**, Gesch. der -, Kerner.
- Avellana Mexic.**, Spies u. Brückmann.
- Azolla**, Strasburger.
- Azolla nilotica**, Decaisne u. Mettenius.
- Azollen**, Beitr. z. Kenntn. der -, Meyen.
- Balanophoren**, zur Kenntn. der -, Göppert.
- Balanophoræ javanicae**, Junghuhn.
- Balanophoreae**, O. Beccari.
- Balsaminearum**, de floribus etc. -, Roeper (1830).
- Balsamum de Mecca**, Nicolai.
- Bambuseae**, Ruprecht (1839).
- Bastardbefruchtung**, Wichura, — F. v. Gärtner.
- Bastarderzeugung**, Wiegmann, — F. v. Gärtner (1849).
- Batis maritima** L., Torrey.
- Batrachium**, Rossmann.
- Baumfarne**, Wagener.
- Baumpflanzung** in d. Städten, Fintelmann, L. (Bresl. 1877).
- Baumschnitt** (Darstellung), Lucas (1879).
- Baumschule**, die -, H. Jäger (1868).
- Baumzucht**, Harbke'sche wilde -, du Roi (1795—1800), neu v. Pott (1874).
- Bäume** Mecklenburgs, Becker, H. Fr.
- Bäume**, unsere - und Sträucher, B. Plüss (1884).
- Beanfortia et Regelia**, Schauer.
- Beerenoast** d. Gärten, Maurer (1867).
- Befruchtung** etc., Treviranus (1844).
- Befruchtungslehre**, Corda.
- Befruchtungsorgane**, v. Gärtner.
- Befruchtungstheorie**, Hartig.
- Befruchtung** durch Insekten, Sprengel, — H. Müller.
- Begoniaceen**, Klotzsch.
- Begoniacées**, Mem. sur la fam. d. -, de Candolle, A.
- Bepflanzung** d. Strassen etc., Jablanzky (Wien 1879).
- Betulacearum** Mon., Regel.
- Bicornes**, Klotzsch.
- Bienenflora**, Alefeld (1863).
- Bignoniaceae surinam.**, Splitgerber.
- Biologie**, allgem., d. Pfl., Agardh, C. A. (1832), — (Beitr. z.), Cohn, F. (Br. 1875—85).
- Birkenfamilie** in Italien, Schouw.
- Birnen-Classification**, Jahn.
- Blattpflanzen**, Dippel.
- Blattstellung** (Wechsel etc.), Schwendener (1879—83).
- Blätterschwämme** (Eintheil.), Tode.
- Blaugummibaum**, v. Hamen (1876).
- Blumengärtner**, praktischer (4. A.), Gruner, — Förster, C. F.
- Blumengärtnerei**, Bosse.
- Blumenstudien**, Reichel.
- Blumenzucht** in ihr. ganzen Umfange, Bouché.
- Blumenzwiebelgärtner**, Neuen-
- Blütenantholyse**, Wydler. [hahn.
- Bolnen** (Garten-), Martens.
- Boletus suaveolens**, Enslin.
- Boopis** et Acicarpha, Jussieu.
- Borbonia**, Thunberg u. v. Hartmann.
- Boswellia**-Arten (Entd.), Cartèr.
- Boswellia**, Colebrooke.
- Botrychiorum** Mon., Milde, J. (Vindob. 1869).
- Botrydium**, ein neues -, Kützing.
- Bouvardia**, Schlechtendal.
- Brandpilze**, Rostrup, — de Bary (Berl. 1855).



- Brand-**, Rost- und Mehlthauptilze um Wien, Voss, W. (1876).
- Braya**, Sternberg u. Hoppe.
- Bryologia italiana**, de Notaris.
- Brombeersträucher**, deutsche -, Weihe u. Nees v. Esenb.  
— Mecklenburgs, Betcke.
- Brotbaum**, ostind. -, Panzer.
- Brunia**, Thunberg u. Nyblaens.
- Bryologia Algarviae**, Solms-Laubach, Gr. v.  
— britannica, Wilson.  
— europaea, Bruch u. Schimper.  
— germanica, Nees, Hornschuch u. Sturm (Nürnb. 1823—31).  
— mosquensis (Florula), Fischer v. Waldheim.  
— silesiaca, Milde, J. (Lpz. 1869).  
— universalis, Bridel-Brideri.
- Bryologie**, skandinavische -, Berggren.
- Bryologische Notizen** aus d. Rhön, Geheeb (1870—71).
- Bryoniae albae**, de radice -, Schwägrichen und Trautmann.
- Bryophyllum calycinum**, Berge, H. (1876).
- Butyrospermum**, Kotschy.
- Büttneracées**, J. Gay.
- Büttneriearum** in Nova-Hollandia Mon., Steetz.
- Buxbaumia** (Blasia, Jungermannia), de -, Schmidel.
- Byssorum** et Fungorum Ill., Cherler.
- Cacao** u. Chokolade, Mitscherlich.
- Cactaeae** in horto Dyckensi, Salm-Dyck.
- Cactearum Enumeratio**, Pfeiffer.
- Cactearum Genera**, Miquel.
- Cacteen**, Anatomie der -, Harting, — Schleiden.  
— Bearb. der -, Scheidweiler.
- Cactées** et Berbérinées (Organogénie), Payer.
- Café**, du -, Chevallier (1862).
- Caffé**, de - (chocolateae, herbae theae ac nicotianae natura), Meisner, 1721.
- Caïnea** (Chiococca), Langsdorff.
- Calamites**, Ettinghausen.
- Calendula officinalis**, Geiger.
- Calligoneae** arabo-caspicae, Borszczow.
- Calothamnus**, Schauer.
- Calycanthus**, Stammbildung des -, Woronin.
- Cambium** u. Dickenwachsth., Schumann, C. (1873).
- Camellia** et Thea, Synops., Seemann (1859).
- Caucellien**, üb. -, Berlièze (Berlin 1838).
- Camphrier**, sur le -, Vriese.
- Canne à sucre**, Payen.
- Cantua**, Jussieu.
- Caoutschouk** u. Sassaaparille, Royle.
- Capparideae**, Calycereae etc., Walpers.
- Capsici**, Mon. gen. -, Fingerhuth (1832).
- Cardamine parviflora**, Wrangel.
- Carica** Papaya, Wittmack.
- Caricologia**, Willdenow.
- Caricologia germanica**, Hoppe.
- Caricologiae** Symbolae, Drejer (Lips. 1844).
- Caricum distigmat.** Synopsis, Fries.
- Carex** Hist. d. - Schkuhr, de la Carnivorous plants, Beal. [Vigne.
- Carpologia**, Gärtner.
- Casses** et Sénéés, Colladon.
- Cassia** Filipendula, de Candolle.
- Cassiengruppe** Senna, Batka (Prag 1873).
- Cassiniaceen**, Schultz-Bipontinus.
- Castanea vesca** s. vulgaris, Haynald, J. L.
- Casuarineen**, Miquel.
- Casuariniis**, de -, Stache.
- Catalpa**, über -, Bolle, C.
- Catechino**, de -, Zwenger.
- Cedri mont. Libani** etc., Trew.
- Cerastien**, drei -, Stein, B. (1878).
- Ceratophylleae**, Schleiden.
- Céréales** de la Suisse, Mon., Seringe (Bern 1818).
- Cerealien**, europäische, Metzger.
- Cerealium characteres**, Schübler.
- Chaerophyllum bulbosum**, Londez, — nitidum, Ascherson.
- Chamaelauciae**, Schauer (Vratisl. 1841).
- Chamaerops excelsa**, Gay.
- Champignons**, Palisot, Tulasne, — (böhm.), v. Leonhardi (1863).  
— comestibles, Dufour, — (Hist. d. com. et vénén.), Roques.  
— hypogées, Tulasne, — (aus Columbien etc.), A. Braun (1858).  
— Icones et Classific. d. -, Leveillé,

- Champignons**, de la France, Bulliard.  
 — quelq. esp. de l'Amér., Bosc.
- Characeen**, europ. -, Sydow, — die, Afrikas, A. Braun (1868).
- Charen** (Befrucht.), de Bary (1871), — (Keimung), de Bary (1875).
- Chênes de l'Amérique**, Michaux.  
 — de l'Amér. tropic., Liebmann.  
 — de France, Bosc.
- Chenopodearum** Mon., Moquier-Tandon.
- China**, della arbore -, Turra.
- China officinalis**, Schwalbe.
- Chinabäume**, Weddell.
- Chinarinde**, chem. Unters. der -, Cothenius.
- Chinin** u. Chinarinden, Binz, C. (1880).
- Chionyphe**, Thienemann.
- Chloranthaceen**, Miquel.
- Chloris protogaea**, Unger.
- Chlorophyll** (Entsteh.), Wiesner, — Böhm, J. A. (1857), — Mikosch, — Haberlandt, — (Untersuch.), Pringsheim (1876—81).
- Chlorophylle** (Réch. microsc. s. l.), Gris, A. (1857).
- Chocolata inda**, Norimb. 1644, Colmenerus, A., — Ledesma.
- Chocolatae de potu**, Linné u. Hoffmann.
- Chrysanthemum indicum**, Rupprecht.
- Cichoriacearum** Palatin. Anales, Schultz-Bipontinus.
- Cichoreis**, de -, Gochnat.
- Cicuta aquatica**, Wepfer.
- Cicuta virosa**, de -, Thomé.
- Cienkowskia**, Baillon.
- Cinchona**, Weddell.
- Cinchonae** Mon. Tent., Rohde, — (Mon. d. Gatt.), Kuntze (Lpz. 1878).
- Cirsien** der Schweiz, Nägeli.
- Cistacearum** Consp. Mon., Spach (1836), — (Organogr.), Spach (1837).
- Cistinées**, St. Hilaire.
- Cladonia**, Dufour.
- Cladoniis**, de -, Floerke.
- Claytonia cubensis**, Bonpland.
- Clusiacees**, Baillon, — (Hyperic. etc.), Müller, K. (1882).
- Coenogonium Linkii**, Schwendener.
- Coffea**, de -, Georgii, — Abendroth, — Marcus.
- Colocasia odora** etc. (note s. l.), Brongniart.
- Commelinaceae** indicae, Hasscarl.
- Compositae** Australiae, Steetz.
- Compositarum** Synops., Lessing.
- Confervae britann.**, Dillwyn.
- Conferves d'eau douce**, Vaucher.
- Coniferae**, Traité gén., Carrière.
- Coniferarum** Synops., Endlicher (Sangalli 1847).
- Coniferen**, Antoine, Fr. (Wien 1840, 54 T.).
- Coniferen**, Cycadeen etc. (Commentar), Richard.
- Coniferen**, Hochstetter u. Henckel. — Strasburger, — Fam. der -, Courtin (Stuttg. 1858).  
 — (geograph. Verbreit.), Beinling (Bresl. 1858).  
 — (männl. Blüte), Zeile.  
 — (Morphologie), Zuccarini.  
 — einige, des cilicischen Taurus, Antoine u. Kotschy.  
 — fossile, Goeppert.
- Coniferenblätter**, Berthold (Bresl. 1875).
- Conifères** (Pinetum), Gordon.  
 — resin., Cult. forest., Gihoul.
- Coniferis**, de -, v. Tschudi.  
 — de - et pice conficienda, Axt.
- Corallines**, s. les -, Trevisan.
- Corchoro**, de -, Wedel.
- Coton**, cult. d. -, Aubry le Comte.
- Cranberry** (Oxycoccus), Webb.
- Crassulacées**, de Candolle.
- Crataegus et Mespilus**, Koch, K. (1854).
- Crotonis** Monogr., Geiseler.
- Cruciformium** Classis, Crantz.
- Cruikshanksia**, Miers.
- Cryptogamae aquaticae**, Wulfen.
- Cryptogamae britann.**, Dickson.
- Cryptogamae guianenses**, Montagne.  
 — italicae, Bertolini.  
 — Trans-Caucasicae, Nordmann.  
 — vasculares Ligusticae, Genari.
- Cryptogamarum** botanice, Payer.  
 — german. Flora, Wallroth.
- Cryptogamia**, Schrader.
- Cryptolepis**, Falconer.
- Cucurbitacées**, Naudin, — (la vrille d. -), Chatin, A. (1866).  
 — nouvelles, Cogniaux, — (s. la constit. de l'androcée etc.), Bailon, L. (1878).

- Cuscutae** genus, Engelmann, G.  
**Cycadearum** Monogr., Miquel (Trajecti 1842).  
**Cycadeen** nymejanske, Samm.  
**Cycadées**, de pl. -, Lehmann.  
**Cynanchum**, Thunberg u. Almer.  
**Cynarocephalorum** Syn., Lessing.  
**Cynoglossa**, de -, Schreck.  
**Cyperacearum** Collectio, Lager u. Reuter.  
**Cyperaceen**, Nees v. Esenbeck (Zeichn. dazu, Putterlick).  
**Cyperacées** de Mex., Liebmann.  
**Cypero** esculento, de -, Preuschen.  
**Cyperographia** synoptica, Kunth.  
**Cyperus**, Fenzl.  
**Cyrtandraceae**, Jack, W.  
**Czackia**, Andrzejowsky.
- Dahlia**, sur la cult. de -, Thouin.  
**Damenbotanik**, Boitard, — Reichenbach, A. L., — Lindley, J.  
**Daphne**, Thunberg u. Wickstroem.  
**Darlingtonia** californ., Torrey J. (Washingt. 1853).  
**Dattelpalme**, Pollen der -, Fourcroy.  
 — (Wachstum), Daubenton.  
**Dattier**, le -, Delchevalerie (Gand, 1873).  
**Degenerieren** d. Obstsorten, Knight.  
**Delphinis**, quibusd. addit. Aconito, de -, Reichenbach.  
**Dendrologie**, Aldrovandi, — Koch, K.  
 — britische, Watson.  
 — deutsche, Lauche.  
 — Russlands, Regel.  
**Desmidiacées** italiane, de Notaris.  
**Desmidiarum** Syn., Meneghini.  
**Diagramme** der Rhoeadineen, Schmitz, Fr. (Halle 1878).  
**Diatomaceae** danicae, Heiberg.  
**Diatomacearum** brit. Syn., Smith, W.  
 — Synops., Kützing.  
 — (Conjug.), Thwaites.  
**Diatomaceen**, Pfitzer, — (Bau u. Nat.), Weiss, A. (1871), — pelagische d. Ostsee, Engler (1883).  
**Dichlamydeae** plantae, G. Don.  
**Dickenwachstum** d. Holzkörpers, Kny, L. (1882), — d. Stengels, Nägeli, C. (1864).  
 — u. Cambium, Schumann (1873).  
**Dionaea** (Monogr.), Ellis.
- Dionaea muscipula** (elektr. Beweg.), Munk.  
 — (Notice s. l. g.) Dumortier (1837).  
 — (some experim.), Balfour f.  
**Dioscorea** batatas, Decaisne.  
**Diplolaena**, Desfontaines.  
**Dipsacées**, Coulter.  
**Disporum** gen., D. Don.  
**Dracaena**, Thunberg u. Dalmann, — Berthelot.  
**Drachenbäume** (Wachstum), Wosidlo, — (im Allgem.), Koch, K. (1855).  
**Dracunculis**, de -, Besser, W. S.  
**Drosera** (Tentakeln), Darwin, Fr.  
**Droseracées**, St. Hilaire.
- Echites**, Thunberg u. Hast.  
**écorce**, l', Vesque.  
**Edgeworthia**, Falconer.  
**Elatinearum** Mon., Seubert.  
**Elektromotor**. Wirkung an Pfl., Kunkel.  
**Embryonen** monocotyl. -, Solms-Laubach.  
**Ephen-Luftwurzeln**, Schuch.  
**Epidermis-Funktionen**, Desrousseaux.  
**Epilobium**. Mon. d. Gatt., Haussknecht, C. (Jena 1884).  
**Equisetaceen**, Duval-Fouve.  
 — (Schutzscheide), Pfitzer.  
**Equiseten** (Monogr.), Milde (Dresd. 1867).  
**Equisetenzellen**, Holzzellen etc., Sanio.  
**Equisetum**, Wickstroem.  
**Erdäpfel** (Abh.), Ludwig, J. A. J.  
**Erdbeerentreiberei**. Gontois.  
**Erfrieren** der Obstbäume, Oberdieck.  
**Ergot** of t. Rye, Quekett.  
**Ericarum** Icones et Descr., Wendland.  
**Eriocaulacearum** Monogr., Körnicke.  
**Eriocaulon** du Bresil (Mon.), Bonnard.  
**Ernährung** d. Pfl., Schmacher.  
**Erysimum**, Gay, J.  
**Essbare** Schwämme, unsre -, Medicus W.  
**Essb.** u. schädliche Schwämme in Abbild., Krombholz.  
**Eucodium** rosae, Strauss.  
**Euphorbiacearum** genera, Jussieu, A. de.

**Euphorbium** Enumeratio, Roeper.  
— Pharmacographia, Landsberg.

**Faëce cerevisiae**, de -, Bail.

**Farbverhältnisse** d. Blüten, Schüb-  
ler (1833).

**Färbepflanzen**, Vogler.

**Farne**, Deutschlands-, Waldner.

— fossile -, Goepfert.

— Lebermoose u. Algen, Nees v.  
Esenbeck sr.

— Pflanzengr. der -, Luerssen  
(Berl. 1874).

**Farnflora** von Chili, Sturm, J. W.

**Farnkräuter**, Kultur der -, Courtin,  
— Plaschnik, — (in kol. Abb.),  
Kunze, G. (1841—51).

— (Entwickl. - Gesch.), Leszczye-  
Suminski, — Kny.

— (Wesen der -), Kaulfuss, —  
(Cultur u. Wachstum), Sadebeck  
(1877).

— (Wachstum u. Bau), Stenzel  
(1859—61).

**Farsetia** (Mon.), Fournier.

**Fasergewebe** des Leins, Hanfs etc.,  
Reissek (1852).

**Fenster-** u. Zimmergarten, Bouché.

**Ferns**, british, Newmann, — brit.  
and exotic., Lowe.

— of Derbyshire, Howe.

— of Great-Britain, Sowerby u.  
Johnson.

**Ferulaceen** der caspischen Wüste,  
Borszczow.

**Fettpflanzen**, Säurebildg. d. -, de  
Vries (1824).

**Ficoidées** et Cactées, Payer.

**Ficus**, Thunberg u. Gedner.

**Fieberheilbaum**, v. Hamm (1876).

**Fiebrerrinde** (Abh.), Säm-Dyck.

**Filices brasilienses**, Raddi.

— britann., Bolton.

— Deckenianae, Kuhn, M. (Lps.  
1867).

— javan. Horti Bogot., Hasscarl.

— jenenses, Dietrich, D.

— Lechnerianae Chil. et Peruv.,  
Mettenius, G. (Lpz. 1856—58).

— verae Hungariae etc., Sadler.

— Musci frondosi et hepatici, Weber  
u. Mohr (1807).

**Filicetum americ.**, Plumier.

**Filicium** Afric. austr. Syn., Pappé  
u. Rawson.

— berolinens. Syn., Stempel.

**Filicium** Enumeratio, Kaulfuss.

— Icones, Hooker u. Greville (Lond.  
1831).

— semina, Wolff.

— Synopsis, Hooker f.

**Flachsbau**, der -, Giersberg (Lpz.  
1877).

**Flechten**, Meyer, G. F. (Entwickl.,  
Metamorph. u. Fortpfl.).

— Normann, — d. Grossh.'s Hes-  
sen, Friedrich, C. (Riga 1878).

— u. fossile Pfl., Massalongho.

— Geschichte der -, Wallroth.

— Europa's (getrockn.), Hepp.

— morphol. Grundr. d. Fam. d. -,  
Montagne.

— der Wetterau, Theobald.

— (Plaudereien), Stitzenberger.

— (als Parasiten der Algen), Krem-  
pelhuber

— Gesch. u. Liter. d. -, Krempel-  
huber.

— von Nordamerika, Tuckermann.

**Flechten - Theorie** (Abwehr der  
Schwendener'schen) Körber (1874).

**Flechten-Gonidien**, Bornet u. Thu-  
ret.

**Flechtensystematik**, Stitzenberger.

**Fleischfressende** Pflanzen, Rees u.  
Will, — Pfeffer, W. (1877).

**Fleurs**, fruits et feuillages choisis  
de l'île de Java (Abb.), Bertha  
Hoola van Nooten.

**Flora** medica, Chiaie.

**Florideen**-Befruchtung, Bornet u.  
Thuret.

— (Befr., Unters. üb.) Schmitz, Fr.  
(Berl. 1883).

**Flower-Garden**, Lindley.

**Forest-Flora** of British-Burma,  
Kurz, S.

**Forest-trees**, Torrey-Bigelow.

**Forstbotanik**, Bechstein, — Reum,  
— Seutter.

— beschreibende -, Behlen, —  
Hessens, Borkhausen.

**Forstbotanische** Beiträge, Will-  
komm.

**Forstflora** von Deutschl. u. Öster-  
reich, Willkomm.

**Forstl. Culturpfl.** Deutschl. (Natg.),  
Hartig, Th. (1851).

**Forsttechnologie**, Völker.

**Forstmänner**, Bot. f., Doebner  
(Aschaff. 1853).

**Fortpflanzungsorgane** d. Crypto-  
gamen, Wurm, F.

- Fossile Pflanzen** (Synopsis), Unger.  
 — Pfl. von Dalmatien, Visiani.  
 — (Herbarium diluvianum), Scheuchzer.  
 — (végét. fossiles, prodrome d'une hist. d. -), Brongniart.  
**Fougères de l'Amérique**, Plumier  
 — sur la fam. des -, Fée.  
**Fraisiers**, hist. d. -, Duchesne.  
**Frankeniacees**. St. Hilaire.  
**Frauenzimmer**. Bot. für -, Batsch,  
 — Rousseau, J. J.  
**Fraxinellae**, pl. fam. -, Nees u. Martius.  
**Froments** (Catal. meth.), Vilmorin.  
**Fruchtbäume** u. Sträucher, Dochnahl.  
**Fruchtbauzucht** (Handb. d. -), Hirschfeld.  
**Frühlingsblumen** (Abb.), Aglaja v. Enders.  
**Fruit-culturist**. small -, Fuller.  
**Fruit**. Flower- and Kitchen-garden, Neill.  
**Fruit-Manual**, Hogg, R.  
**Fruitiers**, arbres -, Petit-Thouars u. Luizet.  
 — — culture forcée des -, Pynaert.  
 — — Traité des -, Duhamel.  
**Fruits and Fruit-trees of America**, Downing.  
**Fruit-trees** (a treatise), Forsyth.  
**Fruits cultured** (Catal.), Thomson.  
**Fuel** brit., Goodenough, — (Syn.), Turner.  
**Fucoideae**. Früchte der -, Link.  
**Fucorum** Hist., Gmelin, F. G.  
 — Icones, Esper.  
**Fucus**, Diss. s. plus. espèces d. -, Lamouroux.  
**Fumaria**, de -, Riecke.  
**Fumariaceen**, Crucifer. etc., Eichler (1865).  
**Funghi mangerecci**, Vittadini, — Agrumicoli, Penzig (Padova 1882).  
**Fungi novi fennici**, Karsten.  
 — venenati, Ascherson.  
**Fungis**, de -, Seyffert.  
**Fungorum agri Arimin.** Hist., Battarra.  
 — Bavariae etc. Icones, Schäffer.  
 — Elenchus, Batsch, — Fries.  
 — Icones, Corda-Zobel.  
 — Index, Hoffmann, H.  
 in Suecia Syn., Lindblad.  
 — Methodus, Gleditsch.
- Fungorum** Nassov. Enum., Fockel.  
 — Synopsis, Persoon.  
 — et Byssorum Illustr., Chevalier.  
**Fungusses**, british -, Bolton-Willdenow.  
**Futter**- u. Wiesengräser, d. wicht. -, Schmidlin-Schüle.
- Gardner's Magazine**, Loudon.  
**Gartenbau-Lexikon**, illustriertes -, Rümpler.  
**Gartenbau**. der -(Ausstellungsber.), Fenzl (Wien 1874).  
**Gartenbotanik**, Bouché.  
**Gärten**, bot. (ihre Aufgabe etc.), Kerner, A. (1874), — (u. deren Verwalt.), Schauer, C. (1833).  
**Gartenbohnen** (Monogr.), Martens.  
**Gartenbuch**, allgem. -, Regel u. Ender, — (deutsches), Walter (3. A., Stuttgart 1820).  
**Gartenbuch**, Metzger, — Ritter, J. A. (1850).  
 — für Damen, Jühlke.  
**Gartenfreund**, Wredow (G. A. Gärdt u. Neide, Berl. 1859).  
**Gartenkunde**, Handb. der -, Lerz.  
**Gartenkunst**, Siebeck, — der ital. Renaissance-Zeit, Tuckermann (1884).  
 — Theorie der -, Hirschfeld.  
**Gartenpflanzen** (Bestimmen der -), Berger, E. (1855).  
**Gährungspilze**, Pasteur.  
**Gasteromyceetes** (et Hymeno-), Weinmann.  
**Gentiana**, de - libellus, Frölich (1796).  
**Gentianae fauce de** (barbatae), Nees u. Prinz Max v. Wied.  
**Gentianearum**. fam. de char. -, Grisebach (Berl. 1836).  
 — genera et spp., Grisebach.  
**Gefäßbildung** d. Farne, Reichardt.  
**Gefäßskryptogamen**, Hofmeister, — Sadebeck, R.  
 — Westphalens, Berthold, — der Schweiz, Bernoulli (1857).  
**Gefäßpfl.** d. bot. Gart. zu Salzburg, Aberle (Wien, I, 1877).  
**Generationswechsel** d. Pfl., Celakowski (1874).  
**Georginen**, Gerhard.  
 — (Nelken u. Hortensien), Gluthorst.

- Geometr.** Anordn. d. Blätt. u. Blütenst., Bravais, L. u. A. (deutsch von Walpers, Bresl. 1839).
- Gemüsegärtner**, der, H. Jäger (1871).
- Geraniaceae**, Sweet.
- Geraniis**, de - (Specimen bot.), Burmann.
- Geraniologia**, l'Héritier.
- Geraniums** (Mon.), Andrews.
- Geschlecht** d. Pfl., Lehre von d. -, Treviranus.
- Gesneraceae**, Hanstein.
- Getreidearten** (Abbild. u. Beschr.), Krause.  
— (Cerealien), Metzger.
- Getreide** (Culturen mit nordischem), Wittmack (1876).
- Gewächse** für Handel u. Industrie, Eichelberg.
- Gewächshauspflanzen** (Verzeichniss), Ventenat.
- Giftgewächse**, deutsche, Brandt u. Ratzeburg.  
— (Pinakothek), Schenk u. Günther.  
— Deutschlands, Brandt, Phoebus u. Ratzeburg.  
— — Winckler, Emil.  
— einheimische (u. essb. Schwämme), Mayer, J. C. A.
- Giftgräser** (intoxicating grasses), Hance.
- Giftige** u. essbare Schwämme, Kerner, J. S.
- Giftpflanzen** Deutschl.'s, Gressler.  
— (Abbild. u. Beschr. v. 48 Arten), Juch.  
— von Neufchatel, Godet.  
— der Schweiz, Hegetschweiler.  
— die wichtigsten d. deutschen -, Buhle.
- Giftpflanzenbuch**, Berge u. Riecke.
- Giftpilze** Schlesiens, die -, Schummel.
- Gladiolus**, notice sur le -, Niccles, — (europ. Arten), Dietrich (Berlin 1832).
- Globulariées**, Willkomm.
- Glumacearum** Synops., Steudel.
- Gnetaceen**, Strasburger.
- Goethea**, Nees v. Esenbeck u. Martius.
- Goodenovieae**, Vriese, — R. Brown, Hooker u. Lindley.
- Gramina** brit., Knapp.  
— austral. (Icones), Host.
- Gramineae**, Nees v. Esenbeck sr. u. Fr. Nees.
- Graminearum** Africae australioris Mon. ill., Nees v. Esenbeck.
- Graminées** belges, Dumortier.
- Gramineen**, Duval-Jouve, — (Blütenbau), Cruse, W., — (Nervation), v. Ettinghausen (1865), — (Bestäubung), Hildebrand, F. (1872).
- Gramineus** Hort. Woburnensis -, Sinclair.
- Graminum** Descr., Koeler.  
— nn. gg., Linné f.  
— spp., Trinius.
- Graphidées**, Hist. de -, Chevalier.
- Gräser**, Fluegge, — belg., Hall, — deutsche, Weihe.  
— (Beschr. u. Abbild.), Schreber, — europ., Woods.
- Grasses**, the - of Great-Britain, Sowerby u. Johnson.  
—, the - of Scotland, Parnell, — of Britain, ders.
- Gräsergattung**, Revision der -, Panzer.
- Gras-** u. Kleesamen, Wittmack (Berl. 1873).
- Griffel** u. Narbe (anatom. Bau), Behrens (Göttingen 1875).
- Grosselliers**, Hist. des -, Thory.
- Grossulariae**, Berlandier.
- Grossulariarum** Revisio, Spach.
- Harzpflanzen** (végétaux résineux), Duplessy.
- Haselstrauch**, Palandt.
- Hausgarten**, der -, H. Jäger (2. A., 1885).  
— der - auf dem Lande, Heinrich.
- Hausgärtner**, der, illustr., J. Hartwig (10. A., 1885).
- Haushalt** d. Pfl., Cohn.
- Hausschwamm**, Bourwieg.
- Héderacées** etc., notice s. l., Marchal, E. (Brux. 1880).
- Hedysari** spp. (Mon.), Basiner.
- Hefe**, Brefeld, — (Morph. u. Biolog.), Schumacher (Wien 1874).
- Heiden**, Waitz.
- Heiden-** u. Wiesenvegetation, Drude u. Wendland.
- Heliophileen**, Revision der -, Sonder.
- Heliotropiorum** Mon., Lehmann.
- Helleborus niger**, Schobinger.

- Hemerocallis**, Schlechtendal.  
**Hepaticae** Europae etc., Jack, J. B. (1877).  
**Hepaticarum** Evol. hist., Kny. — Synopsis, Gottsche, Lindenbergh u. Nees.  
**Hepaticorum** muscor. Hist. Prodr., Schwägrichen.  
**Hepaticologia** germ., Hübener (Mannh. 1834).  
**Herbar** schlesisch. Pilze, Schneider, W. G.  
**Hermannia**, Thunberg u. Daudenelle.  
**Hesperiden** Nürnbergs etc., Volckamer.  
**Hesperides**, Ferrari.  
**Hieracien** der Schweiz, Christener.  
**Hieraciorum** Symbolae, Fries.  
**Hieracium**, Frölich.  
**Hierobotanicon**, Celsius.  
**Himbeeren**, Myatt.  
**Hippocastani** Revisio, Spach.  
**Hirsen**-Bestandtheile, Jenisch.  
**Höhere Sporenpfl.**, Farne etc., Milde.  
**Holzarten** d. mittleren u. nördl. Deutschl. (Abb.), Krebs. — Gesch. d. vorzügl. (syst. Abh.), Burgsdorf. — indische, Brandis.  
**Holzpflanzen** Österreichs, die -, Pokorny, — (Anat. u. Physiol. d. -), Hartig, Th. (1878).  
**Hopfenbau**, Saher (1861).  
**Hornschuchia**, Nees v. Esenbeck sr.  
**Hortipomologium** (Gart.- u. Peltzbuch), Knab, Mich. u. Dümmler.  
**Hortus** gramineus, Sinclair.  
**Houttonyia** et Saururus, Meyer, E. H. F.  
**Hoya** carnosa, Tassi.  
**Hybridae** pl. sponte nasc., Schiede.  
**Hydrillen**, Caspary.  
**Hydroycten**, Biasoletto.  
**Hydrophytes** d. l. Belgique, Morren.  
**Hydrophytologiae** danic. Tentam., Lyngbye.  
**Hydropyrum**, Münter.  
**Hymenomyces** Hung. (Icones), Schulzer.  
**Hymenomycetorum** Hung. Icones, Kalchbrenner.  
**Hymeno-** et Gasteromyces, Weinmann.  
**Hymenophyllaceae**, Presl. — Javanicae, Van den Bosch.
- Hymenophyllaceen**, Mettenius.  
**Hyphomyceten** (zwei krit.), Loew.  
**Hypneen** Tyrols, Heuffer.  
**Hypochoerideae**, Schultz-Bipontinus.
- Jardin**, le - botan. d. l. faculté d. médec. de Paris, Baillon (1884).  
**Jardin** fruitier, Noisette.  
**Indische** Holzarten, Brandis.  
**Infusorien**, Nitzsch.  
**Infusorienstab.** Ehrenberg.  
**Insectivorous** plants, Ch. Darwin (London 1875).  
**Insektenfressende** Pfl., Batalin, — Cohn, F., — Cramer, C. (Zürich 1877), — Stein, B.  
**Insektentödtende** Pfl., Morren, Ed. (1875 u. 77).  
**Inulinvorkommen**, Kraus.  
**Iride**, de, Ekmann. — coltivate, Ré.  
**Iridearum** genera, Bellenden-Ker. — Revis., Klatt. — Syst., Baker.  
**Iris indica** sp., D. Don.  
**Juncaceen** (Mon.), Laharpe, — (klein. Beitr.), Buchenau (1870). — am Cap, Mon., Buchenau (1875).  
**Juncus**, de - (Mon. gen. Junci), Rostkovius (Berol. 1801).  
**Juncorum**. Cyperor. et Gramin. Meth., Rajus.  
**Jungermannia**, Endlicher.  
**Jungermanniarum** Syllabus, Dumortier. — Synops., Eckart, — Herbarii Montagneani spp., Nees u. Montagne (1836).  
**Jungermanniographia** etrusca, Raddi.  
**Juniperus** americ., Engelmann.
- Kaffee** u. Kaffeebaum (gründl. Nachr. von -), La Roque.  
**Kartoffelkultur** etc., Regel, E. (1865).  
**Kartoffelkrankheit**, Harting, — Decken-Himmelreich (Ratibor 1855). — von 1845, Focke, — (Ursache etc.), de Bary (Lpz. 1861).  
**Kartoffeln** (Monogr.), Putsche-Bertuch, — (Zersetzung durch Pilze), Reinke u. Berthold (1879).  
**Kartoffelpflanze**, Schacht (1856), — Preiss, B. (1844).

- Keimen** etc. d. Pfl., Wolff, E., — Fleischer, — (Mono- u. Dicot.), Hanstein (1870).
- Keimung** v. *Triticum* u. *Secale*, Just, L. (1870).
- Kernobstsorten**, deutsche -, Diel.
- Kernpilze** Deutschlands, Nitschke.
- Kirschen-System** (Modifik.), v. Carlowitz.
- Klimmpflanzen**, Darwin, Ch.
- Kohlarten**, kultiv. - (syst. beschr.), Metzger, J.
- Konokarpodendron**, Brückmann.
- Korkeiche** (*Chêne liège*), C. de Candolle.
- Kork** u. verkorkte Gewebe, v. Höhnel, 1877.
- Korkkryptogamen**, Fée.
- Korkentwick.** auf Rinde, H. Mohl (1836).
- Krankheiten** der Kulturgew., Kühn. — der Waldbäume, Hartig, R.
- Kräuterkunde**, Vorles. über die -, Link.
- Krebs** d. Apfelbäume, Goethe, R. (Berl. 1877).
- Kresse**, Assimilation der -, Morgan.
- Kryptogamen**, A. Braun. — der belg. Flora, Westendorp. — Deutschl.'s, Bischoff, — Schkuhr, — O. Wünsche (Lpz. 1875). — des Fichtelgebirges, Funk. — der Göttinger Flora, Weis. — Führer in d. Reich der -, Wagner, H.
- Kryptogamen-Flora** Deutschlands, Rabenhorst, — von Schlesien, Cohn, F. (1877—79).
- Kryptogamen**, Millardet. — von Malmedy, Libert. — der Niederlande, Dozy. — des Taunus, Bayrthoffer.
- Kryptogamenk.** (Elementarcurs.), Helmert u. Rabenhorst (1828).
- Kryptog.** Gewächse v. Deutschl. u. der Schweiz, Bischoff (1828).
- Kryptogamische** Giftgew. Deutschlands, Phoebus.
- Krystalle** in Pflanzenzellen, Holzner (Münch. 1864).
- Küchergarten** in Böhmen, Mehler.
- Kulturpflanzen** (Ursprung), Goeze.
- Labiatarum** gg. et spp., Bentham, — Schreber.
- Labiatis**, de pl. -, Koch, W. D. J.
- Lactariorum** Sueciae Mon., Lindblad.
- Lamio** Plinii, de -, König, S. Fr.
- Landschaftsgärtnerei**, Petzold (Lpz. 1862).
- Landwirtschaftl.** Pflanzenkunde, Langenthal (Jena 1851—55). — Metzger.
- Landw.** Flora, Alefeld (1866).
- Lardizabaleae**, Decaisne.
- Lathraea**, Solms-Laubach, Gr. v.
- Laubhölzer**, die - Deutschlands im Winter, Willkomm (Dresd. 1859).
- Laubmoose** (Entwickl.), Cassebeer. — Lorentz, — neue, Dozy, — preuss., Ebel. — Nord-u. Mitteldeutschl.'s, Milde. — Westphalens, Müller, H. — d. österr. Küstenlande, Sendtner.
- Laurinarum** Syst., Nees v. Esenbeck sr.
- Lavandes**, Gingins.
- Lebermoose**, Leitgeb, — (Bemerk. üb.), Bischoff, G. W. (1835). — Farne u. Algen, Nees v. Esenbeck sr. — u. Flechten der Rinde Pao Pereira, v. Flotow. — Sassi, — (Naturg. d. europ. etc.), Nees v. Esenbeck sr. (1833—38). — (Oelkörper der -), Pfeffer, W. (1874).
- Lecidea**, v. Flotow.
- Leguminosae** capenses (Anim. crit.), Walpers.
- Leguminosarum**, de generibus -, Bentham, G.
- Leguminosen** (Blumenf.), Brown. — (Beitr.), Meyen u. Vogel, — Tulasne.
- Leguminosae**, la graine des -, Chalon, J. (1875).
- Libanon-Alpenflora**, Kotschy.
- Lichen** esculentus, Pallas u. Eversmann. — islandicus, Cramer u. Reisse, — Ebeling.
- Lichenen** Deutschlands, Floerke. — Schlesiens, v. Flotow.
- Lichenenflora** Bayerns, Krempelhuber. — von Würzburg, Hepp.
- Lichenes** arctoi, Fries f., — Meyen u. J. v. Flotow. — Americae septentr., Tuckermann. — Daniae, Rostrup, Deichmann u. Branth.



- Lichenes** Scand. et Novae-Caled., Nylander.
- Licheni** Bassanesi, Beltramini.
- Lichenographia** Europae reform., Fries.
- Galliae et Algeriae Prodr., Nylander.
- Lichenogr.** (Mémoires), Fée.
- Lichenologica** Parerga, Körber.
- Lichenologie** (d. neuer. Fortschr.), Bentzel-Sternau (1859).
- Lichenotheca** Venet., Trevisan.
- Lichens**, british -, Lindsay, — english -, Smith u. Sowerby.
- History of the -, Delise.
- Lichenum** Eiffliae Florulae Tent., Bluff u. Fingerhuth.
- Enumer., Hoffmann, G. F.
- Germanor. Syst., Körber.
- Heidelb. Enum., Zwackh.
- Helvet. Spicilegium, Schärer.
- Histor. Tent., Hagen, — Luyken.
- Method., Acharius.
- Systema, Eschweiler.
- Licht** (rotes u. blaues, Wirk. auf d. Protoplasma), Luerssen.
- Lichtes**, die Wirk. des - auf Gew., Glocker (1820), — Pringsheim (1881), — auf eine Pfl., Schmidt, P. (1870).
- Liliacées**, Rédouté.
- Lilium** sarniense (Guernsey-Lilie), Berry.
- Lolium** temulentum, Roeper, J. (1873).
- Loniceren**, die - des russ. Reichs, Kirillow (Dorp. 1849).
- Loranthaceen**, Decaisne, — de Candolle.
- Luftwurzeln** d. Epheus, Schuch.
- Lupine**, weisse (Anbau der -), Wulffen.
- Lychnophora** Mart., Schultz-Bipontinus.
- Lycoperdineorum** Mon., Vittadini.
- Lycopodiaceés** (Mon.), Spring, — Strasburger (1873).
- Lythrum** Salicaria, Freyer.
- Macrozamia** Preissii, Heintel.
- Mais**, vorl. Mitteil. üb. den -, Körnicke, Fr. (1872).
- Malpighiacées**, Mon., A. de Jussieu (1843).
- Malus** persica (Pfirsich), Ungnad.
- Mannae** excorticatio, Ledel.
- Marantearum** Mon., Körnicke, — (Morph. u. Syst.), Eichler (1884).
- Marattiacées**, de Vriese u. Harting (1851), — Jonkman (Utrecht 1879).
- Marchantia** polymorpha, Mirbel.
- Marchantieae**, Taylor.
- Marsilia**, Hanstein (1864), — u. Pilularia, A. Braun (1870—72).
- Maulbeerbaumzucht** u. Seidenraupe (aus d. Chines.), Stuttg. 1837, — Pathe (Berl. 1865).
- u. Seidenbau, Rammow (Berl. 1845).
- Maulwurfshügel-Flora**, Buchenau.
- Medicago**-Arten Linné's, die -, Urban, J. (1883), — (Keimung), Urban (1873).
- Medical** botany, Stephen u. Churchill, neu: Burnett.
- Flora of the United States, Rafinesque.
- Medizinische** Pflanzenkunde, Ximenez, — Zorn.
- Mediz.-ökon.-techn.** Gewächse (in Abbild.), Vietz, — Bischoff (1843 u. 47).
- -pharmazeut. Botanik (Handb.), Winckler, Ed., — Schleiden.
- — (Handb.), Luerssen.
- — Flora, Kosteletzky.
- Weer**-Botanik, Charla.
- Meeres**-Algen, Pringsheim, — Langenbach (1873).
- Melastoma** et Rhexia, Humboldt u. Bonpland.
- Melastomacearum** Mon., Naudin.
- Melastomaceen** (Bau), Vöchting.
- Melastomacées**, de Candolle.
- Melastomes** (Mon.), Bonpland.
- (the malayan spp.), Jack, W.
- Melocacti** gen. (Mon.), Miquel.
- Mémoires** lichenogr., Fée.
- Menschliche** Pflanzenparasiten, Küchenmeister.
- Mentharum** Rhenanarum Herbar., Wirtgen.
- Menyanthes** trifoliata, Thunberg u. Kjellmann.
- Meratia**, Punica et Calycanthus, Nees v. Esenbeck.
- Merkantile** Warenkunde, Zenker.
- Mesembryanthemeeen** (Entw. etc.), Hagen, C. (1873).
- Mesembryanthemi** et Aloës Mon. Salm-Dyck.

- Metamorphose** (Essai s. l. m. d. pl.), Goethe (übers. v. Fr. Soret) (1831).
- Metamorphose** d. nied. veget. Organismen, Hornschuch.
- Michelia**, Comment. mycol., Saccardo.
- Micologia Italiana**, Bibliogr. della -, Saccardo, Penzig u. Pirota.
- Micologiei studi**, Venturi.
- Micromycetes**, de Notaris.
- Mikroskopische Blicke** in d. inneren Bau etc., Rossmässler.
- Milchbehälter** der Pfl., Schmalhausen.
- Milchsaffbehälter**, David.  
— (Entstehung der -), Dippel.
- Mimosa sentiente**, de -, Bellardi.
- Mirabilis Jalapa**, Finger, F. (Bonn 1873).
- Missbildungen** etc., Zuccarini.  
— d. Gewächse, Jäger, G. F. (Stuttgart 1814).
- Monadelphiarum** class. Diss., Cavanilles.
- Monotropa**, Hypopithys et Neottia etc., Drude, O. (1873).
- Moose**, Dillen, — Necker.
- Moose Deutschlands**, Funk (1820), — Roehling, — K. Müller (1853).  
— Mecklenburgs, Blandow.  
— Ehrenbergs aus Ägypten, Lorentz.  
— Tent. meth., Walker-Arnott.  
— u. Farne, Hedwig.  
— Lebermoose u. Algen Deutschlands, Rabenhorst.
- Moosflora** d. Rheinpfalz, Gumbel (1857).
- Moosstudien**, Lorentz, — (Allgäuer Alp.), Molendo.
- Morchel** (Gemeingefährl. d. essb.), Ponfick.
- Morées**, Payer.
- Morphio**, de -, Kindscher.
- Morphologie** der Gewächse, Hofmeister, — (neues Syst. d. -), Schultz, C. H. (Berl. 1847).  
— d. Pfl., vergleichende -, Irmisch.
- Mousses** (Réch. anat. u. morph.), Schimper (1848).
- Musa Ensete**, Wittmack.
- Musae paradisiacae** Diss., Tilesius.
- Muscaviense Arboretum** (Park v. Muskau), Petzold et Kirchner (Gotha 1864).
- Musci Alleghanici**, Sullivant.
- Musci cleistocarpi**, Jäger, A.  
— cubenses Wrightiani, Sullivant.  
— exotici, Hooker, W. J. (Lond. 1818).  
— italici, de Notaris.  
— hepatici, Weber.
- Muscologia britanni**, Hooker u. Taylor (Lond. 1818).  
— german., Hübener.  
— hibern. Spicileg., Turner.  
— recentior, Bridel-Brideri.
- Muscologie**, Palisot de Beauvais.
- Muscorum europaeorum** Synops., Schimper.  
— Historia, Dillen.  
— Method. illustr., Linné f.  
— Physiologia, Necker (1774).  
— Syllabus, de Notaris.
- Muscorum frondosorum** n. g. halicense, Lobarzewski.  
— — Synops., K. Müller (Berol. 1849—51).  
— — Suecica Dispos. syst., Swartz.  
— — Specimen, Schwägrichen.  
— hepaticorum Hist., Weber.  
— — Hist. Prodr., Schwägrichen.  
— — novorum Icones, Hampe.
- Mycetozoen**, Syst. der -, Rostafinski, — de Bary (1864).
- Mycographie Suisse**, Secretan.
- Mycologia europaea**, Persoon (Lpz. 1822—28).
- Mycologiae Symbolae**, Fockel.  
— Systema, Fries.
- Mykologie**, Bail (1867).  
— allgem. - (Handb.), Bonorden,  
— (Beitr. z.), Fresenius, G. (1863).
- Mykologische Abhandlungen**, Tulasne.  
— Beobachtungen (Gastero- u. Hymenomyc.), Schmitz, J.?  
— Berichte, Hoffmann, H.  
— Hefte, Kunze u. Schmidt.  
— Skizzen, Sorokin.
- Mutterkorn**, v. Münchhausen, — (l'ergot du seigle, Mém.), Fée.  
— (Verhütung etc.), Kühn (Halle 1863).
- Myrtaceae centro-americae**, Oersted.
- Myrtacearum americae** Revis., Berg.  
— xerocarpicarum etc., Schauer (1840).
- Myrtographia brasiliensis**, Berg.
- Mythologische Flora**, Dierbach.
- Myxogasteres** Fruct., Bail, Th. (1859).
- Myxomyceten**, Cienkowski.

- Nadelhölzer**, Synops. d. -, Henkel.  
**Najas** (Mon.), Magnus.  
**Narcissorum** Mon., Haworth.  
**Nectar**, du - (appareils sécrétoires), Desvaux.  
**Nectarien**, Bedeutung der -, Kurr.  
**Nectariis**, de -, Weihe, — (Bed. z. Befrucht.), Würz u. Kurr.  
**Nelken** (oeillets), Ardène.  
**Nelkentheorie**, Rudolphi (2. A., 1799).  
**Nelkenzucht**, Behr u. Münzel, Lpz. 1810.  
**Nepenthes destillatoria**, Moore.  
**Nereis britann.**, Stackhouse.  
**Nessel**, d. (als Textilpfl.), Bouché, C. B., u. H. Grothe (Berl. 1877).  
**Neuen schönsten Pfl.**, die - (der Gewächsh.), H. Jäger (1873 u. 81).  
**Nihil officinale**, Lawson.  
**Nitrariées**, Payer.  
**Noix vomique**, Desportes.  
**Nopaleen**, Martius.  
**North-American Sylva**, Nuttall.  
**Nostocaceen**, insb. Rivularien, de Bary (1863).  
**novae spp. aethiop.**, Schweinfurth.  
**Nutzbare Gewächse** (Handb.), Link. — u. schäd. Gew., Chamisso.  
**Nutzbaumpflanzungen**, Fintelmann (Potsd. 1856).  
**Nützliche** u. schäd. Schwämme, Lenz.  
**Nützliche Pflanzen** (Handb.), Duchesne.  
**Nutzpflanzen**, die - Griechenlands, v. Heldreich (Athen 1862), — (tabell. Übers. d. wicht.), Goeze, E. (1883).  
**Nymphaea** (Mon.), Lehmann. — semi-aperta, Sturm, J. W.  
**Oaks of the United States** (Eichen d. V. St.), Engelmann.  
**Obstarten**, Amoureux.  
**Obst-** u. Weintraubenarten Württembergs, Berg.  
**Obstbau** (deutsch. Magaz.), Bertuch. — Bivort, — Harlin, — (Vervollk.) Borchers. — (Lehre von d.), Lucas, E.  
**Obstbäume** (Erzieh. junger - u. d. künstl. Baumformen), Lucas, E. (1875).  
**Obstbäume** (Erfrieren der -), Oberdieck, — (Schutz der - gegen Krankh.), Lucas, — Klotz (Danz. 1879).  
**Obstbaumschnitt**, d. -, H. Jäger (Lpz. 1860), — u. franz. Obstbaumzucht, Meyer, J. G. (1871 bis 1879).  
**Obstbaumzucht**, Christ, — Fintelmann, — Hendess. — Riviére, — (d. Ganze der -), Röver. — vollständ. Anleitg. d. -, Rubens. — (in Töpfen u. Kübeln), Rivers (Weimar 1864).  
**Obstgärtner**. d. deutsche -, Sickler. — d. - im Zimmer, Diecker (Potsdau 1826).  
**Obst-** u. Beerenfrüchte Deutschl.'s, die -, Calwer.  
**Obstkunde**, syst. Handb. der -, Dittrich. — Josst.  
**Obstnamen**, Etymologie d. -, Oberdieck.  
**Obstsorten**, bessere zusammengest., Pochhammer. — die besten - Englands, Smee. — Degenerieren der -, Knight.  
**Oeillets** (Nelken), Ardène.  
**Oelsaat**, neue -, Wittmack.  
**Oekonomische Flora Deutschlands**, Moser, H. C.  
**Oekon.-technische Flora**, Schmidt (Jena 1827).  
**Oekonomische Pfl.** (in Abbild.), Kerner, A.  
**Oekonomische Pflanzenkde.**, Whistling.  
**Oenanthe Theophrasti**, Wedel.  
**Offizinelle Gew.**, Anleit. z. Kenntn. der -, Kunth.  
**Olea europaea**, Lehr.  
**Olei resinaeque proferendorum organa**, Rebender.  
**Olive and its products**, Bernays (1872).  
**ombellifères**, les pl. -, Gandy.  
**Ombellifères**, Mém. s. les -, de Candolle.  
**Onagriques**, de Candolle.  
**Onagrearum** Synops., Mon., Spach (1835).  
**Ophioglosseen Deutschlands**, Milde (Breslau 1858).  
**Opii usu**, de -, Reimarus.  
**Opiologia**, Wedel.  
**Opium**, treatise on -, Young.

- Opora**, Zeitschr. f. Obstbau, Zittau 1834—35.
- Orangenbäume** (nederlantje Hesperides), Commelin.
- Orangers**, Hist. nat. des -, Poiteau u. Risso.
- Orchardist**, Scott.
- Orchidacea** (Xenia), Beitr. z. Orchideenkunde, Reichenbach f.
- Orchidaceae**, the - of Mexico, Bateman.
- Orchidacearum** Sertum, Lindley.
- Orchidee**, de -, Carpow.
- Orchideen** (Befrucht.), Darwin, Ch. — (Cultur), Warner, — Morel. — epiphytische, Pflzer. — neue, Mutel. — (Morphologie der -), Irmisch. — tropische, Josst. — Zwiebelgew. u. Baumfarne, Wagener.
- Orchidées d'Afrique**, Petit-Thouars. — (Mon.), Richard f. — Rivière.
- Organographie** d. Pfl., Stein, — de Candolle-Meisner. — Agardh (übers. v. L. Meyer) (Kopenh. 1831).
- Organologische Studien**, Auerbach, L. (Bresl. 1879).
- Orobanchen-Cultur**, Tittelbach u. Caspary. — (z. Kenntn. der -), Schultze, F. W.
- Orobanches**, germin. des - (Mon.), Vaucher.
- Osmundae**, gen. Mon., Milde (Vind. 1868).
- Oxalis**, amerik. Arten von - (Mon.), Zuccarini.
- Oxalisarten** (Lebensverh.), Hildebrand, F. (Jena 1884).
- Palmae amazonicae**, Spruce. — australasicae, Wendland und Drude. — centro-americanae, Oersted.
- Palmarum** anatome, Wossidlo. — index, Wendland. — Hist. nat., Martius.
- Palmen**, Naturgesch. der -, Seemann (Lpz. 1857), — (Vegetationsorgane der -), Karsten, H. (1847).
- Pandanophyllum**, Kurz, S.
- Papaveris** gen. (Mon. Tent.), Elkan (Regiom. 1839).
- Papaveraceen** (Diagramm der -), Beneke, F.
- Papierstaude** (de Papyro frutice), Hahn.
- Papyrus**, sur le -, Malherbe, — Wieland (Guilandus).
- Parerga** lichenologica, Körber.
- Paronychiaceen**, Baptista.
- Paronichiées**, de Candolle.
- Parthenogenesis** d. Pfl., A. Braun, — Regel (1859).
- Passiflora mauritiana**, Petit-Thouars.
- Passiflorées** et Cucurbitacées, Dutailly (1879).
- Pavots** et argémones, Hist. n. des -, Viguiet.
- Pedicularibus**, de -, Richers.
- Pelargonien**, Reider, — -Kultur, Klier.
- Pelorien** (bei Labiaten), Peyritsch, — (ad indolem) Ratzeburg (1826).
- Peltophyllum**, Gardner.
- Peruviani corticis**, de usu -, Tretzel.
- Petrefaktenkunde**, Schlotheim.
- Pflanzenanatomie** (Anatome plantarum), Malpighi. — (Beitr. z. vergleichend.), Westermaier (1881). — (Beiträge zur -), Medicus, — (Grundriss), Kiefer.
- Pflanzenbau** und Leben, Thomé (1834).
- Pflanzenbewegung**, Wiesner (1881).
- Pflanzen-Einwanderung** d. norw. Flora, Blytt. — -Ernährung etc., Schultz von Schultzenstein. — — Wolff, Em. — -Erzeugung, Logan. — -Früchte, Watzel. — -Familien, deutsche -, Hoffmann, H. — -Geographie, Meyen, —, A. v. Humboldt. — — Atlas der -, Rudolph. — -Krankheiten (Handb.), Sorauer, — (sulle malattie delle piante), Ré, — Ammann (Stuttg. 1867), — (Atlas der -), Zimmermann, O. E. R. (Halle 1885).
- Pflanzenmissbildung**, Unger (1849).
- Pflanzenmamen-Deutung**, Mejer.
- Pflanzen-Pathologie**, Meyen, — Unger. — -Physiologie (Entwurf), Rafn, — (Grundz.), Frank, A. B. (1882). — — neues System d. -, Meyen. — — Treviranus.

**Pflanzen-Physiologie**, Reum.

— -Schutzmittel (de pl. munimentis), Ludwig.

— -Stacheln, Delbrouck, — (Haare u. Dorne), Suckow (1875).

— -Symmetrie, Schneckenburger.

— -Zeugung, neue Theorie der -, Endlicher (Wien 1838).

**Pflanzliche Parasiten** des Menschenkörpers, Hallier.

**Pflaumen**, Günderode u. Höpfner.

— Anleit. z. Kenntn. der -, Liegel.

**Pfropfens**, Mon. des -, Berg (1824).

**Phaenologie**, Beitr. z. -, Egon Ihne (ph. Beob. in Europa), 1879 bis 1882, — H. Hoffmann (Giessen 1884).

**Phallus impudicus** (germinat.), Oschatz (Vrat. 1842).

**Phanerogamen-Befruchtung**, Radlkofer.

**Pharmakognosie**, Wigand, — (Handb.), Wiggers, — (d. Pflanzenr.), Berg, O. (Berl. 1857).

**Pharmazeutische Botanik**, Grindel, — (Handb.), Nürnberg. 1804.

— — Geiger-Nees v. Esenbeck u. Dierbach, 1840.

— Warenkunde, Goebel u. Kunze.

— (pharm.-veget.) Rohwaren., Dietrich, F. D., u. Krumbholz (Jena 1846).

**Phormium tenax**, Gillet.

**Phyceae novae**, Areschoug.

**Phycologia adriat. et mediterr.** (Icon.), Zanardini.

— germanica, Kützing.

**Phycoxanthin**, Reinke, J. (1876).

**Phylloglogiae elementa**, Drejer.

**Physiologie u. Anatomie d. Pfl.**, Schacht.

— der Gewächse, Treviranus.

— u. Pathologie d. Pfl., Meyen, — Unger.

**Physiologie végétale**, Senebier, — de Candolle-Röper.

— nouv. syst., Raspail, —, Eléments, Richard, A.

**Physiologische Botanik** (Handb.), Hofmeister u. Irmisch, etc.

— Pflanzenchemie, Ebermayer, — Untersuchung, Pfeffer, W. (1873).

**Phythanthozoa** (Icon.), Weimann.

**Phytochemia**, Koch (Jena 1834).

**Phytopathologie**, Hallier.

**Phytostatik** (Jura), Thurmann, — (Pfalz), Schultz, Fr. W.

**Phytotomie**. Elemente der -, Kieser, — Meyen.

**Pierrea**, Hance.

**Pili plantarum** (Pflanzenhaare), Bahrdt.

**Pilobolus** (Mon.), Coëmans.

**Pilularia**, Agardh u. Leche, — u. Marsilia, Hanstein.

**Pilze**, v. Albertini u. v. Schweiniz (Consp. fungorum etc., Lps. 1805), — (Abhandl.), Lèveillé, — Brefeld (Meth. z. Unters., 1874), — Harzer, — (Befrucht.), Karsten, H., — Syst. der -, Nees jr., Henry u. Bail (Bonn 1837—58), — essb. -, Berkeley u. Broome, — (als Krankheitserreg.), Haupt, W. A. (1877), Winter, G. (1878), Hartig, R. (1880), — (verbreit. deutsche), Lösecke u. Bösemann (1872), — (in ök.-chem.-toxicol. Hins.), Boudier (deutsch Husemann, 1867), — Flechten u. Algen, Syst. der -, Oersted (deutsch Grisebach u. Reinke), — (in Sturm's Flora Deutschl.), Ditmar, — Rostkovius (1840), — Preuss (Übersicht, 1851), — Flechten u. Myxomyceten, de Bary (1866), — (der Insektenkrankh., Seidenraupe etc.), Lebert, H. (1858). Pilzepizootien, Bail (1869). — Pilzkunde, Führer in die -, Kummer (1871). — Pilzsammler, Hahn, G. (1883).

**Pinetum** (üb. Coniferen), Gordon.

**Pinus** g., Lambert.

**Piperaceae** (Bemerk.), Kunth.

**Pipere**, de -. Heister (1740).

**Pistill** (Entwick.-Gesch. des -), Buchenau (1857).

**Plantae aquaticae**, Chatin.

— diaphoreticae (Syn.), Rosenthal.

— officinales (Forts.), Nees v. Esenbeck jr.

— parasiticae, Chatin.

**Plantagineen**, Leydolt.

**Plantaginées**, Barnéoud.

**Plantarum Papilionacearum** Mon. med., Ebermaier (1824).

**Plantarum**, de anima -, Valentin, Fr. (Regium. 1758).

**Plantes fossiles des Vosges**, Mougeot u. Schimper.

**Poirrier**, sur la cult. du -, Desfontaines.

**Pollens**, Schutzm. des -, Kerner, A. (1873).

**Polline**, de plantar. -, Fritzsche (1833).

**Polygoni** Monogr., Meisner.

**Pomarium Bononiae**, Aldrovandi.

**Pomologen** (Leitf. f. angehende -), Lucas (1879).

**Pomologie** (bonnes poires), Baltet.

**Pomologie**, Diction. de -, Leroy, — guide pract., Thomas.

**Pomologie**, syst. Anleitung d. -, Manger.

— deutsche -, Lauche.

— Handb. d. -, Hinkert.

— österr.-ungar., Stoll.

**Pomologisches** Handwörterbuch, Christ.

**Pomona austriaca**, Kraft, J.

— francaonica, Mayer, — gallica, Poiteau u. Turpin.

**Pomone française**, Lelieur.

**Populorum** Revisio, Spach.

**Portulacae**, Revis. d. -, de Candolle.

**Potentillarum** Synops., Haller f.

— Monogr., Lehmann.

**Prímeln**, vergl. Anatomie der -, Kamienski.

—, die - der europ. Gärten, Stein, B. (1882).

**Primulaceae** d. österr. Alpen, Kerner, A.

**Primularum** Monogr., Lehmann.

**Propagatio plantarum**, Rudbeck.

**Proteaceae**, fossile -, Ettinghausen.

**Protoplasma**, Velten, — (Studien üb. -), Strasburger (1876).

— (Struct. u. Beweg.), Frommann, C. (1880), — Hanstein (1880).

**Pteridographia** americ., Petiver.

**Pteridographiae** Tentamen, Presl.

**Puccinia rosae et rubi**, Schwabe.

**Punica**, Meratia et Calycanthus, Nees v. Esenbeck sr.

**Pyrenomyceten**, Sollmann.

**Pyrenomycetes** German., Nitschke (Bresl. 1867—70).

**Pyrola et Chimophila**, de -, Radius.

**Pyrolaceae**, Alefeld.

**Quassia Simaruba**, Wright.

**Quercitrondrinde**, Hamburger, Z. S. (1879).

**Querschnitte** von 100 Holzarten, Nördlinger (1876—80).

**Quinologia**, Ruiz u. Pavon.

**Rankenbildung**, Warming.

**Ranunculaceae Candollii**, Schlechtendal.

**Rapateacearum** Monogr., Körnicke.

**Ratanhia**, de -, Klein.

**Reana luxurians**, Baillon.

**Rebschulen** (bei Heidelb.) (1875).

**Regelia**, Beaufortia etc., Schauer.

**Reis** (Rayss), Besch. des -, Raewolf, 1783.

**Résédacées** (Mon. d. -), Müller, Jean.

**Restio**, Thunberg u. Lundmark.

**Rhabarbari**, de eximia etc., Gerber.

**Rhabarbaro**, de -, Ziervogel.

**Rhabarbersorten**, Myatt.

**Rhabarberwurzel**, Calau.

**Rhamnées**, Barnéoud u. Brongniart.

**Rheum** off. botanices, Scheltema.

**Rhizocarpeen**, Mettenius.

**Rhizographia**, Preiss (Prag 1823).

**Rhizomorpha**, Eschweiler.

**Rhodoreae et Rhododendreae**, Seidel.

**Rhododendro chrysantho**, de -, Zahn.

**Rhododendron arboreum** var. roseum, Edwards.

**Rhus** (Mon.), Horsfield.

**Ricieen** (Mon.), Lindenberg.

**Riedgräser**, Schkuhr.

— die - Württembergs, Fleischer.

**Riesen**, die - der Pflanzenwelt, Mielck, — Göppert.

**Rosae** pl. g., Hist. succincta -, Wallroth.

**Rosarum** Mon., Crépin (1880).

**Rose**, Hist. n. d. l. -, Guillemeau.

**Rose**, die -, Cohn, F. (1863).

**Rosen**, die - (nach d. Nat. gez.), Rössig, — (25 Grupp.), Selbstherr.

**Roses from nature**, a collection, Lawrence.

**Rosier** genre (Mon.), Thory.

**Rostpilzformen** d. deutsch. Coniferen, Rees.

**Rubiaceae capenses**, Cruse.

**Rubiacearum** Sect. Anthospermae, Cruse.

**Rubiaceen** d. trop. Afrikas, Hiern.

**Rumex** (Mon.), Campdera.

**Rutacene**, Farne etc., Schott u. Endlicher.

**Saccharum** etc., Zalheimb.

**sacra herba** (nobilis Salvia), Paulini.

- Saftbewegung** u. Function, Cotta.  
**Saftpflanzen**, Haworth.  
**Saftsteigen** (Ursachen), Böhm, J.  
**Salices** europaeae, Wimmer.  
**Salicetum** (Comm.), Trautvetter.  
**Salicum** Monogr., Anderssen, N. J. (Holm. 1867).  
**Salix** (Mon.), Host.  
**Salvia**, Etlinger.  
**Salvinia natans**, Duvernoy, — Bischoff, — Juranyi (1873).  
**Samenschalen** d. Scrophular., Bachmann (1881).  
**Sapindacearum** foss. Mon., Massalongho.  
**Sapindaceen**, Radlkofer.  
**Saprolegniaceen**, Cornu.  
**Saprolegnien**, Walz.  
**Sarsaparilla** et Caoutschouc, Royle.  
**Sassafras** arbor, Trew.  
**Sassaparillae** radix, Hilmziker.  
**Saururus** et Houttounia, Meyer, E. H. F.  
**Saxifraga** (Ind. crit.), Engler.  
**Saxifragearum** Revis., Sternberg.  
**Schachtelhalme** v. Esthl., Lievl. etc., Klinge, M. (1882).  
**Schachtpflanzen** (Stud. üb. -), Griesmann (1883).  
**Scheitelwachstum** der Wurzeln, Schwendener (1882).  
**Schimmelbildungen**, europäisch. -, Cornu.  
**Schimmel-** oder Algengattungen, Carus.  
**Schmarotzergew.** u. Krankheiten, Regel.  
**Schmarotzerpflanzen** (geogr. Verbreit.), Liebe.  
**Schmarotzerpilze** d. Menschenkörpers, Hallier, — Gruby.  
**Schmetterlingsblütigen**, Fam. d. -, Eisengrein.  
**Schutzscheiden**, Schwendener (1882).  
**Schwämme** Bayerns (Abb.), Schäfer-Persoon (Erlang. 1800).  
 — Deutschlands, Schmidt u. Kunze, — (getrockn.), Kunze.  
 — essbare, Persoon (deutsch von Dierbach) (1822).  
 — die essbar. - Oesterr., Trattinick, — Corinser, — d. - Frankreichs u. Deutschlands, Cordier.  
 — (Samml. für Rabenhorst's Fungi europ.), Lasch.
- Schwärmsporen** (Einfluss d. Lichts auf d. -), Stahl.  
**Schwarzkiefer**, Höss.  
**Scilla**, Corvinus, — marit., Athanasius, — Gugubauer.  
**Seitamineae**, Roscoe.  
**Seitaminearum** Mon., Horaninow.  
**Scutellaria**, Hamilton.  
**Secretionsorgane**, Reinke.  
**Seigle ergoté** (Traité), Read.  
**Selbstbefruchtung** (Gesetz d. Vermeid. d. -), Thomé (1870).  
**Senega**, de radice -, Helmhuth.  
**Sénés** (et Casses) Colladon.  
**Semperviven**, neue -, Lehmann u. Schnittpahn.  
**Simarubées**, Planchon (1847).  
**Sisyrinchium** (Mon.), Klatt.  
**Smilacae** (Bemerk.), Kunth.  
**Smilacae**, structura, Beining (1850).  
**Solanacearum** Ordo, Stromeyer.  
**Solaneen**, Dunal, — Sendtner.  
**Sorghü vulgaris** (seminum anal.), Werner.  
**Spargel** (Anl. z. Erzieh.), Nebbien.  
**Spermatozoïden** im Pflanzenreich, Schacht.  
**Sphacelarien**, Geyler, — Magnus, P.  
**Spiraea**, du g., Cambessèdes (1824).  
**Spongia marina**, de -, Uhle.  
**Sporangium** d. Gefässkryptogam., Mohl, H. (1837).  
**Stachelbeeren** (Mon.), Maurer.  
**Stacheln** u. Dorne, Delbrouck (1873).  
**Stapelia**, eine europ. - Mikan.  
**Stärkeunbildungsfermente**, Baranetzky (Lpz. 1878).  
**Sternanis**, de Vriese.  
**Sternkräuter**, Fam. d. -, Willemet.  
**Stirpes** Austriae, Crantz.  
**Strelitzia**, Assimilation d. -, Holle.  
**Stylidium** graminifolium, Morren.  
**Styrace**, de -, Will.  
**Succinorum** Hist., Sendel.  
**Succulentarum** pl. Hist., Bradley.  
**Synanthereen**, Cassini.  
 — des Berlin. Herbariums, Lessing.
- Tabaci** Hist., Antz.  
**Tabaco**, de -, Milchsack.  
**Tabacologia**, Neander.  
**Tabak** (Anbau), v. Babo u. Hofacker.  
 — u. ähnliche etc., Tiedemann.  
**Tabakkultur** in Holland, Schwab.

- Tamus** *Elephantipes* (Mittelstock), Enderle.
- Tanacetaceae**, Schultz v. Schultzenstein.
- Tanaceteeen**, Schultz-Bipontinus.
- Tange** (Abb.), Kützing.
- Technische Pflanzen Deutschlands**, Calwer, - Vietz.
- Teppichgärtnerei**, Hampel.
- Teratologie der ovula**, Peyritsch.
- Grundlegung der -, Wigand.
- Tératologie végét. Elem.**, Moquin-Tandon.
- (Essai hist.), Kirschleger.
- Terebinthineen**, Colebrooke.
- Tertiärfloora etc.**, Weber u. Wessel.
- der Schweiz, Heer.
- Thallassiophytes**, Lamouroux.
- Thé**, cult. du -, Aubry le Comte.
- Thea**, de -, Genge.
- Thee**, der - (Mon.), Houssaye.
- Thymelaeum** Syn., Meisner.
- Tiliarium**, Rev. g. -, Spach (1834).
- Torfmoose** (Entw.-Geschichte d. -), Schimper (1858).
- Torreyia**, G. Arnott.
- Tranbenkrankh.**, die -, Dorner, J. (Pest 1853).
- Tranbensorten** (vorz. Württemb.), Single.
- Tremandrearum** Syn., Schuchardt.
- Tremandreen**, Steetz (Hamb. 1853).
- Trichome** u. Stacheln, Uhlworm (1873).
- Trichostomaceae europ.**, Lindberg.
- Tuberaceae** (Trüffelpilze, Mon.), Vittadini.
- Tuberibus terrae**, de -, Brückmann.
- Tüpfel** (Entst. u. Bau), Dippel, L.
- Turgor** (d. Zellen), Vries.
- Turneraceen** Mon., Urban, J. (1833).
- Umbelliferae**, Lagasca.
- Umbelliferarum** Cl. Emend., Crantz.
- Prodr., Sprengel.
- spp. minus cognitae, Sprengel.
- Umbelliferen**, Cusson.
- Umwandlung v. Antheren in Carpelle**, H. Mohl (1836).
- Unkraut- u. Wegpfl.** Brasiliens, Lund.
- Unkräuter** von Deutschland, die -, Ratzeburg.
- Unorganische Pflanzenbestandteile**, Erdmann.
- Uredinen**, de Bary (Berl. 1865—66).
- Urticées** (Mon.), Weddell.
- Ustilagineen**, de Bary (1832).
- Valerianas**, in -, Betcke.
- Valerianeen** (Mon.), Dufresne, — u. deren Gebrauch, Ebers (1858).
- Valerianées**, de Candolle.
- Vallisneria spiralis**, Müller, J. Fr. (Bonn 1875).
- Vegetationsorg.** d. Phanerog. u. Farne, de Bary (1877).
- Vénéneses**, pl. - de la Suisse, Vicat.
- Verbasci** g. Prodr., v. Berchtold u. Pfund (1840).
- Verbreitungsmittel**, Hildebrand (1873).
- Veredelung** d. Obstes, Keyser.
- Verger**, le -, Mas Alphonse.
- Verjüngung** (Anaphytose), Schultz, C. H. (1851).
- Veronica** u. verwandte Sippen, Duvan.
- Vermehrung**, üb. ungeschlechtl. - d. Phanerogamen, Baum, O. E. (1850).
- der Gramineen, Hildebrand.
- Verpflanzen** der grossen Bäume, Reineken, R. (1877).
- Verrucaria**, Gibelli.
- Vigne**, cult. de la -, Chaptal.
- Vignoble**, Pulliat.
- Violacées**, St. Hilaire.
- Violariées**, Gingins.
- Visnea Mocanera**, Schacht.
- Vorwelt**, Flora der -, Corda.
- Voyria**, Splitgerber.
- Wachsüberz.** d. Epidermis, de Bary.
- Wald**, der - im Haushalt d. Natur, Weber, R. (1874).
- Waldbau**, Cotta (5. A., 1832), — Gwinner (2. A., 1841).
- Waldbäume**, deutsche -, Klöbisch, — (Krankh. d.), Hartig, R. (1874).
- Walderziehung**, Schultze (Lpz. 1839).
- Waldes**, des deutschen - Vergangenheit u. Zukunft, H. Hoffmann (1871).
- Warenkunde**, merkantile -, Zenker.
- Weg-** u. Unkrautpfl. Brasiliens, Lund.
- Weiden Tyrols**, die -, Trauensteiner.
- Weinbau-Kalender**, v. Babo.
- -Katechismus, Dochnahl.



**Weinbau-Schule**, Dornfeld.  
 — Siebenbürgens, Fabini.  
 — (theor.-prakt. Abh.), Chaptal,  
 Rozier, Parmentier u. Dussieux.  
**Weinstock** etc., Champin.  
**Weintraubenarten** (u. Obst-) Würt-  
 tembergs, Berg.  
**Wiesen-** u. Heidenvegetat., Drude  
 u. Wendland.  
**Winden**, das - d. Pfl., Schwende-  
 ner (1883).  
**Winterflora**, H. Jäger (1880).  
**Wintergarten**, der -, Antoine, —  
 Schmidlin, E. (1847).  
**Wintergärtner**, Dietrich, F. G.  
 (3. A., 1808).  
**Wurzel-Ausscheidung**, Walser.  
**Wurzelkraft**, Lehre v. d. -, Brosig,  
 M. (Breslau 1876).  
**Wurzelleben** der Kulturpflanzen,  
 Fraas (1870).  
**Wurzelverwachsungen**, Franke, M.  
 (1881).

**Xenia orchidacea**, Reichenbach f.  
**Xeranthemum**, Gay, J.

**Zapfenbäume**, Salisbury.

**Zea Mays**, de pl., Marabelli (1793).  
**Zelle**, die - als Elementarorg., Da-  
 vid, G. (1873), — u. Zellkern,  
 Auerbach, L. (1874).  
**Zellenstreckung** u. Turgor, Vries.  
**Zellhülle** (neuere Theorie), Dip-  
 pel, L.  
**Ziergärtnerei**, Katechismus der -,  
 H. Jäger (Lpz. 1877).  
**Ziergehölze**, Jäger, H., u. Beissner.  
**Zierpflanzen**, Samml. von -, La-  
 bram.  
**Zimmer-Blumenzucht**, Schmidlin.  
 — u. Fenstergarten, Bouché.  
**Zimmergarten**, Keller.  
**Zingiberaceis**, Observ. de -, Hall.  
**Zoophytes**, Hist. nat. d. -, Du-  
 jardin.  
**Zoosporen** u. Algen, Walz.  
**Zuckerahorn**, v. Paschwitz.  
**Zuckerrübe** (Anat. u. Entw.), Droy-  
 sen, K. (1877).  
**Zwergbaumzucht**, Liebitzer.  
**Zwergmandeln**, Schlechtendal.  
**Zwiebelblumen** (Traité d. fleurs à  
 oignon, Harlem 1760), Kampen.  
**Zwiebelgew.**, Biolog. d. -, Berg,  
 E. v. (1837), — lilienartige u.  
 Prachtg., Kreysig (1836).

#### d. Nomenklatur und Wörterbücher der Botanik.

**Balfour**, the botanist's companion  
 with a glossary of botan. terms,  
 Edinb. 1860.

**Beckmann**, Lexic. botanicum, 1801.

**Bischoff**, Handb. der bot. Terminologie,  
 1844; d. bot. Kunst-  
 sprache in Umrissen, Nürnberg 1822;  
 d. beschreib. Bot. (1839, u. von  
 J. A. Schmidt herausg. 1857).

**v. Böninghausen**, Nomenclator bot.,  
 1821.

**Borkhausen**, bot. Wörterbuch (2 B.),  
 1797 (Nachtr. v. Dietrich).

**Böhmner**, Lex. rei herbariae, cont.  
 etymol. nominum, 1802; Com-  
 ment. bot. -liter. de plantis in me-  
 moriam cultorum nominatis, Lps.  
 1799.

**Bulliard**, Dict. elem. d. bot., re-  
 fondu p. Richard, Paris 1802.

**Dennstedt**, Nomencl. bot. (I. Pl.  
 phanerog.), 1810.

**Dierbach**, Repertorium bot., Lemgo  
 1831.

**Dietrich**, A., u. de Vriese. Kunst-  
 voordenleer d. Planten, Amster-  
 dam 1834.

**Dietrich**, A., Terminologie d. pha-  
 nerog. Pfl., 2. A., 1838.

**Doehnahl**, Fr. J., Biblioth. hortens.  
 (1750—1860, versch. Werke), 1861.

**Fechner**, Erklär. volkst. deutsch.  
 Pflanzennamen, 1871.

**Gérardin**, Dict. raisonné de Bot.,  
 Paris 1822.

**Gesner**, C., Catal. plant., Namens-  
 buch all. Erdgewächse (Lat., Gr.,  
 Dtsch. u. Frz.), Zürich 1542.

**Germain**, Nouv. Dict. de Bot., 1870.

- Gmelin**, J. Fr., Onomatologia bot. (9 Bde.), 1772—78.
- Hayne**, Termini bot. iconib. ill., bot. Kunstspr., Berlin 1799.
- Henckel v. Donnersmark u. Willdenow**, Nomencl. bot., 2. A., Halle 1821.
- Heynold**, Nomencl. bot. hortens., alfab. synon. Aufzähl. der in Europa kult. Gew., 1840 u. 46.
- Index d. Kunstvoordenleer d. Planten**, Amst. 1836 (s. Dietrich, A., u. de Vriese).
- Johrenius**, Vademecum bot., Colbergae 1710.
- Jürgens**, etym. Fremdwörterb. d. Pflanzenk., 1878.
- Kachler**, Grundr. d. Pflanzenk. in Gestalt eines Wörterb.'s d. betr. Sprache, Wien 1830.
- Kohl**, Taschenwörterb. d. botan. Kunstausdr., Berl. 1883.
- Kyber**, Lex. rei herbar. trilingue, Argentor. 1553.
- Langenthal**, Terminol. d. beschr. Bot. u. lat. Wörterb., 1845.
- Lecoq u. Julliet**, Dict. des termes de bot., Paris 1831.
- Leroy**, Diction. de Pomologie, s. 1866.
- Lüder**, Nomencl. bot. stirpium Marchiae Brandenb., Berl. 1786.
- Martin**, A., d. Pflanzennamen d. deutsch. Flora, Halle 1851.
- Mejer**, üb. d. Deutung d. Pflanzennamen („Natur“), 1881.
- Müller**, J. B., bot. prosodisch. Wörterbuch, 1842.
- Nennich**, allg. Polyglotten-Lex. d. Naturg. (20 Spr.), Hamb. (20 Thlr.)
- Oberdieck**, Etymologie d. Obstnamen, Bresl. 1866.
- v. Perger**, Studien üb. d. deutsch. Namen d. in Deutschl. heimischen Pfl., Wien 1858.
- Paxton**, Jos., a Pocket bot. dictionary, 2. A., London 1853.
- Pfeiffer**, Nomencl. bot. (4 Bde.), 1872.
- Plenk**, Anfangsgr. d. bot. Terminologie, Wien 1795.
- Räuschel**, Nomencl. bot. omnium a Linnaeo descr. plant., Lps. 1797.
- Reichenbach**, Repert. rei herb. s. Nomencl. gen. plant., Dresd. 1841.
- Römer**, J. J., Vers. eines Wörterbuchs d. bot. Terminologie, Zürich 1816.
- Schlickum**, Taschenwört. d. bot. Kunstausdr. (Lpz. 1875).
- Stendel**, E., Nomencl. bot., 1840 bis 1841, cryptog., Stuttg. 1824.
- Théis**, A. de, Glossaire de bot. ou Dict. etymol. etc., Paris 1810.
- Voigt**, Handwörterb. d. bot. Kunstsprache, Jena 1803.
- Walpert**, Gu. G., Repertor. botanices syst. (Lps. 1844—48).
- Walpert**, H., Synonyme u. syn. Wörterb. d. deutsch. Pflanzennamen (1852).
- Willdenow**, s. Henckel v. Donnersmark.
- Wittstein**, etym.-bot. Handwörterbuch, 2. Aufl., 1856.

## e. Botanische Litteratur und Geschichte.

- Haller**, A., Bibliotheca bot., Tiguri 1771—72.
- Jessen**, Bot. d. Gegenw. u. Vorzeit, 1864.
- Krüger**, M. S., Bibliographia bot., Handb. d. bot. Literatur etc., 1841.
- Meyer**, E., Geschichte d. Botanik, 1854—57.
- v. Miltitz u. Reichenbach**, Biblioth. bot., Berlin 1829.
- Pritzel**, Thesaurus lit. bot. omn. gent., 2. A., 1872.
- Pulteney**, Gesch. d. Bot. (bes. in Engl.), aus d. Engl. v. Kühn, Lpz. 1798.
- Pulteney**, esquisses hist. et biogr. des progrès de la bot. en Angleterre, 1809.
- Willkomm**, gegenw. Stand d. bot. Wissensch., 1868.
- Winekler**, Emil, do., Frankf. a. M., 1854.
- Zuchold**, Additamenta ad Pritzeli Thesaurum, 1852 u. 66.

## IV. Die wichtigsten essbaren und giftigen Schwämme.

### a. Essbare.

- Agaricus procērus** (Lepiota procēra) Parasolpilz, s. g. Schulmeister.
- Agaricus mutabilis** (Pholiota m.) Schuppenp. od. Stockschwamm.
- Amanita vaginata** Wulstscheide, s. g. Manschettenpilz.
- Am. caesarēa** (Agaricus caesarēus) Kaiserschwamm.
- Armillaria** Armbandpilz, z. B. meliā Honiggelbling, s. g. Hallimasch, stramineā strohgelber, robusta etc.
- Bolētus edulis** Edel- od. Herrenpilz, Steinpilz.
- Bolētus bovinus** Kuhpilz.
- Bolētus lutēus** Butterpilz.
- B. granulatus** s. g. Schmerling, bekörnter Röhrenpilz Kumm.
- B. ovinus** (Polyporus ov.) Schaf-euter.
- B. scaber** Birken- od. Kapuzinerp.
- B. rufus** rotbrauner Röhrenpilz Kumm.
- B. castanēus** kastanienbrauner R.
- B. asprellus** rauhschuppiger R.
- B. elegans** schöner R.
- B. flavidus** gelblicher R.
- B. subtomentosus** s. g. Ziegenlippe.
- B. badius** s. g. Maronenpilz.
- Bovista plumbēa** Bleikugel, s. g. Katzeneier.
- Calocēra furcata** u. **viscosa** Gabel- u. klebriges Schönhorn.
- Camarophyllus** Garnelenpilz, z. B. virginēus Jungfernp., caprinus Ziegenp., ovinus Schaf-G., pratenis Wiesen-G. etc.
- Cantharellus** Faltenpilz, z. B. eibarius Galling, guter Eierschw., Pfifferling etc.
- Clitocybe** Trichterling, z. B. odōra Duftp., suaveolens Wohlgeruchp., fragrans Anisp.
- Clitocybe dealbata** verfärbender Tr. Kumm., **opipāra** prächtiger, **gibba** buckliger etc.
- Clitopilus** Pflaumenpilz, z. B. **pinalis** wohlschmeck., **Prunulus** wahrer Pfl., **Orcella** rötlicher Pfl.
- Clavaria** „Keulenpilz“, Korallenschwamm, s. g. Ziegenbart, z. B. **delicata** zarter, **flava** eigentl. Ziegenb., **Botrytis** Trauben-K., **coralloides** Bärenatze, **aurēa** Gold-K., **abietina** Tannen-K., **digitella** s. anomala Finger-K., **amethystina** Amethyst-K. etc.
- Collybia** „Pfeennigpilz“, z. B. **orca-des** Krösling od. Herbstmousseron, **tenacella** zäher, **esculenta** essb., **porrēa** Zwiebel-Pf., **cras-sipes** s. fusipes Dickfuss, **ery-thropus** Rotfuss etc.
- Cortinarius** „Spinnwebschleier“-Pilz, z. B. **castanēus**.
- Entolōma** Schleierpilz, z. B. **rhodopolium** Rosen-.
- Galorrhoeus** „Milchpilz“, Pepperling, Brätling, Kremling etc., z. B. **deliciosus** köstlicher, **aeris** scharfer, **rubellus** rötlicher, **volēmus** Birnen-M., **seriflūus** Serum-M., **mitissimus** mildester, **glycosmus** Wohlgeruch-M., **piperatus** weiss. Pfefferp., Kuhpilz etc.
- Helvella** Falten-, Stock- od. Frühmorchel, s. g. Lorchel, z. B. **esculenta** Speise-Helvelle, **crispa** krause, etc.
- Hydnum** Stachelpilz, z. B. **coralloides** Korallen-St., **diversidens** ungleichzähniiger, **imbricatum**

- dachziegelschupp., Hirschschw., Habichtsp., **Erinacëus** Igel etc.
- Hypholöma** „Gewebsaum“, z. B. **lateritium** Bitterschw.
- Lepiöta** Ringpilz, z. B. **excoriata** geschundener, **procëra** Parasolp. (*Agaricus procërus*), **ermiüca** Hermelinp., **granulosa** bekörnelter m. v. **amianthina** u. v. **carcharias**, **clypeolaria** schildförm. etc.
- Limacium** „Schneckenpilz“, z. B. **eburnëum** knochenweiss., **discoideum** scheibiger etc.
- Lycoperdon** Staubpilz, Bovist, z. B. **gemmatum** stachelwarziger, m. v. v. (**perlatum**, **furfuraceum** etc.), **gigantëum** Riesenbovist, **caelatum** s. areolatum getäfelter, s. g. Hasenbovist.
- Marasmius** „Schwindpilz“, z. B. **scorodonius** Lauchp.
- Morchella** Morchel, z. B. **deliciosa** köstliche, **esculenta** Speise-M., **conica** Spitz-, **patula** Glocken-, etc.
- Pleurötus** „Seitenstiel“-P., z. B. **ostreatus** Austerp. s. g. Drehling, **ulmarius** Ulmenp.
- Polyporus** „Porenpilz“, z. B. **confluens** Semmelpilz, **sulphurëus** schwefelgelber, **frondosus** laubart., **umbellatus** doldiger s. g. Eichhase, **ovinus** Schafeuter (**Boletus** ov.) etc.
- Psalliöta** Ringpilz, z. B. **campestris** (*Agaricus* c.) ächter Champignon, **sylvatica** kreibeweiss., **arvensis** Schaf-Champignon.
- Rhymovis** Krämpelpilz, Deichselp., z. B. **involuta** wahrer Kr., **atroto mentosa** schwarz-filzig.
- Russüla** Reizker, Täubling, z. B. **aurata** goldgelber, **lutea** gelber, **xerampelina**, hochroter, **integra** unschäd., **alutacëa** ledergelber, **virescens** grünend., **lactëa** milchweiss., **vesca** Speisep.
- Rhizopögon** Wurzeltrüffel, z. B. **Magnatum** Magnaten-, **nivëus** schneeweiss.
- Sparassis** Glucke, z. B. **crispa** krause, **brevipes** kurzstielige.

- Tricholöma** „Haarsäumling“, Ritterschwamm, z. B. **equestre** eig. Ritterschw., **prasinum** lauchgrüner, **pomönae** Obstb., **Columbetta** Tauben-, **tigrinum** Tiger-, **gambosum** Huf-, **saponacëum** Seifenschwamm, **nudum** nackter etc.
- Tuber** Trüffel, z. B. **cibarium** Speise-, **pallidum** bleiche, **fuscum** braune, **albëum** weisse etc.

## b. Giftige.

- Amanita** Wulstpilz, z. B. **muscaria** (*Agaricus muscarius*) Fliegenpilz, **pantherina** Pantherschw., **rubescens** Perlen-, **phalloides** Gichtschw., **solitaria**, **verna**, **excelsa**, **aspëra** etc.
- Boletus** **Satäna**s Satanspilz, **luridus** Sau- od. Schusterpilz, **lupinus** Wolfs-, **piperatus** Pfefferpilz, **pachypus** Dickfuss od. Bitterpilz, **radicans** wurzelnder, **calopus** Schönfuss-Röhrenpilz.
- Cantharellus** Faltenp. z. B. **aurantiacus** falsch. Eierschw.
- Cortinari** **traganus** Bocksgeruchp., Lilaschwamm.
- Galorrhoc** **insulsus** (*Agaricus* ins.) weissmilchender Reizker, geschmackloser Milchp., **torminosus** Birken-Reizker (-Rietsch Kumm.), **fuliginosus** Russ-M., **chryssorrhoc** Goldfuss-M., **théjogalus** Schwefel-M., etc.
- Gomphus** **glutinos.** schmier. „Keilpilz“, Schleimschw. (*Agaricus* glut.).
- Hypholöma** „Gewebsaum“, z. B. **fascicularis** Schwefelkopf, Bitterschwamm.
- Russüla** Reizker, Täubling, z. B. **emetica** Speiteufel, **furcata** Gabel-R., **rubra** roter, **heterophylla** (furcata var.).
- Tricholöma** „Haarsäumling“ z. B. **impolitum** glanzloser, **urens** brennend., **rutilans** rötlicher.

## V. Übersicht

des von **Bartling** und **Bischoff** verbesserten **de Candolle'schen Systems** (nach **Leunis-Frank's Synopsis des Pflanzenreichs**).

### A. Plantae vasculares, Gefäßpflanzen.

#### A. Phanerogamae L., Phanerogamen oder Samenpflanzen.

##### I. Kl. *Dicotyledonæae* Juss.

###### 1. Unterkl. *Choristopetalæae* DC. (*Polypetalæae* Juss.)

1. Ord. **Leguminosae** Juss.: 1. Fam. Mimosæae R. Br., 2. F. Caesalpiniæae R. Br., 3. F. Swartziæae DC., 4. F. Papilionacæae L. (Leguminosae J.) (Phyllobolæae u. Sarcobolæae).
2. Ord. **Rosifloræ** Bisch.: 5. Fam. Chrysobalanæae R. Br., 6. F. Amygdalæae Bartl. (Drupacæae DC.), 7. F. Spiraeacæae Kth., 8 F. Sanguisorbæae Lindl., 9. F. Rosacæae Spenn., 10. F. Pomacæae Lindl.
3. Ord. **Terebinthinae** Bartl. Balsamgew.: 11. F. Cassuviæae R. Br., 12. F. Connaracæae R. Br., 13. F. Amyridæae R. Br., 14. F. Aurantiacæae Corr. (u. Olacinæae Endl.), 15. F. Zygophyllæae R. Br., 16. F. Rutacæae Bartl., 17. F. Diosmæae A. Juss., 18. F. Xanthoxylæae A. Juss., 19. F. Simarubæae DC., 20. F. Ochnacæae DC.
4. Ord. **Tricoccae** Bartl. Schneller: 21. F. Staphyleacæae Lindl., 22. F. Hippocrateacæae Kth., 23. F. Celastrinæae R. Br., 24. F. Pittosporæae R. Br., 25. F. Aquifoliacæae DC., 26. F. Rhamnæae R. Br., 27. F. Bruniacæae R. Br., 28. F. Empetræae Nutt., 29. F. Euphorbiacæae Juss., 30. F. Stackhousæae R. Br.
5. Ord. **Malpighinae** Bartl.: 31. F. Rhizobolæae DC., 32. F. Hippocastanæae DC., 33. F. Sapindacæae Juss., 34. F. Erythroxylæae Kth., 35. F. Coriariæae DC., 36. F. Acerinæae DC., 37. F. Malpighiacæae Juss.
6. Ord. **Ampelidæae** Bartl.: 38. F. Cedrelæae R. Br., 39. F. Meliacæae Juss., 40. F. Leeacæae Bartl., 41. F. Sarmenacæae Vent. Reben.
7. Ord. **Gruinales** Bartl. Schnabelpfl.: 42. F. Oxalidæae DC., 43. F. Linæae DC., 44. F. Geraniacæae DC., 45. F. Tropaeolæae Juss., 46. F. Hydroceræae Blum., 47. F. Balsaminæae A. Rich.
8. Ord. **Columniferae** Bartl.: 48. F. Malvacæae Bartl., 49. F. Dombeyacæae Kth., 50. F. Hermanniacæae Kth., 51. F. Büttne-Glaser, Botan. Taschenwörterbuch. 31

- riacëae R. Br., 52. F. Sterculiacëae Kth., 53. F. Tiliacëae Kth., 54. F. Dipterocarpëae Blum.
9. Ord. **Lamprophyllae** Bartl.: 55. F. Chlaenacëae P.-Th., 56. F. Ternstroemiacëae DC., 57. F. Camelliacëae DC. (Theacëae Rchb.).
10. Ord. **Myrtinae** Bartl.: 58. F. Myrtacëae R. Br., 59. F. Lecythidëae Rich., 60. F. Melastomacëae Don, 61. F. Memecylëae DC.
11. Ord. **Calycanthinae** Bartl.: 62. F. Calycanthëae Lindl., 63. F. Granatëae Don.
12. Ord. **Calyciflorae** Bartl.: 64. F. Combretacëae R. Br., 65. F. Voehsiacëae Mart., 66. F. Rhizophorëae R. Br., 67. F. Philadelphëae Don, 68. F. Onagrariae Juss., 69. F. Lythriacëae Juss., 70. F. Haloragëae R. Br.
13. Ord. **Succulentae** Bartl. (Corniculatae Rchb.): 71. F. Cunoniacëae R. Br., 72. F. Saxifragëae Vent., 73. F. Crassulacëae DC. (Sedëae Rchb.), 74. F. Ficoïdëae Juss. (Aizoïdëae Spr.), 75. F. Nitrariacëae Lindl.
14. Ord. **Caryophyllinae** Bartl. Wendl.: 76. F. Silenëae Bartl. Nelken, 77. F. Alsinëae Bartl. Mieren, 78. F. Portulacëae Bartl., 79. F. Paronychiëae St. Hil. (Illecebrëae DC.), 80. F. Scleranthëae Lk., 81. F. Phytolaccëae R. Br., 82. F. Amaranthacëae R. Br., 83. F. Chenopodiacëae DC. (Atriplicëae Rchb.).
15. Ord. **Guttiferae** Bartl.: 84. F. Garciniëae Bartl. (Clusiëae Rchb. Canellëae DC.), 85. F. Hypericinëae DC., 86. F. Frankeniacëae St. Hil. Salzpfl.
16. Ord. **Cistiflorae** Bartl.: 87. F. Tamariscinëae Desv., 88. F. Parnasiëae Rchb., 89. F. Droseracëae DC., 90. F. Sarraceniëae Turp. Kannenträger, 91. F. Sauvagesiëae Bartl., 92. F. Violariëae DC., 93. F. Cistinëae DC., 94. F. Bixinëae Kth., 95. F. Margravieëae Juss., 96. F. Flacourtiacëae Rich.
17. Ord. **Peponiferae** Bartl.: 97. F. Nopalëae s. Cactëae DC., 98. F. Grossulariëae s. Ribesiacëae DC., 99. F. Escalloniëae R. Br., 100. F. Cucurbitacëae Juss., 101. F. Loasacëae Juss. Brennwinden, 102. F. Turneracëae DC., 103. F. Malesherbiacëae Don, 104. F. Passiflorëae Juss., 105. F. Papayacëae Mart. Melonenbäume, 106. F. Homalinëae R. Br., 107. F. Samydëae Gärt. Birkenpflaumen.
18. Ord. **Rhoeadëae** Bartl.: 108. F. Cappariidëae Vent., 109. F. Cruciferae Juss. (Siliquosae, Latiseptae s. Siliculosae, Angustiseptae, Nucamentaceae, Lomentaceae), 110. F. Papaveracëae DC., 111. F. Fumariacëae DC., 112. F. Resedacëae DC., 113. F. Polygalëae Juss. Bitterlinge, 114. F. Tremandracëae R. Br.
19. Ord. **Hydropeltidëae** Bartl.: 115. F. Nymphaeacëae Bartl., 116. F. Nelumbonëae Bartl., 117. F. Cabombëae Rich. Haarnixen.
20. Ord. **Polycarpicae** Bartl.: 118. F. Ranunculacëae Juss., 119. F. Paeoniacëae Bartl., 120. F. Dilleniacëae DC., 121. F. Magnoliacëae DC. (Illiciëae DC. Rchb.)
21. Ord. **Trisepalae** Bartl.: 122. F. Anonacëae Rich., 123. F. Myristicëae R. Br. Muskatnussartige.
22. Ord. **Cocculinae** Bartl.: 124. F. Menispermëae Juss., 125. F. Berberidëae Vent.
23. Ord. **Umbelliflorae** Bartl. Schirmblüter: 126. F. Hamamelidëae R. Br. Zaubersträucher, 127. F. Hederacëae A. Rich. (Cornëae DC.), 128. F. Araliacëae Juss., 129. F. Umbelliferae Juss. (Umbellatae L.) (Orthospermae, Campylospermae, Coilospermae).
24. Ord. **Loranthae** Bartl.: 130. F. Loranthacëae Don Mistelartige.

2. Unterkl. **Gamopetalae** DC. (**Monopetalae** Juss.)

25. Ord. **Ligustrinae** Bartl. (Oleaceae Lindl.: 131. F. Oleinae Lk. (Oleinae u. Fraxinae), 132. F. Jasminae R. Br.
26. Ord. **Rubiaceae** Bartl. (Rubiaceae Juss.): 133. F. Viburnae Bartl. Holdergew., 134. F. Caprifoliaceae Bartl. (Lonicerae R. Br.), 135. F. Cinchonaceae Lindl. (Coffeina u. Cinchona), 136. F. Stellatae L. (Ophiorrhizae, Hameliaceae, Genipae), 137. F. Lygodysoideaceae Bartl. Stinkschlingsträucher.
27. Ord. **Contortae** Bartl.: 138. F. Loganiaceae R. Br., 139. F. Apocynae R. Br., 140. F. Asclepiadaceae R. Br., 141. F. Gentianeae Juss.
28. Ord. **Tubiflorae** Bartl.: 142. F. Boraginaceae Juss. (Asperifoliae scharfblättr. u. Tournefortia), 143. F. Hydrophyllae R. Br., 144. F. Solanaceae Rchb. (Solanee Beeren-, Daturae Kapselfr.), 145. F. Cuscutae Presl, 146. F. Convolvulaceae Vent., 147. F. Hydroleaceae R. Br. Klebergew., 148. F. Polemoniaceae Vent.
29. Ord. **Labiatiflorae** Bartl. (Personatae u. Nuculiferae): 149. F. Bignoniaceae R. Br., 150. F. Acanthaceae R. Br., 151. F. Labiatae Juss., 152. F. Verbenaceae Juss., 153. F. Selaginiae Juss., 154. F. Myoporinae R. Br., 155. F. Sesameae DC., 156. F. Cyrtandraceae Jacq., 157. F. Gesneriaceae Rich., 158. F. Orobanchae Juss., 159. F. Scrophularinae R. Br. (Personatae u. Rhinanthaceae Juss.) (Verbascum, Antirrhina, Veronica, Rhinantha, Crescentiacea), 160. F. Lentibulariae Rich. (Utriculariaceae Seub.)
30. Ord. **Myrsinaceae** Bartl. Myrrhen: 161. F. Primulaceae Vent., 162. F. Ardisiaceae Juss.
31. Ord. **Styracinae** Bartl.: 163. F. Sapotae R. Br. DC., 164. F. Ebenaceae Juss., 165. F. Styracaceae Rich.
32. Ord. **Ericinae** Bartl.: 166. F. Epacridae R. Br., 167. F. Ericae R. Br. (Arbutum, Erica, Pirola, Rhododendron s. Rhodoraeeae), 168. F. Monotropae Nutt. Ohnblätter, 169. F. Vacciniaceae DC.
33. Ord. **Campanulinae** Bartl.: 170. F. Campanulaceae DC., 171. F. Lobeliaceae Juss., 172. F. Stylidaceae R. Br., 173. F. Goodevinae R. Br.
34. Ord. **Compositae** Bartl.: 174. F. Synantherae Rich. (Cassiniaee Sch. Bip. Syngenesia L.) Röhrenbeutelige (Corymbiferae Vaill. DC. od. Radiatae Juss., Cynarocephalae Juss. s. Capitatae L., Cichoriaceae Rchb. s. Ligulatae L.), 175. F. Ambrosiaceae Lk. Spitzkletten, 176. F. Calycerae R. Br. Kelchhornartige.
35. Ord. **Aggregatae** Bartl.: 177. F. Valerianaceae DC., 178. F. Dipsacae DC., 179. F. Globulariaceae DC., 180. F. Plumbaginaceae Vent., 181. F. Plantaginaceae Vent.

3. Unterkl. **Monochlamydeae** DC. (**Apetalae** Juss.)

36. Ord. **Proteinae** Bartl.: 182. F. Proteaceae R. Br., 183. F. Aquilariaceae R. Br. Adlerhölzer, 184. F. Thymelaeaceae Juss., 185. F. Elaeagnae R. Br., 186. F. Santalaceae R. Br., 187. F. Laurinae Vent.
37. Ord. **Fagopyrinae** Bartl.: 188. F. Nyctaginaceae DC., 189. F. Polygonaceae Juss., 190. F. Begoniaceae R. Br.
38. Ord. **Urticinae** Bartl.: 191. F. Urticaceae Bartl., 192. F. Artocarpae

- Bartl. (Morëae, Artocarpëa u. Platanëae), 193. F. Monimiëae Juss. Trommelbaumartige.
39. Ord. **Iteoidëae** Bisch. Weidenartige: 194. F. Balsamifüae Blum., 195. F. Salicinëae Rich.
40. Ord. **Amentacëae** Bartl. Kätzchenträger: 196. F. Ulmacëae Mirb., 197. F. Juglandëae DC., 198. F. Cupulifërae Rich., 199. F. Betulacëae Bartl., 200. F. Myricëae Rich., Gageln, 201. F. Casuarinëae Mirb. Keulenbäume.
41. Ord. **Conifërae** Bartl.: 202. F. Taxinëae Rich., 203. F. Cupressinæ, Rich., 204. F. Abietinëae Rich., 205. F. Cycadëae Rich. Zapfenpalmen.
42. Ord. **Piperinae** Bartl.: 206. F. Chloranthëae R. Br. Pflaumenpfefferartige, 207. F. Piperacëae Rich., 208. F. Saururëae Rich.
43. Ord. **Aristolochiëae** Bartl.: 209. F. Taccacëae Presl Arrowrootgew., 210. F. Asarinëae R. Br., 211. F. Cytinëae Brongn. Hypocistgew., 212. F. Balanophorëae Rich. Kolbenschosser.
44. Ord. **Ceratophyllinae** Bisch.: 213. F. Ceratophyllëae Gray, 214. F. Nepenthëae Lindl. Kannenträger.

## II. Kl. *Monocotyledonëae* Juss.

### 1. Unterkl. *Symphysogynae* A. Rich. (verwachsenweibige).

45. Ord. **Hydrocharidïnae** Bisch. Nixenkräuter: 215. F. Hydrocharidëae DC.
46. Ord. **Scitaminëae** Bartl. Gewürzlilien: 216. F. Musacëae DC., 217. F. Cannacëae Ag., 218. F. Amomëae Rich. (Zingiberacëae Ingwergew.).
47. Ord. **Orchidïnae** Bisch.: 219. F. Orchidëae Juss. (phyllocaulae, gymnocaulae, exoticae s. epiphytae).
48. Ord. **Ensätæ** Bartl. Schwertblättrige: 220. F. Bromeliacëae Lindl. Ananasingew., 221. F. Amaryllidëae R. Br. (ohne u. mit Nebenkronen), 222. F. Iridëae R. Br., 223. F. Haemodora-cëae R. Br. Blutwurzarzt., 224. F. Hypoxidëae R. Br. Härtlinge, 225. F. Burmanniacëae Bartl.

### 2. Unterkl. *Eleutherogynae* A. Rich. (freiweibige).

49. Ord. **Liliacëae** Bartl.: 226. F. Dioscorëae R. Br. Yamswurzelart., 227. F. Smilacëae R. Br., 228. F. Colchicacëae DC., 229. F. Asphodelëae Bartl. Affodillilien (Zwiebelknollige u. Faserknollige).
50. Ord. **Palmae** Bartl.: 230. F. Palmae L. (Coryphëae Fächer-, Phoenicëae Fieder- u. Calamëae Rotangpalmen).
51. Ord. **Aroidëae** Bartl.: 231. F. Typhacëae DC. Rohrkolben, 232. F. Pandanëae R. Br. Palmkolben, 233. F. Orontiacëae Bartl. Kalmusgew., 234. F. Callacëae Bartl.
52. Ord. **Helobiae** Bartl. Sumpflilien: 235. F. Butomëae Rich. Blumenbinsen, 236. F. Alismacëae Rich. Froschlöffel, 237. F. Juncaginëae Rich. Binsenartige, 238. F. Podostemëae Rich. Stiefaden, 239. F. Najadëae A. Rich. (Potamogëae DC.) Najaden od. Laichkräuter, 240. F. Lemnacëae DC. Wasserlinsen.
53. Ord. **Juncinæ** Bartl. Gras- od. Schilflilien: 241. F. Commelynacëae R. Br., 242. Xyridëae Kth Degenkräuter, 243. F. Restiacëae R. Br. Strickgräser, 244. F. Juncacëae Binsen od. Halbgräser.



54. Ord. **Glumacéae** Bartl. Balg- od. Spelzblütige: 245. F. Cyperacéae DC. (Cyperéae, Scirpeae Simsen, Caricéae Seggen), 246. F. Graminéae Juss. Gräser (Süssgr.-) (Rispengräser u. Ährengr.-).

## B. Cryptogamae L. (Acotyledonéae Juss.) Kryptogamen oder Sporenpflanzen.

### III. Kl. *Cryptogamae vasculares, Gefüsskryptogamen.*

55. Ord. **Goniocaulae** DC. Gliederfarne: 247. F. Equisetacéae DC. Schaft- halme.  
 56. Ord. **Filicéae** DC. Farne: 248. F. Rhizocarpéae Batsch Wurzel- od. Wasserfarne, 249. F. Isoëtéae Bartl. (Selaginelléae Frank), 250. F. Lycopodiacéae DC. Bärlappe od. Moosfarne, 251. F. Ophioglosséae R. Br. Natterzungen, 252. F. Filices Juss. Farnkräuter, Wedel- od. Laubfarne (Marattiacéae Kaulf., Osmundacéae R. Br., Schizaeacéae Mart., Gleicheniacéae Kze., Cyatheacéae R. Br. Baumf., Parkeriacéae Hook., Polypodiacéae Mett.).

## B. Plantae cellulares, Zellenpflanzen.

### IV. Kl. *Cryptogamae cellulares, Zellenkryptogamen.*

#### a. Foliosae, beblätterte.

57. Ord. **Muscinae** DC. Moose: 253. F. Musci Juss. Laubmoose (M. frondosi, Bryinae Schimp. (a. Stegocarpi Deckelfrücht., b. Cleistocarpi Schliessfrücht., c. Schistocarpi C. Müll. Spaltfrücht.), 254. F. Sphagnacéae C. Müll. (Sphagninae Schimp.) Torfmoose, 255. F. Anthocerotéae Nees Fruchthornmoose, 256. F. Ricciacéae Rchb., 257. F. Hepaticae Juss. Lebermoose.  
 58. Ord. **Siphonocaulae** Bisch. Röhrenalgen: 258. F. Characéae Rich.: Armleuchter.

#### b. Aphyllae, blattlose.

59. Ord. **Alginae** Bartl.: 259. F. Lichēnes DC. (a. Gymnocarpi, b. An- giocarpi, c. Collemacéi, d. Byssacéi), 260. F. Algae DC. (a. Floridéae Ag. s. Rhodosperméae Harv. Blüten- od. Rot- tange, b. Fucoidéae Ag. s. Melanosperméae Harv. Leder- od. Schwarz- tange, c. Confervacéae Ag. Fadenalgen, d. Siphon- néae Grev. Schlauchalgen, e. Palmellacéae Näg. Zitteralgen, f. Conjugatae Vauch. Jochalgen, g. Diatomacéae Harv. Stückelalgen, h. Phycochromacéae Rabenhorst Phycochrom- haltige).  
 60. Ord. **Funginae** Bartl. (Mycetes Spr.) Pilze: 261. F. Hymenomycetes Fr. Hautp. (Hutp.), 262. F. Pyrenomycetes Fr. Kernp., 263. F. Gasteromycetes Fr. Bauchp., 264. F. Hyphomycetes Fr. Fadenp., 265. F. Coniomycetes Fr. Staubpilze (Brand, Rost etc.).

## Nachzutragen:

- S. 4: **antidrom** (Gegens. zu homodrom) gegenläufig (s. homodromia).  
 „ 11: **convergens** zusammenneigend, „convergent“.  
 „ 13: **delphinialis** aus der Dauphinée (Frankr.).  
 „ 15: **dipyrenus** mit zwei Steinkernen (näml. drupa).  
 „ 15: **divergens** auseinanderlaufend.  
 „ 17: **eximius** aussergewöhnlich, ausgezeichnet.  
 „ 23: **homodrom** gleichläufig (s. sogl.).  
 „ 26: **latipes** breitfüssig, -stielig.  
 „ 34: **orthostichus** m. senkr. Blattzeile (Blattstellung).  
 „ 34: **ortus** Aufgang, Entstehung (v. orior 4).  
 „ 35: **parallelinervius** parallel- od. streifenförmig (Blatt).  
 „ 38: **phycoxanthinum** Tangelbstoff (*φύκος* u. *ξανθός*).  
 „ 38: **pinax** (*πίναξ*, -*αξος*) Brett, Tafel, Gemälde.  
 „ 40: **polypyrēnus** mit vielen Steinkernen (s. pyrēna).  
 „ 42: **quintuplinervius** fünfnervig (näml. Blatt).  
 „ 44: **rhachis** Blattspindel d. Fiederblätter (*ράχις* Rückgrat).  
 „ 54: **triplinervius** dreinervig, -rippig (Blatt).  
 „ 383: **Coir** (Roya, Kokosfaser) *Cocos nucifera*.  
 „ 383: **Copra** (Kopperah, Kokosnusskerne) *Cocos nucifera*.

## Wesentlichere Druckfehler.

- |   |   |
|---|---|
| <p>S. 57: visigēnus st. vitigēnus.<br/>         „ 75: Kletten = Labkraut st. Kletten-Labkr.<br/>         „ 85: Bainster st. Banister.<br/>         „ 99: Butaceae st. Rutaceae.<br/>         „ 99: arobescens st. arborescens.<br/>         „ 130: Botrytus st. -tis.<br/>         „ 184: Glycesia st. -ceria.<br/>         „ 190: -ähren = Acanthus st. -ähren-Acanth.<br/>         „ 222: Kiefer st. Kieser.<br/>         „ 244: <i>Ανξία</i> st. <i>Ανξία</i>.</p> | <p>S. 264 unten: „Muschia“ st. „Muschel“.<br/>         „ 266 oben: berry-Myrte st. -myrtle.<br/>         „ 273 oben: Noissetia XXI. 6. st. XIX. 6.<br/>         „ 287: hermesina st. kermesina.<br/>         „ 288: <i>πελεκος</i> st. -<i>χυς</i>.<br/>         „ 294 unten: <i>φοίνιξ</i> st. <i>φοίνιξ</i>.<br/>         „ 298 oben: Strombus st. Strobilus.<br/>         „ 299 unten: Plantaneen st. Plat.-blättrig.<br/>         „ 316 unten: kochblättrig st. kahlblättrig.<br/>         „ 386: Coriari st. -ria.</p> |
|---|---|

# Werke zur Botanik

aus dem Verlage von

T. O. Weigel in Leipzig.

---

Aus der reichen Sammlung der zumeist wissenschaftlich gehaltenen Werke meines Verlags hebe ich **einige** hervor, welche auch von **allgemeinerem Interesse** sind.

Zu den **Tafelwerken älteren Ursprungs** bemerke ich, dass die **Farben der kolorierten Abbildungen** nicht mittels der Druckpresse, sondern **mit der Hand aufgetragen** sind, wodurch die Abbildungen ein wirklich **künstlerisches Gepräge** erhalten. Hinsichtlich der Schönheit und **Naturtreue** überragen diese handkolorierten Werke die Erzeugnisse der Druckpresse natürlich ganz ausserordentlich.

---

**Briefe über Humboldt's Kosmos.** Ein Kommentar zu diesem Werke für gebildete Laien, bearbeitet von *B. von Cotta, Julius Schaller, W. C. Wittwer* und *H. Girard*. 4 Teile mit Supplement (Biographie Humboldt's, herausgegeben von Dr. Wittwer), **also 5 Bände**, mit Karten, lith. Tafeln und vielen Holzschnitten. Ermässigtter Preis (früher 46 M 50 ¢)

👉 10 Mark. 👈

Ein vortrefflicheres, gediegeneres Werk kann für so mässigen Preis schwerlich geboten werden.

---

In einer kleinen Anzahl von Exemplaren sind noch vorhanden:

**Deutschlands Flora oder Botanisches Taschenbuch.** Von **G. F. Hoffmann**. 2 Teile in 3 Abteilungen. Mit 38 handkolorierten Kupfern. 1800—1804. Ermässigtter Preis (früher 18 M.) 4 M. 50 ¢

**Deutschlands Gräser und Getreidearten** zu leichter Erkenntnis nach dem Wuchse, den Blättern, Blüten und Früchten zusammengestellt und für die Land- und Forstwirtschaft nach Vorkommen und Nutzen ausführlich beschrieben von Dr. **Carl F. W. Jessen**. Mit 208 Holzschnitten. 1869. 5 M. 40 ¢

**Taschenbuch für Gartenfreunde.** Eine Erläuterung von 1960 Zierpflanzen nach natürlichen Familien geordnet und mit Nachweisungen zu ihrer Kultur versehen von **H. G. L. Reichenbach**. 1827. Ermässigtter Preis (früher 3 M.) 1 M.

- Dobhoff, Über die Drainage.** Ein Beitrag z. wissensch. Begründ. u. z. prakt. Ausführg. dieses Systems andauernder Bodenverbesserung etc. 1851. 75 S.
- Drejer, S., Symbolae caricologicae etc.** Mit 17 Taf. u. 3 Tab. 1844. 15 M.
- Hedwig, R. Ad., Observationum botanicarum Fasc. I.** Mit 11 kolor. Tafeln. 1802. 3 M.
- Hoffmann, G. F., Deutschlands Flora,** od. botan. Taschenbuch. 2 Teile mit 38 kol. Tafeln. 1800—1804. 3 M.
- v. Holleben. Aufforstung verödeter Muschelkalkberge** unter Anknüpfung an d. Verhältn. im Fürstent. Schwarzburg-Rudolstadt. 2. Aufl. 1862. 1 M.
- Jacquin, Nic. Jos., Plantarum rariorum horti Caesarei Schönbrunnensis descriptiones et icones.** Mit 500 kolor. Taf. 4 voll. 1797—1804. 240 M.
- **Oxalis.** Monographia, iconibus illustrata. Mit 81 kolor. Tafeln. 1794. (Einziges noch vorhand. Expl.) 120 M.
- Ledebour, C. Fr., Icones plantarum novarum vel imperfecte cognitarum, florum Rossicam, imprimis Altaicam, illustrantes.** 5 tomi. Mit 590 kolor. Tafeln. 1829—1834. 225 M.
- v. Martius, C. Fr. Ph., Genera et species palmarum** quas in itinere per Brasiliam annis 1817—1820 suscepto collegit etc. 3 voll. Mit 245 kol. Taf. u. d. Portr. d. Verf. 1823—1840. 1000 M.
- Mit schwarzen Kupfern 600 M.
- **Nova genera et species plantarum,** quas in itinere etc. 3 voll. Mit 300 kolor. Tafeln. 1823—1829. 300 M.
- **Icones plantarum cryptogamicarum,** quas in itinere etc. Mit 76 kolor. Tafeln. 1828—1834. 120 M.
- **Reise in Brasilien,** auf Befehl Sr. Maj. Max Joseph I. Königs v. Bayern, in den Jahren 1817—1820 gemacht u. beschrieben von Dr. J. v. Spix u. Dr. C. v. Martius. 3 Teile. Mit Atlas. 1823—1831. gr. 4. 100 M.
- **Pflanzen u. Tiere d. trop. Amerikas.** Mit 4 lith. Tafeln. 1831. 4 M. 50 S.
- Mettenius, G., Beiträge z. Botanik.** I. Heft. M. 6 lith. Taf. 1850. 2 M. 40 S.
- Paykull, Fauna Sueciae insulae.** 3 tomi. 1798—1800. 6 M.
- Persoon, C. H., Commentarius ad Jac. Chr. Schaefferi fungorum Bavaricae indigen. icones etc.** 1800. 8 M.
- **Mycologia Europaea etc.** I. II. III. 1. M. 30 kol. Taf. 1822—1828. Kart. 24 M.
- Petzholdt, Alex., Beitrag z. Kenntnis der Steinkohlenbildung etc.** Mit 1 Tafel. 1882. 1 M. 50 S.
- Pohl, J. E., Plantarum Brasiliae icones etc.** 2 tomi. Mit 200 kolor. Tafeln. gr. fol. 1827. (1830) et 1831. In Mappen. 240 M.
- **Dasselbe.** Pracht-Ausg. auf grossem Papier. 400 M.
- **Reise im Innern von Brasilien,** in den Jahren 1817—1821 unternommen. 2-Teile. 1837. 50 M.
- Reinsch, P. F., Contributiones ad algologiam et fungologiam.** I. Mit 131 Tafeln. 1875. Kart. 60 M.
- **Neue Untersuchungen über d. Steinkohle des Carbon, des Dyas u. Trias.** Mit 94 Tafeln. 1881. Kart. 50 M.
- **Mikrophotographien üb. d. Structurverhältnisse u. Zusammensetzung d. Steinkohle des Carbon etc.** 73 phot. Darstellgn. nebst einem landschaftl. Titelbilde. 1882. In Mappe. 60 M.
- **Dünnschliffe hierzu.** I. Serie zu 24 Stück 64 M. II. Serie zu 12 St. 36 M.
- Schäffer, J. Chr., Fungorum, qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur, icones, nativis coloribus expressae.** Ed. nova comm. aucta a C. H. Persoon. 5 tomi. Mit 330 kolor. Tafeln. 1800. 108 M.
- Schmidel, C. Chr., Icones plantar. Editio secunda.** 3 manipuli mit 75 kolor. Tafeln. 1793—1797. 60 M.
- **Vorstellung einiger merkwürdiger Versteinerungen etc.** Mit 24 kolor. Tafeln. 1793. 10 M.
- **Descriptio itineris per Helvetiam, Galliam et Germaniae partem anno MDCCLXXIII et MDCCLXXIV instituti.** Mit 2 Tafeln. 1794. 1 M.
- Swartz, Ol., Observationes botanicae, quibus plantae Indiae occidentalis etc. illustr. etc.** Mit 11 Taf. 1791. 2 M.
- **Flora Indiae occidentalis etc.** 3 Tle. mit 29 kol. Tafeln. 1797—1806. 15 M.
- **Icones plantarum incognitarum, quas in India occident. detexit atque delin. Ol. Swartz.** Fasc. I. Enth. Bog. A. B. mit 13 kolor. Taf. 1794—1800. 9 M.
- **Dispositio systematica muscorum frondosorum Sueciae.** Mit 9 kolor. Tafeln. 1779. 4 M.
- Wulfen, Xav., Plantarum rariorum descriptiones.** 1805. 1 M.
- **Cryptogama aquatica.** Mit 1 Tafel. 1803. 2 M. 25 S.



